Chir.
137 Kmib

Hoffa

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

LEHRBUCH

DER

FRACTUREN UND LUXATIONEN

FÜR

ÄRZTE UND STUDIERENDE.

BEARBEITET VON

DR. ALBERT HOFFA
PRIVATDOCENT DER CHIRURGIE AN DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG.

3. VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 408 TEXT-ABBILDUNGEN UND 29 COLORIRTEN TAFELN.

WÜRZBURG.
VERLAG UND DRUCK DER STAHEL'SCHEN K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-
BUCH- UND KUNSTHANDLUNG.
1896.

Überreicht vom Verfasser.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Alle Rechte — insbesondere das der Übersetzung
in fremde Sprachen — vorbehalten.

Vorrede zur 3. Auflage.

Die neue Auflage meines Lehrbuches habe ich, wie ein Vergleich mit der vorigen sofort zeigen wird, wirklich neu bearbeitet und verbessert. Bei der Neubearbeitung schwebte mir stets der Zweck vor, den ich schon von Anfang an bei Abfassung des Werkes im Auge hatte, dem praktischen Arzte einen wirklich brauchbaren Wegweiser auf dem für ihn so verantwortungsvollen Gebiete der Fracturen und Luxationen zu geben.

Ich habe demgemäss nicht nur die neuere Litteratur ausgiebigst berücksichtigt, sondern habe vor Allem aus derselben das praktisch Brauchbare herausgelesen und verwerthet. Besondere Beachtung musste natürlich auch den Erfahrungen geschenkt werden, die wir der modernen Unfallgesetzgebung auf unserem Gebiete in so reichem Maasse verdanken. Die Folgen der Fracturen und Luxationen stellen sich nach diesen Erfahrungen doch ganz anders dar, als wir dies bisher anzunehmen gewohnt waren. Ich habe mich bemüht, dem Arzte auch hier, soweit dies zur Zeit möglich ist, die nöthigen Anhaltspunkte zur Begutachtung der Unfallverletzten zu geben.

Schliesslich möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich auch den modernen Bestrebungen, die sich in der sogenannten mobilisirenden Behandlung der Gelenkfracturen mittelst Massage und Gymnastik und in der Einführung des Gehverbandes äussern, gerecht zu werden versucht habe. Im Allgemeinen bin ich der Ansicht, dass namentlich der Gehverband sich für den praktischen Arzt nicht eignet. In gut geleiteten Kliniken und Krankenhäusern mag derselbe am Platze sein; dem praktischen Arzte aber, der seine Patienten nicht ständig unter Controlle hat, kann ich das ambulante Behandlungsverfahren kaum empfehlen.

Eine Anzahl veralteter Figuren habe ich fortgelassen, dagegen eine grosse Anzahl (33) neuer hinzugefügt. Auch den Text habe

ich möglichst gekürzt, so dass trotz Einschaltung ganzer neuer Abschnitte der alte Umfang des Buches gewahrt geblieben ist.

Zahlreiche Aerzte haben mir über die frühere Auflage ihre grösste Anerkennung ausgesprochen und mir versichert, dass ihnen das Buch in der Praxis wirklich genützt hat. Ich hoffe und wünsche, dass auch diese neue Auflage sich recht viele Freunde erwerben möge.

Würzburg im Mai 1896.

Albert Hoffa.

Vorrede zur ersten Auflage.

Das vorliegende Werk ist dem Wunsche entsprungen, ein dem heutigen Stande unserer Wissenschaft entsprechendes Handbuch der practisch so ungemein wichtigen Lehre der Fracturen und Luxationen zu schaffen.

Den Lernenden soll es gründlich in den Gegenstand einführen, dem Arzte aber ein zuverlässiger Rathgeber in seiner Thätigkeit sein. Es ist daher nicht nur besondere Rücksicht auf die Pathologische Anatomie genommen, sondern auch die Differentialdiagnose eingehend besprochen und die Therapie so dargestellt worden, dass mit möglichst einfachen Mitteln möglichst vollkommene Resultate erzielt werden können.

Von den vielen in den letzten Jahren angegebenen neuen Verbandmethoden habe ich nur diejenigen aufgenommen, welche sich bewährt haben und vom Arzte selbst ohne besondere mechanische Hülfsmittel hergestellt werden können. Wer sich für die anderen Apparate interressirt, den verweise ich auf die Zusammenstellung derselben von *A. Schreiber* in der illustrirten Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik 1887.

„Anschauung ist die Seele des Unterrichtes". Diesem Erfahrungssatze getreu habe ich den Text durch möglichst zahlreiche eigene, den bekannten Lehrbüchern, dem Werke von *Gurlt,* sowie den betreffenden Kapiteln der Deutschen Chirurgie entnommene Zeichnungen illustrirt und die colorirten Tafeln hinzugefügt.

Diese letzteren sind nach meinen Skizzen von meinem Freunde, dem Sanitätsrath Dr. *B. Florschütz* aus Coburg in dankenswerthester Weise ausgeführt worden. Sie sollen dem Studirenden die äussere Form der verletzten Glieder einprägen helfen, ihn vor Allem aber auch über die Lage der gebrochenen oder verrenkten Knochen orientiren. Denn nur derjenige kann eine Therapie in rationeller Weise einleiten, welcher diese genau zu bestimmen weiss.

Ich muss diesen Tafeln eine Erklärung hinzufügen.

Es könnte nach denselben den Anschein gewinnen, als ob ich die Dislocation der Fragmente lediglich aus dem Muskelzuge ableiten wollte.

Dagegen muss ich mich ausdrücklich verwahren. Der Leser wird im Gegentheil finden, dass ich mich bei allen Fracturen bemüht habe, alle Verhältnisse zusammenzustellen, welche die Verschiebung der Fragmente begünstigen können.

Es ist aber nicht zu leugnen, dass den Muskeln nach vollständiger Zerreissung der den Knochen deckenden Weichtheile ein grosser Einfluss auf die Erhaltung der Dislocation zukommt.

Diese ist aber bei einer grossen Anzahl von Brüchen eine typische, häufig wiederkehrende, und so habe ich mich entschlossen, dieselbe darzustellen, in dem Gedanken, dass derjenige, welcher sich einen bestimmten Typus gemerkt hat, Abweichungen von diesem stets leicht erkennen wird.

Damit übergebe ich denn mein Werk der Oeffentlichkeit. Möge es in meinem Sinne der kranken Menschheit Nutzen bringen!

Würzburg im November 1887.

Albert Hoffa.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Die vorliegende zweite Auflage meines Lehrbuches der Fracturen und Luxationen hat vielfache Verbesserungen und Umarbeitungen erfahren. Vor allem war ich bestrebt, das Buch durch eingehende Berücksichtigung der in- und ausländischen neueren Litteratur auf der Höhe der Zeit zu erhalten. Die neu empfohlenen Behandlungsmethoden habe ich so viel als möglich an dem mir zu Gebote stehenden Material geprüft und sie dann aufgenommen, wenn sie sich praktisch bewährt haben. Der Anregung eines

verehrten Kritikers folgend, habe ich das Verständniss der selteneren Fracturen und Luxationen dadurch zu fördern gesucht, dass ich an den betreffenden Stellen kurze Krankengeschichten gut beobachteter und pathologisch-anatomisch gut analysirter Fälle eingefügt habe. Eine grössere Anzahl neuer Figuren (49) wird die Anschauung und die Auffassung des an sich doch immerhin spröden Stoffes wiederum mehr erleichtern, als dies schon in der ersten Auflage der Fall war.

Für das liebenswürdige Entgegenkommen meines Herrn Verlegers allen meinen Wünschen gegenüber gebührt demselben mein bester Dank.

Ich wäre glücklich, wenn sich mein Buch auch in seiner neuen Gestalt viele Freunde erwerben würde, und bitte alle meine Leser, mich auf etwaige Mängel, sowie auf wünschenswerthe Verbesserungen oder Ergänzungen aufmerksam machen zu wollen.

Würzburg im Dezember 1890.

Albert Hoffa.

Inhalts-Uebersicht.

Seite

Schädelbrüche . 1
Brüche der Gesichtsknochen 46
Luxationen des Unterkiefers 67
Brüche des Zungenbeines, des Kehlkopfes und der Trachea 75
Brüche der Wirbel 79
Luxationen der Wirbel 110
Fracturen des Brustbeines 129
Fracturen der Rippen 135
Luxationen der Rippen 148
Fracturen der Clavicula 150
Luxationen der Clavicula 168
Fracturen der Scapula 185
Luxationen des Schultergelenkes 194
Fracturen des Oberarmes 230
Luxationen des Ellenbogengelenkes 288
Fracturen des Vorderarmknochens 321
Luxationen im unteren Radio-Ulnargelenk 367
Luxationen der Hand 369
Brüche der Handknochen 375
Luxationen der Handknochen 381
Brüche des Beckens 407
Luxationen der Beckenknochen 424
Luxationen des Hüftgelenkes 427
Brüche des Oberschenkels 463
Brüche der Kniescheibe 525
Luxationen der Kniescheibe 553
Luxationen des Kniegelenkes 570

	Seite
Brüche des Unterschenkels	593
Luxationen des Talocruralgelenkes	650
Luxationen im Talotarsalgelenk	662
Isolirte Luxationen des Talus	672
Luxationen im Chopart'schen Gelenk	685
Luxationen des Calcaneus	701
Luxationen des Os cuboides	702
Luxationen des Os naviculare	702
Luxationen der Keilbeine	703
Luxationen der Metatarsalknochen	704
Luxationen der Zehen	706
Register	710

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Schädelbrüche.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Der Schädel besteht aus dem Schädeldach und dem Schädelgrund. Das Schädeldach, nach Art einer Kuppel gebaut, zeigt verschiedene Nähte, welche das Stirnbein, die Scheitelbeine, das Hinterhauptbein und die Schläfenbeine umgrenzen. In der Mittellinie verläuft die Sutura sagittalis, rechtwinklig zu ihr vorn die Sutura coronalis, hinten, sich in einem spitzen Winkel an sie anschliessend, die Sutura lambdoidea. Auf den steil abfallenden Seitenflächen des Schädels finden sich die bogenförmig verlaufenden Suturae squamosae. Abnorme Nähte, welche sogenannte Schaltknochen einschliessen, trifft man häufig in der Lambdanaht, seltener in der Coronal- und Sagittalnaht. Es ist wichtig, sich an das Vorhandensein dieser Nähte zu erinnern, da sie gelegentlich mit Fissuren des Knochens verwechselt werden können und verwechselt worden sind.

Sämmtliche Schädelknochen bestehen aus einer äusseren und einer inneren Tafel compacter Knochensubstanz, welche zwischen sich eine Spongiosa einschliessen. Die äussere Corticalis, Lamina externa, ist an gut entwickelten, normalen Knochen doppelt so dick wie die Lamina interna. Die spongiöse Substanz, die Diploë, besteht aus kleinen, mit einander communicirenden Zellen.

Die Dicke des Schädeldaches ist sowohl örtlich, wie individuell äusserst verschieden. Sie beträgt auf dem Scheitel eines kräftigen Mannes etwa 4—5 mm. Auf dem Scheitel laufen beide Corticalplatten der Knochen parallel. An der Stirn und dem Hinterhaupt, wo sie am kräftigsten sind, weichen sie schwach keilförmig auseinander.

An der Basis ist die Dicke der Knochen durchschnittlich geringer als an der Convexität. Vielfach bestehen dieselben hier nur

aus spongiöser Substanz, die zwischen zwei papierdünnen Blättern compacten Gewebes eingeschlossen ist. Diese dünnen, durchscheinenden Stellen finden sich vorzugsweise an den Gruben; sie sind von einander durch vorspringende massive Stützpfeiler getrennt und von zahlreichen Kanälen und Löchern durchsetzt. Die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit der einzelnen Theile der Schädelbasis wird dadurch sehr verschieden. Im Allgemeinen ist letztere viel spröder als das Schädeldach, dessen Knochenlagen ziemlich gleichmässig zusammengesetzt sind.

Der Schädel, als Ganzes, besitzt eine grosse Elasticität. Lässt man einen frischen Schädel auf den Boden fallen, so macht er mehrere Sätze, wie eine Billardball. Comprimirt man denselben langsam zwischen Schraubstöcken in einem Durchmesser, so vergrössern sich die andern um mehrere Millimeter. Wird die Elasticitätsgrenze überschritten, so bricht der Knochen an der schwächsten, resp. der am meisten gebogenen Stelle. Die Formveränderung ist bei frontalem Druck (Querdruck) grösser als bei sagittalem Druck (Längsdruck). Bei Querdruck bricht deshalb der Schädel schon bei geringerer Belastung als bei Längsdruck. Der senkrechte Durchmesser verändert sich bei Quer- und Längsdruck fast gar nicht. Der Elasticitätsmodulus der Schädelknochen entspricht nach *v. Bergmann* etwa dem des Messings. Die Tabula externa und interna besitzen einen gleichen Elasticitätscoëfficienten.

Die Knochen des kindlichen Schädels sind noch biegsamer und elastischer als die des erwachsenen Schädels. Ferner ist der kindliche Schädel ausgezeichnet durch die Dünne der Knochen, durch den Mangel von festen Nähten und durch den innigeren Zusammenhang der Dura mater mit der Innenfläche des Schädeldaches.

Das Schädeldach ist durch seine Form und exponirte Lage Verletzungen leicht zugänglich, der Schädelgrund dagegen vor solchen durch das ihn deckende Skelett des Gesichtes einerseits und mächtige Muskellagen andererseits mehr geschützt.

Frequenz der Schädelbrüche.

Die Brüche des Schädels sind im Frieden relativ seltene Verletzungen, indem sie nur 1,4 % aller zur Beobachtung kommenden Fracturen ausmachen. Im Kriege, und zwar im Belagerungskrieg, sieht man sie ungleich häufiger, da Rumpf und Gliedmassen hier in den Batterien Deckung finden. Sie erreichen dann eine Frequenz von 10 und 25 %. Der grösste Theil der Schädelbrüche bleibt auf das Schädelgewölbe beschränkt; ein anderer verbreitet sich über

Dach und Grund; ein dritter, und zwar der kleinste, gehört allein der Schädelbasis an.

A. Brüche des Schädeldaches.


Die Brüche des Schädelgewölbes sind in der Regel directe. Selten entstehen sie auf indirectem Wege in der Weise, dass zwischen der Fracturstelle und dem Ort der Gewalteinwirkung eine unveränderte Schädelstrecke liegt (*Perrin*, *v. Bergmann*). Die directen Brüche beschränken sich aber sehr oft nicht auf die Stelle der Berührung, sondern gehen über dieselbe hinaus. Man spricht dann von ausstrahlenden, irradiirten Fracturen.

Die verletzende, in der Regel stumpfe Gewalt kann in zweifacher Weise einwirken. Einmal ist es ein in Bewegung begriffener Körper, ein Schlag, Wurf oder Schuss, der den Schädel trifft; das andere Mal ist dieser selbst in Bewegung und fällt oder stösst dabei gegen einen harten, unnachgiebigen Gegenstand. Im Ganzen ist die Form der entstehenden Fractur abhängig von der Grösse der Berührungsfläche des brechenden Körpers und der Geschwindigkeit seiner Bewegung.

Man unterscheidet bezüglich dieser Formen der Convexitätsbrüche folgende Unterarten:

1) Fissurae, Spaltbrüche sind solche Zusammenhangstrennungen, welche den Knochen in Form von Linien, d. h. Rissen

Fig. 1.




oder Sprüngen, durchsetzen, vergleichbar den Sprüngen in einem Glas oder Teller. Sie verlaufen entweder einfach oder verästelt, über einen Knochen oder mehrere, überspringen die Nähte (Fig. 1)

oder setzen sich in ihnen, besonders gern bei jugendlichen Individuen, eine Strecke weit bis in die Basis hinein fort. Zu dem Begriff einer Fissur im engern Sinne gehört, dass ihre Ränder nicht klaffen. Am Schädel rechnet man jedoch auch diejenigen lineären Fracturen zu den Spaltbrüchen, deren Ränder sich nicht mehr vollständig berühren, aber glatt und scharf sind und unbeweglich einander gegenüber liegen. Der eine oder beide Ränder können dabei niedergedrückt, „deprimirt“ sein. Im Momente des Entstehens der Fissur hat jedesmal ein Klaffen der Knochenränder stattgefunden. Dies geht mit Sicherheit daraus hervor, dass man oft Haarbüschel in den Fissuren eingeklemmt sieht, ja Fälle beobachtet hat, in welchen beim Vorhandensein einfacher Fissuren Stücke von Kugeln, Hautfetzen und dergleichen im Gehirn gefunden wurden.

Die Fissuren kommen entweder allein für sich vor oder in Begleitung anderer Bruchformen, indem sie von einem Splitter- oder Stückbruch ausstrahlen. Sie entstehen durch die Einwirkung scharfer Instrumente oder durch stumpfe, rasch andringende Gewalten.

2. Stückbrüche sind solche Brüche, bei denen ein Knochenstück durch eine in sich selbst zurücklaufende, bald mehr bogen-


Fig. 2.



förmig, bald mehr winklig gekrümmte Bruchlinie aus dem Zusammenhang des Schädels gelöst ist (Fig. 2). Sie entstehen in gleicher Weise wie ein Theil der Fissuren durch stumpfe, rasch wirkende Gewalten (Granatsplitter).


3) Splitterbrüche (Fracturae comminutivae). Sie sind dadurch charakterisirt, dass eine grössere oder kleinere Partie des

Fig. 3.



Schädelgewölbes in mehrere, oft zahlreiche Fragmente von verschiedener Gestalt und Grösse zerschlagen ist (Fig. 3). Besitzen die einzelnen Fragmente eine gewisse Regelmässigkeit, indem sie

Fig. 4.




von einem gemeinsamen Mittelpunkt radienförmig ausstrahlen, so spricht man von Sternbrüchen (Fig. 4). Die Splitter können ganz gelöst sein oder noch theilweise an Weichtheilen festhängen.

Die einzelnen Splitter sind dabei oft fest ineinander gekeilt und schwer beweglich; ihr Zusammenhang kann aber auch umgekehrt ein sehr lockerer sein, ja sie können sogar während des Traumas oder kurz nachher von selbst herausgefallen sein. Am häufigsten findet man es, dass die Splitter mehr oder weniger nach innen gegen das Innere des Schädels hineingetrieben sind.

Von dem Splitterbruch nehmen oft Fissuren ihren Ausgang, die bis zur Basis verlaufen können. Die Splitterbrüche entstehen, wenn ziemlich spitze Körper den Schädel mit geringer Geschwindigkeit treffen, so dass sich die Wirkung der brechenden Gewalt auf die nächste Umgebung fortpflanzen kann. Durch Sturz aus der Höhe, durch Maschinengewalt oder durch grobes Geschütz zerfällt das Schädeldach zuweilen ganz in Scherben.

4) Lochbrüche. Bei denselben ist ein scharf umschriebenes Knochenstück aus dem Knochen glattwandig oder nur mit geringer Splitterung des Randes herausgeschlagen (Fig. 5 und Fig. 6). Sie entstehen vorzugsweise durch Schussverletzungen (Projectil à bout portant).


Fig. 5. (Aeussere Ansicht). Fig. 6. (Innere Ansicht).



Alle die eben aufgezählten Bruchformen betreffen entweder beide Tafeln des Schädels gleichmässig, indem die Fractur die ganze Dicke des Knochens durchsetzt, oder sie beschränken sich auf die Tabula externa oder interna. Sind beide Tafeln betroffen, so findet man die Tabula interna meist ausgedehnter fracturirt als die Tabula externa (Fig. 5 und Fig. 6 und Fig. 8 und 9). Diese Thatsache führte dazu, der Tabula interna den Namen Lamina vitrea beizulegen, indem man ihr eine grössere Sprödigkeit zuschrieb. Dem gegenüber wies jedoch *Luschka* nach, dass gleich dicke Scheiben der beiden Tafeln weder in ihrem Bau noch in ihrer Structur noch in ihrem Elasticitätscoëfficienten dif-

feriren. Ein Unterschied zwischen beiden Tafeln besteht nur in ihrer Dicke. Dieser Unterschied ist noch grösser, als es auf den ersten Blick scheint, indem die äussersten Gefässkanälchen der Vitrea so weit sind, dass man von einem Uebergang zur Diploë sprechen kann, während die Lamina externa keine solche Schwächung durch Kanäle erkennen lässt *(Merkel)*. Die Tabula interna bricht also leichter, da sie dünner ist als die externa. Es kommt hiezu noch ein Umstand, der in der gewöhnlichen Richtung der brechenden Gewalten zu suchen ist. Bei dieser wird die äussere Lamelle nur von dem andrängenden Fremdkörper, die innere aber von dem Fremdkörper plus dem ausgebrochenen Stück der äusseren Lamelle betroffen, so dass die ganze herausgebrochene Partie nothwendig die Form eines abgestumpften Kegels erhalten und die Lamina interna ausgiebiger splittern muss. Es gibt sich dies aus dem beistehenden Schema (Fig. 7). Lässt man einmal die brechende Gewalt nicht von aussen nach innen, sondern etwa vom Foramen occipitale magnum aus so einwirken, dass zuerst die Lamina interna und dann erst die Lamina externa getroffen wird, so kehrt sich das Verhältniss um: die Splitterung der L. interna wird geringer, die der externa bedeutender. *Teevan* hat dies durch Versuche an Leichen festgestellt. Man erkennt aber diese Thatsache auch sofort bei der Betrachtung von Schädelbrüchen, die durch eine Kugel entstanden sind und eine Ausschussöffnung besitzen. Letztere ist stets grösser als die Einschussöffnung.

Fig. 7.



Bei mässigen, von aussen einwirkenden Gewalten an Stellen, wo die Diploë ganz besonders massig entwickelt ist, kommt es vor, dass die äussere Tafel und die Diploë zertrümmert sind, während die innere Tafel unverletzt bleibt. Der hiebei stattfindende Mechanismus ist leicht verständlich.

Interessanter sind die Fälle, bei denen die Tabula externa intact bleibt und die Tabula interna isolirt bricht. Während die erstere nämlich zuweilen nur eine kleine Delle oder ringförmige Fissuren trägt, kann letztere von einem Punkt aus radienförmig gesprungen erscheinen, etwa wie eine Fensterscheibe,

die von einem Stein getroffen wurde (Fig. 8 und 9). Die Erklärung für dieses Factum hat ebenfalls *Teevan* gegeben. Stellen wir uns in der folgenden Skizze die Wölbung des Schädel-Segmentes vor und auf der Höhe desselben den Angriffspunkt einer mässigen Gewalt, so wird durch diese die convexe äussere Tafel abgeplattet, indem sich die Moleküle hier zusammenschieben, die innere, concave Lamelle wird dagegen gedehnt (Fig. 10). Es findet ganz dasselbe Verhältniss statt, als wenn man einen festen Stab über dem Knie bricht. Ebenso, wie hier der Bruch immer an der freien gedehnten Seite beginnt, wird in unserem Fall die Continuität zuerst in der Lamina interna aufgehoben. Wenn nun durch den Widerstand der Schädelknochen in diesem Momente die einwirkende Kraft erschöpft wird, so federt die verbogene, aber nicht gebrochene äussere Lamelle in ihre normale Lage zurück, und die T. interna ist allein gerissen.

Fig. 8. (Aeussere Ansicht)






Fig. 9. (Innere Ansicht).




Die Gewalten, welche solche isolirte Fracturen der Tabula interna hervorbringen, sind in der Regel stumpf wirkende, namentlich schwach auftreffende Projectile. Mit voller Kraft den Schädel treffende Kugeln bewirken

Fig. 10.



dagegen gerade das Gegentheil dieser isolirten Brüche, sie sprengen das ganze Schädeldach auseinander. Die knöcherne Schädelkapsel schliesst die an und für sich incompressible wasserreiche Gehirnmasse, die Blutgefässe und den Liquor cerebrospinalis ein. Ein langsam steigender Druck innerhalb dieser Kapsel kann dadurch ausgeglichen werden, dass der Liquor cerebrospinalis theils in den Subarachnoidealsack des Rückenmarks, theils in die Lymphbahnen ausweicht. Entsteht die Raumbeengung in der Kapsel aber sehr plötzlich, wie z. B. in unserem Falle durch das mit grosser Geschwindigkeit in die Kapsel eindringende Projectil, so hat der Liquor cerebrospinalis nicht Zeit auszuweichen.

Fig. 11.




Es wird vielmehr der hydrostatische Druck innerhalb der Kapsel plötzlich ganz bedeutend gesteigert und dadurch gewissermassen eine Explosion hervorgerufen, welche den Schädel in viele Splitter auseinandertreibt, wie dies bei dem Schädel der Fall war, der in Fig. 11 abgebildet ist.

In Folge dieser explosiven Wirkung der Kugel, resp. der Sprengwirkung des incompressiblen Gehirns erklären sich auch die sog. Contrafissuren, d. h. indirekte Brüche, welche dort entstehen, wo die Kugel gar nicht eingewirkt hat. Wir kommen auf diese Brüche später noch einmal bei den Basisfracturen zu sprechen.


Die **Dislocation** der gebrochenen Schädelstücke entsteht fast stets primär durch die Gewalt selbst und findet meist gegen die Tiefe der Schädelhöhle in Form einer Depression statt. Ist die ganze, von der Bruchlinie umschriebene Stelle eingedrückt, so spricht man von einer peripherischen Depression (Fig. 12 und 13); hält dagegen die Peripherie an der Umgebung noch fest, während das Centrum, trichterförmig nach unten abfallend, am tiefsten steht, so spricht man von einer centralen Depression (Fig. 14—16).

Fig. 12. (Aeussere Ansicht.)



Bei Splitterbrüchen können einzelne, meist aus der Lamina interna allein bestehende Splitter unter den zunächst gelegenen Bruchrand zwischen die harte Hirnhaut und das Schädeldach eingeschoben werden. In seltenen Fällen und vielleicht nur am kindlichen Schädel kann auch wohl durch heftige, den Schädel tangential treffende Gewalten gelegentlich einmal ein ganzes, aus dem Schädeldach in seiner ganzen Dicke herausgebrochenes Fragment vollständig unter die benachbarten Knochen dislocirt werden *(Braun)*.

Fig. 13. (Innere Ansicht.)



Wird durch die einwirkende Gewalt das herausgebrochene Knochenstück vom Körper des Kranken ganz fortgeschleudert, so entsteht ein Substanzverlust im Schädel.

Am kindlichen Schädel kommt es gelegentlich auch einmal zu einer Impression, ohne dass eine wirkliche Fractur vorausgegangen wäre.

Das Gehirn leidet bei diesen Fracturen in verschiedener Weise. Es kann der verletzende Körper in die

Masse desselben eindringen, oder es können sich die deprimirten Splitter mit ihren scharfen Rändern und Spitzen durch die Hirnhäute hindurch in dasselbe einspiessen. Ist ein grösseres Knochenstück in die Schädelhöhle getrieben, so vermag es durch Beschränkung des dem Hirn und seinen Adnexen angewiesenen Raumes bedeutende Störungen hervorzubringen, ebenso wie ein die Hirnoberfläche drückendes Blutextravasat, das aus den zerrissenen Aesten der Arteria meningea media oder den Gehirnsinus stammt. Selbst wenn in Folge der Elasticität des Schädels die Dislocation der Fragmente eine vorübergehende ist, können die im Momente der Verletzung abgeflachten und eingebogenen Knochen die zarte Sustanz des Hirnes zusammendrücken und zerquetschen.

Fig. 14.





Fig. 15.




Die Verletzung des Gehirnes gestaltet sich am bedenklichsten, wenn bei der Fraktur gleichzeitig auch die äusseren Bedeckungen durchtrennt wurden. Die Fractura simplex und complicata stehen sich hier streng gegenüber, weil durch die Weichtheilverletzung nicht nur die Knochenwunde, sondern auch die Hirnhäute einer septischen Infection von aussen zugänglich werden.

Symptome der Convexitätsbrüche.

Die Diagnose eines Schädelgewölbsbruches ist oft schwer, oft leicht zu stellen, je nachdem die Bruchstelle unserem Auge und dem tastenden Finger zugänglich ist oder nicht. Betrachten wir zunächst die **subcutanen** Fracturen.

Fig. 16.



Von subjectiven Symptomen kommen hier in Betracht der Bruchschmerz und die Empfindlichkeit bei Palpation der Bruchstelle. Der Schmerz ist im Allgemeinen ein dumpfer und soll den Kranken, auch wenn er bewusstlos ist zu unwillkürlichem Greifen nach der Bruchstelle veranlassen. Durch Berührung, Erschütterung des Kopfes, gewaltsame Bewegungen des Unterkiefers soll er deutlicher hervortreten. Objectiv lässt sich oft an der, Bruchstelle, im Umfange der einwirkenden Gewalt, eine als Folge der Hautverletzung auftretende ödematöse Anschwellung der Weichtheile, die sog. *Pott*'sche Kopfgeschwulst nachweisen, die man früher als pathognomonisch für Fissuren ansah.

Das einzig sichere Mittel, eine Fractura simplex zu erkennen, ist das Betasten der Schädeloberfläche mit den Fingern, wobei man gleichzeitig die Veränderungen, Quetschungen und Blutunterlaufungen in der Haut berücksichtigt. Man sucht so eine klaffende Bruchspalte, einen scharfen Bruchrand oder eine Depression zu entdecken. Crepitation und abnorme Beweglichkeit können nur erkannt werden, wenn ein Stück Knochen ganz herausgeschlagen oder in Splitter zertrümmert ist. Geringere Grade einer Depression können nur unter besonders günstigen Verhältnissen einigermassen sicher wahrgenommen, andererseits aber ausgesprochenere Dislocationen durch die geschwollenen Weichtheile maskirt werden.

Hüten muss man sich, Depressionen anzunehmen, wo keine vorhanden sind. Solche können vorgetäuscht werden: 1) durch ein Cephalhämatom, d. h. eine subperiostale, während der Geburt entstandene Blutunterlaufung bei Kindern, bei der sich nach einiger Zeit der Rand als harter Wall anfühlt. 2) Durch phlegmonöse Anschwellungen. Die anfangs gleichmässige Schwellung erweicht im Beginne der Eiterung, und man hat es dann wieder mit einem tieferen Centrum und einer härtlichen Peripherie zu thun. 3) Durch Eindrücke, die während der Geburt, durch frühere Traumen oder durch syphilitische Prozesse entstanden sind. 4) Durch locale Altersatrophie des Schädels und Unebenheiten zufolge eigenthümlicher Schädelbildung, wie sie besonders am Hinterkopf vorkommen. Bei sehr schwierigen Verhältnissen kann die Untersuchung mittelst der *Middeldorpf*'schen akidopeirastischen Nadel etwaige Zweifel lösen.

Eine eigenthümliche Folge subcutaner Schädelbrüche, namentlich an den Scheitelbeinen bei jungen Kindern, ist in seltenen Fällen die Entwickelung einer mehr oder weniger umschriebenen, mit Flüssigkeit erfüllten Geschwulst unter den weichen Schädeldecken. Es handelt sich hier entweder um eine subperiostale Ansammlung von Liquor cerebrospinalis in Folge einer mit dem Knochenbruch gleichzeitig einhergehenden Trennung der Hirnhäute, so dass die arachnoidealen Sinus eröffnet wurden, oder um eine cystische Degeneration eines bei der Verletzung entstandenen Blutextravasates, vielleicht auch um einen Lympherguss, wie er auch an den Extremitäten bei gewaltsamer Hautverschiebung vorkommt *(v. Bergmann)*. Die ursprünglichen Fissuren erweitern sich unter solchen Geschwülsten durch den Wachsthumsdruck des Gehirns allmählig zu grösseren Lücken, welche sich deutlich durch scharfe Knochenränder abgrenzen lassen. *Henoch* fand bei Sectionen solche Lücken, die von einer derben, mit der Dura und dem Pericranium verwachsenen Membran angefüllt waren, von denen wiederum Bindegewebsstränge in das Gehirn hineingingen. Die gesammte Casuistik, 43 Fälle bis zum Jahre 1894, hat *Eigenbrodt* zusammengestellt. Die Flüssigkeit kann spontan resorbiert werden oder es kann in frischen Fällen Heilung auch durch Punction erzielt werden. Bei älteren Patienten kann man, wie dies *Slajmer* zuerst mit Erfolg gethan hat, eine Radicaloperation durch Transplantation eines Knochenperiostlappens ausführen.

Die Diagnose einer Fractur wird leichter, wenn dieselbe eine **complicirte** ist. Schwierigkeiten bereiten dann nur haarfeine

Fissuren, da dieselben mit einer Knochennaht, einer Gefässfurche, einem angeklebten Haar verwechselt werden können. Man muss sich dabei auch an das Vorkommen der Schaltknochen erinnern, um keiner Täuschung zu verfallen. Die Fissuren wird man in frischen Fällen nach Reinwischen der Knochenoberfläche daran erkennen, dass Blut aus denselben heraussickert. Ihre Ausdehnung festzustellen ist oft nicht möglich, es sei denn, dass sie nach der Schädelbasis hin verlaufen und hier besondere Erscheinungen veranlassen.

In gleicher Weise kann man bei Stück- und Splitterbrüchen die Bruchlinie mit dem Auge und dem Finger verfolgen, die Bruchstücke fühlen und feststellen, ob die ganze Dicke des Knochens oder nur die äussere oder innere Tafel allein durchsetzt wurde. Man soll auch nie zu untersuchen versäumen, ob sich nicht vielleicht Splitter oder gar ein ganzes Fragment unter die Nachbarknochen heruntergeschoben haben.

Dieser Aufgabe vermag die Untersuchung oft nur unvollständig zu genügen. Man richtet sich dabei nach der Tiefe der Depression und erinnert sich der Thatsache, dass die Tabula interna meist ausgedehnter splittert als die Tabula externa. Ein isolirter Bruch der Tabula externa wird da wahrscheinlich, wo, wie an den Stirnhöhlen, eine mächtige Diploëschicht vorhanden ist.

Für die Annahme einer ausgedehnten Splitterung der Tabula interna bietet die Art und Weise der Gewalteinwirkung einen guten Anhaltspunkt. Je localisirter diese war, je enger also auch die Grenzen der Fractur sind, desto wahrscheinlicher, ja sicherer ist die Interna in zahlreichere und kleinere Fragmente zerschellt, als an der Aussenfläche sichtbar sind.

Isolirte Fracturen der Tabula vitrea mit Sicherheit zu erkennen, ist sehr schwierig. Man wird ihre Existenz vermuthen dürfen, wenn die losgesprengten Splitter bestimmte Gehirnerscheinungen erzeugen und ein Bruch der äussern Tafel sicher ausgeschlossen werden darf.

Substanzverluste innerhalb der Bruchstelle verrathen sich ebenso wie klaffende Spalten und weitere Abstände der einzelnen Fragmente durch die in Folge der Hirnbewegung entstehende Pulsation des Blutes, welches sich innerhalb der Wunde ansammelt, oder durch die Pulsation des Gehirns selbst. Diese Pulsationen des Gehirns sind durch die Dura mater hindurch sehr

deutlich wahrnehmbar. Sie fehlen nur unter einer ganz bestimmten Bedingung, nämlich bei zu starker Spannung der Dura. Das hat klar eine Beobachtung *Braun's* bewiesen, bei der die sehr schwache Gehirnpulsation sofort wieder ganz deutlich auftrat, als er bei einem Stückbruche des Schädeldaches das zwischen Dura und die benachbarten Knochen hineingeschobene Fragment extrahirt und damit die Spannung der Dura aufgehoben hatte. Diese Beobachtung aber fordert dazu auf, bei jedem complicirten Stück- oder Splitterbruch auf die Gehirnpulsation zu achten. Denn das Fehlen derselben beweist, dass die Dura entweder von aussen durch dislocirte Fragmente oder von innen durch einen Bluterguss abnorm gespannt wird.

Grössere Verletzungen der Dura mater erkennt man durch einen Vorfall der Gehirnsubstanz. Austritt von Liquor cerebrospinalis kommt bei den Brüchen der Convexität selten vor.

Bei der Stellung der Diagnose darf man nicht vergessen, dass dieselbe lediglich der Therapie halber geschieht. Man darf daher nie gewaltsame Manipulationen vornehmen, welche dem Kranken mehr schaden als nützen könnten. Vor allem ist vieles Sondiren zu unterlassen.

Der wichtigste Theil unserer Diagnose bei Schädelbrüchen bezieht sich auf die gleichzeitigen Störungen im Inhalt der Schädelhöhle, denn das klinische Bild eines Schädelbruches wird beherrscht durch die nervösen Störungen, die durch die Insulte des Gehirns bedingt sind und als Commotio, Compressio und Contusio cerebri bezeichnet werden.

I. Commotio cerebri, Gehirnerschütterung, Gehirnshoc.

Die Gehirnerschütterung ist, wie dies *Koch* und *Filehne* durch fortgesetzte schwache Hammerschläge auf Thierschädel nachweisen konnten, die Folge einer mechanischen Beleidigung sämmtlicher Gehirncentra durch die einwirkende Gewalt. Während man früher annahm, dass es sich wahrscheinlich um eine Umlagerung der Moleküle, sei es nun durch schwingende Bewegungen der einzelnen Elemente oder durch Andrängen der Gehirnmasse in toto gegen irgend einen Punkt der Schädelkapsel handelte, ist es heutzutage wohl festgestellt, dass die anatomische Unterlage der Commotio in einer nur mikroscopisch erkennbaren Quetschung kleinster Theile der Hirnsubstanz besteht, die sich auf einen grösseren Bezirk des Gehirnes erstreckt. Die Quetschung der Theilchen selbst entsteht dadurch, dass der

den Schädel treffende Stoss theils durch Vermittelung der Gehirnsubstanz selbst theils durch Vermittelung des Liquor cerebrospinalis fortgepflanzt wird. Circulationsstörungen spielen für das Zustandekommen der Commotio keine Rolle, nur für den Verlauf derselben sind sie von Belang. Hier ist an die Versuche zu erinnern, die *Albert* unternahm, um die Verhältnisse des Gehirnkreislaufes und des allgemeinen Blutdruckes bei der durch Verhämmerung des Schädels erzeugten Gehirnerschütterung zu controlliren. Bei diesen zeigte sich das interessante Ergebniss, dass der Verhämmerung eine Beschleunigung des aus dem Schädel abfliessenden Blutstromes unter Erhöhung des Blutdruckes und unter Eintritt einer Vagusreizung folgt.

Macht man die Section eines an Gehirnerschütterung Gestorbenen, so weist der anatomische Befund keine gröbere Läsion des Gehirns auf. Zuweilen findet man capilläre Apoplexieen in der Medulla oblongata, häufiger eine venöse Hyperämie der Gehirngefässe.

Die **Symptome** der Gehirnerschütterung deuten auf eine diffuse Affection des Gehirns, vor allem der Grosshirnrinde — Verlust des Bewusstseins — und der Medulla oblongata — Störungen der Respiration und Herzthätigkeit.

Man kann im Allgemeinen zwei Grade des Commotio, eine leichtere und eine schwerere, unterscheiden. Im Moment der Verletzung sinkt der Patient besinnungslos zu Boden. Er liegt da mit blassem Gesicht und fast reactionslosen Pupillen. Auf starke Reize hin, sei es auf Anschreien, sei es auf Lichtwirkung, öffnet Patient wohl die Augen oder zieht Arme und Beine unter schmerzlicher Verziehung des Gesichtes zurück, wenn man mit einer Nadel in sie einsticht. Die Respiration ist oberflächlich, der Puls kaum zu fühlen, klein, fadenförmig, in der Regel verlangsamt. An keinem Theil ist eine völlige Aufhebung von Sensibilität und Mobilität vorhanden. Die Temperatur ist in der Regel erniedrigt, doch kommen auch Fälle vor, die mit exquisiter Temperatursteigerung einhergehen. Dieselben bilden dann den Uebergang zur Contusio cerebri. In den leichteren Fällen dauert dieser Zustand nicht lange; der Puls hebt sich, die Athemzüge werden tiefer, und die Patienten erholen sich rasch. In den schwereren Fällen dauert die Bewusstlosigkeit länger, die Kranken reagiren dann auf keinen äussern Reiz mehr, die Extremitäten sind kühl, die oberflächliche Athmung wird zuweilen von tieferen, seufzerähnlichen Inspirationen unterbrochen, der Puls ist klein und verlangsamt, es tritt

Erbrechen ein, Harn und Koth gehen unwillkürlich ab, oder es erfolgt umgekehrt Retentio urinae. Im entleerten Urin lässt sich oft Eiweiss oder Zucker nachweisen. Nach oft stunden-, ja tagelanger Dauer dieses Zustandes kehren das Bewusstsein und die mit ihm gestörten Functionen wieder zurück, es folgt jedoch jetzt der überstandenen tiefen Depression ein Stadium der Erregung. Der Puls wird frequent und hart, die Haut fühlt sich heisser an, das Gesicht erscheint geröthet, die Pupillen eng, die Augen glänzend. Der Patient klagt über Kopfschmerzen, Unruhe und Schmerzen in allen Gliedern. In seltenen Fällen bleibt die Depression unverändert, und Patient stirbt im Coma.

Als Folge einer überstandenen Commotion bleibt öfter ein länger dauernder Diabetes insipidus oder auch wohl eine Ataxie, d. h. Unvermögen, coordinirte Bewegungen auszuführen, ferner Sprachstörungen, Störungen an den Augenmuskeln, namentlich aber Gedächtnissschwäche, zurück, so dass sich die Patienten zuweilen nach dem Erwachen nicht mehr an die Zeit vor und nach der Verletzung erinnern können.

Die Commotio cerebri ist oft combinirt mit den Erscheinungen des Hirndruckes und der Hirnquetschung. Je länger der comatöse Zustand des Erschütterten dauert, desto wahrscheinlicher hat die eine oder andere dieser Verletzungen stattgefunden.

II. Compressio cerebri, Hirndruck.

Der Hirndruck entsteht nur sehr selten durch ein deprimirtes Fragment. Man könnte dies vermuthen, wenn seine Symptome unmittelbar nach der Verletzung entständen. Meistens ist er die Folge einer Blutung, die aus der zerrissenen Arteria meningea media stammt. Der Sitz des Blutextravasates richtet sich nach dem Ort der Fractur. Entweder ist dasselbe diffus über die ganze Concavität der betreffenden Schädelhälfte ausgedehnt, oder es bleibt circumscript, scharf abgegrenzt in der Form eines Kreises oder eines Ovals (Fig. 16). Meist liegt es dann in der mittleren Schädelgrube (Hämatoma medium s. temporoparietale), seltener unter dem Tuber parietale (Hämatoma posterius s. parieto-occipitale) und am seltensten unter dem Tuber frontale (Hämatoma anterius s. fronto-temporale) (*Krönlein)*.

Da die Gehirnmasse nicht compressibel ist durch einen Druckwerth, wie ihn ein solches Blutextravasat darstellt — der Tod tritt ein bei einer Blutmenge von 60—240 gr —, so muss die Raumbeschränkung, die innerhalb des Schädels durch dasselbe

entsteht, auf anderm Wege ausgeglichen werden. Es geschieht dies in der Weise, dass zunächst die Gehirnflüssigkeit, der Liquor cerebrospinalis, aus dem Gehirn ausgedrückt wird, wie man aus einem Schwamm das Wasser ausdrückt. Er weicht aus, indem er durch das Foramen Magendii in den 4. Ventrikel, in den Rückenmarkskanal, in die Scheide der die Schädelkapsel verlassenden Nerven und die abführenden Lymphbahnen abfliesst. Wird der Druck innerhalb der Schädelkapsel so hoch, dass er die Spannung des Liquor cerebrospinalis überwiegt, so fallen nunmehr auch die Gehirngefässe der Compression anheim. Es werden nicht nur die venösen Gefässe, sondern auch die Capillaren und Arterien dauernd zusammengedrückt und die ins Gehirn einströmende und dasselbe durchfliessende Blutmenge auf ein Minimum herabgedrängt. Die Folge davon ist eine allmählich entstehende arterielle Anämie des ganzen Gehirns, die sich zunächst an der Hirnrinde und dann an den grossen Centren, und zwar vorzugsweise am Vaguscentrum und vasomotorischen Centrum geltend macht. Die Blutleere selbst bedingt zuerst eine Reizung, dann eine Lähmung dieser Gehirntheile, und gerade aus der regelmässigen Aufeinanderfolge dieser Reizungs- und Depressionserscheinungen lässt sich die Diagnose des Hirndruckes mit Sicherheit stellen.

Die eben geschilderte Ansicht über die Entstehung der Hirndrucksymptome ist die von *v. Bergmann* entwickelte. Neuere Untersuchungen haben nun diese Lehre ergänzt, indem sie zeigten, dass die Hirndrucksymptome nicht nur durch die vermehrte Spannung des Liquor cerebrospinalis, sondern ebenso auch durch eine vermehrte Spannung innerhalb der incompressibelen Nervensubstanz selbst erzeugt werden (*Kocher-Deucher*). Die erhöhte Spannung in diesen beiden Gebilden führt zunächst zu einer Entleerung der venösen Gefässe des Gehirns, dann hat sie ein Auspressen der Lymphbahnen zur Folge. Schliesslich kommt es zu einer völligen Compression der venösen Gefässe und damit zu einer völligen Unterbrechung der Circulation zunächst an dem primär gedrückten Gehirntheil, dann in der Gehirnrinde und schliesslich in der Medulla oblongata.

Der Endeffect der venösen Stase ist für die Ernährung des Gehirns natürlich derselbe, wie ihn die von *v. Bergmann* angenommene artielle Anämie hervorbringt und erklären sich daher die Hirndrucksymptome in vorher geschilderter Weise ungezwungen dadurch, dass die mangelhafte Circulation erst eine Reizung, dann eine Lähmung der betroffenen Gehirntheile erzeugt.

Die **Reizungsymptome** kommen nach der Verletzung mit allmählich zunehmender Intensität zum Vorschein. Unmittelbar nach der Verletzung kann der Patient scheinbar völlig gesund sein. Erst allmählich entwickeln sich die Symptome. Zunächst erscheint das Gesicht des Patienten geröthet; die Augen glänzen, die Pupillen sind eng. Der Patient klagt über Kopfschmerzen, leidet an starker Empfindlichkeit gegen Sinneseindrücke, an grosser Unruhe und Schlaflosigkeit. Dann kommt Erbrechen hinzu und als besonders charakteristisches Symptom eine bedeutende Verlangsamung des Pulses. Derselbe ist hart, voll und geht herunter auf 40 und weniger Schläge in der Minute (Vagusreizung). So charakteristisch nun auch dieser „Druckpuls“ ist, so ist doch besonders hervorzuheben, dass er bei ausgesprochenem Hirndruck fehlen kann; namentlich *Kocher* hat in jüngster Zeit Fälle publicirt, in denen bei typischem Hirndruck der Puls die ganze Zeit von normaler Frequenz oder sogar beschleunigt war. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass der Hirndruck mit Hirnquetschung complicirt sein kann. Es kann dann Fieber eintreten, und ein Puls von 60—70, der bei Normaltemperatur normal wäre, ist ein verlangsamter Puls bei 39^{0} Temperatur.

Ebenso wie mit dem Puls geht es auch mit der Respiration. In der Regel ist dieselbe tief, langsam, stertorös, doch kommen auch Fälle vor, bei denen sie unregelmässig, oberflächlich und rasch ist. Als ein weiteres Symptom, auf das man stets aufmerken soll, ist die Stauungspapille zu nennen. Man wird es nur selten vermissen.

Die Aufregung geht nun in das entgegengesetzte Symptom über, es entwickelt sich das **Depressionsstadium.** Die Verletzten werden unbesinnlich, liegen theilnahmslos da, sind anfangs noch durch starke Reize zu erwecken, verfallen aber bald einem vollständigen Coma. Koth und Urin werden zurückgehalten oder gehen unfreiwillig ab. Die Pupillen erweitern sich, der Puls wird frequent, die Athmung unregelmässig, entsprechend dem *Cheyne-Stocke*'schen Typus.

Zu diesem Bild der allgemeinen Drucksymptome gesellen sich meist noch locale Drucksymptome in Form isolirter Paresen Paralysen oder gar Convulsionen, also sogenannte Herdsymptome; dieselben können auf einen Arm, auf ein Bein beschränkt bleiben oder sich auf eine ganze Seite erstrecken. Es wird auch wohl eine Lähmung des Facialis, des Abducens, des Oculomotorius,

einseitige Pupillenerweiterung beobachtet. Wird keine Hülfe geschafft, so ist der Ausgang meist ein tödtlicher. Der Herzschlag erlischt in der Regel erst 1—2 Minuten nach dem Aufhören der Athmung.

Für die supraduralen Hämatome sind solche motorische Störungen in Form allmählig entstehender contralateraler Hemiparesen oder Hemiplegieen geradezu pathognomonisch; sie entstehen durch den Druck des Extravasates auf die psychomotorischen Centren.


III. Contusio cerebri, Gehirnquetschung.

Die Quetschung des Gehirns geschieht im Momente der Verletzung durch momentane, sich sofort wieder ausgleichende Depressionen oder durch in das Gehirn eingedrungene Splitter oder Fremdkörper. Es zerreissen dadurch die Parenchymgefässe des Hirns, ebenso wie dessen Zellen zerstört werden. In den geringeren Graden der Quetschung erscheint das Hirn von dichtstehenden kleinen, oft nur punktgrossen Extravasaten durchsetzt, in den stärkeren ist es zertrümmert und bildet einen aus Blut und Gewebselementen bestehenden Brei. Ausser diesen Blutungen in das Hirn findet man stets auch erhebliche Meningealblutungen. Erfolgt keine Wundinfektion, so werden die Zerfallsprodukte resorbirt, es bildet sich eine Narbe, oder es stellt sich eine Gehirn-Erweichung ein, die am Rande des Zerfallsherdes allmählich fortschreitet. Bei Schuss-, Loch- und Sternbrüchen kommt es zuweilen zum Ausfluss der gequetschten Hirnmasse aus einer äussern Wunde. Man bemerkt dieselbe dann beim Reinigen dieser zwischen den Haaren und den Blutgerinnseln. Seltener entwickelt sich später ein Prolapsus cerebri. Derselbe ist dann die Folge eines gesteigerten intracraniellen Druckes, der selbst wiederum einer serösen Imbibition in der getroffenen und der zunächst angrenzenden Hirnregion oder einem Hirnabscess sein Dasein verdankt. Es kann ein solcher Prolapsus cerebri die Grösse einer Mannesfaust erreichen. Tritt keine Meningitis ein, so kann Heilung erfolgen, indem die fungösen Massen theils abgestossen werden, theils durch vernarbende Granulationsbildung wieder in das Cavum Cranii zurücksinken.

Die **Symptome** der Contusio cerebri sind im Gegensatz zu denen der Commotio und Compressio cerebri localisirte. Sie sind vollständig abhängig vom Ort und der Ausdehnung der Hirnverletzung und werden daher als Herdsymptome bezeichnet.

Die Diagnose kann nur gestellt werden, wenn diese Herdsymptome alsbald nach der Verletzung auftreten. Häufig ist sie unmöglich, wenn eine gleichzeitige Commotio oder Compressio das klinische Bild verwischen. Die Symptome bestehen im Ausfall der Funktionen, welche von der contundirten

Fig. 17.



1, 2, 3 = erste, zweite und dritte Stirnwindung.
4, 5 = vordere und hintere Centralwindung.
6, 7, 8 = obere, mittlere und untere Schläfenwindung.
9, 10 = obere, untere Scheitelwindung.
11 = Gyrus angularis.
12, 13, 14 = obere, mittlere, untere Occipitalwindung.
a = motorisches Rindenfeld für die obere Extremität.
b = motorisches Rindenfeld theils für die obere theils für die untere Extremität.
c = motorisches Rindenfeld für die untere Extremität.
d = Rindenfeld für den Hypoglossus.
e = „ „ „ Facialis.
f = motorische Aphasie.
g = Sensorische (acustische) Aphasie mit Worttaubheit.
h = Aphasie mit Wortblindheit.
i = Sehsphäre.

Stelle der Hirnperipherie aus eingeleitet werden. In neuerer Zeit haben klinische Beobachtungen im Verein mit Sectionsbefunden und physiologischen Experimenten die Topographie der Hirnrinde schon so gefördert, dass wir im Stande sind, aus solchen Ausfallssymptomen den Sitz mancher Contusionen zu erkennen. So weist eine nach der Fractur entstehende Aphasie hin auf ein Betroffensein der dritten linken Stirnwindung, eine gleichzeitige Lähmung des Facialis und Hypoglossus auf eine Contusion der zu beiden Seiten des vorderen Endes des Sulcus Rolandi gelegenen Partieen, Monoplegieen auf Contusionen der Centralwindung, Anäthesieen auf solche der hinter der Centralwindung gelegenen Rindentheile.

Es ergeben sich alle diese bisher bekannten Localisationen unmittelbar aus der Betrachtung der Fig. 17, in welcher durch die Zahlen die Gehirnwindungen, durch die Buchstaben die Punkte der Gehirnrinde bezeichnet sind, welche den verschiedenen Localisationen entsprechen.

Neben den verschiedenen Herdsymptomen finden sich oft noch Symptome, wie sie jede Quetschung begleiten können und mit der Resorption der Extravasate zusammenhängen: vermehrte Urobilinausscheidung im Harn und vorübergehende Temperaturerhöhung.

Bald nach der Verletzung auftretende Convulsionen einzelner Muskelgruppen, einzelner Extremitäten oder einer Körperhälfte werden bedingt durch Alteration der Umgebung des Contusionsherdes (collaterales Oedem), später einsetzende Reizerscheinungen dieser Art durch Meningitis und Encephalitis.

Differentialdiagnose der Commotio, Compressio und Contusio cerebri.

Wir haben jetzt die typischen Bilder der Commotio, Compressio und Contusio cerebri kennen gelernt. Es wäre aber für den Patienten gefährlich lediglich nach den geschilderten Symptomen die Diagnose stellen zu wollen. Nur dann dürfen wir vielmehr aus den sogenannten classischen Symptomen eine bestimmte Diagnose stellen, wenn wir zugleich den Verlauf des Falles kennen: Die Commotio und Contusio cerebri kommen unmittelbar durch das Trauma in kürzester Zeit zu Stande; für die Compressio cerebri ist dagegen das freie Intervall characteristisch, das zwischen Verletzung und Ausbruch der Gehirnsymptome liegt. Dauert dieses Intervall oft auch nur ganz kurze Zeit,

manchmal nur eine Stunde, so ist es doch ausserordentlich wichtig, dass die Symptome erst allmählich an Intensität zunehmen.

Eine reine Commotio cerebri lässt sich annehmen, wenn unmittelbar nach der Verletzung Zeichen einer ausgebreiteten Hirnläsion aufgetreten sind, namentlich wenn der Patient sofort bewusstlos gewesen ist, wenn daneben gar keine Herdsymptome irgend welcher Art bestehen und wenn die Bewusstlosigkeit sich allmählich bessert.

Die Compressio cerebri verlangt, wie schon gesagt, ein freies Intervall zwischen Trauma und Eintritt der ersten Erscheinungen. Fehlen auch einige der typischen Symptome wie z. B. der Druckpuls oder treten zuerst Herderscheinungen nach dem Trauma auf, so darf man die Diagnose Compressio cerebri doch sicher stellen, wenn das freie Intervall sicher constatirt worden ist. Beim Vorhandensein von Herdsymptomen wird die Diagnose Hirndruck um so sicherer, je grössere Ausdehnung die Herdsymptome gewinnen, denn bei der Compression durch Extravasate kommt eine circumscripte intensive Einwirkung auf kleinere Gehirnabschnitte selten vor. Für Contusio cerebri spricht das Auftreten von Herdsymptomen im unmittelbaren Anschluss an das Trauma. Die Herdsymptome haben um so mehr Werth, je umschriebener sie sind, je isolirter sie im weiteren Verlaufe bleiben. Bei einer Contusio ist in der Regel keine oder doch nur eine geringgradige, vorübergehende Bewusstseinsstörung vorhanden. Häufig sind Temperaturerhöhungen.

Sind nun die einzelnen Zustände für sich schon öfters schwierig zu diagnosticiren, so wird die Diagnose um so schwieriger, wenn alle drei oder auch nur zwei derselben combinirt vorliegen.

Praktisch stellt sich die Sache so, dass man in allen Fällen, in denen die localen und Allgemeinerscheinungen ohne Zutritt von Fieber und dessen unmittelbare Folgen intensiver werden, an Hirndruck denken muss. Dann ist, wie wir später sehen werden, die Trepanation indicirt

Prognose der Convexitätsbrüche.

Die Verletzung der Schädelknochen hat an und für sich nichts Specifisches, wie man früher vielfach annahm. Einfache subcutane Fracturen, die nicht mit schwereren Gehirnverletzungen complicirt sind, verlaufen in der Regel ebenso gutartig, wie die analogen Brüche an den Extremitäten. Bemerkenswerth ist nur ihre geringe Neigung zur Callusbildung, so dass selbst Fissuren oft nur durch Bindegewebe heilen. Die Callusbildung erfolgt dabei durch das

Periost des äusseren Schädeldaches, durch das Mark und die Dura mater. *v. Bergmann* sieht als Ursache der im Allgemeinen so unvollständigen Regeneration der Schädelbrüche die Unverrückbarkeit der Fragmente an, wodurch der zur Callusbildung nothwendige Reiz verloren geht. Dass die Dura mater als Periost der Tabula interna für gewöhnlich nicht viel Callus producirt, ist recht günstig. Es müsste ja ein solcher gegen das Gehirn hin wachsen und recht bedenkliche Reizerscheinungen hervorrufen. Es kommen aber ausgedehntere Osteophytenbildungen an der inneren Schädeltafel vor, wie das beistehend abgebildete Präparat beweist (Fig. 18). Defecte im Schädel werden sehr selten durch Knochenneubildung, in der Regel nur durch eine straffe Narbe verschlossen. Losgesprengte Splitter, besonders der Tabula vitrea, können wieder anheilen und ganz fest werden.

Fig. 18.



Die Gefährlichkeit **subcutaner** Schädelbrüche hängt von der begleitenden Hirnverletzung ab. Wir sahen schon, dass eine reine Commotio cerebri selten, eine Compressio cerebri in Folge von Blutung aus der Art. mening. media dagegen meist letal endet, wenn die Blutung eine hochgradigere ist. Im anderen Falle gehen die Drucksymptome allmählich zurück, und es erfolgt vollständige Heilung. Die Folgen einer Contusio cerebri hängen von der Ausdehnung des Contusionsherdes ab. Die gekreuzten Lähmungen der Extremitäten, die Störungen im Bereiche der Hirnnerven gehen zuweilen erst nach vielen Wochen zurück, seltener schon nach kürzerer Zeit. Für letztere Fälle kann man eine einfache Resorption des Blutextravasates, für die ersteren eine durch Wucherung der Adventitiazellen der Gefässe und der Zellen der Neuroglia eingeleitete Narbenbildung im Gehirn annehmen. Wieder in anderen Fällen bleiben Functionsstörungen bestehen, ja es können selbst nach günstigem Verlauf der ersten Wochen später noch Ernährungsstörungen auftreten, die unter dem Bilde der rothen und gelben Erweichung und Encephalitis, bedingt durch fortschreitende fettige Entartung der Blutgefässe, einhergehen und endlich zum Tode führen. Ebenso können Contusionsherde, die sich zu Gehirnabscessen umbilden, einen plötzlichen

letalen Ausgang durch Perforation in die Gehirnventrikel veranlassen.

Die Alterationen im Bereiche der Psyche verschwinden vielfach innerhalb mehrerer Wochen, doch haben sie für einzelne Fälle auch eine ernstere Bedeutung, indem nicht nur Gedächtnisschwäche, sondern auch Geisteskrankheiten sich entwickeln können. Diese letzteren sind vorzugsweise durch diffuse Degenerationen, in der Regel Atrophieen der Hirnrinde oder Verdickungen der weichen Hirnhäute und Pachymeningitis, bedingt und treten entweder unmittelbar nach dem Trauma auf oder nach vorausgegangenen Prodromalerscheinungen. Sie können nur vorübergehender Natur sein oder aber fortdauernd bestehen und gehen dann meist in unheilbaren Blödsinn, Dementia paralytica, über. Epilepsie hat man im Gefolge von Depressionsfracturen beobachtet, wenn die Hirnhäute mit der Knochennarbe verwachsen waren.

Die **complicirten** Convexitätsfracturen verlaufen unter dem Schutze des aseptischen Verfahrens fast ebenso reactionlos wie die Brüche mit unverletzten Hautdecken. Ihre Prognose wird jedoch schlecht, sobald septische Keime Zutritt zu den Fragmenten fanden. Dann vereitert das Blutextravasat an der Fracturstelle, es kommt zu einer Osteomyelitis der Diploë, und es gilt dann noch als ein glücklicher Ausgang der, dass nur eine circumscripte Necrose der Schädelknochen eintritt. Meist pflanzt sich die Entzündung fort auf die Meningen, es entsteht die gefürchtete septische Meningitis; die Contusionsherde des Gehirns ebenso wie die Thromben in den Gehirnsinus vereitern, es kommt zur Pyämie, und der Tod tritt unfehlbar ein, da eine Desinfection der weit verzweigten, complicirten subarachnoidealen Räume unmöglich ist.

Die **septische Meningitis** wird eingeleitet durch Frösteln und ein Gefühl des Unbehagens, über das der Patient klagt, selten durch einen wirklichen Schüttelfrost. Die Temperatur steigt allmählich an, der Puls wird klein, frequent, der Kranke wird sehr unruhig, schlaflos, klagt über Kopfschmerzen, fängt auch wohl an zu deliriren. Das Gesicht scheint häufiger auffallend blass, seltener geröthet, die Pupillen sind enge. So lange diese Symptome bestehen, kann man auch an eine intrameningeale Blutung denken, die Diagnose der Meningitis wird jedoch sicher, wenn sich jetzt klonische Krampfanfälle und — in Folge des successiven Ausfalles der Rindenfunctionen durch die eitrige Encephalitas — halbseitige Lähmungen entwickeln. Die ersteren kommen meist nur bei Kindern


vor, die letzteren dagegen bei Erwachsenen, und zwar ausserordentlich schnell von einem Gliedtheile zum andern fortschreitend. Mit dem Beginn der Lähmung wird der Kranke ruhiger, somnolent, später comatös. Die Temperatur bleibt in der Regel hoch, seltener sinkt sie herab. Der Puls wird immer kleiner, die Pupillen weit, die Athmung unregelmässig, röchelnd, bis der Tod wenige Tage nach dem Beginn der Erkrankung dem ganzen Prozess ein Ende macht.

Therapie der Convexitätsbrüche.

Bei der Behandlung eines Schädelbruches sind zwei Punkte zu berücksichtigen: die Beschaffenheit der Bruchstelle selbst und der Zustand des Gehirns und seiner Häute. Was die erstere anlangt, so kommt es zunächst darauf an, ob man es mit einer subcutanen oder mit einer complicirten Fractur zu thun hat. Bei der **subcutanen** Fractur ist unser Handeln lediglich ein zuwartendes. Wir sorgen für ein ruhiges Verhalten der Patienten, indem wir sie in gut ventilirten Räumen das Bett hüten lassen, verhindern alle physischen Erregungen, geben eine leichtverdauliche, etwas knappe Diät, suchen durch Abführmittel, Calomel in Dosen von 0,25 gr. bis 0,3 gr. ein- bis zweimal, regelmässige Stuhlentleerungen herbeizuführen und lassen die Patienten streng überwachen und beobachten. Stellen sich Congestionen nach dem Kopf ein oder bildet sich über der Bruchstelle eine ödematöse Schwellung der Weichtheile, verbunden mit fixem Kopfweh, so legt man Kühlkissen, eine Eisblase auf oder applicirt die Kälte mittelst der *Leiter*'schen Röhre. Eine zu lange Anwendung der Kälte ist nicht zweckmässig, weil dadurch die zur Callusbildung nothwendige Reparation der Gewebe gehemmt wird und Necrose entstehen könnte. Ein operativer Eingriff in Gestalt der Trepanation ist bei subcutanen Fracturen früher vielfach angewendet worden, wenn Depressionen und ausgedehnte Splitterungen vorlagen. Bei unserer heutigen Kenntniss der Schädelverletzungen ist ein solches Verfahren durchaus unstatthaft. Wir wissen, dass selbst grössere Depressionen an sich keine oder doch nur vorübergehende Hirndrucksymptome hervorrufen. Ist es aber im Momente der entstehenden Depression zu einer Gehirncontusion gekommen, so würden wir, indem wir durch die Operation die subcutane Fractur zu einer complicirten gestalten, den pathogenen Mikroorganismen zum Contusionsherd den Zugang frei machen und damit alle die vorher besprochenen Gefahren der septischen

Meningitis heraufbeschwören. Die intacte Haut ist der beste Schutz gegen jede Infection, daher ist auch bei ausgedehnten subcutanen Splitterfracturen die Operation zu unterlassen. Sind einzelne Splitter ganz aus ihrem Zusammenhange gelöst, so dass man eine Necrose derselben befürchten muss, so wartet man mit der Extraction der Sequester besser so lange, bis der Demarkationsprozess im Gange ist und der Eiter die Weichtheile hervorwölbt. Eine Trepanation bei subcutaner Schädelfractur ist nur unter einer Voraussetzung statthaft, dann aber ist sie nicht nur gerechtfertigt, sondern dringend nothwendig: wenn allmählig sich steigernde Hirndrucksymptome eine Blutung aus der zerrissenen

Fig. 19.



Arteria meningea media anzeigen. Die Trepanation wirkt dann direkt lebensrettend durch Stillung der Blutung und Wegräumung des entstandenen Extravasates. Sie wird am Schläfenbein ausgeführt und zwar in der Fossa temporalis, entsprechend etwa der Stelle des Jochbogens, an welcher sich der kurze Process. zygomaticus des Jochbeines mit dem Process. zygomaticus des Schläfenbeines verbindet *(P. Vogt)*. Trifft man an dieser Stelle nicht das Extravasat, ist man aber von dem Vorhandensein desselben überzeugt, so legt man noch eine zweite

Trepanöffnung unter dem Scheitelbeinhöcker an, da es sich dann meist um ein parieto-occipitales Hämatom handelt. Für die richtige Bestimmung der zweiten Trepanationsstelle ziehe man eine Linie vom Supraorbitalrand nach hinten parallel der Horizontallinie des Kopfes und eine weitere Linie unmittelbar hinter dem Processus mastoideus vertical nach oben. Da, wo sich diese beiden Linien schneiden, ist der richtige Punkt (Fig. 19). Von dem einen, event. den beiden Trepanlöchern aus wird dann das Extravasat ausgeräumt und die Blutung durch Unterbindung, Umstechung oder Tamponade mit antiseptischer Gaze gestillt. Es kann sogar notwendig werden, noch eine dritte Trepanationsöffnung anzulegen. Das Hämatoma parietale kann sich nämlich gelegentlich weit nach unten hin ausbreiten. So reichte es bei einer Beobachtung *Krönlein's*, die Dura mit dem Sinus transversus weit ablösend, beinahe an das Foramen magnum. Man hat aber dann ein occipitales Hämatom vor sich und diesem entsprechend muss dann die Occipitalgrube ausserhalb des Sinus traversus eröffnet werden. Als Ort der Wahl für die Trepanation schlägt *Krönlein* in solchem Falle die Mitte der Linea semicircularis inferior vor; man erreicht diese Stelle von einem Schnitt aus, den man etwas hinter dem Proc. mastoideus führt.

Vermag man den Patienten genau zu beobachten, so lassen sich des öfteren derartig sichere Anhaltspunkte für den jeweiligen Sitz des Hämatomes finden, dass man nicht alle drei Trepanationsöffnungen anzulegen braucht, sondern mit einer Oeffnung auskommt.

Den Ausschlag für die Wahl der Operationsstelle muss in jedem Falle die Lokalisation des Hämatoms geben. Irrig ist es, als bestimmend für diese Wahl die anatomische Lage der Arteria meningea media und ihrer Aeste und ihre Projection auf die Schädeloberfläche annehmen zu wollen, wie dies *Steiner* vorgeschlagen hat, der nach zahlreichen Untersuchungen an macerirten Schädeln eine temporale und eine parietale Unterbindungsstelle für die blutende Arterie empfehlen wollte. In der Mehrzahl aller Fälle können wir ja den Sitz der Arterienruptur auch nicht annähernd sicher bestimmen. Wir haben zur Zeit nur die Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose über den Sitz des Hämatoms zu stellen. Dieses Hämatom zu beseitigen muss unser Bestreben sein; die Blutung selbst steht in der Regel schon in dem Zeitpunkte, wo wir zur Trepanation schreiten können; dauert sie aber noch fort, so ist sie durch die Jodoformgazetamponade,

die Trepanationsöffnung, eventuell auch durch Ligatur sicher zum Stehen zu bringen.

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass es sich nach den Versuchen von *F. Krause* und *Steiner* empfiehlt, anstatt eine gewöhnliche Trepanationsöffnung anzulegen, das Schädelinnere gelegentlich auch durch Bildung eines Haut-Periost-Knochenlappens bloszulegen.

Schon manches sonst verlorene Menschenleben ist durch ein solches auf Grund einer wissenschaftlichen Diagnose basirtes Vorgehen dem Tode entrissen worden.

Zur Behebung deprimirter Stellen am kindlichen Schädel haben *Froumy* und *Jennings* neuerdings mit Erfolg Schröpfköpfe angewendet. Man setzt einen grossen Schröpfkopf auf die deprimirte Stelle auf, dichtet ihn mit Glaserkitt und pumpt ihn dann mittelst eines Potain'schen Apparates aus.

Das erste Princip für die Behandlung **complicirter** Schädelfracturen ist die Durchführung der strengsten Antiseptik. Zu dem Zwecke wird zunächst die verletzte Stelle in weitem Umkreis sorgfältig gereinigt, indem man die Haare rasirt, die Kopfschwarte mit Seife und $^1/_{10}$ % Sublimat oder 3 % Carbollösung abbürstet, dann mit Terpentinöl, Aether oder absolutem Alkohol abreibt und schliesslich noch mit Sublimatlösung abspült. Mit dem gut desinficirten Finger untersucht man nun die Wunde. Stark gequetschte Wundränder werden abgetragen, etwaige Fremdkörper entfernt, die Blutung exact gestillt. Ist die Galea oder das Periost in grösserer Ausdehnung von dem Knochen abgelöst, so werden die so entstandenen Buchten und Taschen durch Einschnitte freigelegt, die Wunde dann mit scharfen Haken auseinander gezogen und nun die unterliegende Knochenpartie sorgfältig in Augenschein genommen.

Sind Knochensplitter von der äusseren Lamelle losgelöst, so werden sie entfernt. Nur wenn sie noch vollkommen mit dem Periost und den Weichtheilen zusammenhängen, kann man einen Versuch zu ihrer Wiederanheilung wagen, indem man sie später durch Compression und Naht genau ihrer früheren Lage anpasst. Findet man eine durchgehende Fissur und ist dieselbe sauber, so spült man einfach den Knochen ab; sind jedoch Haare oder andere Fremdkörper in derselben eingeklemmt oder sind die Ränder der Fissur gesplittert oder mit Schmutz imprägnirt, so muss man zu beiden Seiten des Bruchrandes mit dem Meissel einen schmalen Streifen Knochen entfernen, um die eingedrungenen Gegenstände zu

beseitigen. Dabei ist es meist nicht nöthig, die Tabula vitrea zu verletzen. Setzen sich die Fissuren über weite Strecken der Convexität fort, so werden sie nicht in ihrem ganzen Verlauf verfolgt, da dieser ja mit Ausnahme der Bruchstelle selbst ein subcutaner, mithin eine Infection kaum zu fürchten ist.

Findet man eine Depressionsfractur und ist nicht anzunehmen, dass während oder nach der Verletzung septische Keime in die Bruchspalten eingedrungen sind, so werden etwaige Splitter entfernt, spitze Ecken und Kanten abgemeisselt, dagegen keine Elevationsversuche unternommen, denn von dem eingedrückten Knochenstück rühren etwaige Hirndruckerscheinungen nicht her. Ist dagegen eine Infection der Wunde wahrscheinlich, so ist zum Zwecke einer gehörigen Desinfection die Meisseltrepanation geboten. Man braucht sich ja bloss daran zu erinnern, dass die Lamina interna meist in grösserer Ausdehnung gesplittert ist als die Lamina externa, um einzusehen, dass eine derartige Bruchform für einen günstigen Wundheilungs-Verlauf ungeeignet ist. Es müssen erst die überstehenden Kanten der Tabula externa ebenso weit abgemeisselt werden, als man Splitterung der Interna findet. Eher kann man nicht für einen weiteren antiseptischen Wundverlauf garantiren.

Bei den schwersten Formen der Schädelbrüche, den ausgedehnten Stück- und Splitterbrüchen, kann man eine Elevation eventuell Correction der Stellung der einzelnen Knochenstücke versuchen. Zum Zwecke der Elevation kann es dabei nöthig werden, Stücke der ausgebrochenen Fragmente oder der benachbarten Knochen zu reseciren. Ebenso muss man dies zuweilen thun, um ein zwischen Knochen und Dura sitzendes Blutextravasat zu entfernen, um für genügenden Secretabfluss zu sorgen und überhaupt die möglichst beste Wundform herzustellen. Sind Splitter in das Gehirn eingedrungen, so entfernt man sie nur, wenn sie sichtbar sind. Jedes Sondiren tieferer Gehirnpartieen ist zu unterlassen. Quillt aus der zerrissenen Dura das zermalmte Hirn wie ein Schwamm hervor, so hält man es durch Tamponade mit antiseptischer Gaze zurück. Ebenso ist die aseptische Tamponade ein sicheres und ungefährliches Blutstillungsmittel bei Verletzungen der venösen Sinus.

Die vorzüglichen Resultate der nach den eben besprochenen Indicationen ausgeführten Trepanationen sind neuerdings von *Leser*, *Wagner*, *Thiersch*, *Krönlein* u. A. recht deutlich illustrirt worden.

Für eine schnelle Heilung ist es wünschenswerth, die Weichtheilwunde durch eine genaue Naht zu vereinigen. Ist dies wegen starker Spannung nicht möglich, so ist es nach dem Vorgange *v. Bergmann*'s am besten, die Lücke durch eine plastische Operation zu decken. Der antiseptische Verband muss den ganzen behaarten Kopf bis in die Mitte der Stirn bedecken, durch um das Kinn gezogene Bindentouren am Abgleiten verhindert sein und auf der verletzten Stelle namentlich bei Lappenwunden eine gewisse Compression ausüben. Die sonstige Behandlung ist die gleiche wie bei subcutanen Fracturen.

Besondere Massnahmen erfordern die begleitenden Gehirnverletzungen. Im Depressionsstadium der Commotio cerebri sind Excitantien am Platz. Subcutane Injectionen von Aether, Campheröl, Moschustinctur, Sinapismen oder andere Hautreize in die Herzgegend oder an andere Körperstellen: auf das Epigastrium, an die Waden; Erwärmung des ganzen Körpers durch Einpackungen in heisse Decken, durch Wärmflaschen oder heiss gemachte Ziegel. Der Kopf wird tief gelegt, um den Blutzufluss zum Gehirn anzuregen. Bei bedenklicher Kleinheit und Unregelmässigkeit des Pulses injicirt man subcutan 0,0003 Atropin. Im Excitationsstadium müssen die Congestionszustände zum Gehirn bekämpft werden. Der Kopf wird dann hochgelagert, auf demselben eine Eisblase applicirt und durch Calomel eine Ableitung auf den Darm versucht.

Bei bestehendem Hirndruck kommen zunächst die eben geschilderten Mittel in Betracht. Der Kopf wird hoch gelegt, rasirt und mit Eisblasen bedeckt, Calomel verabreicht und die Unruhe des Patienten durch eine Morphiuminjection gelindert. Kommt man aber mit diesen Mitteln nicht zum Ziel, so ist die Trepanation indicirt. Eine Venäsection ist im Allgemeinen wenig zu empfehlen, ebenso wenig locale Blutentziehungen durch Ansetzen von Blutegeln an ein Emissarium.

Bei der Contusio cerebri muss die Vereiterung der Herde durch strenge Antiseptik verhindert werden. Haben sich Gehirnabcesse entwickelt, so ist durch Trepanation für eine möglichst frühzeitige Entleerung des Eiters zu sorgen. Ebenso hat die secundäre Trepanation stattzufinden bei beginnender Meningoencephalitis und bei Vorhandensein epileptischer Anfälle.

B. Brüche der Schädelbasis.

Die Brüche der Schädelbasis sind fast ausschliesslich Fissuren Stück- oder Splitterbrüche kommen höchstens vor, wenn eine Kugel oder ein ähnlicher Fremdkörper in dieselbe eindringt. Kleine Splitter können wohl auch von den vorspringenden Leisten oder Zacken abgesprengt werden, so z. B. die Spitze des Felsenbeines, die Sattellehne des Türkensattels, die Processus clinoidei. Solche abgesprengten Knochenstücke können Gefässe und Nerven anspiessen oder ins Gehirn eindringen.

Die Fissuren sind bei der grossen Sprödigkeit der Basis meist sehr ausgedehnt, verlaufen in der Regel mehr oder weniger senkrecht zur Längsachse des Schädels und betreffen dabei am häufigsten die mittlere Schädelgrube. Nach *Felizet* betrachtet man die Keilbeinflügel und die Felsenbeinpyramiden mit ihren hinten compacten Partieen als zwei Systeme von Pfeilern, welche im Allgemeinen die Fortsetzung von Fissuren aus einer Schädelgrube in die andere verhindern. Es trifft dies zu für schwächere Gewalten. Durch bedeutendere Kräfte werden aber auch diese Strebepfeiler durchtrennt.


Die Fissuren der Schädelbasis scheinen namentlich in schweren Fällen ein durchaus unregelmässiges Gewirr zu bilden. Gibt man sich aber die Mühe, so kann man unschwer gewisse Typen von Brüchen herausfinden. Zeichnet man in eine Schädelbasis diese Typen ein, so ergibt sich doch eine gewisse Gesetzmässigkeit ihres Verlaufes (Fig. 20).

In der vorderen Schädelgrube durchsetzen sie in sagittaler Richtung den mittleren Theil des oberen Randes der Orbita, indem sie oft gerade durch die Incisura supraorbitalis gehen. Sie erstrecken sich von hier aus bis in das Foramen opticum, oder sie theilen sich an der Fissura orbitalis superior, indem sie in die Lamina cribrosa und auf die andere Orbita übergehen. Zuweilen ist auch der obere Augenhöhlenrand von netzartig mit einander zusammenhängenden Fissuren durchsetzt. Eigenthümlich sind Absprengungen vereinzelter, kleiner, unregelmässig geformter, scharfrandiger Knochensplitter. Hierdurch kann eine vollständige Knochenlücke entstehen, durch welche blutgetränktes Fettgewebe pilzähnlich in die Schädelhöhle hineinragt.

In der mittleren Schädelgrube kann man zwei bevorzugte Bahnen unterscheiden. Die eine zieht parallel der Längsachse der Felsenbeinpyramide hin, die andere liegt weiter nach vorne im

grossen Keilbeinflügel. Die erstere ist die häufigere. Die Fissur hält sich dann in der Pars tympanica des Felsenbeins ziemlich genau in der Richtung der vorderen unteren Kante der Pyramide, seltener rückt sie höher hinauf auf die innere Fläche derselben, das mittlere Ohr und die Schnecke öffnend. Die zweite Hauptbahn der hierher gehörigen Fissuren ist in der Regel mit einem Bruch des Processus zygomaticus verbunden. Sehr oft gehen die Fissuren

Fig. 20.




von einer Seite zur andern quer über die Sella turcica hinweg, sie überschreiten auch wohl die mittlere Schädelgrube, indem sie nach der vorderen oder hinteren Grube ausstrahlen.

In der hinteren Schädelgrube verlaufen die Fissuren entweder in sagittaler Richtung zur Seite der Mittellinie oder radiär auf das Hinterhauptloch hin. In der Regel dringen sie in die mittlere Schädelgrube ein, indem sie die Pyramide von der Fossa jugularis aus nach dem Foramen spinosum des Keilbeines hin durchsetzen.

Hervorzuheben ist ferner noch die sog. „Kreisfractur“ der Basis (Fig. 21). Dieselbe beginnt am hinteren Umfange des Foramen occipitale magnum, läuft nach vorn in das Foramen jugulare, durch den dünnsten Theil der Pyramide in den Canalis caroticus, von hier aus ins Foramen opticum und endet mit einer Querfissur am Keilbeinkörper.

Fig. 21.



Schliesslich wollen wir noch erwähnen, dass bei schweren Zangengeburten dann, wenn die Zange das Hinterhaupt nach unten zieht, der Kopf aber nicht folgen kann, zuweilen eine Abreissung der Partes condyloideae von der Hinterhauptsschuppe erfolgt. Letztere wird dann über die ersteren nach vorn dislocirt und dadurch das Foramen occipitale verengt; ja es kann geradezu das Mark förmlich guillotinirt werden.

Aetiologie und Mechanismus der Basisbrüche.

Ihrer Aetiologie nach sind die Basisfissuren directe oder indirecte Brüche.

Die directen Basisbrüche, welche dadurch entstehen, dass die Gewalt an der Schädelbasis selbst angreift, sind relativ selten. Am häufigsten entstehen sie so noch als Schussverletzungen, wie z. B. bei Selbstmördern, die ihren Schuss in den Mund, in die Ohr- oder Schläfengegend abfeuern. Ferner beobachtet man sie am Orbitaldach nach Verletzung der Orbita mit spitzen Instrumenten oder an der Lamina cribrosa des Siebbeines nach einem Stoss in die Nasenhöhle.

Der Mechanismus dieser directen Brüche ist ohne weiteres klar. Schwieriger gestaltet sich dagegen das Verständniss der ungleich häufigeren indirecten Basisbrüche.

Wir haben hier zu unterscheiden einestheils zwischen Impressions- und anderntheils zwischen Biegungs- und Berstungsbrüchen.

Der Mechanismus der Impressionsbrüche ist leichter zu erklären als der der Berstungsbrüche. Sie entstehen vorzugsweise bei einer Compression des Schädels in seiner ver-

ticalen Achse. Setzen wir zunächst den Fall, ein Mann stürzte von einem Gerüst herab mit der Convexität des Schädels auf eine feste Unterlage. Bei dem Auftreffen auf diese Unterlage wird dann sein Kopf momentan in dem verticalen Durchmesser comprimirt, indem der ganze übrige Körper noch in Bewegung ist und vorwärts drängt. Die Folge ist dann die, dass die Halswirbelsäule wie ein Keil in die spröde Basis eindringt, indem sie die sich entgegensetzenden Knochenmassen in Form eines ringförmigen Stückbruches in der Umgebung des Hinterhauptloches eindrückt (Fig. 21). Ein anderes Mal entsteht die gleiche Bruchform dadurch, dass der Patient einen Schlag auf den Schädel bekommt, wobei dieser über die Halswirbelsäule aufgestülpt wird, wie man einen Hut auf einen Kopf eintreibt. Wiederum auf andere Weise kann die Ringfractur dadurch erfolgen, dass der Verletzte auf die Füsse oder das Gesäss fällt, wodurch die Wirbelsäule in ihrer Bewegung aufgehalten wird und der noch bewegte Kopf sich an der Halswirbelsäule aufspiesst, wie man den Hammer auf seinen Stiel auftreibt, wenn man diesen Stiel gegen eine feste Unterlage aufstösst.

Als Impressionsbrüche müssen wir schliesslich noch die Basisfracturen betrachten, die durch Gewalten verursacht werden, welche das Kinn treffen. Es werden dabei die Gelenkfortsätze des Unterkiefers gegen ihre Gelenkgruben angedrängt, sodass sie dieselben auseinandersprengen. Sie können dabei selbst in der mittleren Schädelgrube erscheinen.

Wie erklärt sich nun die ungleich grössere Zahl der indirecten Brüche, welche nicht dem ebengeschilderten Mechanismus entspringen, also nicht Impressionsbrüche sind?

Hatte eine Gewalt das Schädeldach getroffen und eine Basisfractur erzeugt, so sollten nach den älteren Theorieen diese Fracturen entweder durch sogenannten Contrecoup entstanden sein oder durch Irradiation vom Ort der Gewalteinwirkung aus.

Zur Erklärung des Contrecoup hatte *Saucerotte* seine „Vibrationstheorie“ aufgestellt. Von der getroffenen Stelle des Schädeldaches aus sollten sich die durch die Gewalt erzeugten Schwingungen des Stosses nach allen Seiten hin verbreiten und die Fissuren dort zu Stande kommen, wo dieselben sich an der entgegengesetzten Seite kreuzten. Als Beispiel für eine solche Entstehung der Fractur wurde dann später meist der Schädel des erschossenen Lincoln angeführt. Bei demselben fand sich nämlich eine Splitterfractur am rechten Orbitaldach, trotzdem diese Stelle von der Kugel gar nicht getroffen war. Dieselbe hatte vielmehr

das linke Hinterhauptbein perforirt und war im rechten Vorderlappen des Grosshirns stecken geblieben.

Eine solche Fractur konnte auch die zweite Theorie, das „Irradiationsgesetz“ *Aran*'s, nicht erklären. Nach diesem Gesetze sollten alle Basisfracturen in der Weise entstehen, dass die Continuitätstrennung an einem bestimmten Punkt des Schädeldaches, nämlich dem Ort der Gewalteinwirkung, beginnt und sich von hier aus auf die Basis forterstreckt. Die Fissur sollte dabei immer den kürzesten Weg wählen, indem sie von der Stirn in die vordere, von den Scheitelbeinen in die mittlere und vom Hinterhaupt in die hintere Schädelgrube übergeht.

Heutzutage ist das Räthsel der Entstehung der indirecten Basisbrüche durch Zuhülfenahme einer physikalischen Eigenschaft des Schädels, seiner Elasticität, gelöst worden. Nachdem schon durch *Bruns* und *Messerer* die Elasticität des Schädels festgestellt worden war, haben *v. Wahl* und seine Schüler *Hermann* und *Greiffenhagen*, sowie *Messerer*, *Greder*, *Dulles* und *Anna Heer* den experimentellen und klinischen Nachweis geliefert, dass die indirecten Basisbrüche einfache Berstungsbrüche sind. Der Mechanismus ist dabei folgender:


Wir haben uns die Schädelkapsel als eine Hohlkugel von ungleicher Elasticität und Festigkeit vorzustellen. Die grössere Elasticität und Festigkeit besitzt das Schädeldach, die geringere, in Folge ihrer dünnen, spröden Knochentafeln und Leisten und ihrer vielfachen Oeffnungen, die Schädelbasis.

Soll diese Hohlkugel brechen, so muss sie vorher nothwendigerweise eine Formveränderung erleiden; diese Formveränderung aber setzt wiederum die Einwirkung einer brechenden Gewalt voraus. Diese Gewalt kann nun in zweifacher Weise wirken. Sie kann den Schädel entweder von zwei Seiten her oder von nur einer allein treffen.

Nehmen wir zunächst den ersteren Fall an, so sind wiederum zwei Möglichkeiten vorhanden. Einmal greift die Gewalt den Schädel wirklich von zwei Seiten her zugleich an, z. B. von beiden Schläfen her, oder aber sie wirkt nur von einer Seite her, der Schädel liegt dabei aber mit der anderen Seite auf einer festen Unterlage auf oder wird auch wohl von der Wirbelsäule gestützt. In beiden Fällen wird der Effect der gleiche sein; denn unter beiden Voraussetzungen wird die Elasticität des Schädels in toto beansprucht.

Was geschieht nun mit einer Hohlkugel, die in genannter Weise von 2 Seiten her zusammengedrückt wird? Wir können uns das zunächst an einer Hohlkugel klar machen, die wir uns an allen Stellen von gleicher Elasticität und Festigkeit denken. Drücken wir eine solche Hohlkugel (Fig. 22) ABCD von A und C her zusammen, so wird aus ihr das Ellipsoid a b c d. Bei B und D werden

Fig. 22.



ihre Lamellen am meisten gedehnt. Wirkt nun die Gewalt weiter und überwindet sie schliesslich die Elasticität und Festigkeit der Lamellen, so werden diese zwischen b und d nachgeben, sie werden in dieser Linie b e r s t e n.

Nehmen wir nun der Wirklichkeit entsprechend, indem wir die geringere Elasticität und Festigkeit der Basis gegenüber der der Convexität hervorheben, an, dass die Hohlkugel ABCD nicht in allen Bogen gleiche Elasticität und Festigkeit besitze, sondern dass der Bogen DC — in unserem Falle die Schädelbasis — schwächer sei als die übrigen, so muss bei Einwirkung eines Druckes von A nach C bei der Streckung der Bogensehnen zum Ellipsoid die Strecke DC schon an der äussersten Grenze ihrer Elasticität und Festigkeit angelangt sein, bevor sie noch an den anderen Bogenabschnitten eine wesentliche Veränderung wahrnehmen lässt. DC wird daher eine bedeutendere Zerrung seiner Molecüle erleiden und in irgend einem Aequator, z. B. in dem von y, brechen, noch ehe die Elasticität und Festigkeit der anderen Bogenabschnitte gelitten hat.

S o e n t s t e h e n a l s o d i e s o h ä u f i g e n i n d i r e c t e n B a s i s b r ü c h e a l s B e r s t u n g s b r ü c h e. D i e B r u c h l i n i e n a b e r l a u f e n d a b e i i m m e r d e n D r u c k l i n i e n p a r a l l e l. So ist bei dem eben von uns angenommenen Druck der Schädelkapsel in f r o n t a l e r (querer) Richtung ein vollständiger oder unvollständiger Q u e r b r u c h der Basis entstanden (Fig. 23). So entsteht aber in gleicher Weise bei Compression des Schädels in s a g i t t a l e r Richtung ein mehr oder weniger vollständiger

Längsbruch (Fig. 24) und bei schräger Compression ein *diagonaler* Bruch (Fig. 25).

Einzelne Fissuren bei Basisbrüchen lassen sich nach dem Gesagten leicht erklären. Wie kommt nun die zuweilen ganz ausserordentlich grosse Zahl von Fissuren in einer Schädelbasis zu Stande? Hier müssen wir zur Erklärung *die äussere Gestaltung des Schädels* zu Hülfe nehmen. Der Schädel hat keine voll-

Fig. 23.





Fig. 24.



ständig regelmässige Gestalt: vorn, seitlich und hinten finden sich Flächen, die sehr wohl als Ebenen aufgefasst werden können. Wird nun eine solche Fläche von einer Gewalt getroffen, welche auch wiederum mit unregelmässiger Oberfläche einwirkt, so werden sich an allen den Punkten, wo diese Einwirkung stattfindet, gleichzeitig Druckpole, wie unser vorher angenommenes A und C, etabliren,


und von allen diesen Punkten aus werden dann die mehr weniger parallel verlaufenden Fracturen durch Berstung ausgehen.

Selbstverständlich können sich die Berstungsbrüche der Schädelbasis mit den zuerst geschilderten Impressionsbrüchen combiniren. Charakteristisch für dies Zusammentreffen ist das Aussprengen von kleinen Knochenpartikelchen an den Berührungspunkten, wie dies besonders an macerirten Schädeln deutlich hervortritt.

Unsere ganze bisherige Auseinandersetzung ging von der Annahme aus, dass der Schädel von zwei Seiten her comprimirt würde.

Setzen wir nun den weiteren Fall, dass der Schädel nur von einer Seite her angegriffen wird, ohne dass ein Gegendruck vorhanden ist. Die Gewalt ist in diesem Falle in der Regel ein

Fig. 25.



Stoss oder Schlag. Sie trifft den Schädel daher meist nur momentan, wird demgemäss die Elasticität desselben auch nur in beschränkterem Umkreis in Anspruch nehmen und daher auch nicht auf entferntere Theile des Schädels übertragen werden. Der so entstehende Berstungsbruch beginnt daher in der Nähe des Angriffspunktes der Gewalt. Er klafft auch an diesem am meisten, geht dann zur Basis hin, ohne dieselbe jedoch ganz zu durchsetzen, und löst sich schliesslich in eine Anzahl fein verästelter Verzweigungen auf (*Körber*). Diese Bruchform würde demnach am meisten dem beim Beginne dieser Betrachtungen angeführten *Aran*'schen Gesetze entsprechen.

Das eben Ausgeführte hat die grösste Bedeutung für den Gerichtsarzt. Denn wenn wir aus dem Symptomencomplex am Le-

benden oder am Schädel des Verstorbenen die Richtung der Bruchlinien erschlossen haben, und wir wissen, dass die Drucklinien diesen Bruchlinien unbedingt parallel laufen müssen, so kennen wir sofort auch die Richtung, in welcher sich die Gewalt gegen den Schädel hinbewegte. Die Unterscheidung doppelseitiger von einseitiger Compression hat für den Gerichtsarzt weiterhin aber noch insofern Interesse, als nach dem Gesagten aus der Art der Bruchlinien ein Rückschluss auf die Stellung der Gegner und die Intensität der Gewalteinwirkung gemacht werden kann. Wir müssen diesbezüglich auf die Arbeit *Körber*'s in der deutschen Zeitschrift für Chirurgie 1889 und auf die Arbeit von *Anna Heer* in den *Bruns*'schen Beiträgen zur Chirurgie Bd. IX verweisen.

Symptome der Basisbrüche.

Für die Erkennung eines Basisbruches kommen die localen Fracturerscheinungen, wie der Nachweis einer abnormen Beweglichkeit, Crepitation oder Deformität nur selten in Betracht, es wird vielmehr die Diagnose durch Vermittelung der sogenannten rationellen Symptome gestellt. Als solche kommen vor:

1) Blutunterlaufungen, Sugillationen. Dieselben finden sich an Haut- und Schleimhautstellen, welche durch lockere Bindegewebslager mit der Schädelbasis in Verbindung stehen, indem das aus der Fissur extravasirende Blut sich allmählich senkt. Ihr Vorhandensein ist nur dann charakteristisch, wenn die Gewalt nicht am Ort ihres Erscheinens eingewirkt hatte und sie nicht unmittelbar nach der Verletzung, sondern erst Stunden oder Tage lang später aufgetreten sind. Bei Fissuren des Orbitaldaches bemerkt man solche Sugillationen in den Augenlidern und unter der Conjunctiva bulbi. Sie kommen dann zuerst am innern Augenwinkel und am untern Lid, später auch am obern Lid zum Vorschein und sind zuweilen verbunden mit einem Exophthalmus. Sugillationen in der Schleimhaut des Rachens beobachtet man bei Fissuren in der Pars basilaris des Hinterhauptbeines, Sugillationen am Processus mastoideus bei Brüchen der Schläfenbeinschuppe oder der Pars mastoidea selbst. Bei Fracturen der hintern Schädelgruben kommt das Blut unter der Nackenhaut zu Tage. Es senkt sich hierher allerdings auch das Blut aus der Höhe der Lambdanaht und der Hinterhauptsschuppe.

Ist die Basisfractur eine complicirte, so tritt das Blut an die freie Oberfläche; es kommt zu

2) Blutungen. Am häufigsten finden diese aus dem äusseren Gehörgang statt, nach Brüchen, welche das Mittelohr durchsetzen und das Trommelfell zerrissen haben. Ist ein Sinus verletzt worden, so kann die Blutung sehr stark sein und lange andauern. Dringt das Blut durch die Tuba Eustachii, so gelangt es in die Rachenhöhle. Ebendort hin ergiesst es sich bei Brüchen des Keilbeilkörpers, während es bei Brüchen der horizontalen Siebbeinplatte aus der Nase ausströmt. Da die Patienten leicht das in den Rachen dringende Blut verschlucken, so ist ein blutiger Auswurf und Erbrechen blutiger Massen bei Basisfracturen nicht selten. Im Anschluss an die Blutungen aus dem Ohr und unter denselben Bedingungen kommt es häufig zu einem

3) Ausfluss von Liquor cerebrospinalis aus dem Ohr. Es muss dazu stets eine Zerreissung der Dura und Eröffnung der Subarachnoidealräume erfolgt sein, und es nimmt dann die seröse Flüssigkeit ihren Weg entweder durch den inneren Gehörgang, das Labyrinth und das zerrissene Trommelfell, oder sie tritt durch Bruchspalten in der obern Wand des knöchernen Gehörgangs (Tegmen tympani) in den äusseren Gehörgang. Man muss sich daran erinnern, dass das austretende Fluidum auch Lymphe (Aqua Cotunni) oder von einem ausserhalb der Dura gelegenen Blutgerinnsel ausgepresstes Serum sein kann, und darf Liquor cerebrospinalis nur dann annehmen, wenn die Flüssigkeit unmittelbar nach dem Trauma, lange Zeit hindurch (bis 4 Tage) und in grossen Mengen (in 24 Stunden 150—500 gr) ausquillt und wenn sie gleichzeitig hell, kochsalzhaltig und eiweissarm oder eiweissfrei ist. Bei Brüchen des Siebbeines hat man, wenn auch selten, den Austritt von Liquor cerebrospinalis aus der Nase beobachtet. In gleicher Weise findet man zuweilen aus dem äusseren Gehörgang und zur Nase hinaus den

4) Austritt von Gehirnsubstanz. In den äusseren Gehörgang dringt das Hirn am leichtesten aus Spalten, welche die obere Wand des erstern eröffnen; es ist dann vorher zu einem Brei zerquetscht worden und kann ausfliesen, ohne dass man gleichzeitig die Hirnflüssigkeit hätte ausströmen sehen.

5) Lähmungen einzelner Hirnnerven sind für die Diagnose nur dann verwerthbar, wenn diffuse Hirnsymptome fehlen. Ist sofort nach der Verletzung eine vollständige Lähmung vorhanden, so ist der betreffende Nerv durch ein Fragment gequetscht oder zerrissen worden, nimmt sie dagegen im Laufe der ersten Stunden

zu, so handelt es sich wahrscheinlich um einen den Nerven drückenden Bluterguss. Treten nervöse Störungen erst nach Tagen oder Wochen auf, so sind sie abhängig von einer längs des Nervenstammes sich verbreitenden Entzündung, einer Neuritis ascendens, einem gefährlichen Ereigniss, da es zumeist zur Meningitis basilaris führt. Die am häufigsten lädirten Nerven sind der Facialis, Acusticus, Trigeminus, Opticus und die Augenmuskelnerven. Sind der Opticus oder die Augenmuskelnerven und von diesen vor allem der Abducens und Oculomotorius in ihren Stämmen oder in ihren cerebralen Centren betroffen, so treten Sehstörungen auf, wie bleibende oder vorübergehende Erblindung, Sehnervenatrophie, Augenmuskel- und Lidlähmungen, Doppelsehen, Schielen, sowie auch wohl ein pulsirender Exophthalmus. Abducenslähmungen sind übrigens nicht so sehr häufig beobachtet worden. *Th. v. Schröder* fand 1892 nur 12 isolirte, einseitige und 8 doppelseitige derselben in der Litteratur beschrieben. Bezüglich der Diagnose, der Opticusverletzung muss man nach *Leber* unterscheiden, ob der Opticus hinter der Eintrittsstelle der Gefässe oder zwischen dieser und dem Augapfel getroffen ist. Im ersteren Falle ergibt die ophthalmoskopische Untersuchung erst nach Wochen vielleicht eine Entfärbung oder Atrophie der Papille. Im letztern Falle ist dagegen die Blutzufuhr mit abgeschnitten, und man hat daher sofort das ophthalmoskopische Bild wie bei einer Embolie der Centralarterie. Sind die Gefässe nur comprimirt, so erhält man das Bild der Stauungspapille.

Schwindel und Gleichgewichtsstörungen, Umfallen nach der kranken Seite beruhen nach *v. Bergmann* nicht sowohl auf einer Verletzung der nervösen Organe der halbzirkelförmigen Kanäle als auf einer gleichzeitigen Hirnläsion.

6) Schliesslich ist noch das Hautemphysem zu erwähnen, welches nach Brüchen des Processus mastoideus am Hinterhaupt, nach solchen des Siebbeines in der Augenhöhle, den Lidern und den anstossenden Theilen des Gesichtes, nach solchen der Stirnhöhlen an der Stirn zur Entwicklung gelangen kann.

Prognose der Basisbrüche.

Die Prognose der Basisbrüche ist stets eine zweifelhafte. Sie können direct tödtlich werden durch eine begleitende Contusion des Gehirns und der grossen Nervenstämme, sowie durch Ansammlung von Blut längs der wichtigsten Hirnprovinzen. Weiterhin sind sie

trotz ihrer versteckten Lage doch sehr oft der äusseren Luft und damit den Entzündungserregern zugänglich. Einmal werden ja durch die Spalten die luftführenden Nasen-, Stirn- und Keilbeinhöhlen und am häufigsten die Paukenhöhle und der äussere Gehörgang eröffnet, dann aber nehmen die Fissuren doch sehr oft ihren Ursprung an der Convexität, und damit kann der Bruch an der Basis mit einer Hautwunde am Dache in Verbindung gebracht werden. Namentlich aus der Nasenhöhle können noch l ä n g e r e Zeit nach der Verletzung pathogene Keime in das Schädelinnere verschleppt werden, So hat noch ganz kürzlich *Fränkel* einen Fall mitgetheilt, in dem am 21. Tage nach erfolgtem Schädelbruch durch Eindringen des Diplococcus pneumoniae eine Meningitis erzeugt wurde. Entwickelt sich eine Eiterung, so macht meist eine Basilarmeningitis dem Leben ein Ende; ungleich viel seltener kommen die Patienten mit partiellen Necrosen, z. B. des Felsenbeines, davon. Bleibt die Eiterung aus, so heilen die Fracturen der Basis ebenso gut wie die der Convexität mit knöchernem, zuweilen von Bindegewebe unterbrochenem Callus.

Die Heilung erfolgt aber erst nach längerer Zeit. Im Allgemeinen erfordert dieselbe etwa 100 Tage. Die von Seiten der Hirnnerven oder des Hirns selbst ausgehenden Störungen bleiben natürlich noch längere Zeit bestehen. Von übler Prognose sind namentlich auch die einseitigen, plötzlich nach der Verletzung entstandenen Erblindungen. So trat unter 27 von *Berlin* beobachteten Fällen der Art nur einmal eine Wiederherstellung des Sehvermögens ein.

Therapie der Basisbrüche.

Die Behandlung der Basisfracturen weicht in nichts ab von der der Schädeldachfracturen, nur wird noch mehr als bei diesen die gleichzeitige Hirnläsion das Vorgehen des Arztes beeinflussen. Neben absoluter Ruhe und Erfüllung der früher beschriebenen diätetischen Vorschriften soll man auch diese Brüche möglichst aseptisch behandeln. Bei Communication des Bruchspaltes mit der Nasen- und Rachenhöhle ist dies allerdings nicht so gut möglich, wie beim Betroffensein des äussern Gehörganges. Hier werden etwaige Blutungen durch Tamponade mit aseptischer Watte gestillt. Steht die Blutung, so spritzt man die Blutgerinnsel mit einer schwachen Sublimat-, Salicyl- oder Borsäurelösung unter schwachem Drucke vorsichtig aus, damit man nicht etwa pathogene Keime in das Schädelinnere hineintreibt, verstopft dann das äussere Ohr mit

Watte und legt einen antiseptischen Verband an. Sollte schon Eiterung eingetreten sein, so verhält man sich wie bei einer aus andern Ursachen entstandenen Otorrhoe. Bei Brüchen des Siebbeines empfehlen sich Ausspülungen der Nase mit schwachen Lösungen von Kali hypermanganicum oder Sublimat mit nachfolgender Jodoformgazetamponade. Sind die Weichtheile der Orbita verletzt, so werden sie gehörig desinficirt, die Wunde möglichst günstig gestaltet und Occlusivverband angelegt. Ist die Wunde bereits inficirt, so dringe man möglichst gegen die Bruchstelle vor und lege Drainageröhren ein. Fremdkörper müssen aus der Orbita entfernt werden, selbst wenn sie fest eingekeilt sind. Es ist dazu eine Erweiterung kleinerer Wunden dringend nothwendig.

Eine besondere Betrachtung widmen wir als Unterabtheilung der Convexitätsbrüche den

Fracturen der vorderen Stirnhöhlenwand.

Anatomische Vorbemerkungen.

Die Stirnhöhlen entwickeln sich erst nach der Geburt, sind gegen das 6.—7. Lebensjahr etwa erbsengross und erstrecken sich bei Erwachsenen nach oben etwas mehr als 4 cm über die Incisura nasalis, nach der Seite aber bis zur Grenze des inneren und mittleren Drittels vom Supraorbitalrand. Die Mündung der mit Periost und Schleimhaut ausgekleideten Höhlen ist meist weit und befindet sich unter dem Ansatz der mittleren Muschel, nicht weit hinter deren vorderem Ende. Die vordere Knochenwand besitzt etwa dieselbe Widerstandsfähigkeit gegen äussere Gewalten wie das übrige Schädeldach und erhält noch eine besondere Verstärkung durch den schief über die Höhlen hinziehenden Arcus superciliaris.

Aetiologie und Pathologische Anatomie. Wie bei den besprochenen Convexitätsfracturen unterscheiden wir auch hier complicirte und nicht complicirte Fissuren, Spaltbrüche, Impressionen, Splitter- und Lochbrüche.

Die brechenden Gewalten sind entweder scharfe, wie ein Messerstich, oder stumpfe, wie Projectile, Hufschlag, Fall, Stoss oder Schlag.

Der Bruch betrifft entweder nur eine oder beide Stirnhöhlen und besteht entweder für sich oder neben anderen Knochenbrüchen. Das Periost findet sich des öfteren abgehoben, die Bruchstücke in die Stirnhöhle hineingetrieben und von der Schleimhaut abgerissen.

Je nach der Richtung, in welcher die Gewalt wirkt, bieten sich vielfach Complicationen von Seiten der Nasenbeine, der Thränenbeine, der Augenlider und des Augenhöhleninhaltes. Verletzungen der hinteren Stirnbeinwand, der Lamina cribrosa und der cerebralen Gebilde finden sich in der Regel nur bei den schwersten Formen der complicirten Schädelbrüche.

Symptome. Neben mehr weniger heftigen Shocerscheinungen findet sich nicht selten eine Commotio cerebri. *v. Bergmann* ist der Ansicht, dass unmittelbar nach der Verletzung oder erst später eintretende Hirnsymptome bei den Brüchen der Stirnhöhlen mit hoher Wahrscheinlichkeit als ein Zeichen gleichzeitiger Läsion der hinteren Sinuswand angesehen werden müssen. Er schliesst zwar die Möglichkeit einer Verbreitung von Entzündung und Eiterung in der Stirnhöhle auf die hintere Knochenlamelle und die Hirnhäute nicht aus, selbst ohne dass der Knochen vorher zerstört ist, hält dieselbe aber doch für im Ganzen recht selten. Das Ausbleiben von Hirnsymptomen berechtigt aber trotzdem nicht, auf eine Integrität der Tabula interna zu schliessen.

Allgemeine oder in der Stirngegend localisirte Kopfschmerzen, Blutungen aus der Nasenhöhle, zuweilen Erbrechen verschluckten Blutes, subconjunctivale Blutergüsse, Sugillation der Augenlider, Hautemphysem, das sich in das Zellgewebe der Augenhöhle fortpflanzen und zur Protrusion des Bulbus führen kann, sind wechselnd vorhanden. Bei grösseren Substanzverlusten, wo die Schleimhaut intact war, sah *Boyer* ein mit der Respiration rhythmisches Sich-Heben und -Senken und *Rizet* einen herniösen Vorfall der Schleimhaut.

Die **Diagnose** setzt stets eine genaue Untersuchung voraus und hat namentlich durch zweckmässige Beleuchtung oder Sondenuntersuchung das Verhalten der hinteren Stirnhöhlenwand zu prüfen.

Die **Prognose** ist gut bei antiseptischer Behandlung. Bei eintretender Infection kann der Tod durch Meningitis erfolgen oder eine langwierige Eiterung mit Sequestrirung der Knochen, oder ein Hydrops der Stirnhöhle entstehen. Auch Fisteln können zurückbleiben. *Guthrie* theilt einen Fall mit, in dem sich nach Heilung einer Stirnhöhlenwunde beim jedesmaligen Schneuzen die Weichtheile der Stirn zu einer elastischen, crepitirenden Geschwulst erhoben, so dass der Kranke eine Compressionsbandage tragen musste.

Die **Therapie** hat die Asepsis der complicirten Fractur wie bei den Convexitätsbrüchen zu erstreben. Es gelten hier die gleichen Grundsätze wie dort. Im Allgemeinen ist ein zu actives Vorgehen zu widerrathen. Bei subcutanen Fracturen trepanirt man nur, wenn man völlig losgelöste Splitter fühlt. *Wagner* räth allerdings, auch dann zu trepaniren, wenn man zweifelhaft ist, ob auch die hintere Stirnhöhlenwand verletzt ist, denn die stricte Durchführung der Antisepsis ist die Hauptsache. Bei älteren Fracturen mit inficirter Schleimhaut soll man letztere auskratzen und antiseptisch tamponiren. Bei vorhandenem Emphysem ist ein Compressionsverband indicirt.

Die eröffnete Stirnhöhle drainirt man zweckmässig in der Weise, dass man mittelst einer entsprechend gebogenen Sonde von ihr aus eine Drainageröhre in den untern Nasengang zur Nase herausführt.

Defecte der vorderen Stirnhöhlenwand, wie des Schädeldaches überhaupt könnte man durch Transplantation eines *König*'schen Haut-Periost-Knochenlappens schliessen.

Brüche der Gesichtsknochen.

Anatomisch - physiologische Vorbemerkungen.

Die Brüche der Gesichtsknochen betragen etwa 2,4 % aller zur Beobachtung kommenden Fracturen, sind also relativ seltene Verletzungen. Am häufigsten bricht noch der Unterkiefer, nach *Gurlt* etwa doppelt so häufig als die übrigen zusammengenommen. Die Seltenheit dieser Fracturen beruht zum Theil auf der Configuration des Gesichtsskelettes: Die einzelnen Knochen bilden theils gewölbte Flächen und Bogen, theils Gruben, die von Weichtheilen ausgefüllt sind, und es gehören daher kräftige Gewalten dazu, um sie zu brechen. Sie sind ferner sehr innig und fest mit einander verbunden. Die Zusammenhangstrennung beschränkt sich daher oft nicht auf einen Knochen, sondern geht auf seine Nachbarn über, so dass an einem Individuum sogar alle betroffen sein können. Die Brüche sind weiterhin meist complicirte, wenn auch die äussere Haut unverletzt ist, indem in der Regel die Schleimhaut einer der Höhlen des Gesichtes verletzt ist und durch den Riss derselben die Luft zur Bruchspalte gelangt. Die Gesichtsknochen besitzen eine grosse Plasticität, sodass selbst Splitter, die nur noch lose an Weichtheilen festhängen, wieder einheilen können. Der

Reposition und Erhaltung der Bruchstücke in ihrer richtigen Lage setzen sich manche Schwierigkeiten in den Weg, insofern man nicht ohne grosse Beschwerden für den Kranken Verbände anlegen kann. Andererseits bedarf man öfters keines solchen, indem keine beträchtlichen Dislocationen eintreten. Wir betrachten nun die einzelnen Fracturen und besprechen zuerst die


A. Brüche des Nasengerüstes.

Man rechnet hierher die Brüche der Nasenbeine, des Nasenfortsatzes des Oberkiefers und des Stirnbeins, ferner die Fracturen der Lamina perpendicularis des Siebbeines, der Thränenbeine, des Vomer und der Muscheln.

Bei der Kürze, dem gewölbten Bau und dem starken Gefüge der Nasenbeine brechen dieselben nur nach Einwirkung einer direkten und zwar ziemlich starken Gewalt, die, wie ein Fall, Stoss oder Schlag, Ueberfahrenwerden, von aussen her einwirkt. Selten greift sie von innen her an, wie z. B. eine Kugel, welche in den Mund gefeuert, an der Nasenwurzel hervordringt. Sehr häufig sind gleichzeitig die andern Gesichtsknochen mit gebrochen.


Bezüglich der anatomischen Charaktere dieser Brüche ist zunächst hervorzuheben, dass Diastasen eines oder beider Nasenbeine aus ihren Verbindungen noch sehr wenig beschrieben sind. Ebenso sind Fracturen eines Nasenbeines allein ziemlich selten. Sie finden sich gelegentlich an einer unteren Ecke, da wo der Knochen am dünnsten ist. Weit häufiger brechen beide Nasenbeine zusammen. Die Bruchlinie sitzt in solchem Falle meist in der Mitte der Knochen und verläuft quer oder mehr weniger schräg. Die Fragmente werden entweder beide nach innen getrieben, sodass sich die Nase vollständig abplattet (Fig. 26) und Aehnlichkeit mit einer syphilitischen Sattelnase bekommt, oder sie werden

Fig. 26.



nach der Seite hin dislocirt, so dass ein Schiefstand der Nase eintritt (Fig. 27). Jedesmal nehmen auch die Lamina perpendicularis und der Vomer an der Verschiebung Theil. Sie werden entweder gebrochen (Fig. 26), oder es erfolgt nur eine gewissermassen compensatorische Verkrümmung derselben in ihren unteren Theilen (Fig. 27). Falls dieses seitliche Einknicken der Nasenscheidewand nicht rechtzeitig stattfindet, kann sich die Gewalt in direkter Richtung bis zur Crista galli fortsetzen, so dass es zu

Fig. 27.



Fissuren der Schädelbasis kommt. Es gehören dazu jedoch bedeutende Krafteinwirkungen, wie sie ebenso erforderlich sind, um Brüche an der festgefügten Nasenwurzel zu erzeugen. Solche Brüche sind dann wohl auch mit Fracturen der Stirnhöhlenwände oder mit Absprengung eines oder des andern Orbitalrandes verbunden und bilden sehr schwere Verletzungen, welche durch Hirncontusionen, Blutungen oder eitrige Meningitis sehr oft den Tod zur Folge haben.

Die allerhäufigsten Nasenfracturen sind ausgedehnte Splitterbrüche des ganzen Nasengerüstes. Dies ist nicht wunderbar, da die Knochen nur sehr wenig Diploë besitzen und daher ausserordentlich spröde sind.

Die Schleimhaut der Nase ist meist zerrissen. Auch die Nasenknorpel können einbrechen oder abreissen, obwohl sie Dank ihrer Elasticität der Gewalt meist ausweichen.

Symptome der Nasenbrüche.

Die Diagnose einer Nasenfractur ist in der Regel leicht zu stellen, wenn die Patienten sofort nach der Verletzung zur Behandlung kommen. Später kann die Fractur verdeckt werden durch die Schwellung der Weichtheile. Diese ist oft sehr beträchtlich, erstreckt sich über die Wangen und nach den Augen hin und kann mit Blutunterlaufungen der Haut und Oedem der Lider verbunden sein. Die Haut ist dabei oft stark geschunden und schmerzhaft, so dass die genauere Untersuchung in der Narcose zu geschehen hat, die ohnedies der Therapie wegen meist nothwendig ist. Ist die Schwellung noch gering, so fällt zunächst die Deformität der Nase auf, welche schief steht oder abgeplattet ist und dabei oberhalb der dislocirten Fragmente die stehen gebliebenen Knochenränder erkennen lässt. Diese fühlt man auch bei der Palpation, welche weiterhin Crepitation und abnorme Beweglichkeit der Bruchstücke nachweist. Man überzeugt sich von diesen Erscheinungen am besten in der Weise, dass man den kleinen Finger oder einen weiblichen Katheter in die Nase einführt und mit der andern Hand von aussen die Theile abtastet und sich entgegendrückt. Gewöhnlich sind die Nasenfracturen von Blutungen aus der Nase begleitet, die oft sehr heftig sind, ja sogar zum Tode führen können. Seltener kommt es zu einem Hautemphysem, indem die Luft der Nasenhöhle durch die Schleimhautrisse in das subcutane Gewebe um die Nasenwurzel und die Augenlider eindringt. Das Emphysem steigert sich beim Schneuzen der Nase wie bei jeder heftigen Exspirationsbewegung, doch pflegt es sich im Allgemeinen nicht weit zu verbreiten. Wo es nach einer frischen Verletzung an der Nase entsteht, kann man mit Sicherheit eine Fractur annehmen.

Die sich in die Schädelbasis fortsetzenden Fissuren kann man nicht direkt nachweisen. Man darf sie jedoch annehmen bei Einwirkung sehr schwerer Gewalten, auch wenn sich nicht sofort Gehirnerscheinungen einstellen. Durch stark seitlich dislocirte Fragmente können die Thränenwege verletzt werden, so dass es zu Thränenträufeln und später zu Thränensackfisteln kommt. Zudem können sich durch Schwellung der Nasenschleimhaut heftige Respirationsbeschwerden entwickeln.

Im weiteren Verlauf der Nasenbrüche entsteht zuweilen eine Periostitis und eine Perichondritis, die zur Ablösung des

Periostes und damit zu partieller Necrose der Knochen führen können. In Folge solcher Necrosen resultiren dann später entweder starke Entstellungen oder stinkende Eiterausflüsse aus der Nase, Ozoena traumatica, welche erst aufhören, nachdem die Sequester entfernt sind. An eine solche Periostitis muss man denken, wenn die entzündlichen Erscheinungen nach der Fractur nicht nachlassen, ein dumpfer, nach der Stirn hin ausstrahlender Schmerz übrig bleibt und dazu noch eine Geschwulst hinzutritt. Die Incision der Geschwulst und Entleerung des Eiters wird dann dem Ausgange in Necrose vorbeugen, die sonst lange Zeit noch die Patienten belästigt. Im Ganzen sind die letztgenannten Folgen doch sehr selten.

Prognose der Nasenbrüche.

Die Prognose der Nasenfracturen ist im Allgemeinen günstig, da selbst complicirte Splitterbrüche rasch durch festen Callus heilen können. Bleibende Nachtheile entstehen fast nur, wenn keine passende Behandlung eintritt. Es sind hier die entstellenden Dislocationen, die Ozaena traumatica, eine bleibende Verengerung der Nasenhöhle durch Schiefstand des Septums und die Thränensackfisteln zu nennen.

Therapie der Nasenbrüche.

Die Therapie der Nasenfracturen ist eine sehr einfache, wenn keine Dislocation vorhanden ist und die Blutung steht. Man legt in solchem Fall auf die geschundene Haut eine antiseptische Salbe (Acid. borici 1,0 Vaselini 20) auf oder macht Umschläge mit Bleiwasser. Ist die Weichtheilschwellung sehr stark und sind gleichzeitig Hirnerscheinungen vorhanden, so legt man auch wohl eine Eisblase darüber. Ist die Haut verletzt, so werden stark gequetschte Partieen abgetragen und die intacten Ränder möglichst exact durch die Naht geschlossen. Die Heilung erfolgt meist per primam intentionem. Eine mässige Blutung aus der Nase stillt man durch Berieselung mit kalten antiseptischen Flüssigkeiten, etwa einer 2%igen Borsäurelösung. Wo man diese nicht zur Hand hat, genügt auch kaltes Wasser. Ist die Blutung stärker, so kommt man oft nur durch Tamponade der Nase zum Ziel.

Die Hauptindication für die Behandlung der Fracturen ist die primäre Beseitigung der Dislocation, da diese schon nach wenigen Tagen sehr viel schwerer gelingt. Es geschieht dies in gleicher Weise, wie man auf Crepitation untersucht, indem

in die Nase, wenn es geht, der kleine Finger, im andern Fall ein weiblicher Katheter, ein eigens dazu construirtes Instrument *(Dubois)* oder eine Korn- oder Polypenzange eingeführt wird und so die Knochen durch gleichzeitigen Druck von innen und aussen in ihre richtige Lage gebracht werden. Ist der Nasenfortsatz des Oberkiefers gebrochen, so führt man, um den Thränennasenkanal wegsam zu erhalten, von unten her eine hinreichend starke, stählerne *Laforest*'sche Sonde in denselben ein und reponirt ebenfalls von innen nach aussen. Etwaige Splitter sucht man, wenn sie auch nur ganz lose mit dem Periost zusammenhängen, möglichst zu erhalten; sie heilen in der Regel wieder ein. Ist die Reposition gelungen, so hält das Nasengerüst fast stets schon von selbst. Ist Neigung zur Wiederherstellung der Verschiebung vorhanden, so vermeidet man dieselbe am besten dadurch, dass man zwei mit Borsalbe bestrichene, passend dicke Drainröhren in die Nasenlöcher einführt. Von aussen angelegte Verbände schaden mehr, als sie nützen. Die Drainröhren werden von Zeit zu Zeit gewechselt und die Nase mit schwachen Lösungen von Kali hypermanganicum, Borsäure oder Sublimat (1 : 10,000) ausgespült. Ist einmal eine eitrige Meningitis im Anzug, so ist die Therapie meist machtlos.

Bei veralteten Fracturen der Nase muss man mittelst kräftiger Hebel die Dislocation zu beseitigen suchen, eventuell plastische Operationen vornehmen. Ein schiefstehendes Septum operirt man am besten durch Excision mehrweniger grosser Theile aus demselben, um auf diese Weise die beiden Nasenhälften in Communication zu bringen.

B. Brüche des Jochbeins.

Das Jochbein ist durch seine exponirte Lage manchem Stoss und Schlag ausgesetzt. Brüche desselben sind jedoch wegen seines gewölbten und festen Baues und seiner festen Verbindung mit dem Oberkiefer, dem Stirn- und Schläfenbein sehr selten.

Sie entstehen nur durch starke directe Gewalten und sind in der Regel Splitterbrüche. Der Knochen wird dabei meist nach rückwärts getrieben und bricht daher in der Regel gleichzeitig die äussere Wand der Kieferhöhle oder die untere Wand der Augenhöhle ein. Zuweilen wird das Jochbein aus seinen Nahtverbindungen mit den übrigen Knochen völlig herausgeschlagen und nach der Augenhöhle hin verschoben, so dass Compression des Bulbus entstehen kann. Es sind dann meist auch Fracturen der Nachbar-

knochen vorhanden. Verläuft dabei eine Bruchlinie durch den Infraorbitalkanal, so kann der Nervus infraorbitalis zerrissen werden (Fig. 28 u. 29). Ist durch einen mehrfachen Bruch das Mittelstück des Jochbogens losgelöst, so kann es durch den Masseter nach abwärts gezogen werden. Selten werden die Fragmente durch eine vom Munde her wirkende Gewalt, wie bei Schüssen in denselben, nach aussen gelangen. Durch beschränkte Gewalten kommen auch Absprengungen einzelner Theile, z. B. des äussern Orbitalrandes, vor. Die schwereren, oft complicirten Jochbeinfracturen sind häufig mit Schädelverletzungen verbunden.

Symptome der Jochbeinbrüche.

Die Symptome der Jochbeinfractur treten, wenn keine zu starke Weichtheilgeschwulst besteht, recht auffallend zu Tage, indem durch die Dislocation der Fragmente eine sicht- und fühlbare Abflachung des entsprechenden Wangentheiles, seltener abnorme Prominenzen hervorgerufen werden. Eine genaue Palpation des Jochbeines erfordert, dass man gegen dasselbe von aussen dann aber auch von der Augenhöhle und mit dem in den Mund eingeführten Finger vordringt. Man wird dann meist Crepitation und abnorme Beweglichkeit nachweisen können. Ist der Nervus infraorbitalis lädirt, so besteht Anästhesie der Wange, der Nasenhälfte und der Oberlippe. Wird der Nervus dentalis superior gedrückt, so sind auch das Zahnfleisch und die Zähne dieser Seite unempfindlich und taub. Blutungen sind im Ganzen selten. Bei Zerreissungen der Kieferhöhlenschleimhaut können dieselben aus der Nase erfolgen, bei gleichzeitigem Bruch der Orbita Exophtalmus erzeugen oder eine subconjunctivale Ecchymose, wie sie in gleicher Weise bei Basisfracturen entsteht. Fast stets ist das Kauen und das Oeffnen des Mundes erschwert. Es kann dies herrühren von einer Quetschung des Temporalis oder Zerreissung des Masseter, auch wohl von einem Druck, den die nach dem Proc. coronoideus des Unterkiefers dislocirten Fragmente auf diesen Fortsatz auszuüben vermögen.

Prognose der Jochbeinbrüche.

Die Heilung der Jochbeinfracturen erfolgt mit Bildung eines knöchernen Callus innerhalb 3—4 Wochen. Waren die Fragmente stark deprimirt, so bleibt meist eine, wenn auch nicht auffallende Deformität zurück.

Therapie der Jochbeinbrüche.

Die Therapie sucht die Reduction der Fragmente zu bewerkstelligen, indem man von aussen, von der Orbita und vom Munde her an dieselben heranzukommen sucht. Gelangt man so nicht zum Ziele und will absolut einer späteren starken Entstellung vorbeugen, so könnte man unter allen aseptischen Cautelen die Reposition von einem kleinen Einschnitt auf die Bruchstelle aus versuchen. Man wird jedenfalls so eher zum Ziele gelangen, als wenn man die Elevation mit einem Tirefond oder nach *Stromeyer* mit einem starken, durch die Haut hindurch in die Fragmente eingestossenen Resectionshaken unternimmt.

Zur Retention der Fragmente kann man nur die an sich schon schmerzhafte Bewegung des Unterkiefers durch ein Capistrum verhindern. Alle anderen Verbände sind unnütz, denn der Knochen hält sich schon von selbst in seiner Lage, wenn die Reposition gelungen ist.

C. Brüche des Oberkiefers.

Die Brüche des Oberkiefers entstehen fast ausnahmslos durch direkte Gewalten, wie durch einen Schlag oder Stoss auf das Gesicht, Schussverletzung, Auffallen schwerer Lasten oder Ueberfahrenwerden. Da indess solche Kräfte meist durch die vorspringenden Nasen- und Jochbeine parirt werden, so sind die Oberkieferbrüche ziemlich selten, anderntheils aber häufig mit Brüchen dieser Knochen combinirt. Die Fracturen sind in der Regel complicirte, indem entweder die äusseren Bedeckungen oder häufiger die Mundschleimhaut verletzt sind oder auch das Antrum Highmori sich eröffnet findet.

Abgesehen von den begleitenden Brüchen der Nasen- und Jochbeinfortsätze, die wir schon kennen gelernt haben, unterscheidet man im Allgemeinen Quer- und Längsbrüche des Alveolarfortsatzes und des Oberkieferkörpers.

Die Brüche des Alveolarfortsatzes entstehen vielfach beim ungeschickten Ausziehen der Zähne. Die dünnen Knochenlamellen können dabei entweder nur eingebrochen oder auch in mehrere Splitter getrennt sein. Es können aber durch solche Zahnoperationen gelegentlich auch ernstere Verletzungen hervorgerufen werden, wie sie sonst nur die Folge äusserer Verletzungen sind. Durch solche kann der ganze Alveolarfortsatz bis zu dem Proc. pterygoideus abbrechen und die Highmorshöhle eröffnet werden,

indem der abgetrennte Fortsatz mitsammt den in ihm enthaltenen Zähnen nach einwärts gedrängt wird. Seltener verläuft die Bruchlinie von einem Proc. pterygoideus bis zum andern, wobei dann sogar das ganze Gaumengewölbe abgetrennt sein kann.

Die Brüche des Oberkieferkörpers sind entweder einfache Spalt- oder häufiger Splitterbrüche, welche die vordere Wand der Highmorshöhle betreffen (Fig. 28 und 29). Ist die Splitterung sehr ausgedehnt, so können sich Fissuren auf die Nachbarknochen erstrecken und bedeutende Dislocationen entstehen, indem die Splitter nicht nur nach einwärts, sondern auch gegen den Bulbus hin gedrängt werden. Die bedeutendsten Zerstörungen kommen durch Schussverletzungen vor. Während Schüsse, welche Selbstmörder sich in den Mund abfeuern, das Gaumengewölbe zertrümmern oder das ganze Gesichtsskelett zerschmettern, können Kugeln, welche die Kiefer von der Seite her treffen, quer durch sie hindurch gehen, sie ausgedehnt zermalmen, merkwürdigerweise aber die Zähne ganz intact lassen. In einzelnen Fällen wird auch wohl ein ganzes Stück des Kiefers mit fortgerissen oder eine Kieferhälfte aus ihren Nähten gesprengt.

Fig. 28.





Fig. 29.



Die Längsbrüche des Oberkiefers sind viel seltener als die Querbrüche. Sie stellen sich entweder dar als isolirte Diastasen der beiden Oberkiefer und Gaumenbeine in der Mittel-

linie, so dass der Bruchspalt zwischen den Schneidezähnen beginnt und in der Mittellinie des harten Gaumens bis zum weichen Gaumen reicht, oder sie verlaufen seitlich von der Mittellinie vom Eckzahn nach oben längs des Proc. nasalis. Der eine Oberkiefer kann dabei noch anderweitig verletzt sein, so dass er entweder tiefer steht oder nach rückwärts eingedrückt ist oder sich etwas gedreht hat. In diesem Falle kommen dann die Kauflächen der Zähne nach innen oder nach aussen zu stehen. Sehr selten findet man einen oder beide Oberkiefer in toto aus ihren Verbindungen mit den übrigen Gesichtsknochen getrennt und nach hinten gegen den Pharynx dislocirt.

Symptome der Oberkieferbrüche.

Die Diagnose der Oberkieferfracturen ist leicht zu stellen. Besteht keine Dislocation der Fragmente, so lässt doch ein blutiger Spalt zwischen zwei Zähnen den Einriss der Schleimhaut erkennen und die Palpation weist dann an dieser Stelle abnorme Beweglichkeit nach, indem man die betreffenden Zähne gegen einander verschieben kann. Besteht eine Dislocation der Fragmente, so verräth sich dieselbe durch das Einsinken der Wange oder den ungleichen Stand der Zähne. Beim Zufühlen erkennt man dann leicht die abnorme Beweglichkeit und Crepitation. Schwer ist es oft nur, den Verlauf etwa noch bestehender Fissuren richtig anzugeben. Dazu kommen noch Blutungen aus den verletzten Schleimhäuten durch den Mund oder die Nase heraus, ferner Emphysem der Haut bei Verletzung der Highmorshöhle. Auch ödematöse Schwellungen treten in den ersten Tagen nach der Fractur häufig auf und sind besonders am weichen Gaumen oft so erheblich, dass sie Schlingbeschwerden verursachen. Weiterhin ist die Function des Kiefers je nach der Lage der Fractur beim Sprechen und Kauen beeinträchtigt und wie bei allen Verletzungen der Mundhöhle eine stärkere Speichelsecretion vorhanden. Daneben besteht dann schliesslich noch eine mehr oder weniger starke Schwellung der Weichtheile, spontane Schmerzen und Druckempfindlichkeit. Besonders sollen Schmerzen, die bei Druck auf den Proc. pterygoideus entstehen, pathognomonisch für sonst ohne besondere Kennzeichen verlaufende Oberkieferbrüche sein. Durch Dislokation der Fragmente gegen den Bulbus kann derselbe schwer getroffen werden, ebenso kann durch Verletzung des Nervus infraorbitalis Anästhe-

sie der Wangen entstehen. Bei vielen durch starke Gewalten entstandenen Brüchen sind schliesslich gleichzeitig schwere Gehirnerscheinungen vorhanden.

Prognose der Oberkieferbrüche.

Die Prognose der Oberkieferbrüche ist auch bei ausgedehnteren Splitterfracturen meist eine günstige. Die Eiterungen, welche durch die Schleimhautrisse entstehen, hindern nicht eine schnelle Callusbildung, die bei einfachen Brüchen schon nach 14 Tagen bis 4 Wochen, bei schweren nach 5—7 Wochen den Knochen hinreichend fest und das Kauen wieder möglich macht. Es entsteht allerdings ein heftiger Mundkatarrh, und die Eiterung kann in den Nebenhöhlen lange Zeit fortdauern; es werden auch wohl Splitter und kleine Stücke des Proc. alveolaris necrotisch, aber Gefahren durch Pyämie oder Sepsis entstehen nicht, weil die Wundsecrete gut abfliessen können. Ein Exitus letalis erfolgt in der Regel nur durch die begleitenden Schädel- und Gehirnverletzungen. Die später resultirende Entstellung ist meist gering oder kann durch passende Prothesen aufgehoben werden.

Therapie der Oberkieferbrüche.

Die Therapie berücksichtigt zunächst die Deformität. Von der Wange, vom Mund und der Nasenhöhle her sucht man mit den Fingern oder mit Zuhülfenahme dicker Sonden die Fragmente in ihre richtige Lage zu bringen und erkennt diese letztere bei Brüchen des Alveolarfortsatzes daran, dass die Zahnreihe wieder vollständig symmetrisch steht. Splitter, die noch an Weichtheilen adhäriren, lässt man bestehen, da sie meist wieder anheilen. Ebenso werden losgelöste Zähne sorgfältig in ihre Alveolen replantirt, da sie wieder festwachsen. Primäre Resectionen, die man früher bei Splitterfracturen unternahm, werden heutzutage nicht ausgeführt. Etwaige Blutungen werden sorgfältig, eventuell durch Tamponade gestillt. Besteht keine Neigung zu Dislocationen, so legt man dem Patienten einfach eine Funda an und schient so den Unterkiefer gegen den Oberkiefer. Verschieben sich dagegen die Fragmente, so geschieht die Retention mittelst der von *Morel-Lavallée* angegebenen Guttaperchaschienen, die man weich auf die ganze reponirte Zahnreihe des Oberkiefers drückt und dann erstarren lässt. In neuerer Zeit werden von den Zahnärzten aus Aluminiumbronze passende Dentalschienen gefertigt (s. Unterkiefer). Das Zusammenbinden der dem Bruchspalt benachbarten Zähne mit Draht (*Ledran*),

sowie die complicirten Apparate, wie sie früher nach dem Vorgang von *Gräfe* u. A. angewendet wurden, sind wenig empfehlenswerth.

Bis zur Consolidation der Knochen muss der Kiefer möglichst geschont werden. Der Kranke darf deshalb nicht kauen, sondern bekommt flüssige Nahrung. Zur Reinigung des Mundes wird derselbe täglich mehrmals, besonders nach jeder Nahrungsaufnahme, mit schwachen antiseptischen Lösungen (Kali hypermanganicum) ausgespült und mit Kali chloricum-Lösung ausgewaschen. Splitter, welche sich durch Eiterung losstossen sollten, extrahirt man möglichst vom Munde aus.

D. Brüche des Unterkiefers.

Frequenz, Aetiologie und pathologische Anatomie.

Der Unterkiefer bricht wegen seiner exponirten Lage am häufigsten von allen Gesichtsknochen (39 %). Die Fracturen werden bei Männern etwa 10 mal so häufig wie bei Frauen, bei Kindern überhaupt nur selten beobachtet. Nach einer statistischen Zusammenstellung von *Bleichsteiner* kamen von 183 Fällen 56 im dritten, nur 7 im ersten Decennium vor.

Der Knochen besitzt eine grosse Härte und Dichtigkeit und überdies eine ziemliche Sprödigkeit (*C. O. Weber*). Die Bruchflächen sind daher in der Corticalsubstanz gewöhnlich glatt und scharfkantig und die Splitter meist sehr scharf.


Die meisten Unterkieferbrüche entstehen durch directe Gewalten, wie Stösse, Schläge, auffallende Lasten, Schüsse. Von dieser Wirkung der brechenden Kraft hängt nicht nur die Richtung des Bruches, sondern auch die Dislocation der Fragmente ab; letztere wird allerdings auch durch die Muskeln mehr weniger beeinflusst. Der Unterkiefer ist der einzige Gesichtsknochen, bei dem auch indirecte Fracturen vorkommen. Es kann dies in zweierlei Weise geschehen, je nachdem die Gewalt in frontaler oder sagittaler Richtung einwirkt. Im ersteren Fall sucht die Kraft, z. B. ein Wagenrad, das über eine Kieferseite herüberfährt, oder die Puffer von Waggons, die den Kopf einklemmen, die Krümmung des Knochens zu vermehren, und es bricht derselbe an der Stelle der stärksten Knickung. Im andern Fall ist der Bruch veranlasst durch einen Sturz auf das Kinn, wobei die Continuitätstrennung die Gelenkfortsätze betrifft. An dem Proc. coronoideus können schliesslich durch starke Contraction des Musculus temporalis auch Rissbrüche entstehen.

Die anatomischen Formen der Unterkieferfracturen sind mannigfaltige. Man unterscheidet Brüche des Alveolarfortsatzes, des Körpers, des aufsteigenden Astes und der Gelenkfortsätze, wobei je nach dem Grad der Trennung der Bruch ein unvollständiger, vollständiger, einfacher, doppelter oder Splitterbruch sein kann. Am häufigsten sind Brüche des Unterkieferkörpers, während der aufsteigende Ast durch die dicke, ihn deckende Muskulatur mehr geschützt liegt.

Die Brüche des Alveolarfortsatzes entstehen wie am Oberkiefer entweder bei unvorsichtigen oder rohen Zahnextractionen, oder sie verdanken einer directen Gewalt ihr Dasein, so an den Schneidezähnen, wenn dieselben von vorn mit hinreichender Kraft getroffen werden. Die Dislocation erfolgt dann nach einwärts, und das Zahnfleisch wird mit eingerissen. Bleibt dieses intact, so bleiben auch die Fragmente in ihrer normalen Lage.


Brüche des Unterkieferkörpers können an jeder beliebigen Stelle desselben vorkommen. Es gibt jedoch gewisse Prädilectionsstellen. Zunächst kann die Fractur in der sogenannten Symphyse sitzen. Die beiden Hälften des Unterkieferkörpers verknöchern schon sehr frühzeitig, so dass eine wirkliche Symphyse später gar nicht existirt. Es erhält vielmehr die Mitte des Körpers durch die Spina mentalis eine bedeutende Verstärkung, so dass Continuitätstrennungen gerade in diesem Theil nicht sehr häufig sind. Kommen sie vor, so verläuft die Bruchlinie vertikal zwischen den beiden mittleren Schneidezähnen nach abwärts, und die beiden Fragmente behalten ihre normale Lage bei. Seltener steht das eine Bruchende etwas hinter dem andern oder etwas höher als dieses. Hier und da kann man wohl auch ein geringes Klaffen bemerken.

Häufiger als in der Mittellinie finden sich die Fracturen in der Nähe derselben, im Bereiche der Schneidezähne oder zwischen diesen und den Eckzähnen. Gerade diese letztere Stelle wird gern betroffen, da sie die schwächste Partie des Knochens darstellt. Es rührt dies daher, dass der Eckzahn eine sehr lange Wurzel besitzt, die den Knochen in grösserer Ausdehnung aushöhlt, und dass hier das Foramen mentale gelegen ist. *Hamilton* fand unter 20 Fällen 14 mal die Bruchlinie hier verlaufend *Bleichsteiner* unter 115 Fällen 15 mal. Dieselbe ist entweder vertical oder häufiger schräg gerichtet, von oben und vorn nach unten und hinten. Ist das Periost völlig zerrissen, so ist die Dislocation der Fragmente in Folge des Muskelzuges eine typische. Durch den Bruch wird nämlich der Unterkiefer in ein kürzeres



und ein längeres Stück getrennt. An dem kürzeren Fragment inseriren die Kaumuskeln (M. temporalis, masseter und Mm. pterygoidei). Dieselben werden nach stattgehabter Fractur das Fragment im Sinne der Schliessbewegung des Unterkiefers nach aufwärts an den Oberkiefer bis zur Berührung der Zahnreihen erheben. Am längeren Bruchstück wirken dagegen die Muskeln, welche von der Nähe der Symphyse nach dem Zungenbein laufen und das Oeffnen des Unterkiefers besorgen, die Mm. digastricus, geniohyoideus, die vordern Fasern des hyoglossus und eventuell des mylohyoideus. Diese Muskeln werden das längere Fragment nach unten und etwas nach rückwärts ziehen, so dass eine beträchtliche Dislocatio ad latus zu Stande kommt. (Taf. I.) Die Fragmente liegen selten in einer Ebene, sind vielmehr meist auch in frontaler Richtung verschoben, indem das hintere Ende entweder nach aussen oder häufiger nach innen von dem vordern steht. Es hängt dies von der Richtung der Bruchlinie ab. Die Muskelwirkung kommt dabei nicht zur Geltung, weil der M. masseter und temporalis das Fragment nach aussen und etwas nach vorwärts, der pterygoideus internus dagegen dasselbe nach innen gegen die Zunge hin zu dislociren strebt.

Fig. 30.



Gar nicht selten findet man einen symmetrischen Bruch im Bereich der Schneidezähne. Bei einem solchen Doppelbruch ist dann das Mittelstück des Kieferbogens durch schräg laufende Bruchlinien entweder in Gestalt eines grossen Dreieckes

oder in Gestalt eines Trapezes herausgelöst. Die an der Symphyse inserirenden Muskeln ziehen nach stattgehabter Continuitätstrennung das centrale Fragment nach abwärts gegen das Zungenbein und gleichzeitig nach rückwärts gegen die Mundhöhle hin (Fig. 30). Die Zunge kann dabei derart nach hinten sinken, dass sie durch Verlegung des Kehlkopfeinganges Erstickungsgefahr hervorruft.

Doppelbrüche an den seitlichen Theilen des Unterkieferkörpers sind seltener, und ebenso betreffen Splitterbrüche und Schussfracturen öfters die Mitte desselben. Die Brüche im Bereiche der Backenzähne verlaufen meist schräg und sind oft gar nicht dislocirt, ebenso die Brüche hinter ihnen, wobei die Bruchlinie schief in den Unterkieferwinkel hineinläuft.


Sind der Körper und gleichzeitig beide Gelenkfortsätze abgebrochen, so spricht man von 3fachen Brüchen. Alle diese Fracturen gehen einher mit Verletzungen des Canalis alveolaris und demgemäss mit Zerrungen und Zerreissungen des Nervus und der Arteria mandibularis. Zu grösseren Blutungen kommt es jedoch selten, da im Falle einer Zerreissung das Gefäss meist stark torquirt wird.

Die Brüche am aufsteigenden Ast verlaufen selten quer. Meist haben sie eine schräge Richtung, indem sie von vorn und oben nach hinten und unten ziehen. Eine Dislocation ist in der Regel kaum vorhanden, da sich der M. masseter und die Mm. pterygoidei das Gleichgewicht halten. Zuweilen sind beide Aeste gebrochen, dann kann der Körper des Unterkiefers nach der Seite verschoben sein, und ebenso kann derselbe sich dislociren, wenn der Bruch des Astes complicirt ist mit einer Luxation des Gelenkfortsatzes der anderen Seite.

Die Gelenkfortsätze selbst brechen nicht sehr häufig. Im Falle einer Fractur verlaufen die Bruchlinien meist schräg von vorn oben nach hinten unten, indem sie vorn dicht über dem Ursprung des Gelenkfortsatzes ihren Anfang nehmen. Die Dislocation ist dann gewöhnlich sehr auffallend. Durch den M. pterygoideus externus wird der abgebrochene Proc. condyloideus nach vorn und innen gezogen, während das durch den ganzen übrigen Unterkiefer gebildete andere Fragment durch die übrigen Muskeln, besonders den M. pterygoideus internus der anderen Seite, nach der kranken Seite hin verschoben wird (Fig. 31). So kommt es, dass das Kinn nach der verletzten Seite hin steht, im Gegensatz zur einseitigen Luxation des Kiefers, bei der dasselbe nach der gesunden Seite hin gerichtet ist.

Brechen beide Gelenkfortsätze ab, so wird der übrige Unterkiefer stark nach hinten und oben gezogen, so dass die Zähne desselben weit hinter die des Oberkiefers zu stehen kommen. Die Brüche der Gelenkfortsätze sind zuweilen verbunden mit Brüchen ihrer Cavitas glenoidalis. Die Gelenkfort-

Fig. 31.



sätze können dann in den äusseren Gehörgang dislocirt werden und eine partielle Trennung des knöchernen und knorpeligen Gehörgangs hervorrufen. In solchem Falle können die Bruchlinien sich auch weit über die Schädelbasis hinaus erstrecken.


Am Processus coronoideus beobachtet man zuweilen Rissfracturen durch den an ihm inserirenden M. temporalis. Da meist Periost und Sehnenfäden beide Fragmente noch verbinden, ist die Dislocation in der Regel gering. Sie wird jedoch bedeutend, wenn die Continuität vollständig unterbrochen ist, da sich dann durch Retraction des Muskels die Fragmente weit von einander entfernen (Fig. 32).

Symptome der Unterkieferbrüche.

Die Symptome der Unterkieferfracturen sind in der Regel so in die Augen fallende, dass die Diagnose kaum Schwierigkeiten

bieten wird. Die Bewegungen des Unterkiefers sind schmerzhaft. Sie werden daher von dem Patienten vermieden, indem derselbe den gebrochenen Kiefer mit seiner Hand stützt. An die Fracturstelle gelangt man, indem man theils von aussen, theils vom Munde her den Kiefer in seiner ganzen Länge abtastet und dabei vorzüglich auf einen ungleichen Stand der Zähne achtet. Ist man an der Bruchstelle angelangt, so ist die Berührung derselben sehr schmerzhaft. Wenn das Zahnfleisch zerrissen ist oder eine Wunde besteht, kann man auch wohl die Bruchlinien sehen.

Fig. 32.



Ist das Periost ausgiebig zerrissen, so lässt sich leicht Crepitation und abnorme Beweglichkeit nachweisen. Es besteht dann auch stets die oben geschilderte Deformität, die am besten aus der abnormen Stellung der Zähne erhellt. Brüche des aufsteigenden Astes und der Gelenkfortsätze lassen sich am besten vom Munde her nachweisen dadurch, dass man abnorme Beweglichkeit in der Continuität des Kiefers zu erzeugen sucht und dabei zu gleicher Zeit die Stellung des Kiefers berücksichtigt.

Wenn bei Betastung des Proc coronoideus heftige Schmerzen angegeben werden und sich dieselben bei ausgiebigen Bewegungen des Unterkiefers noch vermehren, kann man eine Fractur dieses Fortsatzes annehmen.

Bei complicirten Fracturen, besonders Schussverletzungen, findet oft eine bedeutende Blutung aus der Art. maxillaris externa, interna und der Alveolaris statt. Störungen von Seiten des gedehnten und gezerrten Nervus alveolaris finden sich meist nur bei sehr bedeutender Verschiebung der Fragmente und zwar bei Brüchen, die vom Foramen mentale nach hinten gelegen sind. Taubheit der entsprechenden Lippenhälfte, Ameisenkriechen, aber auch heftige Neuralgieen und Muskelzuckungen können durch eine solche Läsion des Nerven bedingt werden. Wenn sich die Gewalt auch auf die Schädelbasis erstreckt hatte, so findet man nicht selten auch eine begleitende Commotio cerebri. Beim Betroffensein des Gehörgangs beobachtet man den Ausfluss einer blutig serösen Flüssigkeit aus dem Ohr und nachträglich ein oft lange anhaltendes, quälendes Ohren-

sausen. Eine häufige Complication ist die Luxation der der Fracturstelle benachbarten Zähne, welche sich sogar zwischen die Fragmente einkeilen können. In solchem Falle soll man die Zähne wieder fest in ihre Alveolen eindrücken, da sie in der Regel wieder anwachsen.

Prognose der Unterkieferbrüche.

Die Prognose der Unterkieferfracturen ist im Ganzen eine günstige, wenn es sich um einfache Brüche mit nur geringer Zerreissung des Zahnfleisches handelt. Dann bildet sich ein fester Callus meist schon innerhalb einer kurzen Frist, die 3—6 Wochen selten übersteigt. Pseudarthrosen sind nicht häufig, nach *Norris* kommen sie unter 150 Fällen nur 2 mal vor und dann hauptsächlich bei Interposition eines Sequesters oder eines Zahnes zwischen die Fragmente. Dagegen bleiben zuweilen Deformitäten, namentlich Schiefstand der Zähne zurück. Ebenso kann es gelegentlich in Folge von Obliteration des Alveolarkanales durch den Callus zur Ernährungsatrophie des Alveolartheiles mit Verlust der Zähne kommen.

Die complicirten Unterkieferfracturen sind schwerere Verletzungen. Die Weichtheile im Munde schwellen beträchtlich an, es entsteht ein reichlicher Speichelfluss und bei mangelhafter Reinigung des Mundes oft eine ulceröse Stomatitis. Daneben kann es zu Abscessen an der Bruchstelle kommen, in deren Grunde sich necrotische Partieen oder losgelöste Splitter abstossen. Da die Secrete nicht, wie bei den Oberkieferfracturen, gut abfliessen können, werden sie leichter verschluckt, und es entsteht so, oder indem die inspirirte Luft über die Oberfläche der sich zersetzenden Gewebe streicht und die pathogenen Keime direct in die Bronchien trägt, leichter eine septische Bronchitis und Pneumonie, die schliesslich den Tod herbeiführen kann.

Therapie der Unterkieferbrüche.

Die Therapie der Unterkieferfracturen muss sich dieses Verhältnisses bewusst sein und hat daher neben der Retention der Fragmente vor Allem auch für eine möglichste Reinhaltung des Mundes zu sorgen, während der Patient zunächst eine flüssige Nahrung erhält und erst Ende der 5. bis 6. Woche zu kauen beginnt.

Die Reposition der Fragmente ist in der Regel leicht. Beim Bruche des Alveolarfortsatzes schiebt man die Bruchstücke mit

den Fingern zurecht. Bei einfachen Quer- und Schrägbrüchen drückt man den ganzen Unterkiefer gegen den Oberkiefer an und übt dabei gleichzeitig, besonders bei Doppelbrüchen in der Kinngegend, einen Zug nach vorn aus. Eine Contraextension kann man nöthigenfalls in der Weise finden, dass man den in den Mund eingeführten Finger gegen den vordern Rand des aufsteigenden Unterkieferastes oder den Proc. coronoideus anstemmt. In schwierigen Fällen leistet die Narcose gute Dienste bei diesen Versuchen.

Was nun die Retention der Fragmente anbelangt, so bedarf man bei einfachen Fracturen mit geringer Neigung zur Verschiebung kaum irgend eines besonderen Verbandes. Es genügt in solchen Fällen, den Unterkiefer durch eine event. elastische (Bouisson) Funda oder ein Capistrum simplex oder duplex gegen den Oberkiefer zu schienen. Ist dagegen die Neigung zur Dislocation der Fragmente gross, so hat man bei der Retention oft mit sehr grossen Schwierigkeiten zu kämpfen, und die verschiedensten Chirurgen haben sich bemüht, passende Vorrichtungen zu construiren. Erst in der neuesten Zeit hat man wirklich brauchbare Verfahren ausgebildet, seitdem sich die fortgeschrittene Zahnheilkunde in den Dienst der Chirurgie gestellt hat.


Der Vollständigkeit halber erwähnen wir zunächst das Verfahren *Boyer*'s, der bei Brüchen im Seitentheile des Körpers das hintere Stück des Kiefers nach unten, das vordere dagegen nach oben zu drücken versuchte. Er erreichte dies, indem er hinten zwischen die Zahnreihen des Ober- und Unterkiefers einen auf seinen beiden Flächen rinnenförmig ausgehöhlten Korkstopfen schob und das Kinn vorn durch eine Funda menti in die Höhe zog. In gleicher Weise führte *Sczymanowsky* quer durch die Mundwinkel entsprechend den Backenzähnen ein Holzstäbchen und befestigte dieses mittelst einer aus Gypsbrei hergestellten Funda unter dem Kinn. Andere Chirurgen versuchten die Zähne des Ober- und Unterkiefers mit Draht an einander zu binden, gelangten dabei jedoch selten zu einem Erfolg. Wieder andere suchten mittelst Schienen, die sie über die der Bruchstelle benachbarten Zähne fortlegten, auszukommen. Solche Schienen bestanden in früheren Zeiten aus Metallrinnen (*Rütenik*, *Lonsdale*), die mittelst Spangenvorrichtungen an unter das Kinn gelegte Platten befestigt wurden. Dieselben sind jedoch wegen des Druckes, den sie nothwendig auf die Weichtheile ausüben müssen, durchaus unpractisch.

Erst in neuerer Zeit hat man ihnen eine passende Form gegeben, indem *Morell-Lavallée* aus Guttapercha die sogenannten

Interdentalschienen herzustellen lehrte. Das Guttapercha wird in heissem Wasser erweicht, dann in Form eines Hufeisens auf die Zahnreihen gedrückt und nun die Kiefer fest gegen einander geschlossen. Die in dieser Stellung erhärtete Schiene wird dann so zugeschnitten, dass sie auf der labialen und lingualen Seite bis zum Zahnfleische reicht.

Diese Guttaperchaschienen erfüllen ihren Zweck in vorzüglicher Weise, werden aber heutzutage besser über ein vorher genommenes Gypsmodell des Kiefers gearbeitet. Sie haben nur den Nachtheil, dass sie das Kauen auf der betreffenden Seite vollständig verhindern, nnd sind daher in neuester Zeit vielfach von dem aus Aluminium-Broncedraht nach Angabe *Sauer*'s verfertigten Dentalschienen verdrängt worden. Diese Drahtschienen werden ebenfalls über Gypsmodelle sehr exact gehämmert. Sie müssen sich allen Buchten und Prominenzen der Zahnreihe genau anschmiegen und bekommen dadurch schon ihren Halt, werden aber noch mittelst einiger quer zwischen den Zähnen laufenden, dünnen Drahtschlingen befestigt (Fig. 33). Eine derartig gut gearbeitete Schiene gestattet selbst schon nach kurzer Zeit dem Patienten das Kauen weicher Speisen und belästigt denselben sehr wenig. Diese Schienen wirken ungleich viel besser als das blosse Aneinanderbinden der der Fracturstelle benachbarten Zähne, wodurch man höchstens auch noch diese Zähne lockert. Da man zur Herstellung der Schienen immer einen geübten Zahntechniker benöthigt, hat *Sauer* auch einen „Nothverband" construirt, der vom Arzte selbst verfertigt werden kann. Derselbe besteht ebenfalls aus einem 2 mm dicken, verzinnten Eisen- oder Aluminiumbroncedraht, den man ohne Abdruck zu nehmen ungefähr nach der Form des regelrechten Unterkiefers biegt, so zwar, dass er beiderseits etwa bis zur Mitte des zweiten Malzahnes reicht. Der Draht wird dann an den Zähnen befestigt. Wie prompt der Verband wirkt zeigen Fig. 34 und 35. Sie stellen einen einfachen Bruch des Unterkiefers vor und nach Anlegung des Verbandes dar.

Fig. 33.



Auf demselben Princip wie die *Sauer*'schen Schienen beruhen die Schienen, die *Claude Martin* an 59 Unterkieferbrüchen mit grossem Erfolg angewendet hat. Es sind dies zwei Schienen, von denen die eine der Zahnreihe, die andere dem Unterkieferrand entspricht, während beide, die genau nach dem gegebenen Falle

Fig. 34.





Fig. 35.



modellirt werden müssen, durch eine Feder mit einander verbunden sind. Eine gute Uebersicht über die mannigfachen Variationen der Interdental- und Dentalschienen giebt neuerdings *Röse* (Jena, 1893).

Für complicirte Unterkieferfracturen ist es zuweilen zulässig, die direkte Knochennaht auszuführen, doch wird man möglichst selten davon Gebrauch zu machen suchen. Vollständig gelöste Splitter entfernt man, belässt dagegen solche, die noch mit schmalen Weichtheilbrüchen zusammenhängen.

Die Reinhaltung des Mundes geschieht durch stündliches Ausspülen desselben mit schwachen Lösungen von Kali hypermanganicum oder Borsäure. Es empfiehlt sich auch wohl das öftere Zergehenlassen von Kali chloricum-Pastillen auf der Zunge.


Eintretende Abscesse sind möglichst frühzeitig zu incidiren. Communiciren sie mit dem Munde, so legt man am Rande des Kiefers eine Gegenöffnung an und leitet die Secrete durch eine Drainage nach aussen ab. Die Ernährung des Patienten geschieht anfangs mit flüssigen Speisen, eventuell mit dem Schlundrohr. Necrosen entfernt man erst, wenn sie vollständig gelöst sind, und zwar möglichst vom Munde aus. Bekommt man schlecht geheilte Fracturen zur Behandlung, so hat *Suersen* gelehrt, auch diese mittelst genau gearbeiteter Interdentalschienen, welche man den beiden Fragmenten anpasst und durch Keile allmählich auseinanderdrängt, nach und nach wieder gerade zu richten.

Luxationen des Unterkiefers.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Kiefergelenk des Erwachsenen besteht beiderseits aus zwei durch eine Zwischenknorpelscheibe getrennten Abtheilungen, die von einer ziemlich weiten Kapsel umschlossen werden. Der Gelenkkopf articulirt mit dieser Zwischenknorpelscheibe (Meniscus) in Form eines Charnieres. Diese selbst kann dagegen mit dem erstern auf der Gelenkfläche des Schläfenbeines nur hin und her gleiten und zwar in der Richtung von vorn nach hinten oder umgekehrt. Oeffnet man den Mund, so erfolgt zunächst die Charnierbewegung im unteren Gelenke. Der Unterkiefer dreht sich dabei um eine quere Achse, welche man sich durch die beiden Foramina mentalia interna gelegt denken muss.

Fig. 36.



Entfernen sich dann die Zahnreihen weiter von einander, so rutscht der Meniscus auf der geneigten Fläche des Tuberculum

articulare nach vorn. Dieses hemmt für gewöhnlich die Bewegung. Wird aber das Oeffnen des Mundes übertrieben, so springt der Gelenkkopf mit dem Meniscus vor das Tuberculum articulare und kann nun nicht mehr zurück, indem ihm letzteres den Weg versperrt (Fig. 36). Es ist also dann eine Luxation des Unterkiefers nach vorn entstanden. Bei ganz jungen Kindern ist noch kein Tuberculum articulare vorhanden *(Hueter)*. Dasselbe entwickelt sich erst mit dem Knochenwachsthum, und es sind daher Kieferluxationen nach vorn in der frühesten Jugend nicht möglich. Ebenso sind sie bei Greisen selten, weil bei diesen der Bogen des Unterkiefers mit dem aufsteigenden Ast nicht in einem rechten Winkel wie bei Erwachsenen, sondern ebenso wie bei Kindern in einem stumpfen Winkel vereinigt ist und so das Uebertreten des Gelenkkopfes über das Tuberculum sehr viel schwieriger zu Stande kommt.

Bei Frauen ist in seltenen Fällen an der vorderen unteren Wand des knöchernen Gehörganges, also an der hinteren Wand des Unterkiefergelenkes ein Höcker vorhanden, Tuberculum tympanicum, der in Gemeinschaft mit dem Processus mastoideus auf der hinteren Seite und dem Proc. styloideus auf der innern Seite, einen Raum umschliesst, der von *Thiem* als Fossa tympanico-stylo-mastoidea bezeichnet, gelegentlich einmal den beim Schliessen des Mundes nach hinten gleitenden Gelenkfortsatz des Unterkiefers aufzunehmen vermag. Der letztere muss dazu das Tuberculum tympanicum übersprungen haben, und dieses bildet dann für sein Zurückgleiten eine Hemmung, so dass eine Luxation nach hinten entstanden ist.

Wir haben demnach Luxationen des Unterkiefers nach vorn und nach hinten zu besprechen. Wir wollen zunächst die letztere betrachten.

A. Luxation des Unterkiefers nach hinten.

Wie wir eben ausgeführt haben, kommt die Luxation des Unterkiefers nach hinten dadurch zu Stande, dass der Gelenkfortsatz des Unterkiefers das Tuberculum tympanicum *(Thiem)* überspringt, so dass er in die Fossa tympanico-stylo-mastoidea hereingeräth. Diese Grube ist meist nur am weiblichen Schädel so gross, um den Gelenkkopf aufzunehmen. Ganz vereinzelt scheint sie aber auch am männlichen Schädel genügenden Raum zur Aufnahme des Gelenkkopfes zu bieten *(Steiner)*.

Steiner hat im Jahre 1893 13 Fälle aus der Litteratur beschrieben und eine eigene Beobachtung hinzugefügt. 12 mal betraf die Verletzung Frauen, nur zweimal Männer.


Aetiologie.

Die Ursache der Luxation war in den verschiedenen Fällen eine verschiedene; zweimal kam sie zu Stande beim Gähnen, einmal bei starkem Herabziehen der Zunge, dreimal durch krampfhafte Contraction des M. temporalis, dreimal durch starkes Aneinanderpressen beider Zahnreihen mit gleichzeitigen Schluckbewegungen, einmal durch Fall auf den Unterkiefer; zweimal endlich entstand sie beim Erwachen aus dem Schlafe. Der Mechanismus der Luxation ist wohl stets der, dass beim gewaltsamen Schliessen der Zähne der Musculus temporalis den Unterkiefer nach hinten dislocirt. Besondere Schmerzhaftigkeit beim Zustandekommen der Luxationen war in keinem Falle vorhanden; in einem Falle bestand nachher eine schmerzhafte, bretthartе Spannung der Gesichtsmuskeln.

Symptome.

Ist die Luxation nach hinten eingetreten, so hat der Unterkiefer die in Fig. 37 wiedergegebene Stellung. Er ist nach hinten verschoben und in Folge des jetzt gerade nach oben ge-

Fig. 37.



richteten Zuges aller Kaumuskeln fest an den Oberkiefer angedrückt. Die Patienten vermögen nicht den Mund zu

öffnen. Die Zähne des Unterkiefers stehen gegen die des Oberkiefers nach hinten zurück. Der Proc. condyloideus ist vor dem Proc. mastoideus zu fühlen.

Therapie.

Die Reposition der Luxation geschieht nach einer schon von *Purmann* angegebenen Methode dadurch, dass man den Unterkiefer zunächst etwas zurück drückt, um ihn dann nach vorn und unten hin zu biegen. Der Gelenkfortsatz gleitet dann nach vorn über das Tuberculum tympanicum in seinen gewöhnlichen Standort zurück. Kommt man so nicht zum Ziele, so empfiehlt sich eine gewaltsame Oeffnung des Mundes in Narcose herbeizuführen.

Dass Luxationen des Unterkiefers nach hinten durch Einbrechen der Gelenkfortsätze in die vordere Wand des äusseren Gehörganges entstehen können, haben wir schon früher berührt. Luxationen des Unterkiefers nach innen sind aus anatomischen Gründen unmöglich; nach aussen können sie dagegen erfolgen bei gleichzeitigem Bruch des entgegengesetzten aufsteigenden Astes.

Die typische Luxation des Unterkiefers ist die

Luxation nach vorn,

und dieser wollen wir daher unsere Hauptaufmerksamkeit widmen, sie ist auch gemeint, wenn wir gemeinhin von einer Unterkieferluxation sprechen.

Frequenz und Anatomie.

Wie oben erwähnt, ist für die Unterkieferluxation nach vorn das mittlere Lebensalter am meisten prädisponirt. Immerhin sind aber auch diese Luxationen nicht sehr häufig, indem sie nur etwa $1^1/_2$ Procent aller Verrenkungen ausmachen. Gewöhnlich werden sie beim weiblichen Geschlecht beobachtet, weil bei diesem das Kiefergelenk bedeutend flacher ausgebildet ist als beim männlichen Geschlecht. Nach den neuen Untersuchungen *Steiner*'s unterscheiden sich der männliche und weibliche Schädel vornehmlich dadurch, dass beim Manne ein vertieftes Os tympani und ein relativ starker Proc. condyloideus mit geringer Excursionsfähigkeit — beim Weib dagegen ein flaches Os tympani, ein schwacher Proc. condyloideus mit grosser Excursionsfähigkeit und ein mehr nach hinten und aussen strebender Unterkieferast vorhanden ist.

Das Ueberschnappen des Gelenkkopfes kann entweder nur auf einer Seite erfolgen — einseitige Luxation — oder, wie dies öfter der Fall ist, auf beiden Seiten — doppelseitige Luxation.

Das Kiefergelenk ist das einzige Gelenk, bei dem die Luxation zu Stande kommen kann, ohne dass die Gelenkkapsel einzureissen braucht. *(Henne-Schnitzler)*. Dieselbe ist so weit, dass sie die falsche Bewegung stets gestatten kann, selbst ohne beträchtliche Spannung. Dagegen werden die Hülfsbänder und die das Gelenk umgebende Muskeln gespannt, und diese Theile sind es auch, die das Gelenk in seiner falschen Stellung fixiren. Was zunächst die Muskeln betrifft, so wird die Zugrichtung der Kaumuskeln: Temporalis, Masseter und Pterygoideus internus durch die Luxation in der Weise verändert, dass sie den Gelenkkopf, besonders wenn die Patienten nach geschehener Verletzung den Mund gewaltsam zu schliessen versuchen, noch weiter in die Schläfengrube und den Processus coronoideus gegen den Jochbogen hinzudrängen suchen. Die Seitenbänder (Lig. lig. spheno- uud stylomaxillaria) werden zwar nicht gedreht, aber doch sehr angespannt. Besonders leidet das Ligamentum laterale externum, dessen Faserrichtung gerade umgekehrt wird, indem es jetzt statt nach unten und hinten nach unten und vorn verläuft. *Nélaton* lehrte, dass die Fixation des Unterkiefers dadurch bedingt würde, dass sich der Processus coronoideus unter dem vorderen Winkel des Jochbeins einhake und sich daselbst anstemme. Dem gegenüber zeigte jedoch *C. O. Weber*, dass der Processus coronoideus an den meisten Kiefern gar nicht lang genug ist, um sich einhaken zu können. Es hat ferner ein Abkneipen des Processus coronoideus vom Munde her mittelst der *Liston*'schen Knochenzange keinen Effect gehabt bei der Einrichtung veralteter Luxationen *(Roser)*, wogegen bei der Leiche die Reposition sofort gelingt, wenn man mit dem Messer die gespannten Seitenbänder durchschneidet *(Maisoneuve)*. Es ist dagegen möglich, dass die Fixation des Kiefers und die Schwierigkeit der Reposition zuweilen vermehrt wird durch eine Einklemmung des Proc. coronoideus zwischen die Fasern des Temporalis und des Masseter.

Aetiologie.

Die Gelegenheitsursache zur Luxation ist nach dem Gesagten stets ein zu weites Oeffnen des Mundes, wie es durch

blossen Muskelzug oder durch eine Gewalteinwirkung geschehen kann.

Die Luxation durch Muskelzug findet statt beim Gähnen, Schreien, Erbrechen. Es treibt dabei vorzugsweise der Pterygoideus externus den Gelenkkopf über die Höhe des Tuberculum articulare. Gewalteinwirkungen können die Luxation durch Einwirkung von aussen oder vom Mund her zu Stande bringen. Von aussen her kann ein heftiger Schlag oder Stoss auf das Kinn die Veranlassung sein, von innen her das Einführen eines zu grossen Bissens in den Mund, das gewaltsame Einführen von Schlundsonden bei Geisteskranken, das rohe Herausreissen von Zähnen.

Symptome.


Die Symptome der **doppelseitigen** Unterkieferluxation sind sehr prägnant. Der Mund steht weit offen. Das Kinn ist nach vorn verschoben, so dass die Zahnreihe des Unterkiefers nicht, wie normal, hinter der des Oberkiefers, sondern weit vor dieser steht. Unter- und Oberkiefer sind, von den untern zu den obern Schneidezähnen gerechnet, ungefähr 2 bis 4 cm entfernt. Der Unterkiefer ist fast vollständig fixirt. Er lässt sich wohl ganz wenig nach unten bewegen; es ist aber absolut unmöglich, den Mund zu schliessen. Versucht man dies, so setzt sich jedem Versuch ein federnder, unüberwindlicher Widerstand entgegen. An der Stelle des Gelenkes fühlt man vor dem Tragus eine deutliche Lücke; das Gelenkköpfchen selbst bildet dagegen eine abnorme Hervorragung unter dem Jochbein, wo es bei mageren Leuten schon durch die Inspection erkannt werden kann. Führt man den Finger in den Mund, so kann man den Proc. coronoideus ebenfalls gerade unter dem Jochbeine fühlen. Die Wangen sind verlängert, abgeflacht. Die gespannten Kaumuskeln springen reliefartig hervor. Da die Lippen einander nicht genähert werden können, fliesst der Speichel aus dem Munde heraus, so dass letzterer austrocknet. Das Kauen ist unmöglich und das Sprechen, besonders der Consonanten, sehr erschwert

Oft bestehen heftige Schmerzen, indem der Gelenkfortsatz Trigeminusäste drückt; andere Male sind die Schmerzen aber nur wenig ausgesprochen.

Während das eben gezeichnete Bild die doppelseitige Luxation unverkennbar macht, sind die Zeichen der **einseitigen** Luxation weniger hervortretend. Das Hauptsymptom ist auch hier

die Unfähigkeit der Patienten, den Mund zu schliessen. Es können dabei aber leichte Bewegungen mit dem Kiefer gemacht werden. Während auf der gesunden Seite die Gelenkcontouren die normalen sind, findet man auf der verletzten Seite wiederum die Vertiefung vor dem Tragus und die abnorme Hervorwölbung durch das Gelenk-

Fig. 38.



köpfchen. Dem entsprechend weicht die Achse des Kiefers von der Norm ab, und das Kinn steht nach der gesunden Seite hin verschoben (Fig. 38). (Wir sahen schon früher das umgekehrte Verhältniss bei der einseitigen Fractur des Proc. condyloideus). Die Functionsstörungen sind im Uebrigen die nämlichen wie bei der doppelseitigen Luxation.

Prognose.

Werden die Unterkieferluxationen aus irgend einem Grunde übersehen und deshalb nicht eingerichtet, so verschwindet mit der Zeit das charackteristische Bild mehr und mehr. Die Bewegungen werden freier, und die Zähne nähern sich einander, so dass wenigstens mit den Backzähnen gekaut werden kann. Die Lippen berühren sich wieder, so dass der Speichel nicht mehr abfliesst und selbst Consonanten, wenn auch undeutlich, gesprochen werden können. Immerhin bleibt aber der Zustand doch sehr lästig: Ge-

wöhnlich veraltet die Luxation schon nach wenigen Wochen, doch liegen Beobachtungen vor, wo die Reposition noch nach Monaten gelungen ist.

Therapie.

In der Mehrzahl der Fälle bietet die Reposition der frischen Luxation keine Schwierigkeit, sie kann sogar zuweilen vom Patienten selbst vollzogen werden. Sobald jedoch einige Zeit nach der Verletzung verstrichen ist, kann sie sehr schwierig, ja sogar unmöglich werden. Man hat 2 Methoden zur Reposition, indem man entweder den Unterkieferkörper oder die Proc. coronoidei zum Angriffspunkt wählt, um mittelst derselben den Gelenkkopf über das Tuberculum articulare zurückzuhebeln. Meist geht man zuerst den erstern Weg. Der Kranke sitzt dabei auf einem Stuhl und wird in schwierigen Fällen narkotisirt. Man legt nun die mit einem seidenen Tuch wohlumwickelten Daumen beider Hände auf die beiden Backenzahnreihen des Unterkiefers, während die anderen Finger von aussen und unten her das Kinn umgreifen (Fig. 39). Ist dies geschehen, so drängen die Daumen den Kiefer nach hinten und unten, die andern Finger dagegen das Kinn in die Höhe, indem sie den ganzen horizontalen Kieferast als Hebel, den Daumen als Hypomochlion benützen. Sobald man fühlt, dass die Condylen sich anschicken, über das Tuberculum articulare zurückzugleiten — dass der Kiefer wieder flott wird — zieht man, um nicht gebissen zu werden, die Daumen rasch bei Seite und lässt den Kiefer von selbst in seine richtige Lage zurückschnappen. Gewöhnlich gelingt es so schon beim ersten Versuch, beide Luxationen zu gleicher Zeit einzurichten. Ist dies nicht der Fall, so thut man am Besten, erst das eine und dann das andere Köpfchen zu reponiren, die doppelseitige Luxation also zuerst in eine einseitige zu verwandeln. Anstatt der Daumen kann man auch zwischen die hintern Backenzähne Korkstopfen, hölzerne Keile etc. einschieben.

Fig. 39.



Gemäss seiner Lehre, dass der Proc. coronoideus den Hauptwiderstand für die Reposition bilde, empfahl *Nélaton,* von diesem aus den Kiefer zurückzubringen, und man kommt in der That oft mit dieser Methode gut zum Ziele. Die Reposition ge-

schieht dabei in der Weise, dass man beide Daumen vor diese Fortsätze legt und nun mittelst eines directen Druckes auf dieselben von vorn nach hinten die Condylen in die verlassene Gelenkhöhle zurückzutreiben sucht. *Bird* hat so eine schon 18 Wochen bestehende Verrenkung noch glücklich reponirt.

Aeltere Luxationen setzen der Reposition oft grosse Schwierigkeiten entgegen. Man muss in solchen Fällen versuchen, durch gewaltsame Bewegungen mit dem Unterkiefer die Verwachsungen erst auf der einen, dann auf der andern Seite zu sprengen. Dazu sind besondere zangenförmige Instrumente, mit denen man eine grössere Kraft entwickeln kann (*Jung, Stromeyer* etc.), angegeben worden. Dieselben sind jedoch unnütz, da man, wie kürzlich erst wieder *North* und *Bessel-Hagen* mittheilten, auch ohne dieselben zum Ziele kommt.

Nach gelungener Reposition wird der Kiefer wenigstens eine Woche lang fest gegen den Oberkiefer geschient und den Patienten nur flüssige Diät gestattet. Auch später dürfen sie den Mund nicht zu weit öffnen, da gerade an diesem Gelenk die Neigung zur Wiederkehr der Luxation sehr gross ist. Hat man es mit einer solchen habituellen Luxation zu thun, so empfiehlt *Genzmer*, durch Injectionen von Jodtinctur in das Gelenk die Kapsel zur Schrumpfung zu bringen. Bei vollständig irreponibler Luxation versucht man zunächst, durch die aseptisch ausgeführte Arthrotomie die Hindernisse zu beseitigen. Gelingt dies nicht, so ist die Resection der Gelenkköpfchen indicirt und schon oft von Erfolg begleitet gewesen.

Brüche des Zungenbeins, des Kehlkopfes und der Trachea.

Zungenbein, Kehlkopf und Luftröhre liegen durch den vorstehenden Unterkiefer ziemlich geschützt und besitzen ausserdem eine grosse Beweglichkeit und Elasticität. So kommt es, dass Fracturen dieser Theile selten sind. Sie kommen jedoch durch directe Gewalt und selbst durch Muskelzug vor.

A. Fracturen des Zungenbeins entstehen durch directe Gewalt, wie einen Fall oder Stoss gegen prominirende Gegenstände oder beim Erhängen und durchsetzen dann meist den Körper dieses Knochens, oder sie entstehen durch indirecte Gewalt. In

diesem Falle sitzen sie entweder im Bereiche der grossen Hörner oder noch häufiger an der Verbindungsstelle dieser mit dem Körper. Die indirecte Gewalt wirkt entweder in horizontaler Richtung, wie z. B. beim Erwürgen, und biegt dann erst die beiden Hörner, ehe sie brechen, oder sie wirkt von vorn nach hinten, indem sie den offenen Bogen des Zungenbeins gegen die Wirbelsäule flach drückt und denselben so erst übermässig streckt, bis das Mass der Elasticität überwunden ist. Zungenbeinfracturen durch M u s k e l - zug sind selten. *Ollivier* berichtet über einen derartigen Fall, indem eine Frau beim starken Hintenüberneigen des Kopfes sich einen Bruch des linken grossen Zungenbeinhornes zuzog.

Um einen Begriff von der Häufigkeit dieser Verletzungen durch andere Gewalten als das Erhängen zu geben, erwähnen wir eine Statistik *Gibb*'s, nach der von 13 solcher Fracturen 7 durch Erwürgen, 3 durch directe Gewalt und 3 durch Muskelzug zu Stande gekommen waren.

Die D i s l o c a t i o n der Fragmente ist in der Regel ziemlich bedeutend. Oft wird durch dieselben die Schleimhaut des Pharynx lädirt.

Was die **Symptome** der Zungenbeinbrüche anbetrifft, so hört der Verletzte im Augenblick des Brechens ein k r a c h e n d e s G e r ä u s c h und empfindet dabei einen sehr heftigen S c h m e r z , der bei jeder Bewegung des Knochens, wie beim Bewegen des Kopfes, Vorstrecken der Zunge, Oeffnen des Mundes, noch gesteigert wird. Einzelne Patienten bezeichnen diesen Schmerz so, als stecke ihnen eine grosse Fischgräte im Hals. Sehr schnell entsteht eine von aussen wahrnehmbare bedeutende G e s c h w u l s t , meist auch eine S u g i l l a t i o n an der Stelle des Bruches.

Zuweilen kann man mit dem in den Mund eingeführten Finger oder von aussen her die dislocirten Fragmente fühlen und bei ihrer gegenseitigen Bewegung C r e p i t a t i o n erzeugen. Diese Crepitation muss man jedoch streng unterscheiden von dem eigentümlichen Knacken, welches man oft bei normalem Zungenbein und Kehlkopf durch Verschieben dieser Theile an den Körpern der Halswirbel bemerkt. Stets ist eine b e d e u t e n d e S t ö r u n g d e s S c h l i n g a c t e s vorhanden, wenn das grosse Horn unter die Pharynxschleimhaut verschoben ist. Man bezeichnet dieses Symptom nach *Valsalva*, der es zuerst beobachtet hat, als D y s p h a g i a V a l s a l v a e. Das Schlingen kann sogar vollständig unmöglich werden, so dass selbst die geringste Quantität Wasser unter Erstickungsanfällen wieder ausgeschleudert wird. Ist die Pharynx-

schleimhaut verletzt, so kann eine profuse Blutung durch den Mund erfolgen. Das Sprechen macht grosse Beschwerden. Die Stimme ist heiser oder ganz verloren. Kommen die Patienten erst nach einiger Zeit zur Behandlung, so sind meist nur noch Dyspnoë, quälender Husten und Auswurf vorhanden.

Die Heilung der Zungenbeinbrüche erfolgt durch Callusbildung; nur selten kommt es zur Necrose eines Fragmentes.

Die **Therapie** hat dahin zu streben, die dislocirten Fragmente wieder in die richtige Lage zu bringen. Man versucht dies, indem man einen Finger in den Mund einführt und ihn mit der andern Hand von aussen her controllirt. Hat man die Reposition der Fragmente erreicht, so ist es schwer, dieselbe für die Dauer aufrecht zu erhalten. Um dieses nach Kräften zu erreichen, hat man durch Papier- oder Ledercravatten den Kopf und Hals möglichst ruhig gestellt oder auch wohl durch ein permanentes Schlundrohr, welches bei starken Schlingbeschwerden zur künstlichen Ernährung so wie so eingeführt werden muss, direct auf die Fragmente einzuwirken gesucht. Die Hauptsache ist ruhiges Verhalten des Patienten, Vermeiden des Sprechens und Darreichung flüssiger Diät. Bei starken Athembeschwerden muss die Tracheotomie gemacht werden.

B. Fracturen des Kehlkopfes betreffen am häufigsten die Schild- und Ringknorpel, viel seltener die Giessbeckenknorpel. Verhältnissmässig häufig sind Ring- und Schildknorpel gleichzeitig gebrochen. Man findet diese Brüche besonders bei älteren Leuten, bei welchen die Knorpel zum Theil schon verknöchert sind. Sie entstehen durch dieselben Gewalten wie die Brüche des Zungenbeins, indem der Kehlkopf entweder von der Seite her oder von vorn nach hinten zusammengedrückt wird. Im ersteren Fall handelt es sich meist um Längsbrüche oder Impressionen am Schildknorpel und seitliche Doppelbrüche oder einfache Fracturen in oder nahe der Mittellinie des Ringknorpels. Im zweiten Fall kommen ausser diesen auch noch sehr unregelmässige, mehrfache Brüche vor bis zur völligen Zertrümmerung der Knorpel. War die Gewalt sehr bedeutend, so findet man neben solchen Splitterbrüchen auch wohl noch eine völlige Abreissung der Trachea vom Larynx. Häufig sind alle diese Fracturen complicirt mit Verletzungen der äusseren Bedeckungen oder der Schleimhäute. Unter diesen finden sich auch grosse Blutergüsse.

Die **Symptome** der Kehlkopfknorpelbrüche sind verschieden, je nachdem es sich um verticale oder mehr weniger transversale Bruchformen handelt. Bei den ersteren findet man oft nur die nachstehenden objectiven Symptome, bei den letztern jedoch meist das ganze, gleich zu beschreibende Krankheitsbild. Die Kranken empfinden zunächst an der verletzten Stelle Schmerzen, die bei Berührung oder jeder Bewegung des Kehlkopfes sich vermehren. Die Stimme ist rauh, heiser, oft ganz unarticulirt. Das Schlingen ist erschwert, wenn auch nicht so hochgradig, wie bei den Zungenbeinbrüchen. Die vordere Halsgegend ist ecchymosirt und schwillt bald stark an. Im Anfang erscheint sie zuweilen, wenn die Gewalt von vorn nach hinten eingewirkt hatte, abgeplattet und abnorm breit. Wenn, wie in der Regel, die Schleimhaut des Kehlkopfes zerrissen ist, so tritt neben submucösen Blutergüssen ein Hautemphysem auf, welches sich sehr bald über Gesicht, Rumpf, Mediastinum, sogar über Arme und Beine ausbreiten kann. Durch die Schwellung der Schleimhaut, die dislocirten Fragmente und das Hinabfliessen von Blut in die Bronchien entsteht eine stetig sich steigernde heftige Dyspnoë mit Cyanose des Gesichtes. Nicht selten wird unter quälenden Hustenanfällen schaumiges Blut ausgeworfen. Bei der Palpation kann man oft eine ausgesprochene Verlagerung der Kehlkopfknorpel nachweisen, indem man statt der normalen Conturen unregelmässige Vorsprünge und Vertiefungen fühlt. Nicht sehr häufig wird man dagegen Crepitation und abnorme Beweglichkeit constatiren können. Kann man den Patienten mit dem Kehlkopfspiegel untersuchen, so sieht man zuweilen neben dem submucösen Bluterguss die dislocirten Bruchtheile.

Die **Prognose** der Kehlkopfbrüche ist eine sehr zweifelhafte. Nach *Fischer* sind von 75 Patienten 59, nach *Durham* von 69 Patienten 53 der Verletzung erlegen. Der Tod tritt, wenn nicht rasch Hülfe geschaffen wird, meist bald ein, indem Bluteintritt in die Luftwege, mediastinales Emphysem, Glottisödem und Glottiskrampf zu einem Lungenödem führen.

Kommt es zur Heilung der Brüche, so vollzieht sich dieselbe‘ wie bei allen Knorpelbrüchen, vermittelst eines knöchernen, in der Regel nicht ausgiebigen Callus.

Die **Therapie** der Kehlkopfbrüche muss eine sehr energische sein. Wenn nach sorgfältiger Untersuchung, die mit allen Hilfsmitteln zu geschehen hat, die Diagnose sicher ist und auch nur

geringe Athmungsbeschwerden bestehen, muss sofort die Tracheotomie gemacht werden, da Erstickungsanfälle ganz plötzlich eintreten können und die Operation dann oft zu spät kommt. Von der Tracheotomiewunde aus kann man das in die Lunge geflossene Blut aspiriren, auch wohl versuchen, mit einer Sonde oder einem Katheter, die Reposition der Fragmente zu bewirken, wenn man nicht vorzieht, dies später noch durch eine Laryngotomie zu erreichen *(Wagner)*. Bei behindertem Schlucken werden die Kranken mit der Schlundsonde ernährt.

C. Die Brüche der Trachea sind noch seltener als die des Zungenbeins und des Kehlkopfes. Man beobachtete sie isolirt durch starke Gewalten, wie Quetschung zwischen den Puffern zweier Waggons, Ueberfahrenwerden, Hufschlag. Es handelt sich entweder um Längsbrüche, bei denen mehrere Ringe in der Mittellinie getrennt und mit ihren Rändern nach innen umgebogen sind, oder es handelt sich um quere Rupturen, so dass die Luftröhre vom Kehlkopf oder ein Theil der Ringe von den darauf folgenden abgerissen ist und ein Klaffen der Fragmente bis zu 3 cm stattfinden kann. Zuweilen findet man auch einen Bronchus unweit der Bifurcation total von der Lunge losgelöst.

Die **Symptome** dieser Fracturen sind die nämlichen wie bei den Kehlkopfbrüchen, nur ist das Emphysem noch mehr ausgesprochen. Die Diagnose kann daher recht schwer sein und lässt sich oft erst post mortem stellen, indem die Patienten meist unmittelbar nach der Verletzung sterben. Es sind bisher nur 2 Heilungen bekannt.

Die **Therapie** wird in der sofortigen Tracheotomie, Aspiration des Blutes und Schleimes und Einleitung der künstlichen Athmung bestehen müssen.

Brüche der Wirbel.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Für die Erkenntniss von Wirbelbrüchen ist es von Wichtigkeit, sich die normalen Conturen der Wirbelsäule gut einzuprägen. Man erreicht dies durch häufiges Abzählen der Wirbel an den einzelnen Dornfortsätzen, ebenso wie durch wiederholte Inspection des Rückens. Man erkennt dann, dass die Wirbelsäule in der Sagittalebene zweimal S-förmig gebogen ist. Die Nackengegend

erscheint von oben nach unten leicht concav und durch den Vorsprung des Dornfortsatzes des 7. Halswirbels vom Rücken abgegrenzt. Die hintere Thoraxwand ist mehr weniger gewölbt, während die Lenden wieder eingebogen sind. Den 12. Brustwirbel erkennt man am Ansatz der letzten Rippe; der 7. Brustwirbel entspricht etwa der untern Spitze des Schulterblattes. In der Mittellinie des Rückens verlaufen die Dornfortsätze der Lendenwirbel in einer verticalen Rinne, die zwischen den starken Muskelbündeln der langen Rückenstrecker versenkt liegt. Die gewölbte Kreuzgegend wird am wenigsten von Weichtheilen gedeckt. Hier sind daher die Knochenformen leicht durch die Haut hindurch zu erkennen.

Die Wirbelsäule hat eine mehrfache Aufgabe, denn sie stellt nicht nur die Stütze des Rumpfes dar und vermittelt zugleich mit dem Becken die Verbindung des Stammes mit den Extremitäten, sondern muss gleichzeitig als Aufnahmeorgan und Beschützerin des Rückenmarkes dienen. Um allen diesen Aufgaben gerecht zu werden, ist der Bau der Wirbelsäule von der Natur ebenso complicirt wie sinnreich angelegt worden, und es combiniren sich bei demselben Festigkeit und Starrheit, Elasticität und Biegsamkeit in ausserordentlich geschickter Weise.

Die Festigkeit der Wirbelsäule beruht auf dem festen Gefüge der einzelnen Wirbel. Dieselben nehmen von dem Halstheil nach dem Kreuzbein an Stärke und Tragfähigkeit zu. Dabei entspricht die Anordnung ihrer Spongiosa durchaus dem Gesetz, nach dem die Knochenbälkchen so angeordnet sind, dass sie der Einwirkung der Zug- und Drucklinien am wirksamsten widerstehen. Es gleicht, wie sich *Bardeleben* ausdrückt, der Bau der Spongiosa der Wirbel einer „Fachwerkconstruction". Dementsprechend brauchte *Messerer* bei seinen Experimenten schon eine Belastung der Wirbel mit 150—425 Kilo, um Compressionsfracturen hervorzubringen.

Die Elasticität der Wirbelsäule ist eine Folge der Einschaltung von elastischen, nach der Lende hin ebenfalls dicker werdenden Polstern zwischen die einzelnen Wirbel, den Intervertebralscheiben. Durch diese Scheiben werden nicht nur die Gewalten, welche die Wirbelsäule in verticaler Richtung treffen, ebenso oft gebrochen, als solche elastische Einschaltungen vorhanden sind, sondern es wird durch sie die Wirbelsäule gewissermassen in einen biegsamen Stab verwandelt. Die Elasticität dieses Stabes wird aber auch noch vermehrt durch die Krümmungen

der Wirbelsäule, durch welche die ganze Säule gleichsam den Character einer Sprungfeder erhält.

In dem von den Wirbelbogen gebildeten länglichen Hohlraum, dem Wirbelkanal, liegt trefflich geborgen das Rückenmark. Starke Muskeln und Fascien schützen den Wirbelkanal am Rücken, während er im Halstheil hinten durch die sich dachziegelförmig deckenden Proc. spinosi und Wirbelbogen, vorn und seitlich aber durch die Wirbelkörper gesichert wird. Das Rückenmark selbst ist weiterhin in diesem Hohlraum sehr sicher aufgehängt. Die an der Umrandung des Foramen magnum befestigte Dura mater liegt nämlich der Wandung des Wirbelkanales allein an den Intervertebrallöchern fester an. Sonst ist sie nur locker befestigt, und es bleibt daher zwischen ihr und der Umrandung des Kanals ein Zwischenraum, welcher nebst reichlichem, lockeren Fettgewebe die venösen Spinalsinus enthält.

Die bei Bewegungen der Wirbelsäule nothwendigen Ortsveränderungen werden dem Rückenmark einmal durch das eben geschilderte Verhältniss erlaubt; dann aber ist auch das Mark selbst in dem relativ weiten, mit Cerebrospinalflüssigkeit ausgefüllten Arachnoidealsack schwebend erhalten, und es wird ihm so die Verschiebung erleichtert. In dem biegsamsten Theile, in der Halswirbelsäule, ist dann schliesslich auch die Weite des Wirbelkanals am grössten.

Die eigentliche Substanz des Rückenmarkes hört in der Höhe der obern Lendenwirbel auf, um in die Cauda equina überzugehen.

Frequenz und anatomische Charaktere der Wirbelbrüche.

In Folge der eben beschriebenen Verhältnisse sind die Brüche der Wirbelsäule relativ seltene Verletzungen, so dass sie kaum $^1/_3$% aller zur Beobachtung kommenden Fracturen ausmachen. Sie gehören vorzugsweise dem erwachsenen Alter an, sind viel häufiger beim Manne wie beim Weibe und kommen bei Kindern so gut wie gar nicht vor. Sie werden an allen Wirbeln und an allen Theilen des einzelnen Wirbels, an deren Körper, Bogen und Fortsätzen beobachtet und kommen hier als Fissuren, Infractionen, Compressions- und Comminutivfracturen, als Schräg-, Quer-, Längsbrüche und als sog. hintere obere Keilfracturen vor.

Betrachten wir nun die anatomischen Charactere der Wirbelbrüche an den einzelnen Wirbeltheilen, so sind Brüche der **Dornfortsätze** dort am häufigsten, wo die letzteren am längsten

und dünnsten sind, also vom 7. Halswirbel abwärts bis zu den unteren Brustwirbeln.

Die Dornfortsätze brechen selten für sich allein. Meist ist gleichzeitig der Körper oder Bogen fracturirt, und die Fractur sitzt dann am allerhäufigsten so, dass im Bogen je eine Bruchlinie zu beiden Seiten des Dornfortsatzes liegt (Fig. 40). Bei der dachziegelförmigen Anlage der Dornfortsätze kommt es nicht selten vor, dass mehrere Fortsätze gleichzeitig gebrochen sind. Betrifft die Fractur den Fortsatz allein, so verläuft die Bruchlinie meist quer zu seiner Längsachse, seltener schräg oder gar in der Längsrichtung. Die Dislocationen sind meist beträchtlich. Sie erfolgen nach der Seite hin (Fig. 41) oder nach unten, und in der Regel ist eine Reposition der Fragmente unmöglich.

Fig. 40.





Fig. 41.



Isolirte Fracturen der **Processus transversi** sind noch viel seltener als die der Processus spinosi. Sie kommen vorzugsweise an den Lendenwirbeln vor, da hier die Querfortsätze lang und direct nach aussen gerichtet sind. Neben gleichzeitigen Brüchen anderer Wirbeltheile sind sie häufiger. Ebenso kommen Brüche der **Processus obliqui** gewöhnlich nur als Complicationen, wie z. B. von Luxationen an der Halswirbelsäule, vor.


Brüche, die nur den **Wirbelbogen** betreffen, finden sich zumeist an dem 4. bis 6. Halswirbel, da diese directer Gewalt am

meisten ausgesetzt sind. Die Fractur ist dann gewöhnlich doppelseitig am Ansatze des Proc. spinosus, und so kann das herausgebrochene Stück gegen das Mark hin dislocirt werden und dasselbe verletzen (Fig. 40).

Am allerhäufigsten sind die **Wirbelkörper** selbst Sitz der Fractur, und dabei finden wir mannigfache Formen von Brüchen. Sie brechen um so leichter, je näher sie dem Kreuzbein liegen. Ebenso finden wir, je mehr wir nach unten gehen, um so öfter Fracturen nur eines einzelnen Körpers.

Selten beobachtet man Fissuren und Infractionen. Dieselben am Lebenden zu erkennen ist meist unmöglich. Man trifft sie zumeist bei Sectionen solcher Leute, bei denen man die Diagnose auf eine schwere Distorsion der Wirbelsäule gestellt hatte, ausserdem aber auch als Combination einer der noch zu nennenden Bruchformen. Von diesen sind zunächst die von *Middeldorpf* als Compressionsbrüche, von *Roser* als Quetschungsbrüche bezeichneten zu erwähnen. Das Wesentliche dieser Brüche besteht darin, dass das spongiöse Gewebe zusammengedrückt und verdichtet wird, zuweilen sogar ohne jede äussere Bruchspalte. Die äusserlich sichtbare Erscheinung besteht in einer mehr oder weniger auffallenden Formveränderung, indem der Wirbel in der Längsachse verkürzt, in der Querachse verbreitert, also niedriger und platter, aber auch breiter gedrückt wird (Fig. 42). Gemäss der nachher zu besprechenden Aetiologie dieser Fracturen, die häufig durch eine Ueberbeugung der Wirbelsäule entstehen, findet die Compression des Wirbels oft nicht gleichmässig, sondern am vorderen Rande am stärksten statt, so dass der Wirbelkörper eine keilförmige Gestalt annimmt und sich an der Bruchstelle eine kyphotische Krümmung (Fig. 43) der Wirbelsäule einstellt. Der Compressionsbruch kann zum Splitterbruche werden, wenn vom Rande des Wirbels einzelne Stücke abgesprengt werden. Zuweilen ist der obere Wirbel oder ein Theil desselben fest in den comprimirten Wirbelkörper eingekeilt.

Fig. 42.




Es kann der letztere aber auch ganz zermalmt sein und so eine starke Verkürzung der Wirbelsäule resultiren.

Längsbrüche, bei denen die Wirbelkörper in zwei seitliche Theile gespalten werden, sind selten. Sie wurden meist an den Hals- und oberen Brustwirbeln beobachtet und gehen oft mit bedeutendem Klaffen der Bruchstelle einher. Gelegentlich werden eine ganze Reihe aufeinander folgender Wirbel in dieser Weise

Fig. 43.



Fig. 44.




betroffen, oder es wird ein förmlicher Würfel aus dem Körper herausgebrochen und der Splitter dann, ohne dass der Wirbel zusammensinkt, nach vorn dislocirt (Fig. 44).

Beim Querbruch geht die Bruchrichtung mehr weniger wagerecht von vorn nach hinten, so dass der Wirbelkörper in ein oberes und unteres Fragment getrennt wird. Die Bruchlinie liegt dabei in der Regel der oberen Fläche desselben näher als der untern. Zuweilen verfügt sich das obere Fragment nach vorn, während das untere zurückbleibt. Es erscheint dann die Linie der Dornfortsätze abgebrochen, indem die obern mehr nach vorn gerückt sind und verdeckt werden, während die unteren um so deutlicher hervorspringen.

Eine Art Querbruch ist auch die Zerreissung und Heraussprengung einer Zwischenbandscheibe, wie sie zuweilen am untern Theil der Wirbelsäule und an der Halswirbelsäule vorkommt und gewöhnlich einhergeht mit der Abreissung einer dünnen Schicht von den entsprechenden Endflächen der Wirbelkörper.

Die Schrägbrüche verlaufen fast ausnahmslos von oben und hinten nach vorn und unten. Entweder ist nur ein Keil vom vordern oberen Rande abgebrochen, der dann gewöhnlich mit dem zunächst darüber liegenden Wirbelkörper nach unten und vorn dislocirt ist, oder der Bruch durchsetzt den ganzen Wirbelkörper. In diesen Fällen ist, wenn nicht die Fortsätze und die hintern Bänder intact sind, stets eine ausgesprochene Dislocation vorhanden, indem das obere Fragment sammt dem darüber gelegenen Theil der Wirbelsäule über das untere herübergleitet (Fig. 45). Hierdurch entsteht ein Reiten der Fragmente und eine starke Verengung des Wirbelkanales, indem vorne der Körper und hinten der Bogen auf das Rückenmark drückt. Ja dieses letztere kann selbst vollständig durchtrennt werden (Fig. 46). Die unmittelbare Folge einer solchen Dislocation ist eine Kyphose an der Bruchstelle, wie dies durch die nebenstehenden Figuren deutlich illustrirt wird.

Fig. 45.



Als ziemlich typisch ist ferner noch eine Bruchart zu nennen, die man als obere hintere Keilfractur bezeichnet hat (*Ponfic-Tschammer*). Es handelt sich um einen Schrägbruch, der schief von hinten unten nach vorn oben zieht und entweder für sich allein besteht oder mit Splitter- und Compressionsfracturen zusammen vorkommt. Das hintere obere Keilfragment hat man bisher nur an den Lenden- und untern Brustwirbeln gefunden. Es hat einen scharfen untern Rand und meist eine beträchtliche Grösse, indem es in seiner Höhe sogar die Hälfte von der des Wirbelkörpers betragen kann. Meist hängt es mit dem obern Wirbelkörper durch Fasern der Intervertebralscheibe zusammen. Diese Verbindung ist entweder fest, so dass eine Dislocation nur mit dem obern Wirbel zusammen stattfinden kann, oder sie ist los, so dass der Keil unabhängig von dem Wirbelkörper in den Wirbelkanal eindringen kann (Fig. 48). Der Keil entsteht durch Abreissung vermittelst der Zwischenbandscheibe bei starken Ueberbeugungen oder durch directe Absprengung bei gewaltsamer Zusammenpressung der Wirbelsäule.

Die einzelnen Abschnitte der Wirbelsäule bieten je nach der Verschiedenheit ihres anatomischen Baues und ihrer physiologischen Bedeutung auch gewisse Besonderheiten dar hinsichtlich ihrer Fracturen.

Was zunächst die **Halswirbel** betrifft, so kommen Fracturen des Atlas meist nur bei gleichzeitiger Luxation vor. Der Processus odontoideus des Epistropheus bricht relativ

Fig. 46.





Fig. 47.



häufig quer an seiner Basis ab, und dann ist öfter auch der hintere Bogen des Atlas mit fracturirt, oder der Bruch hat die hinteren Bogen des Atlas und des Epistropheus betroffen. Am Epistropheus ist dann noch die zuweilen beobachtete isolirte Fractur seines Processus spinosus und die Fractur quer durch die beiden Gelenkfortsätze zu erwähnen. Bei den übrigen Halswirbeln brechen besonders leicht die Bogen und die Dornfortsätze. Nicht selten sitzt die Continuitätstrennung auch in den Zwischenwirbelscheiben. Es kommt durch die Verletzung zu einer Abreissung derselben. Namentlich zwischen dem 4. und 5. Halswirbel hat man dies beobachtet Die Knorpelscheibe kann dabei entweder völlig losgelöst oder die Trennung kann nur auf einen Theil, etwa die vorderen zwei Drittel beschränkt sein *(Sonnenburg)*. Die Fracturen der Wirbelkörper sind oft mit Luxationen verbunden. Es finden sich an ihnen wie an den Brustwirbeln gelegentlich auch Längsbrüche, die mehrere

Wirbel betreffen können. Selten kommen Verletzungen der Arteria vertebralis vor; man hat jedoch schon Zerreissungen derselben mit bedeutender Blutung zwischen die Muskeln und in den Vertebralkanal hinein beobachtet.

Die Brüche der **Brustwirbelsäule** betreffen meist nur einen Wirbel und zwar den Körper desselben. Ebenso verhält es sich bei den Lendenwirbeln, wo jedoch wieder verhältnissmässig häufig isolirte Brüche der Processus spinosi, transversi und der Bogen vorkommen.

Von den **Nebenverletzungen**, welche die Wirbelbrüche compliciren können, haben wir schon öfters Luxationen und Diastasen genannt. Dieselben sind meist eine Folge von Zerreissungen der starken Wirbelbänder, der Zwischenbandscheiben und der Gelenkfortsätze. Es können diese letzteren Verletzungen jedoch auch vorhanden sein, ohne dass eine Verrenkung erfolgt. Weiterhin findet man gelegentlich Zerreissungen der die Wirbel deckenden Muskeln, Sehnen und Gefässe, so dass es zu ausgedehnten Extravasaten in der Umgebung der Wirbelsäule kommen kann. Alle diese Verletzungen treten jedoch zurück gegen die gleichzeitigen Verletzungen des Rückenmarkes und seiner Adnexa. Es kann das Mark selbst ebenso wie das Gehirn durch die Gewalt in seiner molekulären Structur verändert werden, oder es kann eine Compression, Contusion oder Conquassation erfahren. Die Compression erfolgt durch deprimirte Fragmente oder durch Blutergüsse, welche aus dem zerrissenen venösen Plexus zwischen Dura und Wirbelkanal stattfinden und sich meist an den hinteren Theilen ansammeln. Zerreisst die Dura, was selten geschieht, so gelangt das Blut in den subarachnoidealen Raum, wo es sich jedoch selten weit ausbreitet. Durch das Extravasat wird das weiche Rückenmark abgeplattet, indem es dem Drucke auszuweichen sucht. Blutungen in das Mark hinein bedeuten schon eine Quetschung desselben; denn handelt es sich auch nur um punkt- und streifenförmige Hämorrhagieen, so ist an der Stelle derselben das Mark doch stets zerrissen. Oft findet man jedoch auch ausgedehntere Markblutungen, von denen aus sich dann später rasch Erweichungen des Markes entwickeln. Wenn Splitter in das letztere eindringen, so kann es in ausgedehnter Weise zertrümmert sein, ja es kann sogar seine Continuität vollständig unterbrochen werden. Zuweilen ist auch das Mark geradezu in einen Brei verwandelt, welcher die Duralscheide nur locker ausfüllt.

Die gleichen Veränderungen können natürlich auch die Wurzeln der Rückenmarksnerven erleiden.

Schliesslich wollen wir noch erwähnen, dass gemäss den starken Gewalten, welche die Wirbelbrüche verursachen, sich neben diesen häufig noch anderweitige Fracturen und Luxationen, so der Rippen, des Brustbeins, der Extremitäten, und Verletzungen anderer Organe vorfinden.

Aetiologie der Wirbelbrüche.

Betrachten wir nun die Gewalten, welche die bisher beschriebenen schweren Verletzungen verursachen, so können dieselben direct, indirect und durch Muskelzug auf die Wirbelsäule wirken. Fracturen der letzteren entstehen dabei aber besonders dann, wenn die Elasticität der Wirbelsäule und die Festigkeit der Knochen und des Bandapparates durch vorhergehende Erkrankungen bereits gelitten hat. Solche pathologische Prädispositionen finden sich aber gar nicht selten. Wir erinnern hier nur an die Ankylosen der Wirbel und Verknöcherungen der Ligamente, an die senile Osteoporose, Spondilytis, Arthritis deformans, Lues, an die Geschwülste — Sarcome und Carcinome, — die sich in der Spongiosa entwickeln können, an die Arrosion der Wirbelkörper durch Aneurysmen der Aorta. Namentlich der Muskelzug allein kann einen Bruch der Wirbelsäule nur dann herbeiführen, wenn solche pathologische Affectionen der Wirbelsäule vorhanden sind, denn um einen normalen Wirbel zu brechen, braucht man, wie vorher schon erwähnt, eine ziemlich bedeutende Kraft. An je längerem Hebelarm die letztere ansetzt, um so eher wird sie die Verletzung herbeiführen können; daher kommt es, dass auch directe Fracturen ziemlich selten sind. Die Wirbelsäule liegt eben sehr geschützt, und höchstens die Dornfortsätze und die Wirbelbogen können durch eindringende Kugeln, durch einen festen Schlag, durch Ueberfahrenwerden, durch Auffallen des Körpers von der Höhe auf den Rücken oder durch Auffallen einer Last auf den Rücken des Verletzten in dieser Weise fracturiren.

Bei weitem die Mehrzahl der Wirbelbrüche entsteht auf indirectem Wege und zwar durch übermässige Biegung der Wirbelsäule nach vorn oder hinten. Nach *Malgaigne* können wir die Wirbelsäule als einen Stab von ungleicher Biegsamkeit ansehen. Der Halstheil derselben ist nach allen Seiten beweglich, während der Brusttheil wenig und der Lendentheil wieder mehr, wenn auch lange nicht so ausgiebig wie der Halstheil,

bewegungsfähig ist. Wird nun ein Stab von solcher ungleichen Biegsamkeit bis zum Zerbrechen gebogen, so bricht er besonders da, wo ein relativ biegsamer Theil mit einem unbiegsamen in Verbindung steht. Demgemäss finden wir auch die meisten Brüche am 5. und 6. Halswirbel und am letzten Brust und ersten Lendenwirbel, und ebenso konnte *Philippeaux* auch experimentell durch starke Beugung der Wirbelsäule an der Leiche an diesen Stellen Fracturen erzeugen. Es ist natürlich leicht verständlich, dass viele hierher gehörige Fracturen einer Combination directer und indirecter Gewalt ihr Dasein verdanken. So kann durch eine von der Höhe herabfallende Last der Verletzte gleichzeitig zusammengedrückt werden und eine Fractur eines Dornfortsatzes erleiden, indem das Gewicht diesen trifft. Die Ueberbeugung der Wirbelsäule kommt hauptsächlich zu Stande durch das eben geschilderte Verhältniss, dass schwere Gewichte Kopf, Nacken, Schultern oder Brust des Verletzten treffen wie bei Bergleuten, Gerüstarbeitern. Anderemale ist die Veranlassung der Ueberbeugung Sturz des Patienten auf diese Theile oder auf die Füsse oder das Gesäss, wobei der übrige Körper nach vorn oder hinten überfällt. (Herabfallen von Gerüsten und Treppen, Herausspringen aus Fenstern).

Symptome der Wirbelbrüche.

Das typische Bild der Wirbelfractur setzt sich aus drei Symptomengruppen zusammen: Den Allgemeinerscheinungen einer schweren Verletzung, den localen Zeichen der Fractur und den Symptomen einer Rückenmarksläsion.

Die Allgemeinerscheinungen sind die des Shocs, d. h. die Patienten zeigen unmittelbar nach der Verletzung einen Zustand tiefer Depression, die sich durch Verlust des Bewusstseins, Kleinheit des Pulses, Blässe und Kühle der Haut und der Schleimhäute, und andere Collapssymptome kundgibt. Es ist dieses Bild dann kein klares, wenn gleichzeitig Symptome einer Markverletzung vorhanden sind. Man darf aber auf Shoc schliessen, wenn die Erscheinungen ohne dauernden Nachtheil für das Sensorium bald vorübergehen.

Von den localen Zeichen der Fractur sind zunächst zu erwähnen äusserst lebhafte Schmerzen an der Bruchstelle. Dieselben beruhen wahrscheinlich auf einer Läsion der Nerven des Wirbelkanals; sie sind schon spontan vorhanden, werden aber

durch jede, selbst die leiseste Berührung und alle Bewegungsversuche des Patienten bedeutend gesteigert. Neben dem Schmerz ist stets auch eine Functionsstörung vorhanden. Die Wirbelsäule vermag bei nur einigermassen erheblicher Fractur die Last des Körpers nicht mehr zu tragen. Der Kranke stürzt deshalb im Momente der Verletzung zusammen und ist unfähig sich aufzurichten, selbst wenn die Motilität der Extremitäten nicht gestört ist.

Bei Brüchen des Atlas und Epistropheus verliert der Kopf seine Stütze und damit die Sicherheit der Bewegungen. Bei solchen der übrigen Halswirbel spannen die Verletzten alle Muskeln an, um den Kopf festzustellen und steif zu halten; sie ziehen dazu die Schultern in die Höhe, so dass der Hals verkürzt erscheint, oder suchen auch wohl das fehlende Gleichgewicht zu ersetzen, indem sie den Kopf durch ihre Hände stützen.

Fanden stärkere Gefässzerreissungen an der Bruchstelle statt, so zeigt deren Umgebung nicht selten eine sich weithin erstreckende Schwellung und Verfärbung der Haut.

Fast stets vorhanden ist eine acut entstandene Deformität, die sich durch eine abnorme Haltung des Kopfes, eine Unterbrechung der Dornfortsatzreihe oder eine winklige Knickung der Wirbelsäule zu erkennen gibt. Bei Brüchen der Halswirbel, vorzüglich der beiden obersten, findet man alle diese Erscheinungen vorhanden, indem der Kopf meist vorn übergeneigt oder auch wohl etwas seitlich abgewichen erscheint. Bei Brüchen der Brust- und Lendenwirbel hat man dagegen nur die beiden letzten Deformitäten. Eine Unterbrechung der Dornfortsatzlinie kann eintreten bei Brüchen der Dornfortsätze, der Bogen und beim Querbruch der Wirbelkörper. Tastet man in einem dieser Fälle die Dornfortsätze ab, so findet man plötzlich in der Reihe eine beim Drucke sehr schmerzhafte Einsenkung und fühlt dann in der Tiefe den nach der Seite oder nach unten abgewichenen Dornfortsatz. Die Lücke ist bisweilen so tief, dass man leicht den Finger einlegen kann, und es vermag den Anschein zu haben, als ob die Wirbelsäule aus 2 Theilen bestände, deren oberer nach vorn verschoben wurde. Seltener tritt bei diesen Brüchen eine Kyphose ein. Sie kann daher resultiren, dass der gebrochene Dornfortsatz nach hinten hervortritt. In der Regel deutet jedoch eine plötzlich entstandene winklige Knickung auf einen Bruch des Wirbelkörpers hin. Sie wird um so bedeutender, je mehr der letzteren sich an dem Bruche betheiligen.

Die Entstehung der Kyphose wird leicht verständlich bei Betrachtung der früheren Figuren. Sie ist, wie aus denselben ersichtlich, eine Folge von Compressionsbrüchen, bei denen die Compression vorzugsweise an den vorderen Partieen des Körpers stattfand, oder von Schiefbrüchen, bei denen das obere Fragment an dem untern vorbei nach vorn und unten gleitet. Diese letztere Dislocation kann so bedeutend werden, dass der obere Wirbelkörper gänzlich über den untern heraustritt.

Findet eine Einkeilung der Fragmente statt, so neigt sich das obere Stück der Wirbelsäule ebenfalls meist in einem nach vorn offenen Winkel zum untern. Fand die Zertrümmerung oder Compression des Wirbelkörpers vorzüglich an seinen seitlichen Partieen statt, so krümmt sich die Wirbelsäule nach der Seite, wir bekommen eine traumatische Scoliose. Combiniren sich winklige und seitliche Knickung, so haben wir an Stelle der normalen Verhältnisse eine Kypho-Scoliose.

Die Deformität entsteht, wie schon hervorgehoben, stets acut. Sie braucht jedoch nicht sofort nach stattgehabter Verletzung einzutreten, sondern kann erst längere Zeit nachher durch ungeschickte Bewegungen des Patienten oder durch unzweckmässige Manipulationen mit demselben in die Erscheinung treten.

Die bei Fracturen der Extremitätenknochen so wichtigen localen Symptome der Crepitation und der abnormen Beweglichkeit kommen hier weniger in Betracht, weil die zumeist gebrochenen Wirbelkörper zu tief liegen, um einer Palpation zugänglich zu sein, weil ferner die Fragmente oft eingekeilt oder durch die spastisch contrahirten Muskeln fixirt sind.

Nur bei den selteneren Brüchen der Dornfortsätze oder der Bögen sind beide Symptome oft deutlich nachweisbar, und ebenso gelingt es zuweilen bei Brüchen der obern Halswirbel durch combinirte Untersuchung von aussen und vom Munde her, die gebrochenen Wirbel an einander zu verschieben und so Crepitation zu erzeugen. Es wird auch angegeben, dass letztere, wenn auch objectiv nicht erkennbar, doch zuweilen subjectiv vom Patienten bei leichten Bewegungen des Körpers, z. B. beim Umdrehen, gefühlt wird.

Der wichtigste Symptomen-Complex bei Wirbelbrüchen bezieht sich auf die durch die Fractur bedingte gleichzeitige Läsion des Rückenmarks. Wie bei den Schädelbrüchen das klinische Bild von den Verletzungen des Gehirns abhängt, so beherrscht hier die Rückenmarksverletzung vollständig

die Situation. Ehe wir auf die dadurch bedingten Störungen eingehen, wollen wir jedoch noch betonen, dass in seltenen Fällen bei Lendenwirbelfracturen trotz deutlicher Dislocation nervöse Störungen ganz fehlen können, und erinnern dabei daran, dass vom 2. Lendenwirbel ab der Wirbelkanal kein Mark, sondern nur die festen Stränge der Cauda equina enthält.

Das pathologisch-anatomische Substrat für die Rückenmarkssymptome bilden entweder moleculäre Veränderungen des Markes — Commotio Medullae spinalis — oder eine Compression oder Contusion desselben, wie wir das oben beschrieben haben.

Die Symptome der Rückenmarkserschütterung bestehen im Wesentlichen in Motalitätsstörungen an den Extremitäten — Schwäche, Parese oder Paralyse — und in Sensibilitätsstörungen Parästhesien, Schmerzen längs des Rückgrates mit Druckempfindlichkeit der Wirbel, Anästhesie, seltener Hyperästhesie der Haut und Blasenschwäche. Diese Erscheinungen treten meist sofort nach der Verletzung, zuweilen aber auch erst später ein und führen entweder schnell zum Tode oder mehr weniger rasch zur Heilung, können aber auch in ein chronisches Siechthum übergehen. Fälle der letzteren Art beobachtet man vorzüglich nach Eisenbahnverletzungen und bezeichnet die an Hysterie grenzenden Krankheitserscheinungen, die nach solchen später resultiren, als „ralway spine“ (*Erichsen*), neuerdings auch wohl als traumatische Neurose.

Die Erscheinungen der Compressio und Contusio medullae spinalis sind nach Intensität und Extensität von dem Sitz der Fractur und dem Grad der Zerstörung des Markes abhängig, d. h. je näher dem Gehirn dasselbe lädirt ist, um so grössere Partieen des Körpers werden in ihrer Innervation gestört werden, und je ausgiebiger die nervösen Organe zermalmt oder comprimirt sind, um so vollständiger wird die Lähmung sein.

Im Allgemeinen handelt es sich um doppelseitige (paraplegische) oder halbseitige (hemiplegische) Lähmungen der Motilität und Sensibilität, um Lähmungen der Blase und des Mastdarms, Veränderungen der Reflexerregbarkeit und der Thätigkeit der Vasomotoren.

Daneben kommen aber auch Reizerscheinungen, wie Muskelkrämpfe, Schmerzen, Hyperästhesieen, vor. Wir wollen uns über die Symptome, wie sie je nach dem verschiedenen Sitz der Markverletzung auftreten, Folgendes merken:

Wenn eine Fraktur vom 3. Lendenwirbel an nach abwärts den Inhalt des Wirbelkanals beschädigt, so wird als solcher nicht mehr das Mark, sondern die feste Cauda equina vom Insulte betroffen. Die Verletzung dieses Sacraltheiles des Rückenmarkes ergibt ein einheitliches, wenn auch in gewissen Grenzen schwankendes Bild. Die prävalirende Störung ist eine Lähmung der Blase und des Mastdarms (Retentio urinae mit hochgradigem Harndrang; Obstipation; Stuhl kann nur künstlich herbeigeführt werden und geht dann unwillkürlich ab; Mastdarmschleimhaut anästhetisch, Glieder schlaff). Daneben besteht eine Schwäche der Geschlechtsfunction; das characteristischste Zeichen ist aber eine merkwürdige Form von localer Anästhesie *(Ziegler, Starr)*, die je nach der Ausdehnung der Verletzung bald nur den Damm mit den Genitalien und der Hinterfläche der Oberschenkel, bald auch noch dazu die ganze hintere Fläche der unteren Extremitäten einnimmt. Motorische Lähmungerscheinungen treten dagegen in den Hintergrund. Sie sind nur bei bedeutender Dislocation der Fragmente zu erwarten. *Shaw* theilt eine Reihe von Fällen mit, bei denen die Patienten trotz bedeutender Deformität sogar noch gehen konnten.

Sitzt die Markverletzung in der Mitte der Lendenanschwellung, etwa in der Höhe des Dornfortsatzes des 12. Brustwirbels, so erhalten wir neben einem Fehlen der Reflexe eine unvollständige Paraplegie, indem eine motorische Lähmung alle vom Nervus ischiadicus versorgten Muskeln — also die Muskeln des Gesässes, an der Rückseite des Oberschenkels und alle unterhalb des Kniees gelegenen, mit Ausnahme des Tibialis anticus, dessen Kernregion im obern Theil der Lendenanschwellung liegt, befällt. Dazu kommt dann noch eine Parese oder Paralyse des Sphincter ani und ebenso der Sensibilität, die sich über den ganzen Bereich der untern Extremität, mit Ausnahme der von den Nn. obturatorius und cruralis versorgten innern Schenkelfläche erstrecken kann.

Auch diese Partieen und ebenso der Tibialis anticus werden ergriffen, wenn die transversale Markläsion im obern Theile der Lendenanschwellung liegt. Man findet dann also ausser den vorher genannten Muskeln noch den Quadriceps und die Adductoren gelähmt und Anästhesie der dieselben deckenden Haut.

Complicirter werden die Störungen schon, wenn das Mark dicht oberhalb der Lendenanschwellung, also im Bereiche der untern Brustwirbel, afficirt wird. Neben einer motorischen Lähmung der untern Extremitäten, der Blase und des Mastdarms, sowie einer Taubheit und Anästhesie der Haut von den Zehen bis zum Nabel, sollte man dann vor allen Dingen eine Steigerung der Reflexe in den untern Extremitäten erwarten, weil die Leitung von den reflexhemmenden Centren im Grosshirn zu der grauen Substanz des Lendenmarkes durch diesen Sitz der transversalen Markläsion unterbrochen wird. Wir wollen aber hier gleich erwähnen, dass eine solche Steigerung der Reflexe im Ganzen nur selten vorhanden ist. Es pflegen vielmehr während der ersten 24 Stunden alle Reflexe auszubleiben. Später sind sie dann entweder normal oder abgeschwächt oder fehlen auch wohl ganz. Es rühren diese Abweichungen vielleicht von einer gleichzeitigen Reizung reflexhemmender Fasern her. Es kann aber auch eine Steigerung sämmtlicher Reflexe da sein, ja es können die Patienten von tonischen oder klonischen Krämpfen der untern Extremitäten befallen werden, die entweder spontan auftreten oder auf die geringsten Reize, so der äussern Haut durch Berührung mit der Bettdecke, der Mastdarmschleimhaut durch Fäcalmassen, der Harnröhre durch den Urin oder Katheter.

Ziemlich die gleichen Erscheinungen resultiren nach Verletzung des Markes im mittleren und oberen Brustmark, nur reicht die Anästhesie bis zur Gegend des Schwertfortsatzes, und oft entsteht ein Gürtelgefühl in dieser Höhe. Fast in allen Fällen sind an der Lähmung auch Blase und Mastdarm betheiligt. Die Blasenlähmung ruft zunächst Retentio urinae hervor, so dass die Blase enorm ausgedehnt wird, ohne dass der Patient Harndrang empfindet. Es können aber Harn und Koth von Zeit zu Zeit unwillkürlich und zwar auf reflectorischem Wege entleert werden, sobald Blase und Mastdarm einen gewissen Füllungsgrad erreicht haben. So kann ein Schein von Funktion dieser Organe erweckt werden. Späterhin tritt aber vollständige Incontinenz auf und zwar eine Ischuria paradoxa, indem bei stets gefüllter Blase beständiges Harnträufeln statthat. Mitunter wird durch das Einführen des Katheters oder durch Druck auf die Harnröhre eine kräftige Contraction der sonst gelähmten Blase hervorgerufen. Der Darmlähmung führt entweder sofort zur Incontinentia alvi oder erst zu einer Olstipation. Durch die Stag-

nation der Fäces entwickelt sich dann ein hochgradiger Meteorismus, besonders wenn gleichzeitig die Bauchmuskeln gelähmt sind. Dieses letztere ist aber meist der Fall, und dadurch wird die Athmung sehr erschwert, indem die aufgeblähten Därme das Zwerchfell hoch hinaufdrängen.

Während bisher nur der Rumpf und die untern Extremitäten betroffen waren, erstreckt sich die Lähmung auch auf die Arme, also auf alle 4 Extremitäten, wenn das Mark in der Halsanschwellung, also zwischen den mittleren Halswirbeln und dem 2. Brustwirbel verletzt wird. Es rührt dies daher, dass aus dem 5.—8. Hals- und dem 1. Brustnerven der Plexus brachialis gebildet wird. Da nun ausser den Bauchmuskeln auch sämmtliche Intercostalmuskeln gelähmt sind, so tritt die sogenannte diaphragmatische Respiration ein, indem von allen Respirationsmuskeln nur noch das Zwerchfell und einzelne Halsmuskeln die Inspiration besorgen können, während die Exspiration allein durch die Elasticität des Thorax ermöglicht werden muss. Die unmittelbare Folge dieses Athmungstypus ist die, dass alle Bewegungen, die eine kräftige Arbeit der Exspirationsmuskeln verlangen, also vor allem Husten und Niesen, unmöglich sind. Es wird dadurch das Leben der Patienten sehr bedroht, wenn sich gleichzeitig Bronchialkatarrhe entwickeln.

Durch das Intervertebralloch zwischen dem 3. und 4. Halswirbel kommen Fasern heraus, welche sich zum Nervus phrenicus vereinigen. Sitzt eine Fractur an dieser Stelle, also entsprechend dem obern Theil der Halsanschwellung, so kann der genannte Nerv zerstört, damit auch das Zwerchfell gelähmt und der Tod des Patienten unmittelbar nach der Verletzung herbeigeführt werden.

Bei allen Brüchen im Bereiche der Halsanschwellung können in Folge von Schädigung des Centrum ciliospinale *(Budge)* Störungen der Pupille, als Starre, Erweiterung oder Verengerung derselben, eintreten.

Bei den Fracturen des Atlas und Epistropheus wird das obere Halsmark getroffen. Wird hier der Querschnitt desselben unterbrochen, so tritt totale sensible und motorische Lähmung in allen nach abwärts vom Kopf gelegenen Theilen ein. Die durch Lähmung der Phrenici veranlasste Asphyxie führt hier oft so schnell den letalen Ausgang herbei, dass eine genaue Beobachtung der vorhandenen Erscheinungen nicht möglich ist. Der Tod braucht jedoch nicht sofort zu erfolgen,

sondern kann bei primärer geringer Dislocation erst später durch ungeschickte active und passive Bewegungen des Patienten resultiren.

Wir haben bisher nur von den Erscheinungen bei vollständiger transversaler Markverletzung gesprochen und müssen jetzt noch Einzelnes nachholen über die Symptome bei unvollständiger Querschnittsläsion.

Ist eine solche vorhanden, so können die citirten Lähmungen erst allmählich ihre volle Ausdehnung erlangen, oder es werden einzelne Muskelgruppen stärker als die übrigen oder eine Körperhälfte stärker als die andere betroffen. Isolirte Innervationsstörungen können aber auch durch alleinige Verletzung der austretenden Nervenwurzeln bedingt werden, freilich nur nach Brüchen der Halswirbel, denn nur hier ist der Rückenmarkskanal so weit, dass durch dislocirte Fragmente die Nervenwurzeln gequetscht werden, das Mark aber intact bleiben kann.

Nicht selten begegnet man bei theilweise erhaltenem Mark einem Vorwiegen der motorischen Lähmung gegenüber der sensiblen, derart, dass Sensibilitätsstörungen in den gelähmten Gliedern ganz fehlen oder bald rückgängig werden, während die motorische Lähmung fortbesteht. Es hängt dies mit dem Verlauf der sensibeln Fasern im Rückenmark zusammen, indem dieselben einmal zahlreiche Anastomosen besitzen, dann aber auch von den hinteren Wurzeln in die Hinterstränge eintretend, nicht alle in gleicher Höhe endigen, sondern in beträchtlicher Anzahl im gleichen Hinterstrang direct nach aufwärts ziehen und sich erst höher oben mit Ganglienzellen in Verbindung setzen. Diese Fasern können also über die beschädigte Stelle des Markes hinaus die Eindrücke in centripetaler Richtung weiter leiten (*Beck*).

Sehr interessant gestaltet sich das Krankheitsbild, wenn eine ganze Hälfte des Rückenmarksquerschnittes functionsunfähig gemacht wurde.

Wir erhalten dann die Symptome der *Brown-Séquard*'schen Halbseitenläsion, die in motorischer Lähmung auf der verletzten und sensibler Lähmung auf der entgegengesetzten Körperhälfte bestehen. Auf der motorisch gelähmten verletzten Seite macht sich zugleich auch eine Hyperästhesie bemerkbar, während das Muskelgefühl aufgehoben ist. An der oberen Grenze stösst an dies hyperästhetische Gebiet eine schmale anästhetische Zone an, welche ihren Ursprung einer Zerstörung der von der Verletzung

unmittelbar betroffenen hintern Rückenmarkswurzeln verdankt. Ueber dieser anästhetischen Zone kommt dann wieder ein hyperästhetischer Bezirk, der sich über die Mittellinie hinaus auf die andere Körperseite fortsetzt. Auf der der Markläsion entgegengesetzten Seite ist die Motilität ebenso wie das Muskelgefühl erhalten; es herrscht hier dagegen eine Anästhesie aller Empfindungsqualitäten.

Bei allen Lähmungen tritt eine rapide Atrophie der befallenen Muskeln sowie eine Herabsetzung ihrer electrischen Erregbarkeit ein.

Neben den Lähmungen, die uns bisher vorzugsweise beschäftigt haben, kann nun noch durch die Markverletzung eine Reihe anderer Symptome resultiren. Von diesen haben wir auch schon erwähnt gewisse Reizungserscheinungen, die uns als Hyperästhesieen, als neuralgische Schmerzen in Form des sogenannten Gürtelgefühles, als tonische und klonische Krämpfe, fibrilläre Zuckungen der Skeletmuskeln, Priapismus, Ejaculation des Samens und als Erbrechen entgegentreten können.

Von ganz besonderem Interesse können die Erscheinungen sein, welche durch Lähmung der vasomotorischen Nerven hervorgerufen werden. Dieselben haben nicht nur im verlängerten Mark, sondern auch in der spinalen grauen Substanz ihren Sitz, und daher ist ihre Verletzung stets bei einer Läsion dieser Theile vorhanden. Die Vasomotorenlähmung führt zunächst zur Verlangsamung des Blutlaufes in den Capillaren der paralytischen Glieder, Erweiterung der Gefässe und in Folge davon zu leichtem Oedem der Haut, verlangsamter Wiederkehr der normalen Färbung derselben nach vorausgegangenem circumscriptem Druck auf eine bestimmte Stelle, weiterhin aber auch zu einer Erhöhung der Temperatur der paralytischen Theile um einige Zehntel Grade gegenüber den intacten Gliedern.

Die Schweisssecretion kann eine locale Beschränkung erfahren, indem z. B. in einem Fall die gelähmten unteren Extremitäten trocken blieben, während der obere, gesunde Theil des Körpers mit Schweisstropfen bedeckt erschien.

Als eine Folge der Vasomotorenlähmung muss man theilweise auch den Priapismus ansehen, den man nach Verletzung der grauen Substanz des ganzen Rückenmarkes beobachten kann. Es kann derselbe einer Reizung des Erectionscentrums im Lendenmark,

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

also einer Erregung in der sexuellen Sphäre, zugeschrieben werden. Häufig ist aber dieses Centrum, das dicht bei dem Blasen- und Mastdarmcentrum liegt, gelähmt, so dass active Erectionen nicht mehr stattfinden können, und trotzdem ist Priapismus vorhanden. Er wird dann einfach bedingt durch Lähmung der Vasomotoren, welche die Corpora cavernosa penis versorgen, indem dadurch der Tonus der Gefässwandungen der Schwellkörper aufgehoben und ein reichlicher Blutzufluss zu denselben ermöglicht wird. Sobald man für höhere Lage des Penis und damit für passenden Blutabfluss sorgt, verliert sich in solchem Falle die Steifheit des Gliedes. Der Priapismus kann übrigens wochenlang nach der Verletzung bestehen bleiben.

Nach Fracturen der Halswirbel, ausnahmsweise aber auch nach solchen der Brust- und Lendenwirbel, beobachtet man hier und da eine excessive Steigerung der Körpertemperatur bis zu 41° und 42°. Dieselbe tritt meist erst im Verlaufe der Brüche ein, und man findet dann bei der Section oft eine ausgedehnte Entzündung des Markes. Wo aber eine solche Myelitis nicht gefunden wird, da handelt es sich vielleicht um eine Reizung der Vasomotoren, welche eine Contraction der Hautgefässe und damit verminderte Wärmeabgabe bewirkt.

Viel seltener als eine Steigerung beobachtet man ein abnormes Sinken der Temperatur. *Sonnenburg* und *Reynier* haben Fälle von Halswirbelbrüchen mitgetheilt, bei denen die Temperatur kurz nach den Verletzungen bis auf 33,6 Grad herabgesunken war. Auf dieser Tiefe hielt sie sich 18—24 Stunden, um dann rapid bis auf 40 Grad und höher anzusteigen.

Hand in Hand mit den functionellen Störungen der vasomotorischen Nerven gehen jene der trophischen, die gleichfalls von der grauen Substanz in den Vordersäulen entspringen. Einer Lähmung dieser Nerven verdankt die acute Atrophie der paralytischen Muskeln ihre Entstehung, dann aber noch eine andere schwerwiegende Schädigung der Gewebe, nämlich ein acuter Decubitus, der in schweren Fällen alle Stellen befällt, die irgend einem, sei es auch noch so geringen Drucke ausgesetzt sind. Dieser ausserordentlich schnell entstehende Druckbrand, dessen Bedeutung wir später noch näher würdigen werden, ist selten die Folge einer ausgedehnten Myelitis, wie man früher nach *Charcot* stets annahm, denn er kann auftreten,. ohne dass irgend welche Symptome einer solchen vorhanden wären- Sicherlich aber ist er auch nicht immer durch eine Sensibili

tätslähmung bedingt, denn die geschädigten Theile können sogar auffällig empfindlich sein. Er entsteht vielmehr zumeist bei schwacher Herzkraft durch Druck gegen solche Weichtheile, welche durch Lähmung ihrer trophischen Fasern in ihrer Ernährung sehr Noth gelitten und damit die Resistenz gegen äussere Einflüsse verloren haben.

Die Herzthätigkeit und der Puls erleiden zuweilen Veränderungen, wenn bei Brüchen der Hals- und obersten Brustwirbel die accelerirenden, pulsbeschleunigenden Nervenfasern lädirt werden, die aus der grauen Substanz dieser Markgegend entspringend, sich zum Sympathicus begeben und mit diesem zum Herzen gelangen. Die natürliche Folge hiervon ist eine sofortige Verlangsamung des Pulses, weil nunmehr die Hemmungsnerven der Herzbewegung (Vagus mit den aus dem Accessorius stammenden Fasern) ihre ganze Macht entfalten können. Der anfangs langsame Puls kann aber allmählich ebenso wie die Temperatur ansteigen, sodass er später bis auf das Dreifache seiner anfänglichen Frequenz zählen kann.

In Folge der behinderten Respiration macht sich zuweilen eine grosse Schwäche der Stimme, eine Langsamkeit und Unsicherheit der Sprache und eine eigenthümliche Röthung des Gesichtes geltend. In Folge eines Druckes nach vorn dislocirter Fragmente oder von Blutextravasaten, die sich zwischen Wirbeln und Pharynx oder Oesophagus ansammeln, kann eine Erschwerung des Schlingens entstehen, und schliesslich ist bei vielen Wirbelbrüchen nicht nur ein Diabetes insipidus, sondern auch das Auftreten von Zucker im Urin beobachtet worden.

Diagnose der Wirbelbrüche.

Trotz der stattlichen Anzahl der angeführten Symptome ist es oft doch nicht leicht, ja zuweilen sogar unmöglich, die Diagnose eines Wirbelbruches zu stellen. Leicht ist sie, wenn neben den vom Rückenmark ausgehenden Erscheinungen noch die localen Fractursymptome nachweisbar sind; schwer wird sie dagegen, wenn letztere fehlen. Dann muss die Differentialdiagnose gestellt werden zwischen einer Fractur, einer einfachen Distorsion der Wirbelsäule und einer Compression des Markes durch ein ohne gleichzeitige Knochenverletzung entstandenes Blutextravasat im Wirbelkanal. Eine Luxation der Wirbel-

säule, welche die gleichen Rückenmarkssymptome veranlassen kann, ist im Ganzen durch die bei dieser vorhandene Deformität leichter auszuschliessen.

Die Distorsionen der Wirbelsäule entstehen durch dieselben Gewalten wie die Fracturen; nur kommt es bei denselben bloss zu einer Zerrung und Zerreissung von Ligamenten, Sehnen und Muskeln, vielleicht auch zur Compression der Intervertebralscheiben. Lebhafte Schmerzen, welche die Wirbelsäule hindern, die Last des Körpers zu tragen, sind die Folgen dieser Verletzungen, welche häufig noch durch Läsionen innerer Organe, wie der Nieren, complicirt sind. Treten unter solchen Verhältnissen Rückenmarkssymptome auf, so kann die Gewalt zur Zerreissung des venösen Plexus zwischen Dura und der Wand des Wirbelkanales und damit zu einem das Rückenmark comprimirenden Blutextravasat geführt haben, während das Mark selbst intact bleibt. Die Lähmungen, die auf diesem Wege entstehen, sind meist unvollständige, betreffen z. B. nur einen Arm oder nur bestimmte Muskelgruppen eines Gliedes, oder sie betreffen, je nachdem die vordern oder hintern Wurzeln mehr gedrückt werden, intensiver die Motilität als die Sensibilität. Die Resorption eines solchen Extravasates und damit die Wiedergenesung des Patienten wird ferner rasch, innerhalb weniger Wochen, erfolgen können, während bei Compression des Markes durch Knochenfragmente die Heilung entweder gar nicht oder doch erst nach sehr langer Zeit zu Stande kommt.

Haben wir im gegebenen Fall eine Fractur vor uns, so ist wiederum die Entscheidung oft schwer, ob die Rückenmarkssymptome von einer Compression oder einer Contusion des Markes herrühren. Es hilft uns hier die Erfahrung, welche lehrt, dass einfache Compressionen des Markes bei den uns interessirenden Verletzungen weit seltener sind als Contusionen. Eine Compression des Markes und zwar durch ein Blutextravasat können wir wohl dann annehmen, wenn die Lähmungen nicht unmittelbar nach der Fractur enstanden, sondern sich erst allmählich entwickelten und wenn der Fall günstig verläuft; denn eine Wiederherstellung der Motilität kann nicht erfolgen, wenn die Substanz des Markes vollständig zerstört war. Wie schwer es ist, intra vitam Compression oder Contusion zu diagnosticiren, zeigen zwei Beobachtungen *Wagner*'s, indem sich in dem einen Fall vollständige Abreissung, im andern einfache Compression des untern Dorsalmarkes fand, während bei Lebzeiten völlig gleiche Symptome bestanden hatten.

Berücksichtigt man das soeben Angeführte, so wird man im einzelnen Fall durch eine möglichst exacte objective Untersuchung doch wohl zur Erkenntniss des wahren Sachverhaltes kommen. Die Untersuchung selbst soll methodisch geschehen. Hat man einen Patienten vor sich, bei dem die stattgehabte Gewalt einen Wirbelbruch annehmen lässt, so gilt als erste Regel für die Untersuchung, dass Bewegungen mit dem Patienten auf das geringste Mass beschränkt werden müssen, da durch ungeschickte Manipulation gefährliche, ja schnell tödlich werdende Verschiebungen der Fragmente eintreten können. Zum Fühlen einer Crepitation, einer abnormen Beweglichkeit oder zur Feststellung der acut entstandenen Deformität am Rücken des Patienten gebrauche man die grösste Vorsicht. Dabei soll man den Patienten möglichst dieselbe Körperstellung einhalten lassen, die er gerade inne hat. Lieber soll man sich vorerst mit der Diagnose einer Wirbelverletzung begnügen, als dem Patienten durch übergrossen Eifer schaden.

Sehr wichtig und niemals zu unterlassen ist bei Verdacht auf Fracturen der Halswirbelsäule auch die Abtastung der Wirbelkörper von der Rachenhöhle aus. Der Finger reicht bis zum 5. Halswirbel in der Höhe der Epiglottis, eventuell auch bis zum 6. Halswirbel *(Sonnenburg-Demme)*.

Ehe man aber auf locale Fractursymptome fahndet, soll man untersuchen, ob und in welcher Weise das Mark verletzt ist, da man ja in den nervösen Erscheinungen viele Anhaltspunkte zur Localisation der Verletzung besitzt. Man achtet also auf die Respiration, auf etwa vorhandenen Priapismus und Meteorismus, untersucht mit Nadelstichen die Sensibilität der Haut, fordert den Patienten auf, vorsichtig die einzelnen Glieder zu erheben, sucht durch Percussion den Füllungsgrad der Blase zu bestimmen, untersucht die Reflexerregbarkeit und die electro-musculäre Erregbarkeit in den gelähmten Theilen, stellt genau die Grenzen zwischen sensibler, anästhetischer, eventuell hyperästhetischer Haut fest, misst die allgemeine Körpertemperatur sowie die Temperatur der gelähmten Theile, untersucht den Urin nach seiner Quantität und auf den Gehalt an Zucker oder sonstigen abnormen Bestandtheilen und wird so durch Vergleichung der gefundenen örtlichen und allgemeinen Symptome, sowie durch Analyse der stattgehabten Gewalt die vorliegende Verletzung annähernd sicher diagnosticiren können.

Prognose und Verlauf der Wirbelbrüche.

Für die Prognose der Wirbelbrüche gilt die Regel: Je tiefer die Verletzung sitzt und je weniger das Mark gelitten hat, umsomehr ist Aussicht auf Heilung vorhanden.

Interessant ist die von *Sonnenburg* hervorgehobene Thatsache, dass die Prognose der Halswirbelbrüche gar nicht so schlecht ist, wie man früher geglaubt hat. Durch eigene Beobachtungen und genaue Litteraturdurchforschung stellte er fest, dass die Halswirbelfracturen trotz bedeutender Dislocation und trotz Sitzes des Bruches im Wirbelkörper ausheilen können. Trotz schwerer Knochenverletzungen braucht es auch nicht zu directer Verletzung des Markes zu kommen. *Sonnenburg* hat eine ganze Reihe von Halswirbelbrüchen zusammengestellt, bei welchen die Patienten im Anfange keine Spur von Lähmungen zeigten; einige der Patienten konnten sogar nach der Verletzung noch längere Zeit gehen.

Die Zerstörung lebenswichtiger Centren im Mark führt allerdings meist unmittelbar den Tod herbei. Ueberleben aber die Patienten die erste Zeit nach der Verletzung, so sind sie jetzt keineswegs allen Gefahren überhoben, sondern ein grosser Theil von ihnen geht im Laufe von Tagen, Wochen oder Monaten an den Folgen der Markverletzung zu Grunde. Im Anschluss an eine Compression oder Contusion des Markes entstehen nämlich fast ausnahmslos secundäre Veränderungen desselben, die in Folge einer durch die Verletzung bedingten Circulationsstörung zunächst den Charakter der anämischen oder hämorrhagischen Necrose haben. Später folgt dann eine Erweichung der abgestorbenen Elemente und in der Umgebung derselben eine demarkirende Entzündung, die als auf- und absteigende Myelitis in die Erscheinung tritt. Findet eine Infection der zertrümmerten Gewebe statt, so kommt es zu einer eiterigen Myelo-meningitis. Da es sich aber in der übergrossen Mehrzahl der Fälle nicht um complicirte Fracturen handelt, so ist eine solche im Vergleich mit der so häufigen eiterigen Meningitis bei Schädelbrüchen ein seltenes Ereigniss.

Die Symptome nun, die von den eben geschilderten secundären Markveränderungen ausgelöst werden, sind progressive Lähmungen, die wir oben je nach dem Sitz der Verletzung kennen gelernt haben und die mehr weniger rasch den Tod herbeiführen. Am häufigsten gibt die Blasenlähmung Veranlassung zu demselben. Der Patient kann nicht von selbst uriniren, er

wird daher täglich mehrmals catheterisirt und hat sich bald eine septische Cystitis zugezogen. Es genügt die geringste Menge mit dem Catheter eingeführter Mikroorganismen dazu, um in dem stagnirenden Harn eine kaum zu beseitigende faulige Zersetzung zu erregen. An die Cystitis schliesst sich dann in der Regel eine Pyelonephritis an, und der Kranke stirbt schliesslich an Urämie. Neben diesen Blasenleiden gefährdet den Patienten weiterhin sehr häufig der von uns schon vorher erwähnte foudroyante Decubitus. Am Kreuzbein, an den Trochanteren, an den Fersen sowie an allen andern einem Druck ausgesetzten Körperstellen entwickelt sich derselbe oft so ausserordentlich schnell, dass schon nach wenigen Tagen unter schwerer Jauchung und hectischem Fieber in der Tiefe die necrotischen Knochen freigelegt und der Wirbelkanal eröffnet werden können, so dass dann der durch Sepsis, Pyämie oder ein accidentelles Erysipel herbeigeführte Tod als eine Erlösung angesehen werden muss. Die Darmlähmung macht sich in lästiger Weise geltend, wenn Durchfall eintritt, indem dann der unfreiwillig abgehende Koth den Patienten fortwährend besudelt. Eine nicht geringe Anzahl von Kranken geht ferner durch schwere Erkrankungen der Lunge und des Gehirns zu Grunde, indem sich in den Lungen nicht nur bedeutende Congestivzustände und Lungenödem, sondern auch ausgedehnte Pneumonieen, im Gehirn hingegen starke Blutüberfüllungen sowie seröse Ergüsse zwischen die Hirnhäute und in die Ventrikel entwickeln können.

Es erliegen nun glücklicherweise nicht alle Verletzten diesen Gefahren, sondern ein Theil erholt sich wieder, namentlich wenn die nervösen Lähmungen nur unvollkommene waren. Der Druck der Fragmente kann beseitigt werden, ein comprimirendes Blutextravasat kann sich resorbiren, und so kann allmählich eine Besserung des Befindens eintreten, wenn auch gewöhnlich eine gewisse Schwäche der untern Extremitäten, der Blase und des Darms zurückbleibt und sich in der nicht ganz functionsfähigen Blase leicht phosphatische Concremente bilden.

Wir haben bisher noch gar nichts von den Knochen erwähnt, und in der That ist die Prognose der Wirbelbrüche am allerwenigsten von der Art und der Ausdehnung der Knochenverletzung abhängig. Diese heilt in der Regel trotz ausgiebiger Splitterung, Quetschung und Dislocation mit Bildung eines knöchernen Callus, der allerdings ziemlich lange Zeit, 6—10 Wochen, zu seiner Herstellung braucht und stets die durch die Dislocation be-

dingte Deformität, also vorzüglich die Kyphose oder die Scoliose, bestehen lässt.


Bei der Callusbildung selbst schwindet meist ein Theil der knöchernen Trümmermassen und der Intervertebralscheiben durch Resorption. Der fracturirte Wirbel ist oft, wenn er knöchern geheilt ist, von Osteophytenbildungen umschlossen, und auch die Nachbarwirbel können an der Peripherie durch knöcherne Spangen ankylotisch verbunden werden. Fibröser Callus und Pseudarthrosenbildung ist gelegentlich bei den Brüchen der Fortsätze gefunden worden. Man hat ferner beobachtet, dass von dem verletzten Knochen aus eine tuberculöse Caries ihren Ausgang nahm oder dass sich, bei Vorhandensein von primären Eiterungsprocessen an irgend welchen Körperstellen, eine metastatische Eiterung an der Bruchstelle entwickelte *(Kalthöner)*. Im Anschluss an eine Fractur der Lendenwirbelsäule sahen *Volkmann* und *Leser* eine typische Spondylolisthesis entstehen.

Therapie der Wirbelbrüche.

Die Behandlung der Wirbelbrüche ist vorzugsweise eine prophylactische, indem man durch entsprechende Maassnahmen die bei der Prognose besprochenen Schädlichkeiten zu verhüten sucht. Zunächst erinnere man sich daran, dass durch jede unvorsichtige Bewegung die Dislocation der Fragmente verstärkt werden und dadurch ein sofortiger Tod herbeigeführt werden kann. Es ist daher schon der Transport und die Entkleidung des Patienten mit aller Vorsicht auszuführen. Der Kranke muss auf einer festen Bahre getragen werden, indem man seinen Kopf durch nebengelegte Sandsäcke möglichst stützt. Beim Hinüberlegen des Kranken in das Bett muss man viele Leute zur Verfügung haben, damit der ganze Stamm in verlässlicher Weise gestützt werde. *Albert* gibt dafür folgende beherzigenswerthe Regel: Man rückt mit der Bahre bis an das Fussende des freistehenden Bettes und zwar so, dass die Längenachse der Bahre in die Längenachse des Bettes fällt, wobei das Kopfende der Bahre das Fussende des Bettes berührt. Die Gehilfen treten an beide Seiten der Bahre und greifen paarweise, unter den Kranken so dass das eine Paar die Hände unter das Becken, das andere unter die Schultern, ein drittes unter die Beine des Kranken schiebt. Bei Halsbrüchen nimmt noch ein Gehilfe den durch Sandsäcke gestützten Kopf und Nacken in seine Obhut. Liegt der Körper des Kranken auf den Armen der Gehilfen, so wird die Bahre in der Verlängerung ihrer Längsachse

weggezogen, die Gehilfen heben den Kranken in die Höhe und legen ihn ins Bett, indem die eine Reihe links, die andere rechts vom Bette gegen das Kopfende fortschreitet und den Kranken sanft niederlässt. Das Bett selbst soll eine gut gepolsterte Rosshaarmatratze besitzen, auf die der Kranke möglichst horizontal gelagert wird, während man bei Halswirbelbrüchen den Kopf noch durch passend angebrachte Sandsäcke oder Spreukissen fixirt. Die Matratze sowie alle Kissen werden am besten mit einem wasserdichten Stoff überzogen, und man sorgt dafür, dass die directe Unterlage des Patienten bequem gewechselt werden kann. Die Kleider werden am besten abgeschnitten, und es empfiehlt sich, unter die Kreuzbeingegend sofort ein grosses Wasserkissen zu legen. Wo ein solcher vorhanden ist, kann auch ein *Volkmann-Hamilton*'scher Heberahmen (Fig. 48) als Lager-

Fig. 48.



stätte benützt werden. Alle Stellen, die einem ständigen Druck ausgesetzt sind, müssen möglichst vor solchem geschützt werden. Man legt die Fersengegend durch Erhöhung der Achillessehne hohl oder bettet sie, ebenso wie andere prominirende Knochenvorsprünge, wie besonders das untere Ende der Fibula, den Condyl. internus humeri, das Olecranon, auf kleine Wasserkissen (mit Wasser gefüllte Eisblasen). Zweckmässig ist es auch, solche Theile noch durch das Bedecken mit einem ausgiebigen Stück guten Cerussapflasters vor dem unmittelbaren Druck zu bewahren oder sie

mit dickgestrichenen Bor- oder Zinksalbelappen zu umgeben. Ueber den Füssen bringt man eine Reifenbahre an, um den Druck der Bettdecke zu verhüten, und stützt sie durch kleine Kissen so, dass sie stets rechtwinklig stehen, damit nicht durch die Schwere des Fusses eine Contractur desselben in Equino-varusstellung entsteht. Wenn es irgend angeht, ist ein wiederholter, natürlich vorsichtig vorgenommener Wechsel in der Lage des Patienten dringend anzurathen, damit nicht immer dieselben Stellen dem Druck ausgesetzt sind, und es ist dann stets gut, bei solchen Manipulationen die betreffenden Theile, möglichst aber den ganzen Körper mit lauem Wasser und Spiritus oder Essig abzuwaschen. Grösste Reinlichkeit ist eine Hauptsache. Die abgehenden Fäces werden in untergelegter Watte aufgefangen, der Penis in ein Urinreceptaculum hineingehängt. Aber auch hier sei man vorsichtig, um Decubitus zu vermeiden. Ist derselbe erst einmal ausgebrochen, so muss man ihn nach den allgemeinen Regeln durch strengste Asepsis möglichst zu beschränken suchen.

Grosse Schwierigkeit kann uns die Behandlung der Blasenlähmung bieten. Ist das Mark völlig durchquetscht, so dass vollständige motorische und sensible Lähmung besteht, so thut man am besten Nichts. Die Blase dehnt sich dann allmählich ad maximum aus, bis der Urin continuirlich überfliesst, und es tritt keine Cystitis ein, da ein beständiger Strom vorhanden ist. Hat man bei nicht so schwerer Markverletzung jedoch irgendwie Hoffnung auf Heilung, so muss der Urin täglich mehrmals durch den Katheter entleert werden.

Bei dem Gebrauch des Katheters, der oft Monate lang zu geschehen hat, ist äusserste Vorsicht nöthig, um keine Infectionskeime in das Innere der Blase zu schleppen. Man wählt grosse Metall-Katheter, die man gut desinficiren kann und nur anwendet, nachdem man sie jedesmal vor dem Gebrauch gehörig ausgekocht und dann in 5% Carbolsäurelösung längere Zeit aufbewahrt hat. Um nicht Reste fäulnissfähigen Urins im Grunde der Blase zurückzulassen, thut man gut, der Entleerung der Blase stets eine gründliche Ausspülung derselben folgen zu lassen, und benützt dabei zuverlässige Desinficientien, wie Borsäure-, Salicylsäure-, Kali chloricum- oder schwache Sublimat- oder Carbolsäure-Lösungen. Ist schon Cystitis eingetreten, so lässt man am besten für einige Zeit einen Nélaton'schen Katheter dauernd in der Blase und spült letztere mehrmals täglich mit den eben genannten Antisepticis aus.

Was die Darmlähmung betrifft, so sei man nicht eilig, dem Verletzten baldigen Stuhl zu verschaffen. Es ist besser, wenn dieser nur alle paar Tage eintritt. Sollte sich Durchfall einstellen, so geht man gegen diesen mit mässigen Opiumdosen vor. Längere Stuhlverstopfung bekämpft man am besten durch Clysmen oder Electricität, wobei man eine grosse Electrodenplatte auf den Leib legt, während die andere stabförmige in den Mastdarm eingeführt wird. Werden die Patienten von starkem Meteorismus geplagt, indem die gespannten Gase von den gelähmten Därmen nicht durch den contrahirten Sphincter ani externus hindurchgepresst werden können, so empfiehlt es sich, mit der ganzen Hand oder mit den beiden hakenförmig gekrümmten Zeigefingern in den Mastdarm einzugehen und den Sphincter kräftig zu dehnen. Man kann dann eventuell noch ein dickes Gummirohr in den Mastdarm einlegen und erzielt so eine äusserst prompte Wirkung, die den Patienten sehr wohl thut und nach meinen Erfahrungen durchaus keine Nachtheile hat. Die Ernährung sei sofort kräftig, jedoch mit Vermeidung von Speisen, die viel Koth machen.

Hat man den Verletzten durch die eben geschilderte Behandlung so weit gebracht, dass er über die ersten Gefahren hinaus ist, so kann man sich nun der eigentlichen Behandlung der Fractur selbst zuwenden und kann auch dadurch zuweilen noch etwas zu einer rascheren Beseitigung der Marksymptome beitragen. Es kommen hier hauptsächlich 4 therapeutische Massnahmen in Betracht, nämlich die directe Reposition des Bruches, die permanente Extension bei horizontaler Lagerung oder in Lagerungsapparaten, die Anlegung stützender Verbände in suspendirter Stellung des Patienten und schliesslich operative Eingriffe.


Was zunächst die Reposition der Fragmente betrifft, so könnte man dieselbe versuchen bei sicher diagnosticirten Brüchen der Dornfortsätze und der Bogen. Sie würde dann in Hebung und Richtigstellung derselben bestehen. Ist die Diagnose des localen Verhaltens der Fracturstelle jedoch zweifelhaft, und das ist in der Regel der Fall, so rathen wir, bei bestehendem Gibbus recht vorsichtig zu sein und höchstens durch sanften Druck mit der Hand die Knickung zu mildern, denn ein stärkerer Druck könnte abgesprengte Splitter erst recht in das Mark treiben, und man könnte so dem Patienten direct schaden. Bei Brüchen der

Halswirbelsäule empfehlen manche Chirurgen, jede Dislocation sofort in Narcose zu beseitigen und dann eine andauernde Extension und Immobilisation der Halswirbelsäule zu bewirken (*Dandridge*).

Im Allgemeinen halten wir aber eine gewaltsame Reduction in Narcose nur dann für zulässig, wenn längere Zeit nach der Fractur verstrichen ist und bei noch bestehenden Marksymptomen die Dislocation mehr und mehr zunimmt. In solchem Falle kann man dann nachher noch die permanente Extension ausführen und so zufriedenstellende Resultate erreichen.

Was die permanente Extension betrifft, so halten wir dieselbe als Gewichtsextension indicirt bei Brüchen der Halswirbel. Der Zug wird hier mit Hülfe einer gut mit

Fig. 49.



Watte gepolsterten *Glisson*'schen Schlinge ausgeführt, während das Kopfende des Bettes hochgestellt wird, damit das Körpergewicht des Patienten durch seine Schwere die Gegenextension ausführen kann. Das Gewicht sei zuerst ein geringes; man beginne etwa mit 3 Pfund und steige allmählich, soweit es ohne Belästigung des Kranken möglich ist. Bei Brüchen der Brustwirbelsäule wendet man die Extension in zweierlei Form an, indem man entweder ein gut gepolstertes Rollkissen quer unter den Rücken des Patienten schiebt oder denselben auf eine *Rauchfuss*-sche Schwebe legt (Fig. 49). Man erreicht so in der Regel eine genügende Ausgleichung der Deformität. Die Extension ist vorzugsweise wirksam gegen heftige, von den Nervenwurzeln ausgehende Schmerzen, die häufig unmittelbar nach derselben verschwinden. Die Sensibilität der gelähmten Glieder pflegt sich auch rasch herzustellen, die Motilität wird dagegen weniger beeinflusst. Selbstverständlich muss man von

jeder mechanischen Behandlung absehen, wenn durch dieselbe Decubitus hervorgerufen werden sollte.

Hat man die permanente Extension in der geschilderten Weise ausgeführt, so kann man nach mehreren Wochen, wenn es die Verhältnisse gestatten, dazu schreiten, den Patienten wieder auf die Beine zu helfen, indem man ihnen in mässig suspendirter Stellung nach *Sayre*'scher Methode einen stützenden Gypsverband um den Rumpf anlegt. Die Wirkung desselben ist in der Regel eine sehr prompte. Die Patienten lernen bald mit Krücken und später ohne diese gehen, — natürlich bei nicht vollständiger Markzerquetschung, denn bei solcher ist die Therapie überhaupt machtlos. Man lasse nur nicht die Patienten zu früh aufstehen, denn sonst kann die Deformität trotz des Corsettes zunehmen. Die Anlegung des Gypscorsettes empfiehlt sich auch ganz besonders zur Ausgleichung von Deformitäten, die sich im Verlaufe älterer Wirbelbrüche entwickelt haben.

Es erübrigt uns noch, auf die operativen Eingriffe bei Wirbelbrüchen einzugehen, die man als Trepanation der Wirbel bezeichnet hat. Seit diese Operation von *Cline* zuerst ausgeführt wurde, ist sie in einer ganzen Reihe von Fällen wiederholt worden. *Chipault* konnte im Jahre 1894 schon 167 dieser sog. Laminectomieen zusammenstellen. Nur 12 derselben wurden geheilt, 24 gebessert. Aus der Casuistik hat sich ergeben, dass die Operation in frischen Fällen zu verwerfen ist. Nur bei den relativ seltenen Fällen von Fractur der Wirbelbogen mit Impression gegen das Mark und dadurch bedingter Lähmung könnte man unter streng aseptischen Cautelen auf den Bogen einschneiden und ihn mit Hülfe des Meissels und des Elevatoriums an seinem Dornfortsatz zu erheben suchen, ohne den Wirbelkanal zu eröffnen.

Wird die Rückenmarksquetschung von dislocirten Fragmenten aufrecht erhalten, so empfiehlt *Urban* neuerdings eine temporäre Resection der Wirbelbogen auszuführen. Er führte diese Operation zweimal aus, resecirte den in die Markhöhle vorspringenden Theil des gebrochenen Wirbelkörpers, klappte den Knochenweichtheillappen zurück und erzielte in beiden Fällen eine beträchtliche Verbesserung des Zustandes. Ist aber das Mark verletzt, so wird auch die Operation nichts helfen, da höchstens vielleicht secundäre Degenerationen desselben modificirt werden könnten. Es ist bisher

wenigstens eine Regenerationsmöglichkeit des Markes nicht bewiesen worden.

Bei veralteten Wirbelfracturen mit starker Dislocation und Lähmungserscheinungen, die eine unvollständige Markläsion oder eine dauernde Compression desselben durch die dislocirten Fragmente annehmen lassen, hat man im Allgemeinen günstigere Erfolge durch die Operation erzielt als bei frischen Fällen, indem man die betreffenden Fragmente resecirte und dann eine Reposition mit Extensionsbehandlung folgen liess. Nach *Chipault* verliefen von 59 derartigen Spätoperationen 15 tödtlich; 23 blieben ungebessert, 16 Fällen wurden gebessert, 5 geheilt. Bei den wirklich geheilten Fällen handelte sich zumeist um Compression der Cauda equina oder um Bogenfracturen.

Sind die Patienten glücklich bis zum Stadium der Reconvalescenz gelangt, so würde eine Behandlung der atrophischen Musculatur durch Massage und Electricität, Bäder und Douchen zu empfehlen sein, und man würde neben einer guten Diät die Patienten noch längere Zeit corsetähnliche Stützapparate für die Wirbelsäule tragen lassen müssen. Vielfach hat sich neuerdings auch die Suspension der Patienten nach *Charcot* als ein werthvolles Mittel erwiesen, um die Folgen der Wirbelsäulenfracturen zu mildern. Einer ganzen Reihe von Patienten habe ich schliesslich durch Anlegung eines nach *Hessing*'scher Manier gefertigten Stützcorsettes ihren Zustand wesentlich erleichtert.

Luxationen der Wirbel.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.


Zum Verständniss der Wirbelverrenkungen ist es nothwendig, sich den Bau der Wirbelsäule und die physiologisch möglichen Bewegungen derselben in das Gedächtnis zurückzurufen.

Die Wirbel sind durch feste aber doch elastische Bänder mit einander verbunden und nehmen dabei in ihrer Dimension von oben nach unten zu. So kommt es, dass die Wirbelsäule als Achsengebilde des Rumpfes einen gewissen Grad von Stabilität erhält. Im Ganzen ist ihre Form und Lage jedoch eine labile, schon durch geringe Muskelkräfte veränderliche. Denn trotz des festen Verbandes je zweier Wirbel untereinander besitzt jede dieser Verbindungen doch selbst einen gewissen Grad von Beweglichkeit. Dieser

gestattet den einzelnen Elementen zwar nur geringe Excursionen, der ganzen gegliederten Säule aber durch die Summirung dieser kleinen Excursionen doch auffallende Formveränderungen, so dass sie sowohl nach allen Seiten hin in toto sich biegen lässt wie ein Stab, andererseits aber Torsionsbewegungen in ziemlicher Ausdehnung zulässt. Ermöglicht wird diese Beweglichkeit durch den Bau der Zwischenbandscheiben und die Gestaltung der Gelenkfortsätze.

Was die Bandscheiben betrifft, so ist ihr Nucleus pulposus wie ein elastisches Kissen zwischen die Wirbel eingeschoben und gestattet durch seine Nachgiebigkeit und Verschiebbarkeit dem auflagernden Wirbel kleine Lageveränderungen. Je breiter und je ebener die untere Fläche der Wirbelkörper wird, desto höher müssen die Bandscheiben sein, wenn noch einige Beweglichkeit möglich sein soll. Sie haben einen maassgebenden Einfluss nur auf die Grösse der Bewegung; denn die Excursionsfähigkeit zwischen je zwei Wirbeln wird um so grösser sein, je höher sie sind. Die Richtung der Bewegung hängt dagegen ausschliesslich von der Gestaltung und der Richtung der Gelenkflächen der schiefen Gelenkfortsätze ab. Diese letzteren liegen im Grossen und Ganzen so, dass von der Seite gesehen die Gelenke des unteren Wirbels die des oberen von aussen umgreifen. Ihre Gelenkflächen können sich theils an einander verschieben, theils ihre senkrechte Entfernung von einander wechseln, so dass die Gelenkspalten mehr oder weniger klaffen. Die sagittale Achse dieser Gelenkflächen, welche wir uns senkrecht zu denselben verlaufend und die Syndesmosen gerade in ihrer Mitte treffend denken müssen, geht nur bei den Lendenwirbeln direct von vorne nach hinten. Je weiter wir an der Wirbelsäule nach oben gehen (Fig. 50), um so mehr erhebt sich ihr hinteres und senkt sich ihr vorderes Ende.

Fig. 50.



Die Bewegungen der Wirbelsäule erfolgen nun einmal um diese sagittale Achse und zweitens um eine frontale, quere Achse. Die Bewegungen um eine Achse müssen immer in einer Ebene geschehen, die senkrecht zu dieser Achse steht. Bei der Drehung um eine quere oder frontale Achse müssen sich die Wirbel also in sagittaler Richtung bewegen. Diese Bewegung bezeichnet man als Beugung und Streckung der Wirbelsäule, und zwar verläuft die Achse dabei quer durch den Mittelpunkt der Zwischenbandscheibe. Bei der Beugung wird diese vorn comprimirt, während sie hinten auseinander federt, so dass die Wirbelringe klaffen. Dabei rücken die unteren Gelenkflächen des oberen Wirbels auf den oberen des unteren nach vorn und oben. Bei der Streckung sind die Verhältnisse umgekehrt. Die Beugung der Wirbelsäule findet ihre Hemmung in der Compression der Syndesmosen an deren vorderer Fläche, sowie in der Spannung der Ligamenta flava, welche die Wirbelbogen zusammenhalten. Eine Knochenhemmung existirt nicht. Die Streckbewegung wird dann gehemmt, wenn sich sämmtliche Wirbelbogen aufeinander stemmen und sich dachziegelförmig decken.

Complicirter als die Bewegung um die frontale Achse gestaltet sich jene um die sagittale Achse der schiefen Gelenkfortsätze. Wir haben gesehen, dass diese sagittale Achse je weiter nach oben, um so stärker eine Neigung von oben nach unten erhält. Je senkrechter aber eine Achse verläuft, um so mehr gestalten sich die um sie erfolgenden Excursionen als Drehbewegungen. So kommt es, dass nur an der Lendenwirbelsäule, bei der allein die Achse direct von vorn nach hinten zieht, reine seitliche oder Abductionsbewegungen möglich sind. An der Brustwirbelsäule und noch viel ausgesprochener an der Halswirbelsäule muss sich zu dieser Abductionsbewegung stets noch eine Rotation und zwar um die Längsachse der Wirbelsäule hinzugesellen. Mit anderen Worten: wenn sich einer dieser höheren Wirbel um den nächst unteren nach einer Seite hinüber neigt, so muss zunächst seine Vorderfläche nach derselben Seite herumgedreht werden. Die Hemmung beider Bewegungen findet sich am obern Rand der Seite der Gelenke, nach welcher gedreht wird. Auf einfache Weise kann man sich das Gesagte klar machen. Versucht man nämlich die Seitenfläche des Kopfes möglichst weit der Schulter zu nähern, so wird sich der Kopf stets drehen, und zwar rückt das Ohr der gesenkten Seite nach vorne, während das Kinn sich der

andern Seite zudreht — physiologische Abduction des Kopfes. —

Als **Wirbelluxation** bezeichnet man nun Verletzungen, durch welche die Gelenkfortsätze der Wirbel dauernd vollständig oder unvollständig von einander entfernt werden. Von den beiden Wirbeln nennt man, im Gegensatz zu den Luxationen der Extremitäten, den oberen Wirbel den verrenkten und zwar deshalb, weil die Luxationen am häufigsten an der Halswirbelsäule entstehen und von den beiden Wirbeln stets oder meist der obere die abnorme Bewegung ausführt.

Sind die Zwischenbandscheiben und Gelenkbänder zerrissen, stehen dabei auch wohl die Wirbel vorn oder hinten auseinander, hat aber keine wesentliche Verschiebung der Wirbel in horizontaler Richtung stattgefunden, so bezeichnet man diese Verletzung als Diastase. Wir wollen hier von diesen Diastasen erwähnen, dass sie sich am häufigsten an der Halswirbelsäule zwischen dem 5., 6. und 7. Wirbel finden. Sie sind oft complicirt mit Fracturen der Wirbelsäule, wie denn auch Luxationen häufige Begleiter dieser sind, sei es, dass die Luxation erst eine Folge der Fractur der Gelenkfortsätze ist, sei es, dass sie nur eine unwesentliche Complication der Fractur bildet.

Frequenz, Aetiologie und Mechanismus der Wirbelluxationen.

Es ist noch nicht lange her, dass man über die Wirbelluxationen ins Klare gekommen ist. Während man in früheren Jahren annahm, dass solche Luxationen sehr viel häufiger als Fracturen der Wirbelsäule seien, kam man später zur entgegengesetzten Ansicht, so dass sogar ihr Vorkommen ganz geleugnet wurde. Jedenfalls sind sie sehr seltene Verletzungen. Nach der neuesten Zusammenstellung von *W. Wagner* überschreitet die Zahl der bis jetzt veröffentlichten Fälle kaum 200. Sie wurden noch am häufigsten beobachtet an der Halswirbelsäule, seltener an den Brustwirbeln und noch seltener, aber doch unzweifelhaft sicher, an den Lendenwirbeln. Sie betreffen vorzugsweise Männer im Alter von 20—50 Jahren und sind Raritäten bei Frauen, Greisen und Kindern. Sie kommen in der Regel nur durch schwere Gewalten, wie Verschüttetwerden, Auffallen schwerer Lasten, Herabfallen von bedeutender Höhe, zu Stande. Fälle, bei denen man sie allein durch Muskelzug hat entstehen sehen, waren in der Regel durch

lange, dehnbare Bänder und niedrige Processus obliqui pathologisch prädisponirt.

Entsprechend den Bewegungsmöglichkeiten der Wirbelsäule, die, wie wir gesehen haben, als Beugung, Streckung und Abduction, verbunden mit gleichzeitiger Rotation, gegeben sind, bezeichnet man, da die Luxationen stets durch eine Uebertreibung dieser physiologischen Bewegungen zu Stande kommen, nach dem Vorgang von *Hueter* auch die Luxationen entweder als Beugungsluxationen oder als Abductions- oder Rotationsluxationen. Ein Fortschreiten der Streckung bis zum Eintreten einer Luxation würde voraussetzen, dass sämmtliche Wirbelbogen zusammengepresst und zermalmt werden. Es kommen gelegentlich — jedoch nicht durch Hyperextension, sondern durch bisher noch nicht genauer erforschte combinirte Bewegungen — solche Luxationen nach hinten vor. In den beobachteten Fällen war jedoch mit einer Zermalmung des Rückenmarks der Tod unmittelbar eingetreten, so dass sie nicht Gegenstand ärztlicher Behandlung wurden.

Fig. 51. Vordere Ansicht.





Fig. 52. Hintere Ansicht.



Anders steht es mit der Beugebewegung der Wirbel. Bei dieser rücken die Bogen auseinander und beide Proc. obliqui des nächst oberen Wirbels nach oben, bis die Compression der

Zwischenband-Scheibe und die Spannung der Lig. intercruralia die Bewegung hemmt. Wenn nun die Bänder zwischen den Bogen zerreissen und ebenso die Zwischenbandscheibe abreisst, indem vielleicht noch eine Knochenlamelle an ihr haften bleibt, so können die Proc. obliqui des oberen Wirbels die des unteren vollständig verlassen und damit der obere Wirbel ganz nach vorn gleiten. Erfolgt nun eine Bewegung im Sinne der Streckung, so kommen die beiden Proc. obliqui des oberen Wirbels vor die des unteren zu stehen, und damit ist die luxirte Stellung fertig. Eine solche Luxation ist selbstverständlich eine doppelseitige (Fig. 51 u. 52). Ist aber der obere Wirbel durch Ueberbeugung nach vorn luxirt, so liegt das Hinderniss für das Zurückgehen desselben in seine alte Stellung darin, dass seine beiden untern Proc. obliqui durch die obern des unteren Wirbels festgehalten werden. Die letzteren bilden gewissermassen einen Haken, um welchen die unteren Ränder des luxirten Wirbels herumgeführt werden müssten, wenn beide Paare der Proc. obliqui wieder in ihre normalen

Fig. 53. Vordere Ansicht.





Fig. 54. Hintere Ansicht.



Verhältnisse treten sollten. *Hueter* hat diesen Zustand passend als Verhakung der Proc. obliqui bezeichnet.

Das Zustandekommen der Abductions- oder Rotationsluxationen können wir uns am besten an einem concreten Fall klar machen. Denken wir uns, es würde der Kopf gegen die rechte Schulter geneigt und wir betrachten dabei die Bewegung des 4. Halswirbels, so rückt der rechte Proc. obliquus dieses 4. Halswirbels nach unten. Die beiden linken Proc. obliqui aber machen die entgegengesetzte Bewegung, d. h. der linke Proc. obliquus des 4. Halswirbels rückt gegen den linken Proc. obliquus des 5. Halswirbels nach oben. Gleichzeitig wird aber auch die rechte Seite des 4. Halswirbels nach rechts herumgedreht werden, so dass seine linke Hälfte nach vorn zu stehen kommt. Die Hemmung dieser Bewegung geschieht auf der rechten Seite, indem der untere Rand des Proc. obliquus des 4. Halswirbels sich gegen den Bogen des 5. Halswirbels anstemmt. Denken wir uns nun, dass die Abduction des Kopfes nach der rechten Seite forcirt wird, so wird durch dieses Anstemmen des Proc. obliquus des oberen Wirbels an den Bogen des unteren ein Hypomochlion gebildet, so dass die beiden linken Proc. obliqui von einan-

Fig. 55. Vordere Ansicht.





Fig. 56. Hintere Ansicht.



der abgehebelt werden. Es kann nun der untere Rand des oberen linken Proc. obliquus noch in theilweiser Berührung mit dem oberen Rand der unteren Gelenkfläche bleiben, oder er kann nur theilweise über diesen herüberrücken, ohne jedoch in die Incisur vor der Gelenkfläche einzutreten. Dann hat sich der 4. Halswirbel unvollständig verrenkt (Fig. 53 u. 54). Tritt jedoch der linke obere Proc. obliquus ganz vor den unteren Proc. obliquus, so findet wiederum eine Verhakung beider statt, und die Luxation ist eine vollständige. Auf der anderen Seite muss dabei ein starkes Klaffen der schiefen Gelenkfortsätze stattfinden (Fig. 55 u. 56). Wird diese Diastase noch etwas übertrieben, so dass, während auf der einen Seite die Verhakung der Proc. obliqui geschieht, auf der Seite der Diastase der obere Proc. obliquus sich so stark nach hinten verschiebt, dass sich sein zugehöriger Proc. transversus auf den Proc. obliquus des unteren Wirbels stützt, so entsteht eine Luxation, die man als bilateral entgegengesetzte bezeichnet, die also nichts anderes ist, als eine forcirte Rotationsluxation.

Nach dem eben Ausgeführten sind die Abductions- oder Rotationsluxationen stets einseitige, und zwar entstehen sie immer auf der Seite, welche der entgegengesetzt ist, nach welcher die forcirte seitliche Bewegung stattfand.


Betrachten wir nun nach diesen einleitenden Bemerkungen

Die Luxationen der einzelnen Wirbelabschnitte.

1. **Luxationen des Kopfes** sind sehr seltene Verletzungen. Es existiren bisher überhaupt nur drei sichere Beobachtungen von *Costes*, *Bouisson* und *Milner*, und zwar handelt es sich in diesen um unvollständige Verrenkungen des Kopfes nach hinten. Es ist dies leicht erklärlich, da das Ginglymusgelenk zwischen Hinterhaupt und Atlas durch einen sehr starken Bandapparat befestigt ist und nur im Nacken, nicht aber auf der Vorderseite des Halses Gewalten angreifen können, wie sie zur Zerreissung solcher Befestigungsmittel nothwendig sind. Rein seitliche, also einseitige Luxationen lassen sich experimentell durch directen Druck hervorrufen. Die Stellung des Kopfes in einem solchen Falle erhellt dann aus der nebenstehenden Figur 57. Als Beispiel einer solchen Luxation führen wir die Beobachtung *Coste*'s an. Ein 15 jähriger Knabe hatte einen Schlag in den Nacken erhalten. Der Kopf des Patienten blieb vornübergeneigt, und Bewegungen desselben waren

schwer ausführbar. Einige Tage nach der Verletzung trat Hyperästhesie und motorische Lähmung auf, die ohne Behandlung 4 Monate bestand. Dann wurde der rechte Arm schmerzhaft, der Puls

Fig. 57.



schwach und beschleunigt und der Patient deshalb in das Hospital aufgenommen. Das Kinn des Patienten berührte fast die Brust; auf der rechten Nackenseite prominirte der hintere Theil des Epistropheus als deutliche Schwellung. 5 Monate nach der Verletzung starb Patient. Bei der Section fand sich der Schädel nach hinten vom Atlas luxirt; die Luxation war rechts eine vollständige. Der Proc. odontoideus war gebrochen und der ganze Atlas nach vorn dislocirt. Das Mark war stark comprimirt.

Die Therapie würde darin bestehen, dass man durch Zug am Kopf und Rotation nach der verrenkten Seite die Reposition versucht. In der Regel wird aber wohl durch Quetschung des Rückenmarkes die Respiration gelähmt werden und damit augenblicklicher Tod eintreten.

2. Luxationen des Atlas. Der Atlas führt auf dem Epistropheus Drehbewegungen um dessen Proc. odontoideus aus. Beide Wirbel sind durch die Lig. alaria und cruciata, suspensorium und transversum sehr innig mit einander verbunden. Eine Luxation ist nur möglich, wenn entweder der Zahnfortsatz bricht, — dann liegt eigentlich keine reine Luxation vor — oder wenn das Lig. transversum reisst, und das geschieht sehr selten. Der Mechanismus dieser Verrenkungen besteht gewöhnlich darin, dass durch eine forcirte Beugung des Kopfes (Verschüttetwerden, Auffallen schwerer Lasten, Erhängen) der Zahnfortsatz mit seinem oberen Ende nach hinten gedrängt wird und seine Bänder sprengt. Es handelt sich um eine Beugungsluxation, und der Kopf steht nach der Luxation nach vorn übergebeugt.

Eine traumatische Luxation des Atlas nach hinten ist erst einmal sicher beobachtet und anatomisch untersucht worden von *Mechiori.* Der Atlas war nach einem Fall auf die Stirn beiderseits nach hinten dislocirt und das Lig. anterius vom 1. und 2. Wirbel abgelöst. Die Kapselbänder waren zerrissen, der Zahnfortsatz an seiner Basis abgebrochen und dazu eine Fractur des hintern Bogens des Atlas dicht an den Querfortsätzen vorhanden. Der Verletzte war sofort todt.

Abductionsluxationen kommen dagegen vor, und zwar steht dann der Kopf nach rechts gedreht bei einer linksseitigen, nach links bei einer rechtsseitigen Luxation. Vielleicht gehören hierher einzelne von den Fällen, wo eine rasche spontane Drehung des Kopfes eine Fixation desselben in einer dieser Stellungen hervorbrachte, die sich durch Zug am Kopf und Drehung nach der verrenkten Seite leicht wieder reponiren liessen.

Gelegentlich kommen auch bilateral entgegengesetzte Luxationen hier vor. Einen solchen Fall haben *Uhde, Hagemann* und *Böttger* beschrieben. Die rechts gelegene untere Gelenkfläche des Atlas war in demselben nach vorn, vor die obere entsprechende Gelenkfläche des Epistropheus und die links gelegene untere Gelenkfläche des Atlas nach hinten, hinter die obere entsprechende Gelenkfläche des Epistropheus abgewichen. Der Kopf hatte die unten wiedergegebene Stellung eingenommen, welche einem Caput obstipum ähnlich und von Nackenschmerzen begleitet war. Der Kehlkopf war nach links abgewichen. Die Weichtheile des Halses waren an der rechten Seite schlaff, an der linken gespannt und gewölbt. Der Proc. spinosus des ersten Halswirbels war nach rechts von der Mittellinie abgewichen. Links neben letzterer liess sich der Proc. transversus des Atlas abtasten. Der Kopf hatte nach hinten seinen Halt zum Theil eingebüsst. Patient war nicht im Stande, sich aus der Rückenlage aufzurichten, ohne den Kopf mit den Händen zu stützen. Drehung und Bewegung des Kopfes nach rechts waren behindert, nach links noch eher möglich. Der Plexus pharyngeus sin. und der Nervus Hypoglossus sin. waren ebenso wie der rechte Nervus Glossopharyngeus gelähmt. In Folge dieser Lähmung der Zungennerven hatte die Zunge beim Herausstrecken das charakteristische Aussehen. Die Reposition gelang nur theilweise.

Einen weiteren Fall von bilateral entgegesetzter oder, wie man auch sagen kann, von Rotationsluxation des Atlas hat *Hesse*

aus der *Socin*'schen Klinik beschrieben. Der Fall hat grosse Aehnlichkeit mit dem eben beschriebenen *Uhde*'schen Fall. Der Kopf stand leicht nach rechts geneigt und nach links gedreht. Das Kinn war hoch erhoben; das Hinterhaupt trat stark hervor. Die Halswirbelsäule war lordotisch nach vorn verschoben. Direkt unter dem Hinterhaupt fand sich eine tiefe Einsenkung, dort, wo sonst das Tuberculum posticum des Atlas den Uebergang von der Reihe der Dornfortsätze auf das Hinterhaupt bildet. An der hinteren Pharynxwand, der Lage des Atlas entsprechend, fühlte der Finger rechts einen deutlichen, knochenharten, bei Berührung äusserst schmerzhaften Vorsprung (Massa lateralis dextra Atlantis). Merkwürdig gering waren die Erscheinungen von Seiten des Markes.

Der Patient war von einem Baum herab auf den Kopf gefallen, war aber nicht völlig bewusstlos gewesen, sondern hatte nur vorübergehend ein eigenthümliches Schütteln seiner Arme und Beine bemerkt. Er ging nach der Verletzung noch $^1/_2$ Stunde.

Socin machte in Narkose die Reposition, indem er zunächst kräftig am Kopfe zog mit Uebertreibung der abnormen Kopfstellung, indem er dann den Kopf nach rechts drehte und nach links senkte. Die Reposition gelang überraschend leicht; die Heilung erfolgte vollständig.

Die Verletzungen des Markes sind bei den übrigen in der Litteratur mitgetheilten Atlasluxationen meist sehr ausgedehnt gewesen und verliefen bei den Beugungsluxationen in der Regel tödtlich.


3. Luxationen der übrigen Halswirbel. Gleichwie Fracturen am häufigsten den 5., 6. und 7. Halswirbel betreffen, so kommen auch die Luxationen am häufigsten an diesen Wirbeln vor und zwar relativ am meisten zwischen dem 4. und 5. und dem 5. und 6. Halswirbel. Nach oben und unten zu nimmt die Frequenz ab. Bezüglich ihrer Entstehung sind gerade hier die Beugungs- und Rotationsluxationen charakteristisch, und wir wollen dieselben daher hier näher besprechen. Der Therapie halber betrachten wir zunächst

a. Die Rotationsluxationen.

Die gewöhnlichste Ursache für die Rotationsluxationen ist ein Fall auf den Kopf mit nachfolgendem Rumpf, wobei das Gewicht des letzteren nicht ganz in der Längsachse des Körpers, sondern durch seitliches Umfallen desselben abducirend

auf die Halswirbelsäule wirkt. Es existiren aber auch eine ganze Reihe von Fällen, nach der Zusammenstellung von *Völker* 15, wo unzweifelhaft allein durch Muskelbewegungen — starke Drehung des Halses — die Luxation zu Stande kam. In diesen letzteren Fällen ist aber wahrscheinlich, wie *Martini* und *Völker* hervorheben, durch eine gewisse Schlaffheit oder grössere Zerreisslichkeit des Bandapparates der Wirbelsäule ein prädisponirendes Moment für die Entstehung der Luxation gegeben; denn im Allgemeinen lassen sich die Ligamente an der Leiche nur durch die grösste Gewaltanwendung zerreissen (*Martini*). Den Mechanismus dieser Luxationen haben wir schon kennen gelernt und wenden uns daher gleich zu ihren **Symptomen.** Wir müssen hier streng die unvollständigen und die vollständigen Verrenkungen trennen.

Fig. 58.



Bei der **unvollständigen** Rotationsluxation (Fig. 58), bei der die beiden Spitzen der übereinander liegenden Proc. obliqui aufeinander stehen, muss der Hals auf der Seite der Verrenkung verlängert, auf der anderen in geringem Grade verkürzt sein. Der Kopf erscheint nach der gesunden Seite abducirt und gedreht. Sind die beiden Proc. obliqui schon etwas über einander weggerückt, so wird die Abductionstellung nach der entgegengesetzten Seite nur in geringerem Grade ausgeprägt erscheinen, die Rotation nach derselben Seite wird dabei jedoch fortbestehen. Handelt es sich z. B. um einen Hochstand des linken Proc. obliquus eines Wirbels, so wird der Kopf gegen die rechte Schulter geneigt stehen bleiben. Das Kinn ist dagegen nicht wie bei der physiologischen Abduction nach der entgegengesetzten Seite rotirt, sondern steht ebenfalls mehr nach rechts und zwar deshalb, weil der hochstehende linke Proc. ob-

liquus zugleich auch weiter nach vorn steht als der in Diastase befindliche rechte Proc. obliquus. (Fig. 54.)

Ist die Luxation eine **vollständige** (Fig. 59), besteht also eine Verhakung der beiden Proc. obliqui, dann muss naturgemäss der Kopf nach der verrenkten Seite hingeneigt und wie bei der physiologischen Abduction nach der entgegengesetzten Seite gedreht sein, der Hals aber muss auf der verrenkten Seite kürzer, auf der anderen Seite länger werden und zwar um so mehr, je stärker die Diastase auf dieser Seite ist.

So ist also schon die Stellung des Kopfes charakteristisch für die Luxation. Wir haben aber ausserdem noch eine Reihe anderer Momente, welche für die Diagnose verwerthbar sind.

In der Nackengegend sind die tiefen Muskeln der Seite, auf welcher die Proc. obliqui in Diastase stehen, vorgewölbt und gespannt. Die Proc. spinosi treten aus ihrer Linie nicht merklich heraus. Höchstens bei mageren Individuen kann man die kleine Verschiebung, welche der obere Wirbel durch Rotation erleidet, auch an der Reihe der Proc. spinosi abtasten. Der Schlingact ist bei frischen Luxationen dieser Art immer etwas erschwert oder doch schmerzhaft, weil die eine Hälfte des Wirbelkörpers durch die gedrehte Stellung an der Rachenwand etwas hervorspringt. Man kann diese Hervorragung mit dem in die Mundhöhle eingeführten Finger deutlich fühlen, weshalb man diese Untersuchung nie unterlassen soll. Spontane Schmerzen Fixation des Kopfes in der falschen Stellung und gewisse nervöse Störungen vervollständigen das Bild Was diese letzteren betrifft, so resultiren sie entweder nur aus einer Verletzung der Nervenwurzeln, in Folge einer Quetschung an deren Austrittsstellen aus den Canales intervertebrales, und zwar häufiger an der Seite der Verhakung als an der der Diastase, oder sie sind die Folge einer Commotion, Contusion oder Compression des Markes. Während man im ersten Fall nur reissende Schmerzen,

Fig. 59.



Ameisenkriechen und paretische Zustände in dem betreffenden Arm findet, können im letzteren alle die Erscheinungen zum Vorschein kommen, wie wir sie bei den Fracturen der Wirbelsäule als Folge der Markverletzung kennen gelernt haben.

Die **Prognose** hängt auch hier von der Markverletzung ab. Da diese zuweilen fehlen kann, so lassen im Allgemeinen die Wirbelluxationen eine günstigere Vorhersage zu als die Fracturen, indem man durch passende Manipulationen die Knochenverschiebungen wieder beseitigen kann. Ist sie vorhanden, so verweisen wir auch hier wieder auf das bei der Fractur Gesagte. Während wir aber bei den Fracturen oft ausser Stande sind, das Mark von den drückenden und quetschenden Knochensplittern zu befreien, ist bei den Luxationen unsere Kunsthilfe sehr oft möglich.

Ist die Diagnose einer Rotationsluxation sicher gestellt, dann soll auch die **Reposition** derselben stets ausgeführt werden. Es handelt sich nicht nur um Beseitigung der fehlerhaften Haltung des Kopfes und um die Wiederherstellung der Functionen der Armnerven, sondern es handelt sich vor Allem auch um den Schutz des Lebens gegenüber den progressiven Störungen, wie sie sich bei dem Fortbestehen der Luxation im Rückenmark entwickeln können. Wenn so die Reposition direct eine lebensrettende genannt werden kann, so ist sie aber zugleich ein gefährlicher Act, weil bei gewaltsamer Ausführung und ohne Kenntniss und Benutzung der mechanischen Verhältnisse das Mark schwer verletzt werden kann. So hat man denn auch bei den früher geübten rohen Repositionsmanövern, wobei man den Kranken am Kopf in die Höhe hob, während sein Rumpfgewicht die Contraextension bildete, unmittelbar einen tödtlichen Ausgang eintreten sehen. Heutzutage wird kein gebildeter Arzt mehr in solch leichtsinniger Weise das Leben seines Patienten auf das Spiel setzen, sondern er wird in rationeller Weise durch wohlberechnete Bewegungen die Einrenkung auf demselben Wege bewerkstelligen, auf welchem die Verrenkung erfolgte. *Boyer*, *Richet*, *Hueter* und *Wagner* gebührt das Verdienst, uns diesen Weg klar vorgezeichnet zu haben. Wir müssen den Kopf so in seine normale Stellung zurückzuführen suchen, dass nichts gequetscht und nichts zerrissen wird, was nicht schon im Moment der Luxation gequetscht und zerrissen war, und müssen vor allen Dingen dahin streben, dass die Licht-

ung des Vertebralkanales, in welchem das Rückenmark steckt, bei der Zurechtschiebung der Wirbel ganz unverändert bleibt.

Die **Repositionsmanöver** selbst sind nun verschieden, je nachdem es sich um eine vollständige oder unvollständige Luxation handelt.

Haben wir es mit einer **vollständigen** Rotationsluxation mit Verhakung der Proc. obliqui zu thun, so müssen wir zuerst die Verhakung lösen. Es geschieht dies durch eine stärkere Beugung nach der verrenkten und Drehung nach der entgegengesetzten Seite. Uebt man nun einen stärkeren Zug am Kopf aus und dreht ihn dann nach der verrenkten Seite hin, so hat man die normalen Verhältnisse wieder hergestellt.

Besteht keine Verhakung, ist die Luxation eine **unvollständige**, so wäre eine solche stärkere Beugung nach der luxirten und Drehung nach der entgegengesetzten Seite entschieden falsch, da sie gerade eine Verhakung hervorrufen könnte. Hier soll man einfach den Kopf anziehen, ihn nach der entgegengesetzten Seite abduciren und nach der verrenkten Seite drehen.

Es ist selbstverständlich, dass man diese Repositionsversuche in der Narkose macht. Sehr wichtig jedoch ist, nicht nur den Kopf allein zu benützen, um die nothwendigen Bewegungen auszuführen, sondern stets auch den über der luxirten Stelle liegenden Theil der Wirbelsäule mitzufassen. Nur so findet man eine genügende Handhabe, denn die am Kopf allein ausgeführten Drehungen pflanzen sich nicht genügend auf die unteren Halswirbel fort. Man macht die Reposition am besten so, dass man den Patienten mit dem Gesicht nach unten auf einen Tisch legt. Dann fasst man den Kopf, drückt ihn mit dem linken Arm gegen die eigene linke Brustseite, ergreift mit der rechten Hand die obere Wirbelsäulenpartie und nimmt dann die obengenannten combinirten Bewegungen vor.

Ist die Reposition gelungen, so muss der Kopf durch geeignete Verbände wie Pappkravatten, Schienung desselben mit Sandsäcken, Gypsverbänden noch 2—3 Wochen gut gestützt werden, so dass alle Dreh- und Seitenbewegungen unmöglich sind.

b. Die Beugungsluxationen.

Die Beugungsluxationen entstehen, wie wir schon besprochen haben, durch eine gewaltige Kraft, welche den Kopf so übermässig vorn überbeugt, dass die Bandscheibe und die zunächst gespannten

Bänder zerreissen und die Proc. obliqui der oberen Wirbel über die der untern hinübergleiten und sich vor denselben festhaken. Die Veranlassung, welche zumeist zu Beugungsluxationen führt, ist ein Sturz aus bedeutender Höhe oder eine Verschüttung, wobei die Erdmasse den Kopf mit grosser Kraft gegen das Brustbein andrängt. Gelegentlich kann jedoch die Beugungsluxation auch durch directe Gewalt entstehen, indem z. B. durch einen heftigen Stoss oder Schlag, der den Nacken trifft, der Kopf gewaltsam von hinten nach vorn gedrängt wird.


Es wurde schon früher hervorgehoben, dass die doppelseitigen Luxationen in der übergrossen Mehrzahl der Fälle nach vorn entstehen. Solche nach hinten sind so selten intra vitam beobachtet worden, dass sich ein Symptomenbild von ihnen nur sehr unsicher entwerfen lässt. Meist wird der Kopf und der obere Halstheil als nach hinten gebogen und das Gesicht aufwärts stehend geschildert. Vorn waren die Weichtheile gespannt, hinten eine winklige Einknickung mit ziemlich tiefer Hautrinne vorhanden, in welcher sich der Dornfortsatz verbarg. In anderen Fällen soll kaum eine Dislocation vorhanden gewesen sein. Als Therapie würde eventuell die Extension allein hinreichend sein.

Im Gegensatz zu dieser seltenen doppelseitigen Luxation nach hinten sind die **Symptome der doppelseitigen Beugungsluxationen nach vorn** stark ausgeprägt, obwohl immerhin quere Fracturen eines Halswirbels mit Dislocation der oberen Hälfte nach vorn ähnliche Erscheinungen hervorrufen können. Schon die Haltung des Kopfes ist charakteristisch, indem derselbe vornübergeneigt steht. Nur ganz selten fand man den Kopf reclinirt und zwar dann, wenn die Zwischenbandscheibe und das vordere lange Wirbelband theilweise erhalten waren und das Nachvornrutschen des verrenkten Wirbelkörpers verhinderten, während gleichzeitig die einwirkende Gewalt den Kopf hinten überlegte und die reflectorische Spannung der Nackenmuskeln denselben dann noch mehr herunterzog.

Nehmen wir nun den typischen Fall an, dass der Kopf vorn übergeneigt steht, so ist das Kinn dem Brustbein genähert (Fig. 60). Die Linie der Proc. spinosi bricht entsprechend dem nach vorn gewichenen oberen Wirbel plötzlich ab, so dass man die Proc. spinosi der noch höher gelegenen Wirbel zwischen den krampfartig contrahirten, beiderseitig convex vorspringenden Nackenmuskeln nicht mehr fühlen kann. Die winklige Knickung der Wirbelsäule, die

Kyphose, ist meist sehr deutlich ausgesprochen, und zwar wird die höchste Prominenz gebildet durch das stärkere Hervortreten des unter dem luxirten Wirbel gelegenen Dornfortsatzes. Diese Stelle ist meist auch stark druckempfindlich. Zuweilen halten die Verletzten den Kopf zwischen beiden Händen fest, um jede schmerzhafte Bewegung zu hindern. Das Schlingen ist bedeutend erschwert, und man kann auch hier mit dem in den Mund eingeführten Finger den unter der Rachenschleimhaut vorspringenden Wirbelkörper fühlen. Zu diesen Erscheinungen kommen dann noch die nervösen Störungen, von denen wiederum fast ausschliesslich die **Prognose** der Verletzung abhängt.

Fig. 60.



Viele Luxationen dieser Art endigen durch Zerreissung des Rückenmarkes und Lähmung der Athmung unmittelbar oder wenige Stunden nach der Verletzung tödtlich. Bleiben die Patienten am Leben, so finden wir bei ihnen meist schwere Läsionen des Markes. Die Lichtung des Wirbelkanals wird nämlich so verengt, dass ein Intactbleiben des Markes kaum denkbar ist, und so sehen wir denn Lähmungen an den Extremitäten und dem Rumpfe auftreten, welche wie bei den Fracturen an Grad und Ausdehnung bedeutend variiren können.

Auch bei den Beugungsluxationen muss die **Reposition** versucht werden. Man soll jedoch eingedenk der Gefahren, welche der Act der Reposition mit sich bringt, und angesichts der Möglichkeit, dass die schon vor der Reposition bestehende Verletzung des Rückenmarkes den Tod bedingen kann, den Angehörigen des Verletzten nicht verhehlen, dass es sich nur um einen Versuch zur

Lebensrettung handelt und zwar um einen mit geringer Aussicht auf Erfolg. Ohne diese Vorsicht kann der Arzt vielleicht nach ganz richtig vollzogener Reposition gerade wegen dieser für den tödtlichen Ausgang verantwortlich gemacht werden (*Hueter*).

Die alten Repositionsverfahren bestanden wie bei den Rotationsluxationen in dem Emporheben des Kranken am Kopfe, welcher mit den Händen oder mit einem unter das Kinn geschobenen Handtuch gefasst wurde. Das Gewicht des Rumpfes übte dabei die Contraextension aus. Es kann natürlich bei dieser Manipulation durch den Zug in der Längsrichtung das Rückenmark an dem vorspringenden Winkel guillotinirt werden, und es wurde in der That ein sofortiger Exitus letalis oft genug constatirt. *Hueter* hat uns gelehrt, auch hier rationell und möglichst schonend vorzugehen. W i r v e r w a n d e l n n a c h i h m d i e B e u g u n g s l u x a t i o n z u e r s t i n e i n e e i n s e i t i g e o d e r R o t a t i o n s l u x a t i o n u n d reponiren diese dann nach d e n v o r h e r b e s p r o c h e n e n R e g e l n. Man neigt z. B. den Kopf stark gegen eine, wir wollen annehmen, die rechte Schulter. Dann bildet sich an den rechten verhakten Proc. obliqui der luxirten Wirbel ein Hypomochlion, um welches es gelingt, den ebenfalls verhakten linken Proc. obliquus des oberen Wirbels so nach oben zu hebeln, dass man durch geeignete Rotationsbewegungen, d. h. durch Rückwärtsdrehen der linken Kopfhälfte (das linke Ohr rückt nach hinten, das rechte nach vorn) die linken Proc. obliqui in ihre normale Stellung bringen kann. So ist eine einseitige vollständige Rotationsluxation hergestellt, welche nun nach der uns bekannten Methode reponirt wird. Die Stützung des Kopfes nach der Luxation geschieht ebenfalls, wie dies bei den Rotationsluxationen beschrieben wurde.

4. Luxationen der Brust- und Lendenwirbel. Die Verbindung der Brustwirbel unter einander ist eine sehr feste. Die Achse ihrer Gelenkfortsätze verläuft annähernd horizontal. Ihre Articulation mit den Rippen gestattet ihnen nur eine geringe Bewegung, alles Verhältnisse, welche für das Zustandekommen einer Luxation ungünstig sind. In der That sind denn auch die hier vorkommenden Wirbelverletzungen in der Regel atypische, indem es sich meistens um die Combination von mehr oder weniger ausgedehnten Knochenbrüchen mit Luxationen handelt. So hat noch kürzlich *Hirschberg* einen Fall von s e i t l i c h e r Luxation des 4. Lendenwirbels nach rechts mit gleichzeitigem Bruch der Gelenkfortsätze mitgetheilt. Indessen sind doch durch Sectionen auch hier unzweifelhaft Luxationen nachgewiesen worden. Dieselben betrafen

am häufigsten den 12. Brustwirbel und traten meist als bilaterale Luxationen nach vorn, seltener nach hinten oder als Abductionsluxationen in die Erscheinung. Die Gewalten, welche hier in Betracht kommen, wurden als stark übertriebene Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen der Wirbelsäule beschrieben. Sie wirkten wohl in der Weise, dass bei starker Hyperextension zunächst die Intervertebralscheiben von vorne her einrissen und dass nun, nachdem die Wirbel so beweglich geworden waren, die Gelenkfortsätze ihre Bandverbindungen zerrissen und dann vor die des nächst unteren Wirbels hinüberglitten.

Die Diagnose ist meist sehr schwierig, und es ist oft ganz unmöglich, eine begleitende Fractur auszuschliessen. Die **Symptome** beziehen sich wesentlich auf die Dornfortsätze. Bei der Luxation nach vorn springen die unteren mehr vor, bei der nach hinten die oberen. Dabei besteht eine Knickung der Wirbelsäule, indem bei der vorderen Luxation der verrenkte Wirbel mit seinen oberen Nachbarn in eine Vertiefung nach vorn gerückt erscheint, bei der hinteren Luxation aber das umgekehrte Verhältnis vorliegt. Die Lähmungen betreffen meist nur die unteren Extremitäten. Die **Prognose** scheint etwas günstiger zu sein als bei den Fracturen, indem in einzelnen Fällen durch eine gelungene Reposition auch die nervösen Störungen beseitigt worden sind.

Die **Reposition** selbst geschieht nach den Regeln, welche schon von *Petit* und *Heister* gegeben wurden: Extension, Contraextension und Druck auf den vorspringenden Wirbel. *Petit* legte seinen Kranken mit dem Bauch auf ein cylindrisch zusammengelegtes Tuch, *Heister* über eine Tonne. Wir werden die Extension so ausführen, dass wir in der Narkose vorsichtig am Becken mit Händekraft, unter den Achseln mit Tüchern ziehen lassen.

Trotz der Mächtigkeit und Elasticität der Zwischenwirbelscheiben, trotz der Stärke und Festigkeit der Bänder und der Verstärkung derselben durch die starken Muskelmassen des Rückens und der ungünstigen Lage der Gelenkfortsätze sind doch auch an der Lendenwirbelsäule Luxationen beobachtet worden und zwar sowohl doppelseitige nach vorn und nach hinten, als auch Abductionsluxationen, diese allerdings stets complicirt mit Fracturen. Alle diese Fälle betrafen die drei oberen Lendenwirbel, am häufigsten jedoch den ersten. Bezüglich der Diagnose und der Symptome sowie der Reposition gilt das bei den Brustwirbeln Gesagte. Ein Unterschied ist wohl nur durch die nervösen

Störungen gegeben. Diese sind nämlich meist nur in beschränkter Weise vorhanden, da das Rückenmark an dem ersten Lendenwirbel endigt, neben der Cauda equina aber Raum genug besteht für etwaige Dislocationen. Am häufigsten hat man noch Lumbalneuralgieen und Ischias beobachtet.

Fracturen des Brustbeines.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Sternum nimmt an dem vorderen Theile des Brustkorbes die Mitte ein. Es ist schräg nach abwärts und vorwärts geneigt, mit dem übrigen Skelett durch die Knorpel der sieben obersten Rippenpaare verbunden und dient selbst den beiden Schlüsselbeinen zur Befestigung. Es besteht ursprünglich aus 6 Segmenten, von denen das erste, das Manubrium sterni, meist bis zum mittleren Lebensalter von den übrigen getrennt bleibt. Die folgenden vier Segmente sind beim Erwachsenen zu einem Knochen, dem Corpus sterni, verbunden. Das sechste, der Proc. xiphoideus, bleibt gewöhnlich bis zur Pubertätsperiode, oft aber auch noch im späteren Alter, wenigstens theilweise, knorpelig. Zwischen Manubrium und Corpus sterni findet sich zuweilen noch im späteren Leben eine spaltförmige Gelenkverbindung. Ist diese verknöchert, so wird die Synostose durch eine quere Erhabenheit ausgedrückt. Zwischen dem Corpus und dem Proc. xiphoideus ist das Bestehenbleiben des Halbgelenkes bis zum höheren Alter die Regel. Nur selten kommt es hier zu einer knöchernen Verbindung.

Das Brustbein ist von vorn nach hinten abgeplattet und besitzt in verticaler Richtung eine leichte Krümmung, deren Convexität nach vorn sieht. Es besteht aus einer schwammigen Knochensubstanz, welche nur eine dünne compacte Rinde besitzt. Zuweilen findet man das ganze Brustbein der Länge nach in zwei Hälften getheilt, Fissura sterni congenita

Frequenz, Aetiologie und anatomische Charactere der Brustbeinfracturen.

Entsprechend der Thatsache, dass die einzelnen Elemente des Sternums nach zurückgelegter Pubertätszeit, zuweilen auch schon bei jüngern Individuen verknöchern, ohne dass man dies in vivo

erkennen könnte, angesichts ferner des Erfahrungssatzes, dass Continuitätstrennungen in den oben beschriebenen Halbgelenken meist derart verlaufen, dass mit dem Knorpel auch ein Theil des Knochens abreisst, fasst man diese eigentlich als Diastasen zu bezeichnenden Verletzungen am besten mit den wirklichen Fracturen zusammen.

Trotz der oberflächlichen Lage des Brustbeines sind die Brüche oder Diastasen desselben sehr seltene Vorkommnisse. Nach allen Statistiken nehmen sie mit 0,1% die letzte Reihe in der Häufigkeitsskala der Fracturen ein. Die Ursache dieser grossen Seltenheit ist offenbar in der schwammigen, wenig spröden, daher widerstandsfähigen Beschaffenheit des Knochens selbst, in der Zusammensetzung des Sternums aus verschiedenen, theils gar nicht, theils erst spät consolidirenden Stücken und schliesslich in seiner elastischen Befestigung zwischen den Rippenknorpeln zu suchen. Nach *Messerer* kann man das Sternum bei jugendlichen Individuen mit einem Druck von 60—100 Kilo belasten und es dadurch selbst an die Wirbelsäule andrängen, ohne dass es bricht. Bei älteren Personen geben bei gleicher Belastung eher die Rippen nach. In den wenigen bis jetzt beobachteten Fällen von Brustbeinfractur ist nun auch eine directe Gewalt nur selten die Veranlassung zum Bruch gewesen. Man hat zwar das Auffallen mit dem Brustbein auf einen hervorragenden harten Körper, einen Stoss gegen dasselbe mit einer Deichsel, einen Schuss, das Ueberfahren eines schweren Wagenrades, einen Hufschlag in dieser Weise wirken sehen, und es war dann gemäss der starken dazu erforderlichen Kraft die bedeckende Haut meist mit zerrissen; ungleich häufiger aber war die Fractur durch indirecte Gewalt entstanden. Hier handelte es sich in der Regel um einen Sturz von bedeutender Höhe herab auf den Kopf, den Steiss oder die Füsse, wobei die Wirbelsäule nach vorn oder hinten umgebogen, das Brustbein also entweder eingeknickt oder ausgerissen wurde. Seltener kam die Fractur in der Weise zu Stande, dass sich bei einem Fall auf den Kopf das Kinn in die Spitze des Sternums eintrieb oder dass sich bei einem Fall auf die Schulter die Gewalt entweder durch die Clavicula oder durch die Rippen auf das Brustbein übertrug. Schliesslich spielt hier noch der Muskelzug eine Rolle. Es wurde schon beobachtet, dass derselbe beim Ueberstrecken der Wirbelsäule, z. B. beim Hintenüberbeugen Kreissender, das Manubrium sterni quer durchriss, und ebenso hat man solche Querfracturen des Sternums durch heftige Contractionen der Bauch-

muskeln beim Heben schwerer Lasten oder beim Erbrechen entstehen sehen.

Entsprechend den schweren Gewalten, welche zu einem Zerbrechen des Sternums nöthig sind, findet man die Sternalbrüche sehr selten isolirt vor. In der Regel sind noch andere schwere Verletzungen, wie Brüche der Wirbelsäule, der Rippen, des Beckens, Organverletzungen am Thorax und Abdomen vorhanden, so dass dann die Fracturen des Sternums nur unwesentliche Nebenerscheinungen sind. Sie kommen am häufigsten vor bei Männern, seltener bei Frauen und wurden noch nie beobachtet bei Kindern.

Was die anatomischen Charaktere der Sternalbrüche betrifft, so sind zunächst von *Gurlt* einige wenige Fälle zusammengetragen worden, in denen man bei der Section an der hinteren Fläche des Körpers Infractionen fand, ohne dass vorn eine Spur von Verletzung zu bemerken war. Der sofortige Tod in

Fig. 61.




Fig. 62.




diesen Fällen war eingetreten durch grosse Blutextravasate im Mediastinum und an der Aussenfläche des sonst unverletzten Herzbeutels.

Weitaus die grösste Mehrzahl der Sternalfracturen sind vollständige mit quer oder leicht schräg verlaufenden Bruchlinien. Zuweilen sind mehrfache, sehr selten Längsbrüche beobachtet worden. Bei letzteren muss man sich vor einer Verwechslung mit der schon genannten Fissura sterni congenita hüten. Auftreffende Schüsse erzeugen entweder Loch- oder Splitterbrüche. Letztere

können auch durch das Eindringen eines spitzen Körpers entstehen.

Die Quer- oder leichten Schrägfracturen betreffen am häufigsten die Verbindungsstelle des Manubrium und Corpus sterni und die Gegend zwischen dem 2. und 3. Rippenknorpel. (Fig. 62 u. 63). Sie kommen aber auch in der Mitte des Körpers, zwischen der 3. und 4. Rippe vor (Fig. 61), sind dagegen seltener an den tieferen Punkten. Die Dislocation der Fragmente ist verschieden. Bricht das Manubrium vom Corpus sterni ab, so wird dasselbe durch die starke und breite erste Rippe gewöhnlich in seiner normalen Lage erhalten. Der Körper des Brustbeins dagegen wird durch die Gewalt entweder gegen den Brustraum hingetrieben und rückt dann an der hinteren Fläche des Manubrium etwas in die Höhe (Fig. 62), oder er wird nach vorn dislocirt, indem er sich vorn am Manubrium in die Höhe schiebt (Fig. 63). Zuweilen sind jedoch beide Fragmente einwärts gedrängt und bilden dann einen nach vorn offenen Winkel. Sitzt die Fractur in der Mitte des Körpers, so wird das obere Fragment meist nach innen, das untere nach vorn und oben stehend gefunden.

Fig. 63.



Die Brüche des Proc. ensiformis sind ausserordentlich selten. Man glaubte mitunter beobachtet zu haben, dass solche mit Dislocation des gebrochenen Stückes nach innen eine Ursache unstillbaren Erbrechens gewesen seien, und hat dann sogar die Laparotomie ausgeführt, um die Reposition des Fragmentes zu bewirken.

Zur Vervollständigung der pathologischen Anatomie ist noch anzuführen, dass man in der Umgebung der Bruchstelle stets Blutextravasate trifft, die, wenn sie auf die Aussenfläche des Sternums erfolgen, keine weitere Bedeutung haben, wohl aber, wenn sie nach innen gegen das Mediastinum hin liegen, da sie in diesem Falle einen gefährlichen Druck auf das Herz ausüben können. Sie entstehen meist durch Zerreissung der Knochen- und Periostgefässe, gelegentlich aber auch durch Ruptur der Vasa mammaria interna. In seltenen Fällen wurden durch die dislocirten Fragmente schwere

Verletzungen der Brusteingeweide — Verletzungen des Herzbeutels, des Herzens, der Lunge — beobachtet.

Symptome der Sternalfracturen.

Die Symptome der Sternalfracturen sind in der Regel so auffallend, dass die Diagnose unschwer zu stellen ist. Der Verletzte hat im Moment der Fractur oft ein krachendes Geräusch gehört und nimmt nach derselben eine ganz charakteristische Stellung ein. Um nämlich die Musculatur zu erschlaffen, sitzt er halb aufrecht mit vorgebeugtem Kopf und gebeugtem Rumpf. Jeder Versuch, diesen zu strecken, wird mit heftigen Schmerzen beantwortet. Es besteht aber ausserdem noch ein localer Bruchschmerz, der bei jeder Bewegung, wie tiefen Inspirationen, Hustenstössen, sowie bei Druck sehr gesteigert wird. Weiterhin finden sich Sugillationen über der Bruchstelle und eine auffallende Nachgiebigkeit beim Druck auf den unteren Theil des Brustbeines. Besteht ein reiner Querbruch ohne Dislocation, so hat man beim Vorhandensein der genannten Zeichen das Recht, eine Fractur anzunehmen.

Viel leichter wird aber die Erkenntniss einer solchen, wenn sich die Fragmente verschoben haben. Die vordere Brustwand erscheint dann verkürzt. Auf dem Sternum findet man eine Prominenz und darüber eine Vertiefung, wenn das untere Fragment nach vorn und oben dislocirt ist. Umgekehrt entsteht bei Dislocation desselben nach hinten in der Achse des Brustbeins eine bajonettförmige Knickung nach hinten. Zuweilen sieht man auch bei den Respirationsbewegungen den unterhalb der Fracturstelle gelegenen Theil des Brustbeins an dem oberen hin- und hergleiten. Mit der palpirenden Hand kann man die abnorme Stellung der beiden Theile des Brustbeins gewöhnlich noch deutlicher erkennen und sich ebenso auch von der Anwesenheit abnormer Beweglichkeit und Crepitation überzeugen. Diese letztere kann man mit dem aufgesetzten Stethoskop als kurzes knackendes Geräusch hören, zuweilen auch finden, dass sich die der Bruchstelle benachbarten Rippen einander genähert haben. Bei Dislocation des unteren Fragmentes nach innen sowie beim Vorhandensein eines mediastinalen Blutergusses können Oppressionserscheinungen und bedeutende Respirationsbeschwerden entstehen. Sind die Lungen ver-

letzt, so kommt zu dieser Dyspnoë noch Blutspeien oder Bluthusten und Hautemphysem.

Prognose der Sternalfracturen.

Einfache, nicht complicirte Fracturen des Brustbeins heilen innerhalb 4 Wochen durch knöchernen Callus ohne Zurücklassung functioneller Störungen. Wenn auch die Dislocation nicht immer ganz gehoben wird, gibt dies zu Klagen doch keine Veranlassung. Ebensowenig thut dies eine zuweilen beobachtete Pseudarthrose. Ist die Heilung mit starker Verschiebung der Fragmente erfolgt, dann können allerdings Athembeschwerden, Hustenreiz und Herzklopfen theils durch Raumbeengung der Brusthöhle, theils durch Compression des einen oder beider Phrenici eintreten. Ein solcher Fall, in dem ein mit starker winkelförmiger Knickung nach innen geheilter Sternalbruch eine Mitralstenose zur Folge hatte, ist kürzlich von *Ritter* beschrieben worden.

Der Verlauf nicht aseptisch gehaltener, complicirter Fracturen kann ein verhängnissvoller werden, indem sich Mediastinalabscesse bilden und von hier auf den Herzbeutel und die Pleura fortkriechen können. Vor dem Durchbruch eines solchen Abscesses nach aussen pflegen Pulsations-Erscheinungen in demselben aufzutreten. Complication mit anderen Verletzungen bedingt meist eine Trübung der Prognose. So kann der Tod durch Blutungen aus der Mammaria interna oder aus dem verletzten Herzen, durch Haemo- und Pneumothorax, durch Zerreissung des Rückenmarkes erfolgen.

Therapie der Sternalfracturen.

Die Therapie leistet in der Regel nicht viel. Man lässt die Patienten ruhig im Bette bleiben und versucht das untere prominirende Fragment mit den Fingern zurückzudrängen, oft jedoch ohne dauerden Nutzen, indem beim Nachlass des Druckes die Verschiebung sich wieder einstellt. Ist es nicht durch begleitende Nebenumstände verboten, so kann man dem Patienten ein Rollkissen unter den Rücken legen und so durch permanente Extension die Retention der Fragmente besorgen. Ist das untere Fragment nach hinten dislocirt, so hat man empfohlen, dasselbe mit einem eingeschlagenen starken Haken oder einem eingebohrten Tirefond, ja sogar mittelst des Elevatoriums und des Trepans in die Höhe zu heben. Da man durch alle diese Manipulationen die einfache Fractur in eine complicirte verwandelt, die Eingriffe aber selbst im günstigsten Fall keine Garantie für die Retention der

Fragmente bieten, so sind dieselben auch unter dem Schutz der Aseptik zu verwerfen. Nur dann könnte man dieselben gelten lassen, wenn bei erheblicher Depression des Bruchstückes dauernd schwere Störungen von Seiten des Herzens oder der Lunge vorhanden wären und man hoffen könnte, dieselben nach Hebung der Depression und Entfernung des mediastinalen Blutergusses zu beseitigen. Alle Verbände, welche den Thorax circulär umgeben, sind zu unterlassen. Wollte man mit einer pelottenartigen Vorrichtung ein prominirendes Stück zurückhalten, so stellt man sich die Pelotte am besten aus einem Bindenkopf dar, den man mit breiten Heftpflasterstreifen befestigt. Dass bei complicirten Fracturen strengste Asepsis nothwendig ist, ist selbstverständlich. Eine secundäre Trepanation des Sternums könnte bedingt werden durch Abscedirungen hinter dem Sternum, während Resectionen an den Fragmenten durch etwaige Necrose an denselben nothwendig werden könnten.

Fracturen der Rippen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Die Rippen sind elastische, bogenförmig gekrümmte, von aussen nach innen plattgedrückte Knochen, welche von den Brustwirbeln gegen das Brustbein verlaufen und den in der Brust gelegenen Respirations- und Circulations-Organen ein schützendes Gerüst bilden. Nur die sieben oberen, sog. wahren Rippen setzen sich direct an das Brustbein an. Von den übrigen fünf, den sog. falschen Rippen, besitzen die 8. bis 10. noch eine mittelbare Stütze an ihm, indem sie sich mit dem unteren Rand der nächst oberen Rippe verbinden. Die 11. und 12. dagegen enden frei zwischen den Bauchmuskeln. Jede Rippe besteht aus zwei Theilen, der mehr nach hinten gelegenen, längeren *knöchernen Spange* und dem kürzeren, vorderen *knorpeligen* Ansatzstück. Die knöcherne und knorpelige Portion müssen als ein Ganzes angesehen werden, indem von einer Gelenkverbindung zwischen ihnen nicht die Rede ist. Jede einzelne Rippe ist in *doppeltem* Sinne gekrümmt. Die *erste* Krümmung ist jene, welche der Brusthöhle zugekehrt ist. Sie ist am auffallendsten da, wo sich die Rippe von hinten nach vorn wendet, und ist an der Aussenseite der Rippe durch eine scharfe Knickung, den *Rippenwinkel*, deutlich sichtbar. Die *zweite* Krümmung ist nach aufwärts gerichtet. Die Rippen

laufen nämlich nicht horizontal gegen das Brustbein nach vorn, sondern in nach abwärts gesenkter Richtung. Sie liegen mit dem hinteren Ende höher als mit dem vorderen, behalten diese Richtung jedoch nicht in ihrer ganzen Länge bei, sondern sind in ihrem vorderen Theil wieder etwas nach aufwärts gekrümmt, um das Brustbein oder ihren nächst oberen Nachbar zu erreichen. Weiterhin zeigt eine Betrachtung der Rippen, dass nur die mittleren und unteren ihre Ränder direct nach oben und unten kehren. Die obersten dagegen und ganz besonders die erste wenden dieselben nach innen und aussen. Die Rippen sind im Ganzen gleich breit und stehen ebenso in gleichen, von den Intercostalmuskeln ausgefüllten Zwischenräumen auseinander. Sie bestehen aus einer zellenreichen Diploë, welche von dichten, compacten Knochenlamellen umgeben ist.

Die Rippen besitzen namentlich im kindlichen Alter eine bedeutende Elasticität. Durch Experimente an Kindsleichen ist festgestellt, dass man den Brustkorb durch eine Belastung von 90 bis 100 Kilo bis zur Berührung des Brustbeins mit der Wirbelsäule zusammenpressen kann, ohne dass ein Bruch erfolgt. Es federn vielmehr die Rippen aus dieser äussersten Compressionsstellung wieder in die normale Lage zurück. Im höheren Alter nimmt die Elasticität der Rippen ab, indem die Rippenknorpel verknöchern.

Frequenz, Aetiologie und anatomische Charaktere der Rippenbrüche.

Trotz dieser grossen Elasticität sind Brüche der Rippen doch ziemlich häufig, so dass sie nach *Gurlt*'s Statistik mit 17% direct hinter den am häufigsten vorkommenden Brüchen des Vorderarmes rangiren. Der Grund hierfür liegt einerseits in der exponirten Lage der Rippen, andererseits in dem Umstand, dass diese gewissermassen als Umgrenzung eines Hohlorgans jeder Unterstützung in der Tiefe entbehren. Die Brüche ereignen sich vorzugsweise bei kräftigen Männern, kommen viel weniger vor beim weiblichen Geschlecht und sind im Kindesalter fast gar nicht vertreten, wegen der dann vorhandenen grossen Elasticität des Thorax. Bei älteren Individuen werden sie wieder häufiger, weil mit der fortschreitenden Verknöcherung der Rippenknorpel der ganze Brustkorb starrer wird und beim Beginn des Greisenalters eine Rarefication der Knochensubstanz eintritt, durch welche die Rippen schwammiger und zum Brechen geneigter werden. Nehmen wir dazu noch eine Atrophie der schützenden Muskeln, so verstehen

wir, wie *Messerer* bei einer 82jährigen Frau schon durch ein Gewicht von 40 Kilo eine Fractur erzeugte, während dazu bei einem kräftigen, 30jährigen Manne 200 Kilo nothwendig waren. Stärkere Grade der Osteomalacie und Rhachitis bieten ebenfalls eine pathologische Prädisposition zu diesen Fracturen. Ebenso hat man dieselben sehr oft bei Geisteskranken gefunden, wohl in Folge der bei solchen Kranken vorkommenden Ernährungsstörungen, die einestheils beträchtliche Atrophieen der Rippen selbst, anderntheils beträchtliche Atrophieen der Thoraxmuskulatur erzeugen.

Die **Ursachen** der Rippenbrüche können directe, indirecte Gewalten oder der Muskelzug allein sein. Directe Brüche beobachtet man am häufigsten an der Vorderfläche oder am seitlichen Umfang des Thorax, weil auf der Dorsalfläche, zu beiden Seiten der Wirbelsäule, die starke Muskulatur und die Schulterblätter einen ausreichenden Schutz gewähren. Die Gewalten, die hier in Betracht kommen, sind ein Stoss z. B. mit einer Wagendeichsel, einem Balken gegen die Brust, ein Wurf mit einem spitzen Stein, ein Schlag mit einem schweren Stock, mit einem Hammer, mit dem Hufe eines Pferdes, ein Fall mit der Brust gegen die Ecke eines Tisches, gegen die Kante einer Treppenstufe, das Eindringen einer Kugel. Der hierbei stattfindende Mechanismus ist der, dass die andringende Gewalt den Rippenbogen nach seiner concaven Seite einbiegt, bis seine Elasticität überwunden ist. Es werden so meist nur eine oder auch zwei Rippen gebrochen. Fracturen vieler Rippen durch directe Gewalt sind aber auch beobachtet worden und zwar in der Weise, dass die Patienten überfahren oder durch herabstürzendes Gebälk derart getroffen wurden, dass der Arm fest gegen den Thorax angepresst wurde und dabei die betreffenden Rippen einbrach.


Kommt die Fractur durch indirecte Gewalt zu Stande, so sitzt sie an der Stelle, an welcher die Rippe durch die Gewalt am stärksten zusammengebogen wurde.

Diese kann zunächst in sagittaler Richtung einwirken, sei es, dass ein Wagenrad über das Sternum geht oder dass der Patient zwischen zwei Eisenbahnwagen u. s. w. eingeklemmt wird. Das Sternum wird dabei der Wirbelsäule genähert und die Rippen zum Ausweichen nach aussen gezwungen, der ganze Thorax also platter gedrückt. Gleichzeitig werden aber die Rippen auch in Folge ihres anatomischen Verlaufes nach unten gedrängt, d. h. dem Nabel genähert. Ist die Brustwand nicht mehr elastisch genug, so kann diese Veränderung der Brustform nur dadurch zu Stande kommen,

dass die Rippen nachgeben. Es resultiren dabei, und das ist nach dem Gesagten leicht verständlich, fast stets doppelseitige und zwar mehrfache Brüche mehrerer Rippen in der Weise, dass die Bruchlinie entweder entsprechend der Richtung der Axillarlinie oder entsprechend den Knickungswinkeln der Rippen, seltener am Rippenhalse oder an den Knorpelverbindungen mit dem Sternum verläuft. Die Bruchlinien durchsetzen die Rippen dabei vielfach in Form von Spiralen.

Wird der Körper mehr in frontaler oder diagonaler Richtung zusammengepresst, so dass das Sternum von der Wirbelsäule entfernt wird, so sind die Brüche in der Mehrzahl der Fälle einseitig, betreffen aber auch oft eine ganze Reihe von Rippen und sitzen theils in der Mitte, theils am Sternal- oder Vertebral-Ende. Es wird auch wohl durch solche Gewalt ein ganzes Stück der Thoraxwandung ausgebrochen, indem dann die Grenze des ausgebrochenen Stückes hinten an den Knickungswinkeln oder etwas weiter nach der Axilla, vorn in der Axillar- oder Mammillarlinie herzieht (Fig. 64). Es ist hierbei sehr wohl möglich, dass die eine Reihe der Fracturen durch directe Gewalt entstand, während die andere auf indirectem Wege zu Stande kam.

Fig. 64.



Fracturen durch Muskelzug hat man zuweilen beobachtet bei starken Exspirations-Bewegungen, wie beim Husten oder Niessen. Sie kommen wohl meist nur bei pathologisch prädisponirten Knochen, wie bei stärkerer Atrophie und Lipomasie, vor und finden sich am häufigsten an dem vorderen Theile der Rippen, in der Nähe ihrer Knorpel.

Ihrer **anatomischen Lage** nach werden die einzelnen Rippen sehr verschieden häufig von Fracturen befallen. Am häufigsten brechen die mittleren wahren Rippen.

Die oberen sind durch das Schulterblatt, das Schultergelenk, das Schlüsselbein und die grossen Brustmuskeln besser als jene geschützt. Ausserdem vermögen die oberen aber auch, da sie nur einen kleinen Bogen beschreiben, da sie ferner ihre schmale Seite nach aussen kehren und verhältnissmässig stark sind, den sie comprimirenden Gewalten besser zu widerstehen als die mittleren, die einen grösseren Kreisbogen beschreiben und ihre schwächste, die flache Seite nach aussen wenden. Die falschen Rippen wiederum können wegen ihrer langen Knorpel und ihrer beweglichen Verbindung mit dem Brustbein äusseren Einflüssen leichter ausweichen.

Was die **anatomischen Charaktere** betrifft, so kommen auch an den Rippen einfache und complicirte, vollständige und unvollständige Brüche vor. Bei den unvollständigen Brüchen ist entweder ein Längsbruch des Rippenrandes vorhanden in der Weise, dass von diesem entweder oben oder unten ein längliches Stück ausgebrochen wird, oder die Rippe hat eine Infraction, eine Einknickung, erlitten.

Die Längsbrüche sind sehr selten und entstehen durch begrenzte Gewalteinwirkungen, wie z. B. *Malgaigne* einen solchen an der Leiche erzeugte, indem er mit einem Hammer zufällig den unteren Rand der 5. Rippe traf. Beim Lebenden kann durch eine derartige Fractur des unteren Randes eine Verletzung der Art. intercostalis und damit ein traumatisches Aneurysma entstehen.

Die Infractionen der Rippen sind sehr häufige Verletzungen und betreffen öfter die innere als die äussere Knochentafel, indem die von aussen einwirkende Gewalt die Rippe bricht wie einen Stab, den man über das Knie biegt. Das Periost kann an der eingeknickten Stelle vollständig erhalten sein, selbst dann, wenn eine ganze Reihe von Rippen, wie das nicht selten geschieht, der Infraction anheimfällt.

Die vollständigen Rippenbrüche verlaufen ihrer Richtung nach quer oder schräg oder spiralig. Sie sind weitaus häufiger subcutan als complicirt und der Zahl der Bruchstellen nach einfache, mehrfache oder Splitterbrüche. Die Fragmente besitzen entweder glatte oder mehr weniger stark gezähnte oder gezackte Bruchflächen. Entsprechend dem Zustandekommen der Fracturen durch übermässige Biegung findet man von der Bruchlinie öfter

Fissuren ausgehen, so dass ein dreieckiger Keil durch dieselben umgrenzt, eventuell ganz herausgebrochen wird (Fig. 65).

Wenn das Periost theilweise erhalten ist oder die Zähne der Bruchlinie ineinander greifen, so bleiben die Fragmente in ihrer normalen Lage (Fig. 66). Ist dagegen das Periost verletzt, so findet sich meist auch eine Dislocation. Diese wird um so grösser, je grösser die Zerreissung der Intercostalmuskeln und je grösser die Anzahl der gleichzeitig gebrochenen Rippen ist. Die Verschiebung der Fragmente findet entweder nach der Brusthöhle hin statt oder gegen die Aussenfläche des Thorax hin. Im letzten Falle bilden die Fragmente dortselbst einen Vorsprung und können sich dabei gleichzeitig mit ihren breiten Flächen über einander schieben oder mit ihren schmalen Kanten neben einander stellen. Bei der Fractur einer einzelnen Rippe ist natürlich eine Dislocation im letzteren Sinne unmöglich, weil die als Schiene dienende Nachbarrippe eine solche Verschiebung verhindert. Ist eine Anzahl von Rippen zum Theil an zwei verschiedenen Stellen gebrochen, so findet man zuweilen eine Depression der Fragmente.

Fig. 65.






Fig. 66.



Die Art, in welcher die Fragmente sich zu einander dislociren, ist durchaus nicht constant und hängt von der Art der stattgehabten Gewalteinwirkung und dem Sitz des Bruches ab. So ist es einleuchtend, dass bei Compression des Thorax in sagittaler Richtung die Fragmente nach aussen weichen, während bei directer Gewalt und frontalem oder diagonalem Druck dieselben leichter nach innen gleiten. Am häufigsten scheint bei Brüchen am hinteren Umfang der Rippen das hintere (vertebrale) Fragment hinter das

vordere (sternale) zu treten und dies letztere sich in gleicher Höhe vor dem ersteren zu halten oder sich etwas nach abwärts zu senken (Fig. 67). Bei Brüchen am Sternalende der Rippe erfolgt die Dislocation meist umgekehrt. Bei mehrfachen oder Splitterbrüchen, welche sich am häufigsten nahe der Wirbelsäule finden, wird sich noch weniger eine bestimmte Regel für das Zustandekommen der Verschiebung auffinden lassen. Ist eine Doppelfractur an einer oder mehreren Rippen vorhanden, so kann der abgetrennte Theil der Thoraxwand unter Umständen so beweglich sein, dass er bei den Respirationsbewegungen ventilartig eingezogen und ausgestossen wird.

Fig. 67.



Abgesehen von der Zerreissung der deckenden Haut sind die Rippenbrüche mitunter noch mit anderen Verletzungen complicirt. Dass Zerreissungen der Art. intercostalis gelegentlich zu einem traumatischen Aneurysma führen können, haben wir schon erwähnt. Es kann jedoch durch diese Verletzung auch ein zum Tode führender Haemothorax entstehen.

Die regelmässigsten Begleiter schwerer Rippenbrüche sind Insulte beider Pleurablätter und der Lungen. Diese werden fast ausnahmslos durch spitzige Fragmente oder Knochensplitter veranlasst, welche beim Zustandekommen der Fractur in die Lungen hineingetrieben werden. Bei den elastischen Rippen der Kinder kann es jedoch gelegentlich vorkommen, dass eine Quetschung und ein Einriss in die Lunge entsteht, ohne dass die Pleura costalis verletzt ist.

Die Folgen der Lungen- und Pleuraverletzung sind Haemo- und Pneumothorax, Haemoptoë und Hautemphysem. Diese Erscheinungen hängen theils von der Grösse und Art der Verletzung, theils von dem Verhalten der Pleura und der Lunge zu einander ab. Ist nämlich die Pleurahöhle von normaler Beschaffenheit, so sammelt sich die mit dem Blute zugleich aus der Lunge austretende Luft in sehr erheblicher Menge in ihr an und führt zur Compression der Lunge. Dadurch wird dann der Riss in derselben geschlossen und Blutung und Luftaustritt sistirt. Sind dagegen Verwachsungen zwischen den beiden Pleurablättern

vorhanden, wie dies ja so häufig der Fall ist, so kann sich die Luft nicht in bedeutendem Maasse in der Pleurahöhle ansammeln, sondern wird in Folge des starken Exspirationsdruckes die Bindegewebsadhäsionen zwischen Pleura pulmonalis, costalis und Pericardium infiltriren, weiterhin aber auch in das intermusculäre und subcutane Bindegewebe der Brustwand eindringen und so als Hautemphysem in die Erscheinung treten.

Eine seltene Complication von Seiten der Lungen bilden bei perforirenden Verletzungen des Thorax die Lungenhernien; die Lunge liegt dann vor der Körperoberfläche, indem sie sich bei der Inspiration trichterförmig einzieht, bei der Exspiration aber aufbläht *(Weiss, Wahl, Huguier)*.

Viel gefährlicher als diese Lungenverletzungen sind die glücklicherweise selteneren Verletzungen des Herzens, welche bei Brüchen der 5., 6., 7. oder 8. Rippe beobachtet wurden und meist innerhalb der kürzesten Zeit den Tod herbeiführten. Nicht ganz so selten findet man bei Brüchen der unteren Rippen auch Zerreissungen des Zwerchfells, der Leber, der Milz und des Oesophagus.

Diagnose der Rippenbrüche.

Die Diagnose eines isolirten Rippenbruches, besonders einer Infraction, zu stellen, kann mit grossen Schwierigkeiten verknüpft sein. Namentlich dann, wenn die muthmassliche Fractur sich bei fettleibigen Patienten ereignet hat oder wenn sie durch dicke Muskellagen, durch ein Blutextravasat verdeckt ist, bleibt die Entscheidung, ob nicht nur eine einfache Contusion vorliegt, oft zweifelhaft. Glücklicherweise bringt dieser Zweifel für die Patienten keinen Schaden mit sich, da die Behandlung in beiden Fällen die gleiche sein wird. In der überaus grossen Mehrzahl der Fälle bieten nun aber die Rippenbrüche doch eine ganze Reihe subjectiver und objectiver Symptome dar, so dass die Art der Verletzung leicht erkannt werden kann.

Symptome der Rippenbrüche.

Der Patient berichtet uns den Hergang der Verletzung, giebt an, im Momente derselben ein deutliches Krachen vernommen zu haben, und bezeichnet mit dem Finger ganz genau die Stelle, wo die Fractur sitzt. Hier findet sich ein mehr oder weniger erhebliches Blutextravasat und ein stets heftiger, stechender Schmerz, der bei allen Bewegungen des Thorax, be-

sonders aber beim Husten, Niesen und ebenso beim Druck mit den Fingern noch gesteigert wird. Dieser Schmerz ist eines der werthvollsten Symptome, wenn er auf eine fixe Stelle beschränkt ist und dorthin auch dann localisirt wird, wenn man die sog. indirecte Palpation ausführt, d. h. von Stellen, die von der Fractur entfernt liegen, z. B. vom sternalen und vertebralen Ende der Rippe her einen Druck ausübt, als wolle man diese beiden Enden einander nähern. Um den Schmerz möglichst zu vermeiden, athmet der Patient so wenig als es irgend geht mit der verletzten Seite. Bei jeder tieferen Inspiration, oft auch durch Druck auf die Fracturstelle, wird ein quälender Husten ausgelöst. Die Palpation, mittelst welcher man die Rippen einzeln von vorn nach hinten untersucht, trifft auf den Ort der Verletzung durch Wachrufen dieses Schmerzes, ergiebt aber ausserdem noch Crepitation, die Deformität und abnorme Beweglichkeit. Die Untersuchung auf Crepitation geschieht in der Weise, dass man entweder die flache Hand auf die Fracturstelle auflegt und den Patienten tief inspiriren lässt oder dass man die Rippe auf beiden Seiten der Fracturstelle umfasst und die Fragmente in entgegengesetzter Richtung an einander verschiebt. Bei diesen Manipulationen wird sich auch die abnorme Beweglichkeit geltend machen. Crepitation kann man aber auch noch durch die Auscultation wahrnehmen, indem man durch das aufgesetzte Stethoskop hört, wie bei jeder Inspiration eine knackende Verschiebung der Fragmente entsteht. Es ist dies Geräusch wohl zu unterscheiden von dem knisternden Geräusch des Emphysems und dem reibenden Geräusch eines pleuralen Exsudates.

Die Deformität ist meist am wenigsten ausgesprochen. Nur bei starker Depression am vorderen Umfang des Thorax fühlt man beim Abtasten der Rippen eine Vertiefung oder auch wohl ein vorspringendes Fragment.

Zu diesen nur der Fractur angehörigen Zeichen kommen dann noch die Symptome der Complicationen. Die Verletzung der Lunge giebt sich zu erkennen durch blutigen Auswurf, Haemo- und Pneumothorax und Hautemphysem. Letzteres kann oft so bedeutend werden, dass es sich über den ganzen Rumpf, den Hals und Kopf, ja sogar über die Extremitäten ausbreitet. Ein solch starkes Emphysem verhindert dann eine genaue Untersuchung des Thorax. In den Fällen schwerster Compression der Lunge wird die Athmung sehr behindert. Die Patienten

werden blauroth, cyanotisch, machen ungeheure Anstrengungen, um Luft zu bekommen und werden dadurch sehr unruhig.

Prognose der Rippenfracturen.

Solche Fälle bieten dann eine zweifelhafte Prognose. Im Uebrigen ist jedoch der Verlauf der Rippenbrüche gewöhnlich ein durchaus günstiger. Die Schmerzen an der Bruchstelle pflegen sich bereits nach einigen Tagen zu vermindern und bald darauf ganz aufzuhören. Die Vereinigung der Bruchenden erfolgt trotz der fortdauernd durch die Respiration unterhaltenen Bewegungen der Rippen nach 3—4 Wochen durch knöchernen Callus. Derselbe ist meist nicht voluminös und verursacht, selbst wenn eine Reihe von Rippen gebrochen war, keine Störungen (Fig. 68). Nur selten kommt es vor, dass durch denselben zwei benachbarte Rippen mit einander verwachsen. Berühren sich wirklich die Callusmassen, so entsteht zwischen ihnen lieber eine Art falschen Gelenkes (Fig. 69). Pseudarthrosen sind sehr selten; ebenso entwickelt sich nur bei besonderer Prädisposition eine Caries oder Necrose der Bruchenden. War die Lunge verletzt worden, so kann unter schwerer Dyspnoë der Exitus erfolgen. Kommt es nicht so weit, so können uns doch die Patienten viele Sorgen bereiten, wenn sich zum Haemopneumothorax noch eine hypostatische Pneumonie gesellt, die sich durch das Auftreten fieberhafter Temperatursteigerungen anmeldet. Zuweilen kommen noch die schwersten Verletzungen durch, und man braucht daher nicht gleich die Hoffnung aufzugeben. Der Riss in der Lunge schliesst sich alsdann und vernarbt. Blut und Luft werden resorbirt, und nur pleuritische Adhäsionen bleiben zurück. Zu einer Zersetzung der Luft im subcutanen Zellgewebe kommt es nicht, da etwaige infectiöse Keime in den Bronchien abfiltrirt werden.

Fig. 68.





Fig. 69.



Selbst bei bestehendem Pyothorax kommt es nie zur Fäulniss der Emphysemluft, wahrscheinlich wohl deshalb nicht, weil nach dem bekannten Gesetz von einer feuchten Fläche sich nie Bacterien in die Luft ausbreiten können. Bei alten Leuten, besonders solchen, die an Lungenaufblähung und chronischer Bronchitis leiden, wird durch eine Rippenfractur die Expectoration des Schleimes durch die beim Husten stattfindenden Schmerzen sehr erschwert. Es liegt hierin für dieselben eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Bei complicirten', nicht aseptischen Fracturen droht natürlich das Empyem mit seinen Folgen.

Therapie der Rippenbrüche.

Die Behandlung einer einfachen Rippenfractur ohne Dislocation ist eine symptomatische. Die Patienten werden vor allen Dingen Ruhe haben müssen. Sie gewöhnen sich bald, nur mit der gesunden Seite zu athmen und suchen sich im Bette eine schmerzlose Lagerung auf. Gegen den Hustenreiz und gegen den Schmerz gibt man Morphium. Den zähen Schleim löst man durch ein Expectorans und legt auf die Bruchstelle eine Eisblase oder noch besser einen feuchtwarmen Umschlag. Sollte ein starkes Hautemphysem auftreten, so empfiehlt *P. Vogt* den Thorax mit elastischen Binden einzuwickeln, um die Ausbreitung der Luft in den Bindegewebsmaschen zu verhindern. Besteht nur eine geringe Dislocation, so macht man am besten gar nichts gegen dieselbe. Ist sie stärker, so versucht man die Reposition durch Druck auf die gebrochenen Enden. Bei tiefer Depression eines Fragmentes räth *Malgaigne*, dieses durch einen hinter dasselbe einzusetzenden scharfen Haken zu eleviren, doch wird wohl nur selten Anlass zu solcher Operation vorhanden sein. Nach *Koenig* könnte man heutzutage, wenn eine Operation indicirt ist, unter dem Schutze der Asepsis bei deutlicher schmerzhafter Verschiebung eine Blosslegung des Bruches, Einrichtung desselben event. mit Resection eines untergeschobenen Stückes und Naht der zusammengepassten Bruchenden versuchen. Gypsverbände zur Immobilisation des Thorax sind im Allgemeinen zu widerrathen, da sie die Respiration zu sehr beeinträchtigen und daher von den wenigsten Patienten vertragen werden. Will man die gebrochene Seite stützen, so thut man diess mittelst eines breiten Handtuches oder noch besser mit dachziegelförmig sich deckenden, nicht circulären Heftpflasterstreifen.

Ein actives Vorgehen ist dann angezeigt, wenn bei starker Cyanose ein voller harter Puls auf eine bedeutende Lungencon-

gestion schliessen lässt. Man kann dann durch einen rechtzeitig ausgeführten Aderlass dem Patienten über die erste Gefahr hinaushelfen. Ebenso kann man bei hochgradigem Haemothorax durch eine vorsichtige Punction das Blut zum grössten Theil entfernen, ohne eine neue Blutung befürchten zu müssen.

Brüche der Rippenknorpel.

Die Rippenknorpel sind die Verlängerungen der Rippen, welche deren Ansatz oder deren Verbindung mit dem Brustbein besorgen. In ihrer Verlaufsrichtung weichen sie sehr von einander ab. Der erste zieht gegen das Brustbein hin etwas nach abwärts, der zweite horizontal nach vorn. Alle übrigen aber mit Ausnahme der beiden letzten verlaufen von der Rippe aus zum Brustbein um so stärker nach aufwärts, je weiter sie in der Reihe nach unten hin gelegen sind.

Wir haben gesehen, dass diese Knorpel im höheren Alter meist verknöchern, und es sind dann Fracturen derselben nichts Auffallendes. Es liegen jedoch auch Beobachtungen vor, dass sie trotz ihrer Elastizität auch bei jugendlichen Individuen brechen können.


Solche Brüche findet man dann entweder an der Grenze der Rippe und des Knorpels oder in der Mitte des letzteren oder schliesslich nahe der Verbindung desselben mit dem Brustbein. An der ersteren Stelle kommen sie am häufigsten vor, und zwar bezieht sich die Mehrzahl der gemachten Beobachtungen auf den 6., 7. und 8. Knorpel. *Bähr* beobachtete im vergangenen Jahre eine Fractur des zweiten Knorpels.

Es handelt sich fast stets um ganz reine Querbrüche mit glatten, nicht gezackten Bruchflächen. Doppelbrüche sind sehr selten. In der Regel besteht eine Dislocation, und zwar entweder blos als Verschiebung in der Richtung von vorn nach hinten, so dass das eine der Fragmente stark hervorspringt, während über dem andern die Haut eingezogen erscheint, oder es findet dazu noch eine nicht unbeträchtliche Uebereinanderschiebung der Fragmente in der Längsrichtung derselben statt. Es hängt die Art der Dislocation ab von der einwirkenden Gewalt, von der Elasticität der Rippenknorpel und von der Beschaffenheit der Brusteingeweide. So kann z. B. durch etwaige Pleuraadhäsionen ein Fragment fixiert, das andere jedoch frei sein und dieses dann durch seine Elasticität nach vorne gedrängt und vor das erstere dislocirt werden.

Ueber die Aetiologie und Complicationen gilt dasselbe wie bei den Fracturen der knöchernen Rippen.

Die **Symptome** sind ziemlich einfacher Art. Das Gefühl des Krachens im Moment der Verletzung, der locale durch alle Thoraxbewegungen gesteigerte Schmerz führt zu der muthmasslichen Bruchstelle. Ist hier keine Dislocation vorhanden, so bleibt man oft über die Art der Verletzung im Zweifel, indem die beiden wichtigsten Fracturzeichen, Crepitation und abnorme Beweglichkeit, fehlen können. Sind sie vorhanden, so giebt sich die Crepitation als ein weiches Knorpelreiben zu erkennen; die abnorme Beweglichkeit aber lässt sich durch die Verschiebbarkeit der Fragmente deutlich von der den Rippenknorpeln infolge ihrer Elasticität inne-

Fig. 70.



wohnenden natürlichen Beweglichkeit unterscheiden. Bei bestehender Dislocation sieht man die durch die vorspringenden oder deprimirten Fragmente hervorgerufenen abnormen Erhöhungen (Fig. 70) und Vertiefungen der Haut über der Bruch-

stelle. Berücksichtigt man diese Symptome und ist man sich stets der Lage und der Länge der Rippenknorpel bewusst, so wird man wohl immer die Diagnose, ob es sich im vorliegenden Falle wirklich um eine Rippenknorpelfractur handelt und nicht um eine solche der knöchernen Rippe, mit Sicherheit stellen können. Die Symptome der Nebenverletzungen sind die gleichen, wie wir sie vorher geschildert haben.

Durch zahlreiche Experimente und Sectionsresultate ist es sicher erwiesen, dass die Knorpelbruchflächen nie durch knorpelige Vereinigung verheilen. Die Consolidation geschieht vielmehr in der Weise, dass vom Perichondrium aus sich ein knöcherner Callus bildet, welcher die beiden Bruchenden ringförmig umgiebt und die sich selbst vollständig passiv verhaltenden Bruchflächen vereinigt. Die Callusbildung selbst erfolgt meist innerhalb 3—4 Wochen.

Die **Therapie** ist derjenigen der Rippenknochenbrüche durchaus analog.

Luxationen der Rippen.

Die Rippen verbinden sich an ihren hinteren Enden mit der Wirbelsäule, Articulatio costo-vertebralis, an ihren vorderen Enden durch die Knorpel mit dem Seitenrande des Brustbeins, Articulatio costo-sternalis.

Die Wirbelgelenke sind doppelt, indem sich das Rippenköpfchen mit dem seitlichen Gelenkgrübchen der Wirbelkörper und der zwischen je zwei solchen gelagerten Zwischenwirbelscheibe verbindet, während die Rippenhöcker mit den entsprechenden Querfortsätzen articuliren. Bei den zwei letzten Rippen fehlt diese zweite Gelenkverbindung. Wo dieselbe aber vorhanden, sind beide durch starke Kapseln und Hilfsbänder befestigt.

Die Articulatio costo-sternalis betrifft die 1.—7. Rippe. Jedes dieser Gelenke besteht aus einer Synovialkapsel mit vorderen deckenden Bändern. Vom 6. und 7. Rippenknorpel geht das straffe Lig. costo-xiphoideum zum Schwertfortsatz.

Ausserdem stehen im jugendlichen Alter die Knorpel der 6. oder 7.—10. Rippe an ihren unteren Rändern durch Halbgelenke, die mit Kapselbändern versehen sind, untereinander in Verbindung. Im späteren Alter verfallen auch diese der Verknöcherung.

Vergleicht man die kräftige Befestigung der Rippen mit ihrer Form und Stärke, so begreift man, dass Luxationen dieser Gelenkverbindungen sehr seltene Vorkommnisse sind. Wenn sie aber vorhanden sind, so spielen sie neben anderen schwereren Knochenverletzungen meist nur eine untergeordnete Rolle. Sie sind stets die Folge einer die Rippe an der Gelenkverbindung direct treffenden, schweren Gewalt, z. B. eines Falles auf einen spitzen Gegenstand, Ueberfahrenwerden, Sturz von einer Höhe herab.

Entsprechend den genannten Gelenkverbindungen hat man nun Luxationen im Costovertebralgelenk, im Costosternalgelenk und der unteren Rippen gegen einander gefunden.

Die **Verrenkungen in den Costovertebralgelenken** erfolgen stets auf die vordere Seite des entsprechenden Wirbels. In der Regel sind sie mit Fracturen oder Luxationen der Wirbel complicirt. Die nach vorn luxirten Enden der Rippen können die Pleura perforiren und frei in die Pleurahöhle hineinragen. Ferner können gleichzeitig die Arteriae intercostales zerreissen und dadurch starke Blutergüsse in den Brustraum erfolgen.

Die **Diagnose** soll bei plötzlich entstandenem, krampfartigem Schmerz durch grössere Beweglichkeit der Rippen an ihren hinteren Theilen mit eigenthümlicher Nachgiebigkeit der Weichtheile und Mangel der Knochencrepitation gestellt werden können. Sie wird aber bei der Dicke der langen Rückenmuskelschicht und dem starken Bluterguss immer unsicher sein.

Bei den Luxationen oder besser Diastasen im **Costosternalgelenk** findet man den verrenkten Knorpel nach dem Sternum dislocirt und hier nach vorn unter der Haut prominirend. Charakteristisch für die Palpation ist dann wohl die unter der Haut zu fühlende Abrundung des Knorpels, während sich die Rippe leicht reponiren lässt, bei nachlassendem Druck aber sofort ihre pathologische Stellung wieder einnimmt.

Bei den **Verrenkungen der Rippenknorpel unter einander**, die ausser durch indirecte Gewalt auch durch Muskelzug, z. B. beim Heben schwerer Lasten und bei stattfindender Rückwärtsbeugung des Körpers, entstehen können, gleitet der Knorpel, dessen Gelenkverbindung gelöst ist, unter und hinter den nächst oberen und drängt diesen nach vorn, so dass

derselbe einen Vorsprung bildet, welcher zu der Annahme verleiten kann, es sei der obere Knorpel verrenkt.

Behufs der **Reduction** drückt man in diesem Falle auf den hervorragenden Knorpel von unten und vorn, worauf der verrenkte alsbald hervorspringt und durch seine Elasticität den richtigen Platz wieder einnimmt. Bei den übrigen Luxationen lässt man eine tiefe Inspiration ausführen und übt während dieser die directe Impulsion des verrenkten Gelenkendes in seine normale Lage aus. Meist gelingt die Reposition und Retention nur unvollkommen, so dass die Heilung mit mehr oder weniger starker Dislocation erfolgt. Ein Schaden ist dies für die Patienten nicht, indem sich die Schmerzen und Athembeschwerden bald ganz verlieren.

Fracturen der Clavicula.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Schlüsselbein ist der Strebepfeiler, welcher durch seine Verbindung mit dem Schulterblatt einer- und dem Brustbein anderseits die obere Extremität in ihrer normalen Haltung nach aussen vom Thorax befestigen soll. Ober- und unterhalb desselben vertieft sich die Haut zu der Fossa supra- und infraclavicularis. Wegen seiner oberflächlichen Lage kann man das Schlüsselbein bei mageren Individuen deutlich hervortreten sehen. Bei besser genährten ist dies weniger der Fall, trotzdem lässt es sich aber auch bei diesen ganz genau abtasten. Thut man dies, so erkennt man leicht seine einem liegenden, langgezogenen S vergleichbare Gestalt mit dem von oben nach unten spatelförmig plattgedrückten acromialen und dem mehr prismatisch angeschwollenen sternalen Ende. Bei Kindern, oft auch bei Frauen, ist es mehr gerade und in den Gelenkenden nicht so breit gebaut, ebenso links meist schwächer gebogen als rechts. Im Allgemeinen gilt die Regel, dass es eine um so stärkere Krümmung erhält, je mehr das betreffende Individuum resp. die betreffende Seite gearbeitet hat.

Für die Unterscheidung der verschiedenen Schlüsselbeinfracturen ist es von Wichtigkeit, dasselbe in ein äusseres, mittleres und inneres Drittel einzutheilen. Das äussere Drittel umfasst dasjenige Stück, an welches sich von oben der Cucullaris, von unten der Deltoides ansetzen. Es gehört vollständig der Schulter im engeren Sinne an und ist sowohl an dem Acromion als

an dem Proc. coracoideus des Schulterblattes durch starke Bänder befestigt. Das ungefähr cylindrisch gestaltete mittlere Drittel beginnt an der inneren Grenze des Lig. coraco-claviculare posticum, welches bei mageren Menschen äusserlich leicht durchzufühlen ist; es liegt vor dem ersten Intercostalraum und der 2. Rippe, ist bei nach vorn geschobener Schulter beinahe ganz zu umgreifen und dient zur Insertion des Lig. coraco-claviculare anticum, des Musc. subclavius und eines kleinen Theiles des Pectoralis major. Das innere Drittel endlich nimmt seinen Anfang an der Stelle, an der sich die Clavicula mit dem äusseren Rand der ersten Rippe kreuzt. Es steht mit dem Knorpel dieser Rippe durch das Lig. costo-claviculare in Verbindung und dient zur Insertion eines Theiles des Pectoralis major und der Clavicularportion des Kopfnickers.

Frequenz, Aetiologie und anatomische Charaktere der Schlüsselbeinbrüche.

Die Fracturen der Clavicula kommen ziemlich häufig vor. Sie betragen etwa 15—16% aller Kochenbrüche und betreffen ziemlich gleichmässig die rechte und linke Seite. Wenn sie auch im mittleren Lebensalter, in welchem die Arbeitskraft des Menschen am meisten beansprucht wird, sehr oft beobachtet werden, so ist ihre Zahl doch noch grösser in der ersten Jugend bis zum 10. Jahre. *P. Vogt* erklärt ihre Frequenz in diesem Alter durch den hohen Grad der Elasticität, welchen die obere Extremität durch ihre Epiphysenknorpel erhält, während die des Schlüsselbeins relativ früh verknöchern. Nach *Krönlein* entspricht die Schlüsselbeinfractur der Kinder der Schultergelenksluxation der Erwachsenen. Wie diese aber im höheren Alter an Häufigkeit zunimmt, muss die Frequenz der Clavicularfractur zu derselben Zeit abnehmen. Im Ganzen selten kommt die Verletzung intra uterum oder intra partum zu Stande. Während in der ersten Lebenszeit die Geschlechter gleich häufig betroffen sind, kommt im spätern Alter etwa nur ein Neuntel auf den weiblichen Theil der Bevölkerung.

Obwohl man annehmen sollte, dass die Clavicula wegen ihrer oberflächlichen Lage leicht von Gewalten getroffen werden könnte, so kommen doch directe Fracturen derselben, veranlasst durch einen Schuss, Schlag oder Fall, im Allgemeinen nicht häufig vor. Man findet solche zwar an allen Stellen des Schlüsselbeins, vorzugsweise jedoch an dem äusseren, durch seine Lage an der vorspringenden Schulter am meisten exponirten Drittel. Sie sind fast durchweg einfache, quere, selten Splitterbrüche.

Die überwiegend grössere Mehrzahl der Schlüsselbeinbrüche wird durch eine indirecte Gewalt hervorgerufen. Dabei wirkt diese auf das laterale Ende der Clavicula, sei es nun als Stoss auf die Schulter oder auf den Oberarm oder als Fall auf die Hand, wobei sich durch Feststellen des ausgestreckten Armes im Ellenbogen und Schultergelenk die Gewalt auf das Schulterblatt und das Schlüsselbein überträgt. Auch beim Heben schwerer Lasten, beim Zudrücken schwerer Thüren wird die Bewegung durch das Gewicht der Last, durch das Hindernis der schweren Thür plötzlich gehemmt, und es setzt sich die so entstehende Kraft durch den Oberarm in entgegengesetzter Richtung nach oben gegen den Oberarmkopf und gegen das Schlüsselbein fort. Gerade so wie bei einem Fall auf den Ellenbogen oder die Hand oder beim Stoss gegen die Schulter stemmt sich hierbei das mediale Ende der Clavicula an seiner Sternalverbindung an, und der schwach S-förmig gebogene Knochen bricht an seiner dünnsten Stelle, d. i. an der Grenze des mittleren und äusseren Drittels. Der Mechanismus der Fractur ist dabei derselbe wie bei einem gegen den Boden gestemmten Stab, den man durch Druck von oben nach unten über seine Elastitätsgrenze hinaus biegt. Derselbe bricht auch an seiner schwächsten und am meisten gebogenen Stelle.

Ziemliche Raritäten sind allein durch Muskelzug entstandene Clavicularfracturen. Zu ihrer Entstehung bei plötzlichen, ruckweisen Bewegungen mit dem Oberarm trägt wohl meist eine durch Syphilis, mercurielle Cachexie, Osteomalacie, Carcinom oder Scorbut bedingte Knochenbrüchigkeit viel bei. Peitschenhiebe, ein Schlag, der sein Ziel verfehlte, Aufschwingen auf das Pferd, Heben schwerer Lasten über den Kopf, Fortwerfen schwerer Gegenstände, Unachtsamkeit beim Häckselschneiden waren die Ursachen. Die Richtung der Infraction oder Fractur ist auch hier nahezu eine quere. Sie sitzt gewöhnlich im mittleren Drittel oder nahe dem sternalen Ende am Aussenrande des Sternocleidomastoideus. Bei ihrem Zustandekommen ist dieser letztere auch mit Vorliebe betheiligt, seltener der Pectoralis major oder Deltoides.

Einer besonderen Erklärung bedarf zuweilen die Entstehung einer Fractur beim Heben schwerer Lasten. Bei diesem Act werden beide im Ellenbogen flectirte Arme, da sie durch die Contraction des Brachialis internus und Biceps starr gehalten werden, die beiden Schultern und mit ihnen das äussere Ende des Schlüssel-

beins nach hinten und unten drängen. Das Schulterblatt weicht dabei über den Thorax nach hinten, während sich die Schultern und Schlüsselbeine senken müssen. Wird nun diese Senkung forcirt, so finden die Schlüsselbeine an der ersten Rippe einen Unterstützungspunkt, und der vor der Rippe gelegene Schlüsselbeintheil wird abgeknickt.

Doppelseitige Fracturen der Clavicula sind ungleich viel seltener als einseitige. Zwei Drittel aller ihrer Brüche betreffen das mittlere und die Grenze des mittleren und äusseren Drittels.

Was die anatomischen Charaktere der Schlüsselbeinfracturen betrifft, so kommen hier wieder vollständige und unvollständige, einfache und mehrfache, subcutane und complicirte Brüche vor, von denen die subcutanen vollständigen die häufigsten, die complicirten die seltensten sind.

Die **unvollständigen** Brüche, die Infractionen der Clavicula, kommen besonders häufig bei Kindern vor. Die Clavicula ist dabei an ihrer unteren und hinteren Fläche gebogen, während die oberen und vorderen Corticallamellen in querer Richtung gebrochen sind. Die Verletzung entsteht entweder nach Fall auf die Hand oder die Schulter. Nach derselben besteht eine Deformität, die sich, wenn auch öfters durch eine stärkere Schwellung der Weichtheile verdeckt, doch bei genauer Palpation als Krümmung oder winklige Knickung der Knochenachse nachweisen lässt. Die Kinder schreien beim An- und Auskleiden sowie beim Druck der die Clavicula abtastenden Finger auf die betreffende Stelle. Ueber dieser erscheint oft nach mehreren Tagen eine Sugillation und eine stärkere Schwellung, letztere herrührend von der beginnenden Callusbildung. Diese sichert dann die Diagnose, die vorher beim Fehlen der abnormen Beweglichkeit und Crepitation öfter auf einfache Verstauchung gestellt wurde. Die Reposition, welche durch directen Druck auf die Fracturstelle bei nach hinten gezogenen Schultern geschieht, gelingt auch bei frischen Infractionen oft nicht zur Zufriedenheit, indem sich die fracturirten Lamellen mit ihren Zähnen und Zacken fest verhaken können.


Die Details der **vollständigen** Brüche besprechen wir, um Wiederholungen zu vermeiden, lieber, indem wir die Fracturen jedes einzelnen Drittels besonders behandeln.


1. Die Brüche des mittleren Drittels oder an der Grenze des mittleren und äusseren Drittels werden vorzugsweise im

mittleren Lebensalter beobachtet. Die Richtung des Bruches ist zumeist eine schräge, zuweilen so sehr, dass die Bruchlinien eine Strecke weit in der Längsachse der Clavicula liegen. Im Allgemeinen verlaufen dieselben sonst von vorn, unten und aussen, nach hinten, oben und innen, selten umgekehrt. Verhältnissmässig oft fehlt jede Dislocation, so besonders bei den subperiostalen Querbrüchen der Kinder. Auch bei den schiefen Brüchen ist sie dann gering, wenn das Periost noch theilweise erhalten ist oder wenn die beiden Bruchflächen an einander eine Stütze gefunden haben. Sobald dieser Contact jedoch verloren und das Periost ganz zerrissen ist, findet eine Verschiebung der Fragmente statt. Dieselbe kann dann sogar eine ganz beträchtliche sein und erfolgt in der überaus grossen Mehrzahl der Fälle in typischer Weise.

Das innere sternale Stück des fracturirten Knochens wird nämlich nach oben, das äussere nach unten dislocirt, während sich zugleich die acromiale Bruchfläche unter die sternale schiebt und sich beide Bruchflächen so lagern, dass sie einen mit dem Scheitel nach oben und hinten gerichteten Winkel bilden (Taf. II). Es entsteht also eine Dislocatio ad latus, ad longitudinem cum abbreviatione und ad axin, die Bruchstücke reiten aufeinander und zwar das innere auf dem äussern. Das sternale Bruchstück tritt hierdurch dicht unter die Haut und kann hier durch Inspection und Palpation leicht erkannt werden. Diese typische Dislocation der Bruchenden wird bewirkt durch Muskelzug und durch die Schwere des Armes. Ersterer wird vorzugsweise an dem sternalen Rande zur Geltung kommen, indem der Sternocleidomastoideus, weniger allerdings durch seine contractile als seine elastische Eigenschaft, dasselbe nach geschehener Fractur nach oben eleviren wird. Dieser Zug nach oben wird dann noch unterstützt durch die Wirkung des Lig. interclaviculare, welches in gleicher Weise infolge der ihm innewohnenden Elasticität sich nach oben auszubreiten bestrebt ist (*Linhart*). An dem äusseren Fragment kommt wohl theilweise die elastische Retraction des Deltoides zur Geltung. Von grösserer Bedeutung ist jedoch hier die Schwere des Armes. Mit dem Bruch der Clavicula verliert der Schultergürtel seinen Strebepfeiler, welcher ihn im normalen Abstand von der Brustwand hält. Er wird daher sammt dem äusseren Bruchstücke dieses Pfeilers der Last des Armes anheimfallen und durch das Gewicht desselben

Taf. 2.






Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

nach unten gezogen werden. Gleichzeitig wird aber auf den Oberarm und damit auch auf das äussere Fragment der Zug der Adductoren und Innenrotatoren des Oberarmes vorzüglich des Pectoralis major und minor, vielleicht auch des Subclavius und Latissimus dorsi voll einwirken können und dadurch die Verkürzung des Schlüsselbeines und eine Innenrotation des Armes resultiren.

Auffällig könnte es bei dieser Verschiebung sein, dass der Plexus brachialis meist keinen Druck erfährt. Er liegt indessen der ersten Rippe so genau an, dass zwischen ihm und dem herabsinkenden Bruchstück immer noch Raum genug bleibt. In ähnlicher Weise sind durch ihre Lage die Art. und Ven. subclavia vor Verletzungen geschützt. Nur bei Schussfracturen werden sie zuweilen betroffen.

Sehr selten nur tritt bei diesen typischen Brüchen im mittleren Drittel eine Lageabweichung der Fragmente in der Weise ein, dass das Acromialende höher steht. Die oben beschriebene Dislocation kann jedoch sehr hochgradig werden, so dass die Dislocatio ad axin und ad longitudinem selbst zu einer Y-Form des fracturirten Knochens führen können (Fig. 71).

Fig. 71.



Mehrfache Brüche, d. h. Doppelbrüche, sind im Ganzen selten, doch beobachtet man zuweilen das Herausbrechen eines kleinen Stückes aus der Mitte, wobei sich dieses vollständig herumdrehen und sich mit seiner Längsachse senkrecht zu der des Schlüsselbeines stellen kann.

Die **Symptome** dieser Fracturen sind durchaus charakteristische. Besteht keine oder nur eine geringe Dislocation, so leitet die Feststellung der Gewalteinwirkung schon meist auf die Fractur hin. Als werthvolles Zeichen derselben findet sich dann über der Bruchstelle ein heftiger, auf ein enges Gebiet begrenzter Schmerz. Derselbe wird bei Bewegung des Armes, bei Druck auf die Fracturstelle selbst, ebenso wie auf einen entfernteren Punkt der Clavicula stets auf die gleiche Stelle localisirt und gesteigert. In früheren Zeiten hielt man eine Functionsstörung in der Weise für charakteristisch, dass die Patienten die Hand der kranken Seite nicht auf den Kopf zu legen vermochten. Dieses Symptom tritt jedoch nur darum ein,

weil die Kranken bei den Bewegungen Schmerzen empfinden. Hat man es mit kräftigen, willensstarken Menschen zu thun, die diesen Schmerz überwinden, so erheben dieselben auf eine dahin gerichtete Aufforderung unmittelbar nach der Fractur den Arm bis über den Kopf.

Ist die Dislocation stärker, dann vermeiden allerdings die Verletzten jede Bewegung und stützen mit dem gesunden Arm den im Ellenbogengelenk gebeugten kranken, um der Schulter das Gewicht abzunehmen. So kommen die Patienten zum Arzt. Lässt man dieselben sich dann völlig entkleiden und sie in einiger Entfernung vor sich hintreten, so constatirt man Folgendes (Tafel II): Der Kopf ist nach der kranken Seite geneigt, um den Sternocleidomastoideus zu entspannen. Die Schulterwölbung der kranken Seite hat ihre normale Contour verloren, sie erscheint flacher und nach unten, innen und vorn gesunken. Der Arm ist nach innen rotirt und das Acromion deutlich der Mittellinie genähert, die Entfernung der Schulter vom Jugulum also geringer wie auf der gesunden Seite. Ueber der Fracturstelle sieht man entweder nur eine Blutunterlaufung, oder man erkennt auch schon durch die einfache Inspection die charakteristische Verstellung, indem das sternale Bruchende die Haut hervorwölbt. Lässt man nun den Patienten sich herumdrehen, so erkennt man, wie der mediale Rand des Schulterblattes auf der kranken Seite weiter von den Proc. spinosi entfernt ist als auf der gesunden, und constatirt ebenfalls auf jener eine scheinbare Verlängerung des Armes.

Geht man jetzt zur Palpation über, um sich vollständig klar zu werden über das Wesen der Verletzung, so tastet man die Clavicula mit dem einen Zeigefinger vom Sternal-, mit dem andern vom Acromialende her ab, kommt so auf die schmerzhafte Fracturstelle, überzeugt sich, indem man die beiden Bruchenden gegen einander zu verschieben sucht, von der bestehenden Deformität und wird dabei regelmässig auch abnorme Beweglichkeit und Crepitation nachweisen können.

2. Brüche im äusseren Drittel sind in der Regel auch schiefe und entstehen durch directe Gewalt. Die Verschiebung der Fragmente ist hier nicht so typisch. Liegt die Fractur im Bereiche des Lig. coracoclaviculare und noch dazu zwischen den dasselbe constituirenden Lig. trapezoides und conoideum, so ist in der

Regel keine Dislocation vorhanden, wenn diese Bänder intact sind (Fig. 72). Auch bei nur theilweiser Verletzung derselben können sich der Deltoides und Cucullaris das Gleichgewicht halten. Sind sie dagegen vollständig zerrissen, dann pflegt sich eine bedeutende Dislocation einzustellen, und zwar ist sie dann gleich jener, wie sie stattfindet, wenn die Clavicula nach aussen von dem Lig. coraco-claviculare gebrochen wird. An diesem etwa 3 cm langen Stück pflegt sie nämlich so einzutreten, dass das äussere Fragment sich aufrichtet, so dass seine Bruchfläche auf dem Vorderrande des medialen Knochenstückes reitet und beide Fragmente in einem rechten Winkel zu einander stehen (Fig. 73). Diese Dislocation entsteht einerseits durch den Zug des M. trapezius und der von der Brust zum Arm verlaufenden Muskeln, andererseits in Folge einer Achsendrehung, welche das Schulterblatt erleidet, indem es sich mit seinem unteren Winkel nach vorne dreht. Selten sinkt das Fragment durch die Schwere des Armes nach abwärts (Fig. 74).

Fig. 72.




Fig. 73.





Fig. 74.




Ist die erstere Dislocationsform auch nur theilweise ausgeprägt, so sind die Symptome so prägnant, dass die Diagnose der Fractur leicht zu stellen ist, zumal die Stellung des Armes, der Schulter und des Schulterblattes dieselbe

ist wie bei den Fracturen im mittleren Drittel. Die Schulter ist also nach unten, innen und vorne gesunken und die Entfernung derselben vom Jugulum verringert. Schwieriger wird die Erkenntniss des Bruches bei fehlender Dislocation. Abgesehen von den subjectiven Symptomen — spontanem Schmerz und Functionsstörungen — sind dann die wesentlichsten Erscheinungen eine Sugillation und Anschwellung über dem verletzten Theile, Schmerzen, die bei Druck auf diesen sowohl wie auf eine entferntere Knochenstelle stets auf den nämlichen Punkt localisirt werden, und der Nachweis einer Crepitation beim Erheben des Armes, sowie beim Versuch, die beiden Fragmente mittelst Fingerdruckes in entgegengesetzter Richtung zu verschieben.

Sitzt die Fractur sehr nahe am Schultergelenk, so kann das sternale Fracturende eine supra-acromiale Luxation der Clavicula vortäuschen. Die richtige Diagnose wird dann gestellt durch die rauhe Beschaffenheit des Fracturendes im Gegensatz zur glatten des luxirten, durch die heftige Schmerzhaftigkeit an der Bruchstelle bei directer und indirecter Palpation, durch die geringere Entfernung des Acromions vom Jugularrande des Sternums und vor Allem durch die Crepitation, welche beim Heben und Senken der Schulter entsteht.

Fig. 75.



3. Die Brüche im inneren Drittel sind die seltensten an der Clavicula. Sie können wohl durch indirecte Gewalteinwirkung entstehen, haben jedoch ihre Ursache häufiger in einer activen Contraction des sich perpendiculär an die Clavicula ansetzenden

Musculus cleidomastoideus. Die Bruchlinien verlaufen quer oder schräg oder umgrenzen gar mehrere Splitter. Im letzteren Falle können sich Fissuren bis in das Gelenk hinein fortsetzen. Eine Dislocation besteht meist nicht (Fig. 75). Sie ist nur dann möglich, wenn das Periost, die Muskeln und das Lig. costoclaviculare eingerissen sind und keine Verzahnung der Bruchflächen besteht. Wenn sie vorhanden ist, so bleibt das sternale Fragment in situ oder weicht auch nach unten und hinten ab, während das äussere Ende, der Schwere der heruntersinkenden Schulter folgend, nach aufwärts verschoben wird. War die Fractur durch Muskelzug entstanden, so findet man im Muskel infolge des Blutergusses eine ziemlich harte, längs desselben verlaufende Geschwulst, über der die Haut normal ist und die bei Druck mit Schmerzhaftigkeit reagirt. Auch hier ist wieder für den Bruch ohne Dislocation der Schmerz bei directer und indirecter Palpation pathognomonisch, wenn Crepitation und abnorme Beweglichkeit fehlen. Sitzt die Fractur nahe dem Gelenk, so muss die Differentialdiagnose gestellt werden zwischen dieser und einer incompleten Luxation der Clavicula nach vorn und oben. Hier hilft uns die genaue Palpation, indem man bei der Luxation nachweist, dass die Anschwellung direct dem Gelenkende angehört, während dieselbe bei der Fractur vom Gelenke getrennt ist und sich noch in den Cleidomastoideus fortsetzt. Bei der Luxation fühlt man das leere Gelenk und eine gleiche Länge beider Claviculae, bei der Fractur ist dagegen das Gelenk ausgefüllt und das gebrochene Schlüsselbein kürzer als das gesunde. Wenn sich nach einigen Tagen über der verletzten Stelle eine Sugillation und die beginnende Callusbildung erkennen lässt, ist die Diagnose natürlich sicher. Bei allen Manipulationen an dieser Stelle kommt uns die leichte Palpationsfähigkeit des nach vorne gerichteten Bogens der Clavicula sehr zu Statten.

Prognose der Schlüsselbeinbrüche.

Die Prognose aller Fracturen des Schlüsselbeins ist in Bezug auf die Heilung eine sehr günstige, denn dieselbe erfolgt bei Kindern in 15—20, bei Erwachsenen in 20—40 Tagen. Schlechter ist es mit der Ausgleichung der Deformität bestellt, da es oft nicht gelingt, dieselbe vollständig zu beseitigen. Glücklicherweise verursacht jedoch eine solche deforme Heilung selten Functionsstör-

ungen. Ganz ausnahmsweise kommt es zur Pseudarthrosenbildung — nach *H. Lossen*'s Statistik sind deren in der Litteratur nur 25 beschrieben —, ebenso selten zu Lähmungen des Plexus brachialis durch einen Callus luxurians. Eine Atrophie der Armmuskeln, Starrheit in den Gelenken des Armes, zuweilen auch neuralgische Schmerzen bleiben, wie nach allen Fracturen, so auch hier zurück, weichen indess rasch der geeigneten Behandlung. Verhängnissvoll für die Funktion der Clavicula kann bei Brüchen im Bereich des Lig. coracoclaviculare eine Osteophytenbildung werden, die zur Verwachsung der Bruchstelle mit dem Proc. coracoideus oder dem oberen Rande der Scapula, ja sogar mit der ersten Rippe führt. Die Function wird natürlich weniger leiden, wenn sich ein künstliches Gelenk in den betreffenden Knochenspangen bildet.

Therapie der Schlüsselbeinbrüche.

Die Behandlung der Clavicularfracturen ist eine sehr einfache, wenn keine Dislocation besteht. Dann genügt eine Mitella zur Stütze des Armes, um die Heilung ohne Störung eintreten zu lassen. Schwierig wird dagegen die Behandlung, wenn die Dislocation in typischer Weise erfolgt ist. Es handelt sich in solchem Falle darum, die nach vorn, unten und innen gesunkene Schulter nach hinten, oben und aussen zu drängen und in dieser Stellung fixirt zu erhalten. Die Reposition geschieht nun ziemlich leicht entweder in der Weise, dass man sich hinter den Patienten stellt, dessen Schulter mit beiden flach aufgelegten Händen hebt und nach hinten zieht, indem man eventuell noch das Knie in seinen Rücken stemmt, oder dass man denselben über ein zwischen seine Schultern gelegtes Rollkissen lagert. Sobald man jedoch mit diesen Repositionsmanövern nachlässt, ist es auch mit der Coaptation der Fragmente vorbei. Man ist nicht im Stande, die äusserst bewegliche und relativ schwere obere Extremität, welche durch ihr Gewicht die Schulter in die falsche Stellung herunterzieht, in der mitgetheilten normalen Lage zu erhalten. Der Thorax aber, an welchem man die obere Extremität fixiren könnte, verändert selbst bei der Respiration seinen Umfang und darf andererseits nicht zu sehr eingeschnürt werden, wenn keine Athmungsbehinderung entstehen soll.

Es hat sich nun eine grosse Reihe von Chirurgen bemüht, trotz der angegebenen Schwierigkeiten die Retention zu bewirken. *Gurlt* hat sich die Mühe gegeben, alle diese Verbandmethoden zusammenzustellen, und hat dabei nicht weniger als 70 derselben be-

schrieben gefunden. Wir wollen uns nicht mit allen diesen Verbandarten, selbst nicht mit dem gefürchteten *Desault*'schen und *Velpeau*'schen Verband aufhalten, da diese ihren Zweck nicht erfüllen und daher nur historisches Interesse besitzen. Wir wollen vielmehr nur die Mittel besprechen, welche in rationeller Weise wirken.

Fig. 76.





Fig. 77.



Die Pessimisten in der Therapie, die sich sagen, dass trotz aller ihrer Mühe doch eine Dislocation bestehen bleibt, dass diese aber nicht für die Function des Schlüsselbeins hinderlich ist, begnügen sich mit der einfachen Mitella, indem sie vielleicht nebenbei noch einen stärkeren Wattebausch in die Achselhöhle einlegen. Wenn man die Mitella mit Verständniss anlegt, so kommt man mit derselben oft auch allein zum Ziele. Wenn sie nur die Schwere des Armes zu übernehmen hat, so legt man die Breitseite an die Hand, den Zipfel an den Ellenbogen, das ist die gewöhnliche Anwendungsweise (Fig. 76). Soll sie jedoch den Ellenbogen heben, so muss die Breitseite an den Ellenbogen, der Zipfel an das Handgelenk angelegt werden. Dann lässt sich der Zipfel noch umschlagen, so dass das Tuch eine Rinne für den mit der Hand nach der gesunden Schulter gerichteten Vorder-


arm bildet (Fig. 77). Diese Stellung des Armes der gebrochenen Seite mit der Hand auf der gesunden Schulter nennt man gewöhnlich die *Velpeau*'sche. *Pirogoff* erreichte die Fixation in dieser Stellung bei Kindern, die gern aus der Mitella herausschlüpfen, in zweckmässiger Weise dadurch, dass er denselben eine eng anliegende Jacke anziehen und dann den Aermel, in dem der Arm der verletzten Seite steckte, an den Brusttheil der Jacke annähen liess.

Ein sehr zweckmässiger Ersatz der Mitella ist von *Moore* angegeben worden (Fig. 78 u. 79). Ein 6 Fuss langes und 8 Zoll

Fig. 78.



Fig. 79.




breites, kravattenförmiges Tuch wird gerade auf seiner Hälfte unter den Ellenbogen angelegt und von da über dessen Rückseite nach vorn über die Schulter und von dort über den Rücken in die Achsel der gesunden Seite geführt. Das andere Ende verläuft über die Vorderfläche des Ellenbogens und über den Rücken um hier mit dem von der anderen Schulter zurückkommenden Antheil vereinigt zu werden. Eine Mitella drängt den Vorderarm leicht in die Höhe.

Der Verband, der heutzutage wohl am meisten angewendet wird, ist der *Sayre*'sche Pflasterverband (Fig. 80). Derselbe wird angelegt mit drei langen, 2—3 Finger breiten Heftpflasterstreifen. Man legt den ersten, von der Mitte der inneren Seite des kranken Oberarmes beginnend, spiralig nach hinten und oben über die

äussere Fläche des Oberarmes unter der Schulter weg über den Rücken und unter der Achsel der gesunden Seite bis zur Mamma. Diese Tour hebt die Schulter und zieht sie mit Kraft nach hinten. Der zweite Streifen hat ebenfalls die Aufgabe des Schulterhebens; er geht von der gesunden Schulter schief über die Brust unterhalb des rechtwinklig gebogenen Ellenbogens der kranken Seite und von da zurück schief über den Rücken nach der Anfangsstelle an der gesunden Schulter. Der dritte Streifen wird mit seinem Anfang direct auf die Fracturstelle aufgeklebt, läuft dann an der Vorderfläche des Thorax herunter und wird mit seinem Ende wieder auf der Fracturstelle befestigt. Er dient als Tragband für die Hand, übt aber vor allem einen directen Druck auf die Fragmente aus. Der Verband ist practisch, man erreicht mit ihm jedoch auch keine idealen Resultate.

Fig. 80.




Der *Sayre*'sche Heftpflasterverband ist von *Schönborn* und *Landerer* modificirt worden. *Schönborn* braucht nur 2 Heftpflasterstreifen. Den ersten legt er wie *Sayre* an, nur klebt er den Streifen nicht an der Haut an, sondern befestigt das um den Arm in Form einer Schleife herumgeschlungene Ende mit einer Stecknadel. Der Arm erhält dann die *Velpeau*'sche Lage. Der zweite Streifen wird nun analog dem *Velpeau*'schen Verbande an dem Radialrande des Vorderarmes dicht unterhalb des Ellenbogengelenkes angeklebt, um den Ellenbogen, wie die *Velpeau*'sche Schlinge, mit Vermeidung des Epicondylus internus herumgeführt und auf der gesunden Schulter angeklebt. Der Handrücken und die Vola der auf der Schulter aufruhenden Hand müssen gut mit Watte gepolstert sein.

Landerer legte den Angriffspunkt des 1. Streifens nicht an den Oberarm, sondern an die kranke Schulter selbst. Der erste Streifen besteht nach *Landerer* aus 3 Theilen, einem ungefähr handgrossen, vom Rande her fächerförmig gespaltenen Stück Heftpflaster, einem an dieses angenähten, 20—30 cm langen Streifen elastischen Gurtes und einem wiederum an diesen angenähten, 60 bis 80 cm langen und 5—6 cm breiten Heftpflasterstreifen (Fig 81). Dieser so zusammengesetzte Streifen wird nun, nachdem ein fest zusammengedrehter Wattekeil in die Achsel gelegt worden ist, mit

seinem handförmigen Ende unmittelbar auf die Schlüsselbeingegend aufgeklebt, jedoch so, dass das Fragment von jeder Zugwirkung frei bleibt. Der Streifen wird dann über die Schulterhöhe weggeführt, kräftig angezogen und wie der erste *Sayre*'sche Streifen nach der Vorderfläche der Brust geleitet. (Fig. 82). Darüber kommt


Fig. 81.



dann der zweite *Sayre*'sche Streifen, wie in Fig. 80 und dann ein diesen fixirender Bindenverband.

In anderer Weise hat kürzlich *Goeschel* einen ebenfalls leicht anzulegenden, zweckmässigen Verband angegeben. Es wird der Arm der verletzten Seite rechtwinklig im Ellenbogengelenk gebogen und in dieser Stellung durch einen Gypsverband fixirt. In die Achselhöhle wird ein Wattekissen eingeschoben und über demselben der Oberarm durch Bindentouren am Thorax befestigt. Nun wird ein daumendicker Gummischlauch, dessen eines Ende zu einer Schlinge geknüpft ist, mit dieser Schlinge um den Vorderarm in der Nähe des Ellenbogens ebenfalls mit Binden befestigt und derselbe dann über die Fracturstelle, auf die ein Wattebausch kommt, und von hier über die Schulter hinweg über den Rücken zum Oberschenkel der gesunden Seite geführt, nach genügender Anspannung um Hüfte und Perineum geschlungen und hier aussen und hinten geknüpft. Der elastische Zug hebt dauernd und kräftig die Schulter, und der Druck des Gummischlauchs hält die emporstehenden Bruchenden sehr sicher in richtiger Lage. Dieser Verband ist bequem und in allen Körperstellungen wirksam.

Fig. 82.



Einen weiteren recht praktischen und deshalb sehr zu empfehlenden Verband hat *v. Büngner* angegeben. Derselbe ist einfach anzulegen, hält die reponirten Fragmente genau in ihrer richtigen Lage und hat den Vortheil, dass er den Arm der kranken Seite nicht am Thorax fixirt. Der Verband wird vermittelst einer **T**-Binde (Fig. 83) in folgender Weise angelegt. Das Querstück der Binde wird um die gesunde Schulter gelegt und hier mittelst einer Schnalle befestigt. Der mittlere und ein seitlicher Längsstreifen (Fig. 84) liegen an der Hinterseite der gesunden Schulter, der andere seitliche Längsstreifen (Fig. 85) auf der Höhe der letzteren, alle der kranken Seite zugewendet. Man ergreift nun zunächst den Mittelstreifen, führt ihn über den Rücken weg durch die Achselhöhle um den oberen Theil des Oberarmes der kranken Seite herum, und darauf zum Ausgangspunkt zurück. Hier wird das Bindenende angesteckt. Auf diese Weise wird der kranke Arm direct nach hinten gezogen. Darauf wird der untere Streifen ebenfalls über den Rücken weg und in gleicher Richtung um den Oberarm der kranken Seite herumgeführt, aber so, dass er den untersten Theil desselben umgreift und um den Ellenbogen gewunden wird, um dann ebenfalls zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Auf diese Weise wird der kranke Arm theils wieder nach hinten gezogen, theils angehoben (Fig. 84). Der obere und letzte Streifen endlich (Fig. 85) geht als Mitellatour nach vorn, unterstützt das Handgelenk und geht darauf, die Bruchfragmente niederdrückend, über die Fracturstelle und die verletzte

Fig. 83.




Fig. 84.





Fig. 85.



Schulter hinweg an die Rückseite der letzteren, um hier an den beiden ersten Schleifen befestigt zu werden. Dadurch werden diese letzteren so sicher in ihrer Lage fixirt, dass sie sich in keiner Weise verschieben können.

Mit den bisher beschriebenen Verbänden können die Patienten umhergehen. Es ist nun aber auch vielfach empfohlen worden, die Fractur in der Bettlage zu behandeln. In der That kann man dadurch, dass man den Kranken auf eine feste Matratze und ein zwischen die Schulterblätter geschobenes Rollkissen legt, die verletzte Schulter durch ihre eigene Schwere nach rückwärts bringen und kann die Coaptation der Fragmente dann noch dadurch unterstützen, dass man dem Arm die *Velpeau*'sche Lage gibt. Die Bettlage gewährt den Vortheil, dassdieFragmenteingrösserer Ruhe verharren. Trotz dieses Vortheiles sind die Resultate bei dieser Behandlung doch nicht so viel besser, dass man die Patienten zu der Ruhelage verurtheilen soll. Wir möchten sie nur empfehlen für Doppelbrüche der Clavicula und für solche Fälle, in denen der Patient wegen anderer gleichzeitiger Verletzungen so wie so zu Bett liegen muss. Kommt es darauf an — bei jungen Mädchen — die Dislocation möglichst vollständig auszugleichen, und sind die Patienten mit der Bettlage einverstanden, so kann man nach *Bardenheuer* auch an der Clavicula die permanente Extension mittelst Heftpflasterstreifen anwenden. Die Extension wird dabei direct am Oberarm angebracht und der Zug nach aussen, oben und hinten geleitet, der Oberarm selbst aber mittelst Heftpflasterzirkeltouren in der Gegend des Ellenbogengelenkes an den Körper fixirt

Fig. 86.



und gleichzeitig an eine Latte des Bettrandes der anderen Seite befestigt, damit der Körper nicht dem Gewichtszuge folge.

Bei dieser Art der Extension müssen die Patienten, wie gesagt, im Bette liegen bleiben. Dadurch verliert die Extensionsbehandlung aber an Brauchbarkeit, da die Bettlage vielfache Unbequemlichkeiten im Gefolge hat. Man muss daher *Bardenheuer* grossen Dank wissen, dass er mit vieler Umsicht eine Extensionsschiene construirt hat, welche die unbestrittenen Vortheile der Extension bequem und sicher verschafft und trotzdem eine ambulante Behandlung gestattet. Da diese Extensionsschiene für alle übrigen Fracturen der oberen Extremitäten und für die Luxationen der Clavicula *Bardenheuer* und anderen Chirurgen ausgezeichnete Resultate geliefert hat und daher eine grössere Verbreitung unter den Aerzten verdient, wollen wir hier energisch auf sie aufmerksam machen. Fig. 86 zeigt die angelegte Schiene. Ausserdem sei aber dringend das Studium von *Bardenheuer*'s Leitfaden der Behandlung von Fracturen und Luxationen der Extremitäten mittelst Feder- resp. Gewichtsextension empfohlen, da die Leser aus demselben neben den vorzüglichen Resultaten *Bardenheuer*'s ganz detaillirte Schilderungen der Anwendungsweise der Schienen für jede einzelne Fractur und Luxation und namentlich auch das durchaus zu billigende Verfahren *Bardenheuer*'s bei der Nachbehandlung der Fracturen und Luxationen erkennen werden.

Schliesslich müssen wir noch erwähnen, dass mit der Aseptik vollständig vertraute Chirurgen, wie *Dawson*, *Langenbuch* und *Bardenheuer*, bei starker Dislocation der Fragmente dieselben durch eine Incision blossgelegt und nach Reposition durch die directe Knochennaht mit Silberdraht in der richtigen Stellung fixirt haben. Es erscheint uns dies Verfahren das für complicirte Fracturen geeignete zu sein.

In späterer Zeit kann ein operatives Verfahren nothwendig werden, wenn ein hypertrophischer Callus durch Druck auf den Plexus brachialis Neuralgieen oder Lähmungen verursacht oder wenn Pseudarthrosen bestehen bleiben. Im ersteren Falle wird man dann unter aseptischen Cauteln die Resection des Callus, im zweiten die Anfrischung der Fragmente und Vernähung derselben vornehmen.

Luxationen der Clavicula.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Die Clavicula ist mit dem Brustbein durch die Articulatio sternoclavicularis, mit dem Schulterblatt durch die Articulatio acromioclavicularis verbunden.

Im Sternoclaviculargelenk sind die Gelenkflächen der beiden mit einander verbundenen Knochen nicht congruent. Die Gelenkgrube des Manubrium sterni ist nämlich eine nach aussen und rückwärts gerichtete, seichte Höhlung, während das Sternalende der Clavicula eine unregelmässig dreiseitige Gelenkfläche besitzt, Die Congruenz beider Gelenktheile wird erst vermittelt durch eine keilförmige Zwischenknorpelscheibe (Meniscus), welche wesentlich an dem hinteren Theile der clavicularen Gelenkfläche adhärirt und dieser auch bei allen Bewegungen folgt. Dieser Zwischenknorpel, den man von aussen kaum fühlen kann, trennt die kleine Gelenkhöhle in zwei nicht mit einander communicirende spaltförmige Abtheilungen, deren eine der Clavicula, deren andere dem Manubrium sterni zugewendet ist. Die Synovialkapsel dieser Gelenke zieht sich von dem Gelenk zwischen Meniscus und Clavicula noch gegen das Lig. costoclaviculare hin. Das ganze Sternoclaviculargelenk wird von sehr starken, festen Bandmassen (Lig. fibrosum posticum et anticum) vorne und hinten umgeben, während sich oben das kräftige Lig. interclaviculare zwischen beiden Sternalenden der Claviculae über den oberen Rand des Brustbeines hinweg-spannt und ausserdem noch mit der Zwischenknorpelscheibe zusammenhängt. Zur Festigung des Gelenkes trägt zweifellos auch das breite Lig. costoclaviculare bei, welches sich dicht nach aussen von der Gelenkkapsel zwischen der Clavicula und dem Knorpel der ersten Rippe ausspannt.

Die Bewegungen des Schlüsselbeines gehen nun hier in der Weise vor sich, dass in dem clavicularen Gelenktheile eine Drehung um eine von vorn nach hinten gehende Achse geschieht. Dieses Gelenk vermittelt also Hebung und Senkung der Clavicula. In dem sternalen Gelenktheile werden dagegen vermöge der Elasticität des Faserknorpels und dessen Verschiebbarkeit am Brustbein freie Bewegungen um senkrechte und quere Achsen, also nach vor- und rückwärts ermöglicht. Die Senkung des Armes und des Schlüsselbeines wird gehemmt, sobald sich der Körper des letzteren

auf der ersten Rippe anstemmt, ferner durch das Lig. interclaviculare und die unten an der ersten Rippe, oben am Schlüsselbeinende fixirte Bandscheibe. Die Hemmung der Bewegungen nach hinten geschieht durch das Lig. interclaviculare und sternoclaviculare anticum, die nach vorn durch das Lig. fibrosum posticum. Da das Gelenk durch den Knorpel der ersten Rippe gewissermassen vervollständigt wird, so ist eine Verrenkung nach unten nicht denkbar, ohne dass dieser gebrochen ist. Luxationen können demnach nur nach den drei anderen Seiten hin, also nach vorn, hinten und oben entstehen.

Im Acromioclaviculargelenk stehen Clavicula und Scapula durch fast plane, elliptische Gelenkflächen in Verbindung. Selten ist zwischen beiden noch ein Meniscus eingeschoben. Aeusserlich sind beide Knochen durch ein festes, sehniges Gewebe mit einander verbunden, welches besonders auf ihrer oberen Fläche stark entwickelt ist und nur geringe Bewegungen des Gelenkes, Vergrösserung oder Verkleinerung der Winkelstellung zwischen Clavicula und Scapula gestattet. An der oberen und unteren Seite des Gelenkes verstärken dasselbe ausserdem noch die Lig. acromioclavicularia sup. et inf. Das Acromialende der Clavicula ist bei Männern zuweilen ein wenig nach aufwärts gebogen, so dass es mit einem kleinen Höcker über das Gelenk emporragt. Nach Zerreissung der bekannten Befestigungsmittel kann eine Luxation der Clavicula nach oben über das Acromion oder nach unten unter dieses oder nach rückwärts erfolgen.

Frequenz und Eintheilung der Schlüsselbeinluxationen.

Trotz der vielen Gewalten, welche die Clavicula zu pariren hat, sind Luxationen derselben doch sehr selten. Es rührt dies einmal her von der festen Verbindung, welche sie mit den anschliessenden Knochen eingeht, und zweitens von der Configuration des relativ spröden Knochens, der durch seine verschiedenen Krümmungen viel eher zum Zerbrechen neigt. So steht die Frequenzzahl der Fractur mit 16 % der der Luxation mit etwa 1,5 % entgegen, wobei noch zu bedenken ist, dass Verrenkungen überhaupt ungleich seltenere Verletzungen sind als Brüche. Von den beiden Gelenkenden luxirt noch am häufigsten das acromiale.

Die Clavicularluxationen sind nach *Malgaigne* vollkommene und unvollkommene. Die unvollständigen, bei denen die Bänder nur zum Theil zerstört sind, kommen besonders als pathologische Luxationen des Sternoclaviculargelenkes vor, wie z. B. bei tuberculösen Entzündungen desselben oder bei hochgradiger Scoliose.

In der Regel sind die Kapsel, der Bandapparat und die nächstliegenden Muskelansätze ganz zerrissen. Die Luxation ist dann eine vollständige.

Fügen wir noch hinzu, dass in seltenen Fällen die Clavicula an beiden Enden luxirt sein kann, so ergibt sich nachfolgende Eintheilung der Clavicularluxationen.

1. am sternalen Ende:

a) Luxationen nach vorn, Luxatio praesternalis,
b) Luxationen nach oben, Luxatio suprasternalis,
c) Luxationen nach hinten, Luxatio retrosternalis;

2. am acromialen Ende:

a) Luxationen nach oben, Luxatio supraacromialis claviculae oder Luxatio infraclavicularis scapulae,
b) Luxationen nach unten, Luxatio infraacromialis claviculae oder Luxatio supraclavicularis scapulae,
c) Luxationen nach rückwärts, Luxatio claviculae supraspinata.

3. Luxationen an beiden Enden zugleich, Doppelluxationen der Clavicula.

I. Luxationen am sternalen Ende.


a) Die Luxation nach vorn, Luxatio praesternalis, kommt am häufigsten von allen Luxationen des Sternalendes zur Beobachtung und befällt mit Vorliebe das mittlere Alter (Fig. 87). Relativ oft findet sich als Complication eine Fractur des Acromion, des Proc. coracoideus oder der Rippen.

Der Kopf der Clavicula wird jedesmal gegen die vordere Kapselwand angestemmt, wenn die Schulter nach hinten gedrängt wird. Soll eine Luxation entstehen, so muss die Kapsel an ihrem vorderen Umfange nachgeben. Die Luxation setzt also eine forcirte Bewegung der Schulter nach hinten zu ihrer Entstehung voraus.

Als solche Gelegenheitsursachen, welche das Acromialende der Clavicula direct von vorne nach hinten drängen, sind zu nennen: ein Fall auf die Vorderfläche der Schulter; Ueberfahrenwerden, während das Rückgrat unterstützt ist und die Schulter selbst hohl liegt; das Zurückdrängen der Schulter über ein in den Rücken gestemmtes Knie; das Tragen schwerer Lasten auf dem Rücken, besonders wenn die ihnen zur Stütze dienenden und über die Schultern laufenden Riemen plötzlich abgleiten.

Die Gewalt, welche die Schulter nach hinten drängt, kann derselben weiterhin auch auf indirectem Wege übermittelt

Fig. 87.



werden, so z. B. durch einen Fall auf die nach vorn ausgestreckte Hand. Seltener besteht sie in einer einfachen activen Muskelkontraktion. Durch diese sah man schon Luxationen entstehen bei militärischen Uebungen, bei denen die Schulter stark nach hinten geworfen wurde, oder beim Fortschleudern schwerer Gegenstände durch die starke Rückwärtsbewegung des Armes.


Ueber den Mechanismus der Luxation stehen sich zwei Ansichten entgegen. Bis auf die neueste Zeit glaubte man an eine Hebelwirkung. Wenn nämlich die Schulter stark nach hinten gedrängt wird, so sollte die Clavicula entweder an dem hinteren Theile der Incisura clavicularis sterni (*Morel-Lavallée*) oder an der ersten Rippe (*Boyer, Cooper*) ein Hypomochlion finden. Im ersteren Falle würde dann bei einer Uebertreibung dieser Bewegung das Köpfchen der Clavicula als die Last eines einarmigen Hebels, im zweiten als die eines zweiarmigen gegen die Kapsel drängen, bis

dieselbe zerreisst. Das aus der Kapsel ausgetretene Köpfchen würde aber weiterhin noch durch die elastische Wirkung des Pectoralis major nach innen gedrängt werden.

Dieser Theorie ist vor Kurzem *Stetter* entgegengetreten. Nach ihm ist die Luxatio praesternalis eine s e c u n d ä r e Stellung, die p r i m ä r e dagegen eine Luxation n a c h o b e n. Ein Hypomochlion soll sich aus anatomischen und mechanischen Gründen auf der ersten Rippe nur dann bilden können, wenn die Schulter nicht nur direct nach hinten gedrängt wird, sondern wenn gleichzeitig v o n o b e n h e r eine Gewalt das acromiale Ende der Clavicula in der Richtung von oben nach unten trifft. Findet aber dann die Mitte des Schlüsselbeines auf der ersten Rippe einen Unterstützungspunkt, so wird sein Köpfchen gegen die o b e r e Kapselwand angedrängt werden müssen und diese bei Einwirkung weiterer Gewalt h i e r o b e n zerreissen.

Die **Symptome** der L u x a t i o p r a e s t e r n a l i s sind unverkennbar (Fig. 88). Subjectiv klagt der Patient über einen h e f t i g e n l o c a l e n S c h m e r z. Er hält den K o p f gegen die l u x i r t e S e i t e hin g e n e i g t, um die zeitweise eintretende Einklemmung des Sternomastoideus zwischen die Clavicula und den Pfannenrand zu verhüten, und kann den A r m n i c h t v o l l s t ä n d i g e r h e b e n. Die Inspection ergibt eine c h a r a c t e r i s t i s c h e D e f o r m i t ä t. Die S c h u l t e r, die ihren Strebepfeiler verloren hat, ist nach h i n t e n und u n t e n h e r a b g e s u n k e n, die C l a v i c u l a dagegen s p r i n g t in ihrem m e d i a l e n T h e i l e n a c h v o r n e h e r v o r. In Folge dessen sind die Fossae supra- und infraclavicularis stärker ausgesprochen. Das K ö p f c h e n des S c h l ü s s e l b e i n e s steht d i c h t u n t e r der H a u t a u f d e m S t e r n u m und zwar meist etwas n a c h u n t e n u n d i n n e n v o n s e i n e r G e l e n k g r u b e. In der Gegend dieses Vorsprungs besteht zuweilen eine sehr s t a r k e A n s c h w e l l u n g. Es verhilft uns dann die P a l p a t i o n zur Diagnose. Wenn man nämlich mit den F i n g e r n die V o r d e r f l ä c h e der C l a v i c u l a a b t a s t e t, so stösst man auf die a b n o r m e H e r v o r r a g u n g und g e l a n g t v o n d i e s e r w e i t e r n a c h i n n e n i n e i n e s t e i l e A b f l a c h u n g z u m B r u s t b e i n. Zuweilen gelingt es auch, die

Fig. 88.



leeren Gelenkgruben zu fühlen. Der Vorsprung unter der Haut folgt den Bewegungen der Schulter. Zieht man die letztere nach hinten, so kann man ihn zum Verschwinden bringen, indem das Köpfchen wieder in seine Pfanne einschnappt. Lässt man mit dem Zug aber wieder nach, so stellt sich die Deformität sofort wieder her. Das Köpfchen liegt unter dem Ansatze des Sternomastoideus, kann denselben aber auch stark quetschen und nach innen und unten drängen. Der Ansatz des Cleidomastoideus ist dagegen mit dem Capitulum claviculare nach vorn dislocirt und springt als scharfer Rand hervor. Der Abstand vom Acromialende der Clavicula bis zur Mitte der Incisura jugularis der kranken Seite ist verkürzt, bis zu dem Vorsprunge dagegen gleich lang wie die Clavicula der anderen Seite.

Die **Prognose** der Verletzung ist im Ganzen sehr günstig. Nach Verlauf weniger Tage nimmt die locale Anschwellung und ebenso der örtliche Schmerz bedeutend ab. Der Patient, der wegen des letzteren seinen Arm ruhig hielt, fängt nunmehr an, ihn wieder zu gebrauchen, und schliesslich wird seine Function wieder ganz normal. Diese Besserung des Befindens stellt sich ein, trotzdem dass es fast nie gelingt, die Deformität ganz zu beseitigen.

Die **Therapie** leistet in der Regel nicht viel.

Die Reduction gelingt allerdings leicht durch einen Zug der Schulter nach aussen und hinten in Verbindung mit einem gleichzeitigen Druck auf das Köpfchen der Clavicula. Allein es ist ausserordentlich schwer, dieses dauernd an Ort und Stelle zu fixiren. Die grosse Reihe hierzu empfohlener Verbände wollen wir nicht erwähnen, da dieselben ihren Zweck nicht erfüllen.


Am zweckmässigsten würde es sein, die Retention des Köpfchens durch den Druck einer Pelotte zu bewirken. Ein solcher Druck wird aber hier schlecht vertragen. Es ist daher besser, den Patienten auf ein zwischen die Schulterblätter gelegtes Kissen zu lagern und das reponirte Köpfchen durch dachziegelförmig sich deckende Heftpflasterstreifen zu befestigen. *Bardenheuer* räth zu der permanenten Gewichtsextension wie bei den Clavicularfracturen, verbunden mit dem Druck einer Pelotte oder einem *Malgaigne*'schen Stachel. In der ambulanten Praxis besorgt die Retention am besten ein je nach dem Fall etwas modificirter *Sayre*'scher Heftpflasterverband oder, wie auch bei den anderen Clavicularluxationen, die

Bardenheuer'sche Extensionsschiene, die bei allen diesen Luxationen in gleicher Weise angelegt wird wie bei den Clavicularfracturen.

b) Die Luxation nach oben, Luxatio clav. suprasternalis (Fig. 89) kommt nach *Stetter* als primäre Stellung viel häufiger vor, als man bisher geglaubt hat. *Stetter* stellt ja die Behauptung auf, dass alle durch Hebelwirkung entstandenen Luxationen des sternalen Claviculaendes primär solche nach oben sind.

Durch einen directen Schlag oder Stoss von unten her kann die Luxation nicht entstehen, weil die erste Rippe dies verhindert.

Fig. 89.



Stetter erklärt den Mechanismus so, dass eine Gewalt die nach unten gesunkene Schulter von aussen her trifft, dadurch das sternale Ende der Clavicula gegen resp. durch die obere Kapselwand hindurchtreibt und so die Luxation herbeiführt. Die von *Hueter* ausgesprochene Ansicht, dass bei starker Adduction des Schultergürtels an der ersten Rippe sich ein Hypomochlion bilden solle, über welches das gleichzeitig stark nach unten gedrängte Acromion das Köpfchen der Clavicula nach oben abhebele, lässt *Stetter* nur für ganz vereinzelte Fälle gelten, weil bei der genannten Art der Gewalteinwirkung auf der ersten Rippe nur dann ein Unterstützungspunkt vorhanden sein kann, wenn dieselbe an ihrer Ansatzstelle unter dem Sternalende der Clavicula p a t h o l o g i s c h stark vorspringt.


Nach eingetretener Luxation steht das Köpfchen auf dem oberen Rande des Brustbeines und mehr der Mittellinie genähert, selbst bis zum Musc. sternomastoideus der anderen Seite hin.

Zuweilen steigt es auch gleichzeitig noch in die Höhe, ja man hat es selbst am Kehlkopf stehend gefunden. Gewöhnlich wird das Aufsteigen dadurch verhindert, dass es sich zwischen den Musc. sternomastoideus und sternohyoideus einkeilt.

Die **Symptome** sind vice versa dieselben wie bei der Luxation nach vorn, nur findet man jetzt den Vorsprung nicht vor dem Brustbein, sondern auf dessen Jugulum. Die Schulter ist nach unten, innen und vorne gesunken, die Clavicula fällt von innen nach aussen hin ab. Die Fossae supra- und infraclavicularis sind abgeflacht. Durch Druck des Köpfchens auf den Kehlkopf kann Athemnoth entstehen, ebenso Unvermögen zu sprechen.

Die **Therapie** bewirkt die Einrichtung durch einen starken Zug nach aussen und hinten und einen gleichzeitig von oben nach

Fig. 90.



unten auf das Köpfchen ausgeübten Druck. Die Luxation stellt sich aber auch ebenso leicht wieder ein.

Bezüglich der Retention gilt dasselbe wie bei den Luxationen nach vorne. Anstatt eines Stachels würde man hier nach *Bardenheuer* besser die *Malgaigne*'sche Klammer anwenden, indem man deren Spitzen einerseits in das Brustbein, andererseits in die Clavicula einhaken könnte.

c) Die Luxation nach hinten, Luxatio retrosternalis, (Fig. 90) ist nur selten beobachtet worden. Sie entsteht entweder durch eine Gewalt, welche das Köpfchen direct von vorne nach hinten durch die Kapsel treibt, oder durch indirecte Gewalt, welche

die Schulter von hinten her trifft, sie stark nach vorn drängt und dadurch dem sternalen Ende der Clavicula die Möglichkeit gibt, im entgegengesetzten Sinne, d. h. nach hinten, auszuweichen.

Die **Symptome** sind charakteristische. Sie werden dadurch hervorgerufen, dass das Köpfchen der Clavicula nunmehr auf der hinteren Fläche des Brustbeines, der Mittellinie mehr genähert und bald etwas mehr nach unten, bald mehr nach oben steht. An Stelle des Köpfchens findet man eine Grube, welche sich als die leere Pfanne nachweisen lässt. Das innere Ende des Schlüsselbeines steht mehr zurück, während das Acromialende stärker hervorspringt. Die Fossae supra- und infraclavicularis erscheinen sehr abgeflacht. Die Schulter ist nach unten, innen und vorn gesunken, der Kopf wohl etwas nach der verletzten Seite hin geneigt. Der Musc. cleidomastoideus springt an der gesunden Seite weiter vor als an der kranken, weil hier sein Ansatzpunkt an der Clavicula mit nach hinten gezogen ist. Ebenso weichen auch die allgemeinen Bedeckungen auf der verletzten Seite nach hinten ab, während der obere Rand des Pectoralis major relativ prominirt, wenn nicht eine starke traumatische Anschwellung die Deformität überhaupt maskirt. Der nach hinten ausgetretene Gelenkkopf führt nur selten durch Druck auf die lebenswichtigen, hinter dem Manubrium sterni gelagerten Organe schwere Zufälle herbei. Es liegen daselbst: Die Art. carot. communis resp. die Vena jugularis communis, die Vena anonyma, Vena subclavia, der Nervus phrenicus und vagus, der Oesophagus und die Trachea, und es können durch Druck auf diese Theile hochgradige Cyanose, Athemnoth, Singultus, Dysphagie, Pulslosigkeit in der Art. radialis des betreffenden Armes, Ohrensausen und Ohnmachten hervorgerufen werden. Wir sagen, es können diese schweren Erscheinungen vorhanden sein, weil sie auch trotz bestehender Luxation fehlen können. So wurden sie beobachtet von *Cooper* und *Poland*, während sie in Beobachtungen von *Madelung* fehlten.


Die **Prognose** ist auch bei dem Vorhandensein gefahrdrohender Erscheinungen keine schlechte, indem sich die Organe dem plötzlichen Druck adaptiren können. Nur einmal war *Cooper* gezwungen, bei einer infolge einer hochgradigen Verkrümmung der Wirbelsäule allmählich entstandenen Luxation die Resection des Köpfchens zu machen.

Die. **Reposition** geschieht durch starken Zug an der Schulter nach hinten und aussen bei gleichzeitiger Impulsion des Köpfchens von hinten nach vorn. Sollte die Reduction Schwierigkeiten bieten, so könnte man die Clavicula mittelst eines stumpfen Hakens umfassen und nach vorn ziehen. Die Retention geschieht in einer der vorher beschriebenen Weisen, eventuell mit der *Malgaigne*'schen Klammer.

II. Luxationen am acromialen Ende.

a) Die Luxation nach oben, Luxatio supraacromialis (Fig. 91), müsste man nach dem Grundsatz, dass der am meisten peripher gelegene Theil als der luxirte angesehen wird, eigentlich als Luxatio scapulae infraclavicularis bezeichnen. Es hat sich jedoch, da die Dislocation der Clavicula am auffallendsten ist, der erste Name eingebürgert, und wir wollen denselben auch beibehalten.

Fig. 91.



Es ist diese Luxation die häufigste der Clavicula. Man beobachtet sie öfter als alle anderen Verrenkungen des acromialen und sternalen Endes zusammen. *Hamilton* zählt unter 50 Clavicularluxationen 38 supraacromiale, *Gurlt*, *Krönlein* und *Albers* berechnen eine Frequenz von etwa 2,5 %, *Defranceschi* eine solche von 6 %.

Nach *Malgaigne* unterscheidet man zwei Unterarten: die vollständige und unvollständige Luxation.

Beide entstehen durch Gewalten, welche das Acromion der Scapula in der Richtung von oben nach unten treffen und dasselbe nach unten und hinten treiben. Hierbei wird gleichzeitig die durch das Lig. coracoclaviculare anter. und poster. mit der Scapula verbundene Clavicula nach unten gedrängt. Wird diese Bewegung forcirt, so stützt sich die letztere auf die erste Rippe, ihre Extremitas acromialis wird nach oben und vorn abgehebelt, reisst die Ligamenta acromialia und die Synovialis ein und gleitet über das Acromion nach oben, während dieses und die Scapula durch die Brust- und Rückenmuskeln nach vorn und innen gezogen werden. Wenn nun bloss die oben genannten Bänder nachgeben,

so entsteht die unvollständige Luxation. Werden aber gleichzeitig auch die Lig. coraco-clavicularia zerstört, so entsteht die vollständige. *Boyer* glaubt, dass bei der Dislocation der Clavicula nach oben dem Zug des Musc. trapezius eine nicht zu unterschätzende Rolle beizumessen sei. Als Gewalt wirkt bei dieser Entstehungsart der Luxation entweder ein Fall auf das Acromion oder das Auffallen schwerer Lasten auf dieses. Es kann aber auch das umgekehrte Verhältniss stattfinden, d. h. es sind Fälle beschrieben worden, in denen das acromiale Ende der Clavicula durch eine seine untere Fläche direct treffende Gewalt nach oben verschoben wurde. So z. B. in einer Beobachtung *Hamilton*'s durch einen Pfeilschuss.

Die **Symptome** der **unvollständigen** Luxation, die in der Regel im höheren Alter und vorzugsweise bei Männern beobachtet wird, sind heftiger localer Schmerz mit gleichzeitiger Sugillation und Anschwellung. Das Hauptzeichen ist jedoch die Deformität. $^1/_2$—1 cm über der Acromialfläche sieht und fühlt man einen kleinen, rundlichen Vorsprung, von dem der palpirende Finger in einem steilen Winkel auf das Acromion herabsteigt. Er liegt in gleicher Entfernung von der Mittellinie wie das Acromialgelenk der anderen Seite und folgt den Bewegungen der Clavicula. Druck auf diesen Vorsprung ist meist nicht sehr schmerzhaft. Der Schmerz wird dann erst stark, wenn man den Arm erhebt.

Die Reposition gelingt oft durch die directe Impulsion, noch leichter jedoch beim Heben und Nachaussenführen der Schulter.


Differentialdiagnose. Die eben geschilderten Symptome könnten eine Fractur des acromialen Endes der Clavicula vortäuschen. Bei dieser ist jedoch der Abstand vom Sternoclaviculargelenk verkürzt, der Schmerz viel bedeutender und die Hebung der Deformität mit grösseren Schwierigkeiten verbunden. Auch von einer Fractur des Acromion muss man die Verletzung unterscheiden. Hier muss uns die Entdeckung der schmerzhaften Bruchspalte nach aussen von dem Gelenk, die leichte Repositionsmöglichkeit der Bruchfragmente durch einfaches perpendiculäres Heben des Armes und die dabei entstehende Crepitation zur Entdeckung eines eventuell vorhandenen Bruches führen.

Die **Prognose** ist günstig quoad functionem. Die Reduction gelingt leicht durch die vorher beschriebene Manipulation. Beim Nachlass des Druckes stellt sich jedoch die Deformität leicht wieder ein.

Die **Therapie** fällt zusammen mit derjenigen der vollständigen Luxation.

Die **Symptome** der **vollständigen** Luxation sind sehr ausgesprochen, da der Stand des Schlüsselbeinendes auf dem Acromion eine ganz charakteristische Deformität hervorbringt (Fig. 92). Anstatt der normalen Schulterwölbung findet man jetzt nämlich einen starken Vorsprung, welcher nach abwärts zum Acromion flach oder leicht concav abfällt und $1^1/_2$—2 cm, oft auch noch mehr von diesem entfernt liegt. Das luxirte Schlüsselbeinende ist dabei nicht stets gerade nach aussen und oben gerichtet, sondern weicht meist auch etwas nach hinten, seltener nach vorn ab. Die Schulter ist wie bei der Clavicularfractur nach innen, unten und vorn verschoben und scheinbar verlängert. Ebenso könnte man beim ersten Anblick fälschlicher Weise eine Verkürzung des tiefen Durchmessers des Gelenkes annehmen. Der untere Winkel der Scapula nähert sich nach hinten und oben der Wirbelsäule. Der Arm hängt schlaff am Leibe herunter. Der Musc. trapezius springt mit seinem äusseren Rande stark unter der Haut hervor. Die Palpation ergiebt eine grosse Beweglichkeit des dislocirten Gelenkendes, so dass man dasselbe mit Leichtigkeit nach vorn und rückwärts verschieben kann. Der Abstand des Vorsprunges von dem Brustbein entspricht genau der Länge der andern Clavicula, und es gelingt, an demselben die acromiale Gelenkfläche abzutasten. Die Bewegungen des Armes, besonders aber die Erhebungen desselben sind schmerzhaft und behindert, die Functionsstörung jedoch ähnlich wie bei der Clavicularfractur nur durch den Schmerz bedingt. Letzterer kann sehr heftig werden, wenn der Musc. deltoides verletzt ist.

Fig. 92.



Es kann diese Verletzung verwechselt werden mit einer Fractur des Acromion und einer Luxation des Oberarmes nach vorne. Die Unterscheidungspunkte führen wir bei der Differentialdiagnose aller Schulterverletzungen an.

Die **Prognose** verhält sich wie bei den Luxationen am sternalen Ende, d. h. die Reposition ist leicht, die Retention aber schwierig.

Die Heilung erfolgt meist ohne bedeutende Functionsstörung, aber mit mehr oder weniger erheblicher Dislocation.

Die Reposition geschieht durch starkes Erheben und Rückwärtsziehen der Schulter, während gleichzeitig die verrenkte Clavicula nach unten gedrückt wird.

Die **Therapie** muss darin bestehen, die bei dieser Manipulation in ihr Gelenk einschnappende Clavicula zu fixiren. Es ist zu diesem Zwecke wiederum eine grosse Reihe meist unpractischer Verbände angegeben worden. So die Anwendung von elastischen Zügen, Federn, Bruchbändern oder von Schraubentourniquets. Andere empfehlen eine einfache Mitella, den *Sayre*'schen Heftpflasterverband oder den von *Velpeau*.


Das Prinzip aller Behandlungsmethoden muss das sein, einmal die Erhebung der Clavicula durch die elastische Retraction des Trapezius zu verhüten und zweitens die schon ohnedies bewegliche, jetzt aber vollständig gelockerte Scapula zu fixieren. Beiden Indicationen kann man nach *Bardenheuer* dadurch gerecht werden, dass man in der Rückenlage des Patienten mittels der Heftpflastergewichtsextension die Clavicula nach unten und von einem Achselkissen aus die Scapula nach oben zieht, oder dass man die Federextensionsschiene anlegt, welche den Oberarm nach oben, die Clavicula nach unten hält. Würde man so nicht zum Ziele kommen, so könnte man wieder die *Malgaigne*'sche Klammer in Anwendung bringen. Sehr practisch erscheint uns für manche Fälle ein Verfahren, das kürzlich *W. Baum* mit Erfolg angewendet hat, nämlich die subcutane Bändernaht. Er zog durch die Reste der Lig. acromio-claviculare und coraco-claviculare je einen Faden von carbolisirter Seide, reponirte die Luxation und knotete ähnlich wie bei der *v. Volkmann*'schen Patellarsehnennaht die Enden über eine Heftpflasterrolle. Darüber kam ein aseptischer Schutzverband, während der Arm in eine Mitella gelegt wurde. Die Resultate waren sehr gute, indem schon nach drei Wochen die Heilung eingetreten war und die Arme mit alter Kraft bewegt werden konnten. *Helferich* hat dieses Verfahren *Baum*'s ebenfalls mit günstigen Resultaten in drei Fällen befolgt (*Scholz*).

Bei veralteten Luxationen mit stärkeren Beschwerden haben *Cooper*, *J. Wolff* und neuerdings *Paci*, *Poirier*, *Rieffel*, *Le Bei* und *Albers* mit gutem, ja zum Theil idealem Erfolg die Knochenenden durch eine ausgiebige Incision blossgelegt und die Knochennaht mit Silberdraht ausgeführt.

b) Die Luxation nach unten, Luxatio claviculae infraacromialis (Fig. 93), oder Luxatio scapulae supraclavicularis ist sehr selten. Es ist kaum ein Dutzend derartiger Verletzungen bekannt.

Die Aetiologie bildet ein Schlag oder Stoss auf das äussere Ende des Schlüsselbeins, welcher dasselbe direct von oben nach unten treibt, während gleichzeitig der Arm abducirt ist und der untere Winkel der Scapula nach aussen steht, so dass der Proc. coracoideus der Clavicula den Weg nicht versperrt. Es kann vielleicht auch in demselben Augenblick das Acromion nach aufwärts getrieben werden, so z. B. durch einen Fall auf den Ellenbogen bei belasteter Clavicula. Durch die genannten Gewalten werden die Bänder ausgiebig zerrissen, so dass sich das Gelenkende der Clavicula unter dem Acromion festhaken kann.

Fig. 93.



Von den **Symptomen** ist zunächst der Schmerz zu nennen, der durch active und passive Bewegungen noch bedeutend gesteigert wird. Zuweilen besteht in dem zugehörigen Arme durch Druck auf den Plexus axillaris das Gefühl des Ameisenkriechens. Der Arm selbst liegt dem Körper dicht an und ist in seiner Function bedeutend gehindert. Das Köpfchen der Clavicula prominirt ziemlich stark. Diese selbst senkt sich von ihrer Mitte ab schroff nach abwärts, so dass sie gleichsam im Muskelfleisch der Schulter zu verschwinden scheint. Die Ober- und Unterschlüsselbeingrube sind verstrichen. Das acromiale Ende der Clavicula fehlt an seiner normalen Stelle, so dass das Acromion spitzig hervorspringt und dessen Gelenkfacette durch die Weichtheile hindurch gefühlt werden kann. Das Acromion selbst erscheint ferner der Mittellinie genähert, die Schulter

nach vorn und innen gesunken, das Schulterblatt um seine Querachse gedreht, so dass sein unterer Winkel vom Körper absteht.

Die **Prognose** ist, selbst wenn die Einrichtung nicht gelingt, eine günstige. Der Schmerz und die Anschwellung am Gelenk verschwinden bald, und es bleibt weder in den Bewegungen des Schulterblattes noch des Armes eine Behinderung zurück. Es rührt dies daher, dass sich dann zwischen der oberen Fläche der Clavicula und der unteren des Acromion eine Nearthrose entwickelt.

Die **Reposition** gelingt nach *Morel-Lavallée* leicht, wenn man bei gebeugtem und fixirtem Vorderarm den Oberarm in seinem untern Theil kräftig nach aussen zieht, während man gleichzeitig die Clavicula nach vorn und oben drückt.

Zur Retention, die ziemlich schwierig ist, legte derselbe Autor ein Achselkissen in die Axilla und lagerte die Hand mittelst einer Mitella auf die gesunde Schulter. *Bardenheuer* empfiehlt, den Patienten auf eine feste Unterlage zu legen, wodurch der abstehende untere Winkel der Scapula an den Thorax angedrückt wird, und nun vom Oberarm aus eine Gewichtsextension nach hinten, oben und aussen zu führen.

c) **Die Luxation nach hinten, Luxatio claviculae supraspinata.** Der einzige Fall, in dem eine isolirte Luxation der Clavicula am acromialen Ende gerade nach hinten stattfand, wurde von *Davis* beobachtet und 1887 beschrieben. Er betraf einen 40jährigen Arbeiter, dessen linke Schulter von einem an einem Krahnen hängenden Eimer einen heftigen Stoss bekommen hatte.

Von vorn gesehen zeigte sich nur eine geringe Veränderung der linken Schulterwölbung. Nur das Acromion zeigte sich etwas schärfer abgegrenzt, während sich an der Stelle des Clavicularendes eine kleine Grube bemerkbar machte.

Bei der Betrachtung von der Seite und von hinten fiel dagegen sofort eine beträchtliche Deformität der Schulter auf. Dieselbe war, wie sich beim Abtasten der Clavicula, des Acromion und der Spina scapulae herausstellte, dadurch bedingt, dass das laterale Ende der Clavicula nach hinten verschoben, in die Fossa supraspinata getreten war und über der Spina scapulae einen deutlichen Vorsprung bildete. Ich habe deshalb die obige Bezeichnung Luxatio supraspinata gewählt.

Die Bewegungen des Armes waren nur wenig beschränkt.

Die Reposition gelang weder im Stehen noch im Sitzen, aber sofort und ohne Schwierigkeit, als man den Kranken auf den

Rücken gelegt hatte. In dieser Lage wurde eine schmale Rollbinde von hinten her gegen die Clavicula angedrängt und mit Heftpflasterstreifen fixirt. *Desault*'scher Verband. Die Heilung erfolgte in tadelloser Weise.

3. Die Doppelluxationen der Clavicula.

Die **Doppelluxationen** der Clavicula sind sehr selten. *Kaufmann* konnte 1888 nur 8 einschlägige Fälle mittheilen, die *Lucas* dann 1889 auf 10 vermehrte.

Bei diesen Doppelluxationen ist die Clavicula an ihren beiden Enden luxirt. Die rechte Clavicula wurde bisher gleich häufig betroffen als die linke. Die Luxation erfolgte 9mal so, dass das sternale Ende nach vorn und etwas nach oben, das acromiale Ende nach oben und hinten verrenkt war. Nur in einem Falle (*Lucas*) war das sternale Ende nicht nach vorn, sondern nach hinten und unten verschoben. Sämmtliche betroffenen Patienten, die Mehrzahl davon männlichen Geschlechts, standen im Alter von 13—39 Jahren, was leicht verständlich ist, da jenseits dieser Grenze das Schlüsselbein leichter bricht.

Die U r s a c h e der Verletzung war entweder ein rascher und starker Stoss gegen den oberen, hinteren Theil der Schulter oder ein Zusammenpressen der beiden Schultern, während die eine fixirt war, mit gleichzeitiger Torsion des Körpers um die fixirte Schulter von hinten nach vorn. Die Clavicula springt dabei aus ihren Gelenkverbindungen heraus, wie ein Kirschkern aus der Kirsche, wenn letztere zwischen Daumen und Zeigefinger zusammengedrückt wird. Nach *Porral* erfordert das Zustandekommen der Verletzung eine besondere Festigkeit der Clavicula.

Die S y m p t o m e und D i a g n o s e lassen sich durch Combination des bei den Luxationen der einzelnen Gelenkenden Gesagten unmittelbar construiren. Wir wollen dies .an dem gut beschriebenen Falle *Kaufmann*'s erläutern. Ein 36jähriger Postillon war vom Wagen herabgeschleudert worden. Der Kopf stand leicht nach links geneigt. Die linke Schulter war stark nach innen, unten und vorn verschoben. Die Fossa infra- und supraclavicularis sin. waren viel deutlicher ausgesprochen als normal. Der Arm lag dem Körper an und wurde von dem Patienten mit der rechten Hand gestützt. Elevation und Abduction des Armes waren in einer Ausdehnung von 30 Grad noch activ möglich. Ueber dem

Manubrium sterni sah und fühlte man die charakteristische Hervorwölbung des sternalen Gelenkendes des linken Schlüsselbeines. Die Gelenkfläche reichte bis $^1/_2$ cm an die Mittellinie heran; ihr oberer Rand stand in gleicher Flucht mit der Incisura sterni. Die Protuberanz über dem Manubrium war $2^1/_2$ cm hoch und etwa 3 cm breit; medialwärts fiel sie steil ab. Die beiden Köpfe des Sternocleidomastoideus waren einander bis zur Berührung genähert.

Gleich charakteristisch waren die Symptome der supraacromialen Luxation. Das Schlüsselbein stieg steil nach aufwärts aussen und rückwärts. Sein leicht abtastbares acromiales Ende ragte etwa 4 cm nach oben, 3 cm nach hinten und über 2 cm nach aussen über das Acromion vor.

Das ganze Schlüsselbein war abnorm beweglich. Bei Druck auf seine Mitte von vorn nach hinten wich das acromiale Ende nach hinten oben, bei Druck von oben nach vorn und unten aus. Bei Druck von unten her liess sich die ganze Clavicula um etwa $1^1/_2$ cm nach oben schieben.

Die Reposition erfolgte durch Zug an der Schulter nach hinten, oben und aussen, bei gleichzeitigem Druck auf das sternale Ende.

Die Retention erfolgte durch einen *Sayre*'schen Heftpflasterverband. Die Heilung fand am acromialen Ende vollständig statt; die Luxatio praesternalis blieb dagegen bestehen, ohne die Arbeitsfähigkeit des Patienten zu beschränken.

Mit dem zuletzt Gesagten haben wir schon die Prognose und Therapie der Doppelluxationen berührt. In keinem Falle blieb ein dauernder Nachtheil für den Patienten zurück.

Die Reduction gelang in der Regel leicht wie in dem beschriebenen Falle *Kaufmann*'s. Schwierigkeit bereitete nur einmal die Reposition des nach hinten luxirten Sternalendes in dem Falle von *Lucas*. Sie gelang schliesslich durch Rotation des Armes nach aussen unter Abduction und Rückwärtsziehen desselben.

Behufs der Retention muss durch ein in die Achsel gelegtes Kissen ein möglichst grosser Abstand zwischen der Scapula und dem Sternum erstrebt und der Arm dann durch einen *Sayre*'schen Heftpflaster- oder einen Binden- oder den *Moore*'schen Verband nach auf- und rückwärts geschoben oder am Thorax fixirt werden.

Fracturen der Scapula.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Die Scapula, das Schulterblatt, ist ein breiter, flacher, besonders in der Fossa infraspinata sehr dünner Knochen, welcher der hinteren Fläche des Brustkorbes von der zweiten bis siebenten Rippe aufliegt. Sie ist von demselben jedoch durch ein weiches, elastisches, dickes Muskelpolster getrennt und ebenso auf ihrer hinteren Fläche durch ein gleich dickes Lager von Weichtheilen geschützt. Letztere werden von einer starken Fascie überzogen, welche an dem oberen und inneren Rande der Scapula entspringt und mit der Spina scapulae verwachsen ist. Sie trennt also die Fossa supra- und infraspinata in zwei abgeschlossene und von einander getrennte Räume. Blutextravasate werden daher in diesen Gruben retinirt werden und nicht nach aussen dringen. Eine grosse Anzahl von Muskeln, welche gleichmässig an der vorderen und hinteren Fläche der Scapula entspringen, verleihen derselben eine ausserordentlich grosse Beweglichkeit.

Frequenz und Eintheilung der Schulterblattbrüche.

In Folge ihrer grossen Beweglichkeit, ihrer geschützten Lage ihrer starken Umpolsterung seitens des dicken Muskellagers und seitens der elastischen Rippen sind Brüche der Scapula im, Allgemeinen selten. Die grössten Fracturstatistiken von *Gurlt* und *Bruns* geben ein Verhältniss von 1 $^0/_0$ an. Es wurden vorzugsweise Männer im Alter von 21—50 Jahren betroffen, seltener Frauen, Kinder fast gar nicht.

Je nach dem Sitze theilt man die Brüche ein in solche des Körpers, des Collum, des Acromion, des unteren und oberen Winkels, der Spina und des Proc. coracoideus. Diese Reihenfolge ergibt auch zugleich die Häufigkeit der Fracturen je nach den Theilen der Scapula. Betrachten wir nun diese Fracturen des Näheren und beginnen wir mit der

a) Fractur des Körpers, des oberen und unteren Winkels und der Spina. Die Brüche des Schulterblattkörpers sind bald Quer-, bald Splitterbrüche. Am häufigsten kommen die Q u e r - b r ü c h e vor und zwar mit besonderer Vorliebe nach unten von der Fossa infraspinata. Sie durchsetzen dann den ganzen Körper von dessen vertebralem bis zum axillaren Rande. Meist ist die

Bruchrichtung keine ganz vollständig quere. Es fällt vielmehr die Bruchlinie häufig nach der einen oder anderen Seite mehr ab.

Fig. 95.





Fig. 96.



In beiden Fällen schieben sich die Fragmente bedeutend über einander und zwar am axillaren Rande mehr als am vertebralen (Fig. 95).

Fig. 97.





Fig. 98.



An dem mittleren dünnen Theile des Körpers findet man sehr oft sternförmige Splitterbrüche (Fig. 96). Schussfracturen

erzeugen entweder Lochbrüche mit zackigen Rändern (Fig. 97) oder Splitterbrüche. Die Splitter können dabei erheblich verschoben werden. So wurden z. B. in einer Beobachtung *Pitha's* Splitter in die Lunge hinein und sogar durch die vordere Brustwand wieder hinausgetrieben.

Die Längsbrüche sind äusserst selten (Fig. 98). Sie führen, da sie nur in Ausnahmefällen die ganze Scapula durchsetzen, kaum zu einer Dislocation. Dieselbe kann jedoch bei vollständiger Längsfractur so erfolgen, dass das mediale Stück vom Levator ang. scap. nnd den Rhomboideis nach innen, das laterale dagegen durch das Gewicht des Armes nach vorn und aussen verschoben wird.

Zuweilen finden sich mehrfache Brüche in der Weise, dass zwei Querbrüche zu gleicher Zeit vorkommen. Einer von diesen betrifft dann zumeist den unteren Winkel. Isolirte Fracturen des letzteren, sowie des oberen Winkels sind im Ganzen selten. Der abgebrochene untere Winkel wird gewöhnlich in Gestalt eines kleinen dreieckigen Fragmentes durch den Zug der betreffenden Serratusfasern, sowie durch den Teres major nach vorn, aussen und aufwärts vor das obere Fragment verschoben. Die Fractur des oberen Winkels betrifft sehr oft gleichzeitig einen Theil der Fossa supraspinata. Durch Retraction des Levator ang. scapulae kann dann das abgebrochene Stück nach oben und innen zu stehen kommen. Die Spina kann sowohl quer an ihrer Basis abgebrochen als auch longitudinal fracturirt sein.

Die genannten Bruchformen entstehen sehr selten infolge einer activen Muskelcontraction. Ihre Ursache ist vielmehr in der Regel eine starke directe Gewalt, z. B. Ueberfahrenwerden, Auffallen schwerer Lasten, Eingeklemmtwerden zwischen Puffern oder Sturz aus grosser Höhe auf die Hinterfläche des Schulterblattes. Gemäss den starken Gewalten geht die Fractur immer mit einer bedeutenden Quetschung der Weichtheile einher; seltener ist sie wirklich complicirt.

Die **Symptome** dieser Fractur werden durch die Anschwellung an der Bruchstelle sowie das unter die Fascien ergossene Blut mitunter verdeckt. In solchem Falle ist dann ein wichtiges Zeichen ein fixer Schmerz, der sowohl spontan wie bei allen activen und passiven Bewegungen, selbst beim tiefen Athmen, Husten, Niesen auf einen bestimmten Ort localisirt wird. Diese Stelle ist dann auch auf Druck besonders empfind-

lich und gibt uns nach geschehener Abschwellung gewissermassen einen Fingerzeig zur Auffindung der übrigen Erscheinungen, der Dislocation der Fragmente, der abnormen Beweglichkeit und Crepitation.

Um jedoch diese Zeichen zu entdecken, ist es nothwendig, die Scapula der Palpation zugänglich zu machen, und dies geschieht dadurch, dass man den Arm der betreffenden Seite stark abducirt und retrovertirt oder ihn am besten ganz auf den Rücken des Patienten legt. Man erreicht dadurch ein flügelförmiges Abstehen der Scapula und kann sich nun von der Dislocation überzeugen, indem man besonders an den Rändern des Schulterblattes abnorme Winkel- und Buckelbildungen, event. eine Verkürzung, an andern Stellen, wie an der Spina, Vertiefungen, Depressionen nachweist. Bei der gleichen Manipulation fühlt man dann gleichzeitig die Verschieblichkeit und das Reiben der Fragmente. Letzteres erkennt man oft auch schon, wenn man die Hand flach auf die Scapula auflegt und dann Bewegungen mit dem Arm ausführt. Bei den Brüchen der Fossa infraspinata fehlt meist die Crepitation, weil hier die Bruchränder wegen der Dünne des Knochens keinen Contact mit einander haben. Die Bewegung des Armes ist für die ersten Tage immer sehr schmerzhaft, und es kann die Hand meist nicht auf den Kopf gelegt werden.

Die **Prognose** der Verletzung ist eine relativ günstige. Wegen der guten Ernährung der Scapula erfolgt die Heilung sehr rasch durch einen nicht sehr bedeutenden knöchernen Callus, gewöhnlich allerdings mit bleibender Dislocation. Auch Pseudarthrosen kommen vor, doch schaden auch diese nicht der Function. Nach complicirten Splitterfracturen, besonders nach Schussfracturen, hat man Eiterung und Necrose der Fragmente beobachtet.

Die **Therapie** ist eine sehr einfache. Besteht keine stärkere Dislocation, so genügt eine einfache Mitella. Im andern Fall kann man in der Rückenlage des Patienten und bei abducirtem Arm das Schulterblatt gegen die Thoraxwand mit Binden oder Heftpflaster befestigen. Für die Fractur des unteren Winkels empfiehlt *Bardenheuer*, die abgebrochene Spitze zuerst mit circulären Heftpflastertouren am Brustkasten zu befestigen und dann den Arm nach aussen, oben und etwas nach hinten permanent zu extendiren.

b) Fractur des Collum scapulae. Man unterscheidet an der Scapula einen anatomischen und einen chirurgischen Hals.

Der anatomische Hals entspricht der unmittelbar an die Fossa glenoidalis sich anschliessenden Einschnürung.

Der Knochen ist in diesem Gebiete äusserst compact, zudem durch starke Weichtheile, wie die Gelenkkapsel, Sehnen und Muskeln, sehr geschützt, so dass eine Fractur hier eine grosse Seltenheit ist. Bei den wenigen Präparaten, wo der anatomische Hals wirklich durch einen Bruch betroffen war, war meistens gleichzeitig noch ein Theil der Gelenkfläche abgelöst (Fig. 99), oder diese war in mehrere Stücke zersprengt, oder die Bruchlinie erstreckte sich doch wenigstens in den Gelenkfortsatz hinein (Fig. 100).

Fig. 99.




Fig. 100.




Die eigentliche typische Fractura colli scapulae verläuft in deren chirurgischem Hals. (Tafel III).

Als solchen bezeichnet man nach *Gurlt* eine Linie, welche von der Incisura scapulae beginnend, an der Spina scapulae vorbeiläuft und sich nach unten bis unterhalb des Tuberculum infraglenoidale erstreckt. Sitzt hier ein Bruch, so umfasst das nach aussen von dieser Linie liegende Bruchstück also den Gelenkfortsatz mit der Cavitas glenoidalis, den Proc. coracoideus und die Tubercula infra- et supraglenoidalia. Es zerreisst hierbei ferner das Lig. transversum sup. et inf., welches sich zwischen dem Collum anatomicum und der Basis der Spina scapulae ausbreitet. Die Fractur verläuft nicht immer genau in dieser Linie; sie kann vielmehr gelegentlich den Proc. coracoideus unberührt lassen.

Als häufigste Veranlassung dieser Fractur finden wir einen Fall oder Schlag auf das äusserste Ende der Schulter verzeichnet. Sie entsteht aber ebenso gut auch durch einen Sturz auf die Hand oder Ellenbogen. Als directe Fractur sah man sie ferner bei Schussverletzungen. Eine Beobachtung liegt vor, wo

sie durch eine heftige Contraction des Musc. biceps und coracobrachialis hervorgerufen war.

Die **Symptome** sind sehr charakteristisch (Taf. III). Der Kranke fühlt im Augenblick der Entstehung der Fractur einen äusserst heftigen Schmerz, der Arm fällt ihm am Körper herunter, und er ist nicht im Stande, ihn wieder zu erheben. Es geschieht dies dadurch, dass das Gewicht des Armes durch Vermittlung der Kapsel, der langen Köpfe des Biceps und Triceps, sowie des Coracobrachialis und Pectoralis minor den abgebrochenen Gelenkfortsatz des Schulterblattes nach auswärts zieht. Gleichzeitig wirken aber noch auf das obere Ende des Humerus der Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi und verschieben denselben gegen die Achselhöhle hin nach einwärts. Dem entsprechend steht der Ellenbogen abducirt, und die Achse des Armes ist schräg gerichtet, so dass dieselbe, nach oben verlängert, nicht unterhalb des Acromion fällt, sondern nach innen an demselben vorbeischiesst. Die Schulter erscheint daher abgeflacht. Das Acromion springt scharf hervor. Der Deltoides ist über diesem Vorsprung stark gespannt und vertieft, an seinem Claviculartheil dagegen von dem dislocirten Kopfe vorgewölbt. Bald direct unter dem Acromion, bald gleichzeitig mehr nach vorn oder hinten von demselben besteht eine Vertiefung, in die man bequem den Finger hineindrücken kann. Der Arm erscheint von rückwärts gesehen verlängert, das Acromion aber tiefer stehend als auf der gesunden Seite. Der Kopf des Patienten ist meist nach der kranken Seite geneigt. Der Arm lässt sich, allerdings unter heftigen Schmerzen für den Patienten, activ und passiv frei nach allen Richtungen hin bewegen. Erhebt man ihn perpendiculär und übt von der Achselhöhle her von innen nach aussen einen Druck auf das äussere Fragment aus, so verschwindet sofort jede Deformität. Bei dieser Manipulation fühlt man in der Axilla den Humeruskopf und anstatt einer vermeintlichen glatten Fossa glenoidalis die zackige Bruchfläche. Wenn man auf diese letztere seinen Finger aufsetzt oder auch wohl die Scapula mit der flach aufgelegten Hand fixirt und nun mit dem kranken Arm Rotations- und Elevationsbewegungen ausführt, so überzeugt man sich leicht von der vorhandenen Crepitation. Um zu entscheiden, ob der Proc. coracoideus mit abgebrochen ist oder nicht, fixirt man denselben und sucht dann festzustellen, ob er bei starken



Rotationen den Bewegungen des Armes und des peripheren Fragmentes folgt. Zuweilen entstehen durch den Druck des dislocirten Kopfes auf den Plexus axillaris nervöse Störungen und Lähmungen des N. axillaris.

Die Fractur könnte verwechselt werden mit einer Luxation des Oberarmes nach vorne, einem Bruch des chirurgischen Halses des Humerus und einer Luxatio claviculae supraacromialis. Die Differentialdiagnose betrachten wir später.

Die **Prognose** ist im Allgemeinen günstig, indem die Heilung meist durch knöchernen Callus, gewöhnlich aber erst nach 10—12 Wochen eintritt. Selten ist eine Pseudarthrose oder eine nachträgliche Steifigkeit des Schultergelenkes. Bleiben Functionsstörungen zurück, so beschränken sich dieselben in der Regel auf eine leichte Hemmung der Elevation.

Die **Therapie** hat zwei Indicationen zu genügen. Sie muss den Kopf des Humerus sammt dem Gelenktheile der Scapula nach aufwärts, aussen und hinten führen und den Scapulakörper fixiren. Das Erstere erreicht man, indem man den im Ellenbogen flectirten Arm stark nach aufwärts schiebt und die Schulter nach rückwärts zieht, das zweite nur dadurch, dass man die Rückenlage auf einer harten Matratze einnehmen lässt. Viele Patienten können aber aus socialen Gründen nicht für einige Wochen im Bette liegen. Bei ihnen muss man die Retention entweder durch eine einfache Mitella und ein Achselkissen oder mittelst eines *Sayre*'schen Heftpflasterverbandes erstreben. Kann die Bettruhe eingehalten werden, so empfiehlt sich die Extension wie bei der Fractura claviculae, indem man den Zug nach aussen und etwas nach hinten und oben leitet. Zur Extension bei ambulatorischer Behandlung würde sich ein *Middeldorpf*'scher Triangel eignen (Fig. 145) oder die *Bardenheuer*'sche Federextensionsschiene, die nach Art der Fig. 86 angelegt werden müsste, da sie auch hier den Zweck hat, den Oberarm nach oben und die Clavicula nach unten zu leiten.

c) Die Fracturen des Acromion (Fig. 96) sind relativ häufig, da dasselbe dicht unter der Haut liegt und somit Traumen sehr exponirt ist.

Letztere wirken als Fall, Stoss oder Schlag auf die Schulter, seltener als Fall auf den Ellenbogen. Ganz ausnahmsweise hat man die Fractur auch durch Muskelaction bei plötzlichem Erheben des Armes entstehen sehen.

Die Fractur kann entweder im Gebiete des Acromioclavicular. gelenkes oder mehr gegen den Bereich der Spina scapulae hin sitzen. Sehr

oft liegt sie in der Gegend der Epiphysenlinie, ja *Hamilton* glaubt, dass es sich namentlich im kindlichen Alter oft um eine Epiphysentrennung handle. Der directe Bruch liegt meist näher an der Spitze, der indirecte näher an der Basis, einestheils, weil dort die schwächere Epiphysenlinie liegt, anderntheils, weil mit der Länge des Hebelarmes die Gewalt wächst. Die Richtung der Bruchlinie ist fast ausnahmslos eine quere (Fig. 96), ungleich viel seltener eine schräge. Das Periost bleibt wenigstens an der unteren Seite meistens erhalten und verhütet eine stärkere Dislocation. Nur wenn alle Weichtheile zerrissen sind, wird das periphere Fragment durch die Schwere des Armes und die Retraction des Deltoides nach abwärts gezogen. Da jedoch der Cucullaris das Gleichgewicht zu erhalten bestrebt ist, so imponirt die Dislocation der Fragmente meist nur als eine stärkere Wölbung der oberen Fläche des Acromion.

Dieses Ergebniss der Palpation ist das wichtigste **Symptom** der Fractur. Auf die Stelle derselben wird man hingeleitet, indem der Patient dortselbst über Schmerzen klagt. Dieselben werden durch Druck und beim activen Erheben des Armes gesteigert. Um die Schmerzen zu lindern, hält der Patient den Kopf oft nach der kranken Seite geneigt. Die Schulter erscheint abgeflacht. Wenn man den Arm nach abwärts zieht, so gelingt es, die Bruchspalte zu vergrössern und den Finger in dieselbe hineinzulegen. Schiebt man den Arm dann wieder in die Höhe, oder fasst man das Fragment von vorne und hinten und verschiebt es in dieser Richtung, so entdeckt man neben der abnormen Beweglichkeit noch die Crepitation.

Die **Prognose** ist im Ganzen eine günstige. Die Verheilung der Fragmente beansprucht gewöhnlich 4—5 Wochen, geschieht allerdings oft nur durch eine straffe Pseudarthrose. Die Funktion des Armes leidet nur dann, wenn die bindegewebige Vereinigung eine schlaffe ist, da dann der Kranke den Arm nicht gut über einen rechten Winkel erheben kann.

Die **Therapie** beschränkt sich im Allgemeinen auf das Anlegen einer Mitella, welche den Ellenbogen erhebt. Ist die Dislocation eine stärkere und hat der Patient noch andere Verletzungen, so dass er zu Bett liegen muss, so könnte man die permanente Extension des Oberarmes quer nach aussen oder direct nach oben ausführen oder könnte mit der *Bardenheuer*'schen Federextensions-

schiene den Oberarm nach oben und die Clavicula nach unten lenken.

d) **Die Fractur des Processus coracoideus** kommt isolirt ausserordentlich selten vor. Häufiger wird sie beobachtet als Complication anderer Verletzungen, wie der Luxation des Oberarmkopfes, Fractur oder Luxation des Schlüsselbeins, Fractur des Acromion und der Rippen.

Der Proc. coracoideus bricht fast ausschliesslich an seiner Basis ab. Die Bruchlinie kann sich auch auf die Scapula weiter ausdehnen, so dass sie entsprechend der früheren Epiphysenlinie bis in die unmittelbarste Nähe des Gelenkes reicht. In anderen Fällen findet man neben der queren Fractur noch eine Längsspaltung des distalen Fragmentes.

Als Ursache der Fractur finden wir entweder eine directe Gewalt, z. B. den Stoss mit einer Wagendeichsel angegeben, oder häufiger den Muskelzug, insbesondere, wenn der gestreckte Arm eine kräftige Schleuderbewegung ausführte.

Die **Symptome** sind wenig ausgesprochen, wenn das Lig. coracoacromiale nicht zerrissen ist, da dann jede Dislocation fehlt. Ausser einer Sugillation über der verletzten Stelle ist dann eigentlich nur der Bruchschmerz vorhanden. Für denselben ist aber charakteristisch, dass er nicht allein bei Druck stärker wird, sondern auch dann, wenn man den supinirten Vorderarm im Ellenbogengelenk stark beugt. Der Schmerz wird dann erzeugt durch die Zerrung des Biceps an dem abgebrochenen Stück. Ist das obengenannte Band und das Periost ganz zerrissen, so wird der abgebrochene Fortsatz durch die an ihm entspringenden Mm. biceps, coracobrachialis und pectoralis minor nach unten und innen gezogen. Da jedoch das Bruchstück hinter dem dicken Pectoralis major sehr versteckt liegt, so gelingt es nur bei mageren Leuten abnorme Beweglichkeit und Crepitation hervorzurufen. Beides entdeckt man noch am besten, wenn man den Arm vom Leib abzieht und nun von der Achselhöhle aus hinter dem unteren Rande des Pectoralis major nach innen und oben hineingreift, um die Spitze des Fortsatzes zu fassen.

Die **Prognose** ist eine günstige. Die Heilung erfolgt zwar meist nur durch Pseudarthrose, doch leidet darunter die Funktion des Armes nicht, *Hueter* und *Albert* theilen Fälle mit, in denen sich an der Fracturstelle Abscesse bildeten, nach deren Incision man auf den abgebrochenen Fortsatz gelangte.

Die **Therapie** besteht darin, dass man den an den Thorax adducirten Ober- uud den stark flectirten Vorderarm in eine Mitella legt.

Luxationen des Schultergelenkes.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Schultergelenk besteht in seinem knöchernen Theil aus der Pfanne, der Fossa glenoidalis scapulae, und dem Kopf des Oberarmknochens.

Die Gelenkfläche des Schulterblattes hat eine längliche Eiform, deren grosser Durchmesser senkrecht steht, mit dem breiten Ende nach unten und etwas nach hinten, mit dem spitzen dagegen mehr nach oben und innen gewandt. Sie selbst sieht nach aussen und ist so flach und so viel kleiner als der Humeruskopf, dass sie demselben nicht zur Aufnahme, sondern sozusagen nur zur Stütze dienen kann. Etwas vergrössert wird sie dadurch, dass ein faserknorpeliger Ring, Labrum glenoideum, ihren Rand um ein Weniges erhöht.

Der Oberarmkopf hat im Ganzen die Gestalt einer Halbkugel von nicht ganz 3 Cm. Radius. Seine knorpelige Oberfläche ist 3—4mal so gross als die der Fossa glenoidalis, sitzt dem Schafte schräg, in einem Winkel von 140°, auf und ist von letzterem durch eine ringsum verlaufende, nach vorn und oben deutlicher ausgeprägte Rinne, Collum anatomicum, abgegrenzt. Dicht vor dieser befinden sich zwei Höcker, ein lateraler, das Tuberculum majus, zum Ansatz für die Mm. supraspinatus, infraspinatus und teres minor, und ein kleinerer medialer, das Tuberculum minus zum Ansatz für den M. subscapularis. Beide Höcker sind durch eine längliche Furche, Sulcus intertubercularis, welche für die Aufnahme der Sehne des langen Bicepskopfes bestimmt ist, getrennt. Dicht unter den Tuberkeln verjüngt sich der Humerusschaft sehr rasch, so dass hier der schmalste Theil desselben entsteht, der, sich bis zu den Insertionen der Mm. pectoralis major, latissimus dorsi und teres major erstreckend, den Namen Collum chirurgicum führt.

Die Gelenkkapsel entspringt vom ganzen Umfange der Cavitas glenoidalis nach aussen vom Limbus cartilagineus, die Strecke ausgenommen, an welcher die Bicepssehne aus derselben

heraustritt. Hier nimmt sie ihren Ursprung von der Basis des Proc. coracoideus. Am Humerus setzt sie sich jenseits der überknorpelten Fläche des Gelenkkopfes an und geht hier in das Periost über, nur den Anfang des Sulcus intertubercularis für die Bicepssehne freilassend. Die Kapsel ist ausserordentlich weit und schlaff. Sie ist beinahe gross genug, um den Humeruskopf zweimal zu fassen. Bei herabhängendem Arm bildet die untere Wand nach unten eine Ausbuchtung, welche bis zur oberen Höhe des Teres major reicht. Präparirt man die Muskeln ab, so sinkt der Kopf um fast 3 Cm. nach unten. Das fibröse Gewebe der Kapsel wird nach oben von einem Band verstärkt, welches von dem seitlichen Theil des Proc. coracoideus zum Oberarmkopf herunterzieht und sich zu beiden Seiten des Sulcus intertubercularis an das Collum anatomicum ansetzt (Lig. coracohumerale). (Fig. 101.) Es ist mit der auf ihm liegenden Sehne des M. supraspinatus fest verbunden und verläuft selbst dicht über der langen Bicepssehne. Der schwächste Theil der Kapsel befindet sich am oberen Rande des M. subscapularis dicht unterhalb des Proc. coracoideus. Sie besitzt hier eine Oeffnung, welche mit dem subscapularen Schleimbeutel communicirt. Eine zweite schwache Stelle ist nach unten zwischen den Mm. subscapularis und teres minor vorhanden. Es ist dies der einzige Punkt, an welchem die Kapsel nicht von Muskeln bedeckt ist. Im ganzen humeralen Theil finden wir nämlich sonst die Sehnen der hier vorbeiziehenden Muskeln. — Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor und subscapularis — innig mit der Gelenkkapsel verwachseu.

Das Schultergelenk wird nach obenhin um fast 4 Cm. von einem knöchern-ligamentösen Dach überragt. Dasselbe besteht aus dem Acromion, dem Proc. coracoideus und dem zwischen beiden ausgespannten Lig. coracoacromiale. Durch das so entstehende Gewölbe wird eine Gelenkhöhle gebildet, in welcher nunmehr der Kopf sammt den Tuberculis Aufnahme finden kann.

Der Processus coracoideus springt nur bei mageren Leuten als rundlicher Höcker unter der Haut hervor. Nach innen von ihm ist die letztere zu einer kleinen ungefähr 3 eckig nach abwärts auslaufenden Vertiefung eingezogen, die man als *Mohrenheim*'sche Grube bezeichnet. Dieselbe entspricht dem nur von der Fascie überbrückten Zwischenraume zwischen dem Deltoides und Pectoralis major einerseits, andererseits dem von diesen Muskeln freigelassenen unteren Rande der Clavicula.

Die eben geschilderte anatomische Einrichtung des Schultergelenkes gestattet dem Humerus eine sehr freie Beweglichkeit. Das Gelenk ist eine Arthrodie, ein Kugelgelenk, und es können also seine normalen Bewegungen um alle die zahlreichen Achsen, welche seinen Mittelpunkt treffen, ausgeführt werden. Es empfiehlt sich indess, drei Hauptarten von Bewegungen zu unterscheiden, je nachdem dieselben um die frontale, um die sagittale und um die perpendiculäre Achse erfolgen.

Am ausgiebigsten ist die Bewegung um die sagittale Achse, die Ab- und Adduction im Schultergelenke möglich, bei der also der Oberarm vom Rumpfe gerade auswärts nach der Seite entfernt oder dem Rumpfe in gleicher Ebene genähert wird.

Weniger ausgiebig geschieht die Bewegung um die frontale Achse, die Beugung und Streckung resp. die Hebung des Oberarmes gerade nach vorne und gerade nach rückwärts.

Die dritte Bewegung ist die Rotation des Armes, welche wieder ausgiebiger von Statten gehen kann als die vorhergehende. Hierzu kommen dann noch die sog. Schleuderbewegungen des Armes, bei denen die Achsen fortwährend gewechselt werden.

Die Hemmung aller dieser Bewegungen ist eine knöcherne, indem sich das Labrum cartilagineum der Cavitas glenoidalis in die Rinne des Collum anatomicum einstemmt. Daneben treten an den Grenzen der Bewegungsexcursionen stets noch Hemmungen ein durch Spannung der das Gelenk umgebenden Sehnen und Muskeln, sowie auch des Lig. coracoacromiale. Sämmtliche Bewegungen des Schultergelenkes, vor allem aber die um die horizontale und sagittale Achse, können weit ausgiebiger gestaltet werden durch eine Mitbewegung der Scapula. So ist z. B. die Hebung des Armes über die Horizontale nur durch eine Drehung der letzteren möglich.

Bei der Weite und Dehnbarkeit der Gelenkkapsel müssen wir die Fixation des Kopfes in der Pfanne noch erklären. Dieselbe geschieht zum grössten Theil durch den Luftdruck. Dass durch diesen der Kopf nicht nach abwärts gedrängt wird, verhütet die elastische Spannung der Kapsel, welche letztere wiederum ihren Tonus durch die innige Verbindung mit den umgebenden Muskeln erhält.

Frequenz und Eintheilung der Schultergelenksluxationen.

Der Satz, dass diejenigen Gelenke am häufigsten von Luxationen befallen werden, welche bei möglichst grosser Beweglichkeit

zugleich auch die möglichst grossen Bewegungshemmer haben, trifft am Schultergelenk vollkommen zu. Die Luxation desselben kommt häufiger vor als die aller anderen Gelenke zusammen, indem die Statistik allein 50—51 % für dieselben berechnet. Es rührt diese grosse Frequenz theilweise auch wohl daher, dass das Gelenk einwirkenden Gewalten gegenüber sehr exponirt liegt, und dass der Arm einen sehr langen Hebel darstellt, an welchem die an sich vielleicht geringfügige luxirende Gewalt mit bedeutender Kraft angreifen kann. Die Männer werden 4—5 mal mehr betroffen wie die Frauen, Kinder fast gar nicht. Die Disposition wächst mit dem Alter, so dass das 55.—70. Lebensjahr das grösste Kontingent stellt. Im achten Decennium nimmt die Frequenz wieder ab. Die linke Seite scheint etwas häufiger luxirt zu werden als die rechte.

Das schützende Dach des Gelenkes, das durch das Acromion, den Proc. coracoideus und das Lig. coracoacromiale gebildet wird, bietet einen solchen Widerstand, dass Luxationen des Oberarmkopfes nach oben nur unter besonderen Verhältnissen möglich sind. Wir betrachten daher diese Verletzung als eine atypische und werden sie deshalb nicht in die gewöhnliche Classification der Schultergelenksluxationen aufnehmen, sondern gesondert betrachten. Der Gelenkkopf wird aber auch nicht gut direct nach unten die Kapsel verlassen können, weil dieselbe in der Mitte des unteren Randes der Gelenkfläche durch den Ursprung des langen Kopfes des Triceps bedeutend verstärkt wird. Es bleibt also nur ihre vordere und hintere Seite für den Durchtritt des Kopfes übrig, und in der That kann man alle am Gelenk vorkommenden Luxationen in solche nach vorn und solche nach hinten eintheilen. Wir unterscheiden also mit der eben genannten Reserve:

1. Luxationen nach vorn, Luxatio praeglenoidalis,
 a) Luxatio axillaris, auch genannt Luxatio infraglenoidalis mit der Unterart der Luxatio erecta *(Middeldorpf)*;
 b) Luxatio subcoracoidea,
 c) „ subclavicularis s. intracoracoidea.
2) Luxationen nach hinten, Luxatio retroglenoidalis,
 a) Luxatio subacromialis,
 b) „ infraspinata.

Alle diese Luxationen können vollständige und unvollständige sein. Als unvollständige darf man jedoch nur diejenigen bezeichnen, in denen der Oberarmkopf noch mit einem

Theil seiner Gelenkfläche die der Scapula berührt. Sie sind im Allgemeinen selten und kommen in der Regel nur als Varietäten der Luxationen nach vorn vor.

Betrachten wir nun die einzelnen Luxationsformen näher, so erwähnen wir vorher noch, dass die häufigsten Luxationen die nach vorn sind, während die nach hinten nur sehr selten vorkommen.

A. Luxationen nach vorn, Luxatio praeglenoidalis.

Die Veranlassung zu dieser Luxation ist entweder eine indirecte oder directe Gewalt oder auch der Muskelzug. Nehmen wir zunächst den häufigsten Fall, die indirecte Gewalt, an, so wirkt dieselbe in der Regel als Sturz auf die vorgestreckte Hand oder auf den Ellenbogen. Hierbei geräth der Oberarm in eine Hyperabduction und drängt seinen Kopf gerade gegen den relativ schwächsten unteren und inneren Abschnitt der Gelenkkapsel, während sich der oberste Theil des Tuberculum majus gegen den oberen Rand der Cavitas glenoidalis, das Collum chirurgicum humeri aber gegen das Acromion anstemmt. Wirkt nun bei dieser Stellung des Armes die Gewalt noch weiter abducirend, so hebelt sich der Oberarmkopf von der Cavitas glenoidalis und zwar um das an ihrem oberen Rand gelegene Hypomochlion ab, sprengt die Kapsel an ihrer tiefsten, am meisten gespannten Stelle und tritt dann durch den Kapselriss in die Achselhöhle.

Wird in diesem Moment der Arm durch die gespannten unverletzten Kapseltheile in seiner erhobenen Lage fixirt, während ihn vielleicht der Latissimus dorsi und Pectoralis major noch mehr nach unten gegen den Thorax heranziehen, so steht jetzt sein Gelenkkopf am Tuberculum infraglenoidale in der Weise, dass seine kugelige überknorpelte Fläche gerade nach unten schaut. Wir haben es zu thun mit der Luxatio humeri erecta *(Middeldorpf)*. Diese Verrenkung ist eine sehr seltene. Es wird nämlich in dem Augenblick, in dem der Oberarm gewissermassen wie ein zweiarmiger Hebel zwischen den nicht zerissenen Kapselpartieen pendelt und die luxirende Gewalt erschöpft ist, auf denselben einerseits die Schwere des Armes, andererseits die elastische Spannung der Muskeln und des Kapselrestes wirken und ihn in Abductionsstellung herabsinken lassen. Bleibt der Ge-

lenkkopf bei dieser secundären Bewegung unterhalb der Cavitas glenoidalis stehen oder rückt er nur ein wenig an ihrem inneren Rand empor, so resultirt die Luxatio sub- oder infraglenoidalis oder axillaris. Schiebt er sich dagegen noch weiter nach oben und innen in die Höhe, so dass er gerade unter dem Proc. coracoideus, zwischen den vorderen Rand der Fossa glenoidalis und den Thorax zu stehen kommt, so ist die Luxatio subcoracoidea gegeben. Stellt er sich schliesslich an die innere Seite des Proc. coracoideus, ohne einen anderen Theil des Schulterblattes zu berühren, nahe unter die Mitte des Schlüsselbeines, so spricht man von der Luxatio subclavicularis und unterscheidet wohl von dieser noch die Luxatio intracoracoidea, wenn der Kopf zwar nach innen vom Proc. coracoideus steht, diesen aber noch mit einem kleinen Theil seiner Gelenkfläche berührt.

Bei den Luxationen durch reinen Muskelzug, wie sie in seltenen Fällen beim Werfen, Schleudern, Dreschen oder auch wohl während epileptischer oder eklamptischer Anfälle entstehen, sogar während die Betroffenen schlafend im Bette lagen (*Laren, Richter*), findet sich in annähernd ähnlicher Weise ein Hypomochlion zwischen dem Deltoides und den Adductoren des Armes. Der Deltoides zieht den Arm nach aufwärts, während ihn der Pectoralis major und Latissimus dorsi nach abwärts zu ziehen bestrebt sind. Somit pendelt der Oberarm um einen zwischen den Ursprungsstellen dieser Muskeln gelegenen Punkt und wird bei forcirter Abduction in gleicher Weise luxirt, wie wir dies eben besprochen haben.

Schliesslich kann auch durch directe Gewalt eine praeglenoidale Luxation entstehen. Die Gewalt, ein heftiger Stoss, Fall oder Schlag auf die Schulter, muss dabei vorzugsweise auf das Tuberculum majus einwirken und somit den Gelenkkopf direct nach vorn und unten durch die schwächste Kapselpartie hindurchtreiben.

Die Luxatio humeri erecta ist stets die Folge einer grossen Gewalteinwirkung und entsteht meist durch Sturz mit emporgehobenen Armen durch eine relativ enge Oeffnung, z. B. durch die Sprossen einer Leiter hindurch. *Stetter* beobachtete die Luxation dadurch, dass der betreffende Patient, die Treppe herunterfallend, sich am Geländer festhalten wollte.

Wir wollen gleich hier anschliessen, dass sie nach *Middeldorpf* in der Weise reponirt wird, dass man zunächst in der Richtung des verrenkten Armes extendirt, den Ellenbogen dann in einer

Bogenlinie nach abwärts führt und schliesslich, während man eine Faust in die Achselhöhle stemmt, den Arm adducirt.

Pathologische Anatomie der praeglenoidalen Luxationen.

Hat man Gelegenheit, eine frische Luxation anatomisch zu untersuchen, so trifft man etwa folgende Veränderungen:

1. Die Kapsel ist entsprechend der Richtung der Luxation gewöhnlich am vorderen und untern Umfange des Gelenkes zwischen der Sehne des M. subscapularis und dem langen Kopf des Triceps so ausgedehnt zerrissen, dass der Gelenkkopf durch diese Oeffnung leicht hin- und herbewegt werden kann. Zuweilen findet sich jedoch ein enger schlitzartiger Riss nahe dem Collum humeri, durch welchen der Kopf dann wie durch einen Gummiring geschlüpft ist.

Bei grosser Schlaffheit der Kapsel und der dieselbe spannenden Muskeln kann eine Luxation auch ohne Kapselläsion eintreten. Es handelt sich jedoch dann in der Regel um unvollkommene Luxationen. Solche Fälle haben *Eve* und *Evill* beschrieben. In dem Falle des letzteren war die Luxation eine vollkommene. Bei der Section zeigte es sich, dass die Kapsel durchaus unversehrt war. Sie schien nur etwas schlaffer als normal und an ihren vorderen Ansatzpunkten etwas gedehnt. Der Proc. coracoideus war von der Scapula abgerissen und der Musculus subscapularis eingerissen. Die Innenfläche der Kapsel war blutig durchtränkt. Von der Innenfläche des Kopfes war eine Knorpelabsprengung erfolgt. Das abgesprengte Knorpelstückchen lag mitten in der Gelenkhöhle.

Bei der Luxatio subclavicularis leidet die Kapsel am meisten. Man findet sie hier oft nach allen Seiten, besonders aber nach oben hin zerstört.

Die unverletzten Kapseltheile ziehen straff gespannt und verdreht zu dem Arm hinab. Es betheiligen sich hierbei hauptsächlich Faserzüge, welche zu beiden Seiten der Durchtrittsöffnung des Subscapularis in der Kapsel liegen und vom Rande der Cavitas glenoidalis zum Tuberculum minus und Collum humeri ziehen (*Farabœuf*), dann aber nach den Untersuchungen *Kocher*'s vorzugsweise auch das Lig. coraco-humerale. Seinen Verlauf in normaler und luxirter Stellung erläutern die beistehenden Skizzen (Fig. 101 und 102). Diese gedrehten und gespannten Kapseltheile fixiren den Arm in seiner falschen Stellung. Man kann an der Leiche alle Muskeln durchschneiden,

ohne auf diese abnorme Fixation irgend einen Einfluss auszuüben. Schneidet man dann aber auch die eben erwähnten Kapselpartieen durch, so ist dieselbe sofort behoben.

Fig. 101.




Fig. 102.




2) Die die Kapsel verstärkenden und spannenden Sehnen der MM. subscapularis, teres minor, supra- und infraspinatus sind nicht selten eingerissen oder ganz zerquetscht. Seltener reisst die Sehne des langen Bicepskopfes, dagegen wird sie öfter mehr oder weniger aus der Intertuberkularrinne herausdislocirt und kann dann entweder durch die Bruchspalte des gleichzeitig abgesprengten Tuberculum majus verlaufen oder zwischen dem überknorpelten Gelenkkopf und dem Pfannenrande eingeklemmt werden oder auch wohl sich um den äusseren und hintern Theil des Humerushalses herumschlagen *(Körte, Kocher)*. Sie kann dann ein bedeutendes Repositionshinderniss werden. Bleibt sie in ihrer Rinne liegen, so kann sie dem verrenkten Gelenkkopfe nur in einem bedeutenden Bogen, mithin nur mit beträchtlicher Spannung des Biceps folgen, woraus sich dann die Beugung und Supination des Vorderarmes erklärt.

3) Von den Muskeln verlaufen der Deltoides sowie der Coracobrachialis und der kurze Kopf des Biceps stark gespannt, emporgehoben und ausgebreitet über den medialen Umfang des Gelenkkopfes herunter. Der Subscapularis ist gewöhnlich ausgebuchtet und gequetscht, da der Gelenkkopf in der Richtung seiner Wirkung verschoben wird und sogar zwischen ihn und die Scapula ein-

dringen kann. In solchem Falle reissen auch wohl seine Fasern ein, ja der Kopf kann geradezu durch ihn hindurchdringen (Luxatio subscapularis), so dass er wie in einem Knopfloch eingeschlossen ist (Fig. 103). Er kann sich dann weiterhin sogar noch auf den Serratus anticus major, Luxatio serrato - scapularis (*Pitha*), Luxatio intracoracoidea (*Malgaigne*), einwärts vom Proc. coracoideus anstemmen. Auch der Deltoides kann gelegentlich vom Kopfe durchbohrt werden, so dass dieser dicht unter der Haut liegt, umfasst von den Bündeln dieses Muskels. Der lange Kopf des Triceps bildet dann mit dem des Biceps zusammen eine den Humerushals umfassende Schlinge.

Fig. 103.



4) An dem Gelenkkörper findet man nicht selten begleitende Fracturen. So zunächst am Tuberculum majus. Dasselbe wird zuweilen in dem Moment, in dem es sich an den oberen Rand der Cavitas glenoidalis anstemmt, bei der kraftvollen Abhebelung der Gelenkflächen abgesprengt, oder es wird durch den Zug der an ihm befestigten Muskeln, des Supraspinatus, Infraspinatus und teres minor abgerissen. Ist es von seiner Unterlage getrennt, so liegt es mit seiner Bruchfläche fast immer auf der Cavitas glenoidalis der Scapula auf, während sich die Bruchfläche des Humerus selbst gegen den unteren, inneren Rand dieser Gelenkfläche anstemmt und sich hier festhakt (*Roser*, *Körte*). Hält das Tuberculum dagegen Stand, so kann es umgekehrt ein Stück vom Rande der Cavitas glenoidalis oder vom Limbus cartilagineus abbrechen. In anderen Fällen können aber auch so vom inneren unteren Rande der Gelenkfläche kleine Stücke abgesprengt werden. Selten reisst der M. subscapularis das Tuberculum minus ab. Schliesslich können neben der Fractur des Tuberculum majus auch noch Fracturen des anatomischen oder chirurgischen Halses des Humerus und dazu noch Absprengungen kurzer Stücke von der inneren Seite der Diaphyse vorhanden sein (*Kocher*).

5) Die Gefäss- und Nervenstämme der Achselhöhle werden bei der Entstehung der Luxation im Momente der stärksten Hyperabduction durch den vordrängenden Kopf stets gedehnt und gezerrt. Dann aber gleiten sie seitlich nach einwärts und bleiben da auch nach vollendeter Luxation liegen. Zuweilen sind sie aber dann beträchtlicher Quetschung ausgesetzt, zumal wenn der Kopf den M. subscapularis durchbohrt hat und nun in unmittelbare Berührung mit ihnen getreten ist. Mit Ausnahme der Subscapulargefässe kommen Zerreissungen grösserer Gefässe dabei nur ganz ausnahmsweise vor; dagegen beobachtet man in Folge einer Compression der Gefässe mitunter Cyanose und Oedem des Armes. Durch die Laesion der Nerven kann es zur bleibenden Lähmung derselben kommen. Häufiger findet man jedoch nur eine vorübergehende Parese einzelner Nerven, vor Allem aber eine Lähmung des die hintere Portion des Deltoides versorgenden Nervus axillaris, der ja in der Regel gerade über die höchste Prominenz des verrenkten Kopfes hinzieht.

6) Das Bindegewebe in der Umgegend des Gelenkes ist stets blutig infiltrirt. Das extravasirte Blut senkt sich dann meist dem Verlaufe des langen Bicepskopfes folgend, so dass sich die Sugillationen oft auch an der inneren Seite des Oberarmes finden.

7) Sehr selten sind Zerreissungen der bedeckenden Haut- und Weichtheile, so dass der Kopf aus der Wunde herausschaut.

Untersucht man eine traumatische Luxation längere Zeit, nachdem dieselbe wieder eingerichtet worden ist, so ist der Gelenkkörper stets mehr oder weniger verändert. Da wo die Knorpel verletzt waren, hat sich der Defect durch eine feste Knochennarbe geschlossen. Am Rande der Kapsel und an dem Tuberculum majus und minus haben sich in der Regel Osteophyten, an ersterer Stelle nicht selten auch Knorpelwucherungen ausgebildet. Der Kapselriss ist gewöhnlich durch eine feste, dichte Narbe geschlossen, die übrige Kapsel aber schlaffer als im gesunden Zustande. Der Kapselriss heilt übrigens nicht in allen Fällen. Man findet vielmehr hier und da eine breite Communication der Kapsel mit dem unter dem M. subscapularis liegenden Schleimbeutel. Die Sehne des langen Bicepskopfes liegt oft ausser ihrer Rinne. War sie zerrissen, so kann ihr oberes Ende mit dem Gelenkkopf verwachsen und dann ein Lig. interarticulare darstellen.

Bei veralteten Luxationen bildet sich in der Regel eine Nearthrose, indem sich der Kopf an dem vorderen Umfang der alten Pfanne eine neue Pfanne schleift und sich mit einer von dem Rande dieser neugebildeten Pfanne ausgehenden, aus derbem Bindegewebe bestehenden und an der Innenfläche mit reichlichen Zotten besetzten Kapsel umgibt. Der Knorpelüberzug der neuen Pfanne zeigt in der Regel proliferirende Wucherungen wie bei der Arthritis deformans. Die alte Gelenkhöhle kann dabei grösstentheils veröden, indem theils die Kapsel, theils die abgerissene Sehnen der Mm. Supraspinatus und Infraspinatus mit ihr verwachsen. Ebenso verändert der Gelenkkopf seine Form vollständig. Da wo er seiner neuen Pfanne aufliegt, wird er platter, ja es bilden sich dort selbst neue Schlifffacetten. Wo er dagegen keine Berührung mit der Unterlage hat, wächst er zu unregelmässigen Erhebungen und Höckern aus und nimmt dadurch eine hypertrophische Form an. Sein Knorpel verschwindet stellenweise oder gänzlich oder zeigt zahlreiche fibröse Adhäsionen mit der Nachbarschaft. Seine untere Grenze kann eine unregelmässige Linie darstellen, so dass der anatomische Hals in einem Zickzack zu verlaufen scheint. Der vom Knorpel entblösste Knochen wird glatt und erhält ein polirtes Aussehen.


Die alte Kapsel füllt stellenweise die alte Gelenkpfanne aus oder ist mit dem Pfannenrand verwachsen, oder sie zieht auch wohl stark gespannt über den Kopf herüber. Zuweilen ist sie zwischen Kopf und Pfanne eingeklemmt. Sehr oft finden sich in ihr auch Knochenwucherungen.

Die die frische Luxation begleitenden Knochenbrüche heilen bei nicht erfolgter Reposition entweder in falscher Stellung oder gar nicht an und geben im letzten Falle zu ausgiebigen Knochenwucherungen Veranlassung.

Betrachten wir nun die

Symptome der präglenoidalen Luxationen,


so sind die Erscheinungen der verschiedenen Arten im Grossen und Ganzen dieselben und differiren nur dadurch, dass der verrenkte Kopf jeweils an verschiedenen Stellen zu sehen oder zu fühlen ist. Als Beispiel nehmen wir bei der folgenden Schilderung die häufigste aller dieser Verrenkungen, die Luxatio subcoracoidea, deren Zeichen gewöhnlich so prägnant sind, dass man dem Patienten die Luxation oft schon durch die Kleider hindurch ansehen kann (Pitha). Tafel IV.



Haben wir einen derartigen Verletzten vor uns, so zeigt derselbe einen ganz charakteristischen Habitus (Fig. 104). Er hält seinen Kopf und Rumpf gegen die kranke Seite geneigt, während der Vorderarm gebeugt ist und von der gesunden Hand unterstützt wird. Er klagt über heftige Schmerzen an der Schulter und, wenn der Plexus axillaris gezerrt wurde, über Schmerzen im ganzen Arm, Druck in der Axilla, über das Gefühl des Ameisenkriechens in der Hand und Taubseins in den Fingern.

Macht man nun, nachdem diese Symptome auf die Luxation hingewiesen haben, die Inspection des Gelenkes, so sieht man zunächst, dass die Schulter ihre normale Rundung und Wölbung verloren hat. Das Acromion springt stark hervor; namentlich tritt dies an seiner hinteren Ecke hervor. Ebenso ragt weithin sichtbar hervor der laterale Rand der Crista scapulae. Die Weichtheile fallen von dem Acromion gerade nach abwärts herab oder zeigen unter demselben eine Abflachung, welche der von hier verschwundene Gelenkkopf zurückgelassen hat. Statt dessen bildet dieser eine abnorme, runde Hervorwölbung der Haut nach innen vom Gelenk unterhalb des Proc. coracoideus in der *Mohrenheim*'schen Grube. Der Deltoides erscheint in seinen seitlichen Theilen herabgezogen, abgeflacht, zuweilen sogar eingesunken, vorn hingegen vorgewölbt. Da das obere Ende des Humerus nach innen gewichen ist, so haben sich die Insertionsstellen des Pectoralis major und Latissimus dorsi ihrer Ursprungsstelle genähert. Es wird dadurch eine Faltung der Haut am unteren Rande der vorderen und hinteren Achselwand bedingt. Besonders in die Augen fallend ist dann weiterhin die Stellung des Armes. Der Ellenbogen steht bedeutend abducirt, oft 6—12 Centimeter vom Rumpfe entfernt und gleich-

Fig. 104.



zeitig etwas nach hinten gerichtet. Die verlängerte Achse des Humerus führt nicht in die Cavitas glenoidalis, sondern nach innen von derselben in die *Mohrenheim*'sche Grube hin. Der Arm erscheint dadurch in der Gegend des Deltoidesursprunges wie abgeknickt, und man kann den Humerus von diesem Abknickungswinkel aus nach innen und vorn verfolgen. Der Arm erscheint ferner, besonders wenn man den Patienten von hinten her betrachtet, etwas verlängert, das Olecranon steht tiefer. Die Verlängerung tritt um so mehr hervor, je längere Zeit nach der Luxation verstrichen ist. Es beruht dies, ebenso wie eine allmähliche Verminderung der Abductionsstellung des Oberarmes auf einer Dehnung der ursprünglich gespannten Kapseltheile und Bänder, speciell des Lig. coraco-humerale und seiner Ausstrahlungen. Die Achselhöhle ist theils vom Kopf, theils von der nach innen dislocirten Oberarmdiaphyse ausgefüllt, so dass die Kuppel der Axilla tiefer steht und die vordere Achselwand verlängert ist.


Zu diesen stets mehr oder weniger durch das Auge wahrnehmbaren Symptomen gesellen sich nun noch die durch Palpation zu eruirenden. Man fühlt zunächst das mehr nach der Seite und hinten prominirende Acromion und kann, in die Vertiefung unter demselben mit dem Finger eindringend, die leere Gelenkgrube abtasten. In der *Mohrenheim*'schen Grube fühlt man den runden Gelenkkopf selbst durch die Muskelwand des Pectoralis hindurch und kann ihn auch von der Achselhöhle aus umgreifen. Der Arm ist in seiner falschen Stellung fast vollständig fixirt. Er kann activ in der Regel gar nicht oder doch höchst wenig abducirt oder rotirt und auch passiv nur unter grossen Schmerzen und mit Mühe etwas nach hinten und vorn gebracht oder dem Leibe genähert werden. Die vorhandenen passiven Bewegungen sind meist nur durch die Rotation der Scapula möglich. Bei jedem Versuch, eine grössere Bewegung hervorzurufen, fühlt man einen federnden Widerstand.

Die Erscheinungen an der Schulter können gelegentlich durch ein starkes Fettpolster oder durch einen grossen Bluterguss, oder wenn der Patient später zur Behandlung kam, auch durch die der reparativen Gewebsreaction ihr Dasein verdankende Schwellung verdeckt werden. In solchen Fällen verhilft dann die genaue Untersuchung in der Narcose zur richtigen Erkenntniss der Verletzung. Ist der Arm stärker beweglich, so kann dies durch

die Absprengung von Stücken des Pfannenrandes oder der Tubercula hervorgebracht werden.

Die **Symptome** der **Luxatio axillaris** sind den oben geschilderten insofern ähnlich, als wir auch hier die der Luxation an sich zukommenden Erscheinungen finden. Eine Verschiedenheit resultirt nur durch den jetzigen tieferen Stand des Kopfes in der Achselhöhle. Derselbe ist in dieser äusserst leicht zu fühlen. Er steht nicht immer gerade nach unten, sondern weicht zuweilen mehr nach vorn, zuweilen mehr nach hinten ab. Je stärker er nach innen steht, um so stärker wird die Abduction des Armes. Charakteristisch sind dann ferner für diese Luxationsform eine grosse Spannung und Abplattung des Deltoides, eine stärkere Vertiefung unter dem Acromion und eine bedeutendere Verlängerung des Armes und der vorderen Achselwand.

Fig. 105.




Bei der Unterart der Luxatio axillaris, der **Luxatio humeri erecta,** hat der Arm die elevirte Stellung beibehalten, welche er im Moment der Entstehung der Luxation einnahm. Der Ellenbogen steht in der Höhe des Kopfes, die Hand des verrenkten Armes wird mit ihrer Dorsalseite gegen diesen angedrückt (Fig. 105) oder auch mit der anderen Hand fixirt, um die bei jeder Bewegung eintretenden Schmerzen zu verhüten.

Bei der **Luxatio subclavicularis** bildet der Kopf in der Gegend, wo Pectoralis major und Deltoides zusammenstossen, eine Hervorragung, ist dagegen von der Achselhöhle aus schwer zu fühlen. Es rührt dies einmal daher, dass der Kopf sich unterhalb des Schlüsselbeins befindet, dann aber auch daher, dass der Arm jetzt so stark adducirt steht, dass kaum ein Finger in die Axilla eindringen kann. Der Arm ist ferner

nach einwärts rotirt, die Schulter stark abgeflacht und ein grosser Abknickungswinkel am Ansatz des Deltoides vorhanden. Die Sehnen der am Tuberculum majus inserirenden Muskeln, Supra-, Infraspinatus und Teres minor, sind straff über die Gelenkhöhle gespannt oder auch wohl selbst zersprengt oder gleichzeitig mit dem Tuberculum abgerissen, so dass man dann noch Crepitation an der Bruchstelle fühlt. An der inneren Seite des Armes findet man häufig eine Ecchymose und ebenso eine stärkere Faltung der Haut in der Gegend des Pectoralisansatzes.

Bardenheuer theilt zwei Beobachtungen mit, in denen sich bei einer derartigen Luxation der Arm in der Horizontalen vollständig fixirt zeigte. Die Deformität ergibt sich leicht aus der untenstehenden Figur (Fig. 106).

Fig. 106.




Die als Luxatio horizontalis bezeichnete Verletzung war durch starke Elevation und gleichzeitige Retroversion des Armes beim Fallen von der Treppe entstanden. Die Reposition gelang in der Narcose leicht durch mässige Rotation nach aussen und Extension.

Besondere Symptome werden jeweils noch durch die **Complicationen** hervorgerufen.

Die Fractur der Tubercula erkennt man meist an einer grösseren Beweglichkeit des luxirten Kopfes, die gleichzeitige Fractur des anatomischen oder chirurgischen Halses des Humerus daran, dass neben den für die Luxation charakteristischen Veränderungen der Schulter noch Crepitation vorhanden und der Arm nicht abnorm fixirt ist, sondern vollständig beweglich am Körper herunter hängt.

Es erübrigt uns nun noch, einige Worte über die **Luxatio supracoracoidea** zu sagen. Dieselbe ist ausserordentlich selten. Nach den Leichenexperimenten von *Busch* nahm man bisher an, dass sie nur entstehen könnte, wenn gleichzeitig die Sehne des Subscapularis und die vordere Wand der Kapsel weit zerrissen sind und der Proc. coracoideus oder das Acromion abgebrochen ist. Diese alte Ansicht lässt sich aber nicht völlig aufrecht erhalten. *Mayo-Robson* beobachtete nämlich eine Luxatio supracoracoidea ohne diese begleitenden Verletzungen. Die fragliche Verrenkung war bei einem 16jährigen Arbeiter dadurch entstanden, dass beim Anziehen eines Rockes der rechte bereits in seinem Aermel befindliche Arm durch Verwickelung des Rockes mit einem Treibriemen plötzlich nach oben und hinten gerissen wurde. Als *Mayo-Robson* 6 Wochen später auf den nicht reponirten, vor dem Acromion etwas nach aussen von dem Proc.

a. (Ansicht von vorne). Fig. 107. b. (Seitl. Ans.)





coracoideus fühlbaren Gelenkkopf des Humerus einschnitt, fand er, abgesehen von der Luxationsstellung, eine Längsfissur, welche das Tuberculum majus theilweise vom Kopf und Schafte des Humerus losgetrennt hatte, die Cavitas glenoidea mit Callusmassen ausgefüllt, im übrigen aber alle Knochentheile unverändert.

Die **Symptome** sind kurz folgende (Fig. 107 a u. 107 b): Man findet eine Prominenz an der vorderen Seite zwischen Acromion und Proc. coracoideus. Der Vorsprung gehört dem Kopfe an und hat dessen Configuration, folgt den Bewegungen des

Humerus und ist durch den Deltoides abzutasten. Er springt stärker hervor, wenn man den Arm nach hinten wendet oder ihn perpendiculär erhebt. Es fehlt die Einsenkung des Deltoides sowohl vorn als aussen. Das Acromion steht der Höhe des prominirenden Kopfes gegenüber, indess viel tiefer, so dass eine bedeutende Diastase zwischen diesen beiden Punkten besteht. An der hinteren Seite kann man unterhalb des Acromion die Cavitas glenoidalis oder doch ihren hinteren Rand abpalpiren. Der Arm steht adducirt, ist leicht nach aussen rotirt, retrovertirt und verkürzt. Die active Abduction desselben ist vollständig aufgehoben, die passive bedeutend vermindert, die Ante- und Retroversion in geringem Masse möglich. Zuweilen gelingt es, an dem abgebrochenen Proc. coracoideus Crepitation zu erzeugen.

Die **Prognose** dieser Verletzung ist sehr ungünstig für den Fall, dass die Einrichtung nicht gelingt, weil die Function eine sehr gestörte ist.

Die **Reposition** wird man durch Elevation des Armes nach oben und hinten, combinirt mit einem Druck auf den prominirenden Kopf versuchen.

Die **Differential-Diagnose** hat die Aufgabe, die Luxation nach vorn zu unterscheiden von der Luxatio claviculae supraacromialis, der Fractur des Acromion, der Fractura colli scapulae, der Fractura colli humeri anatomici und chirurgici. Die bezüglichen Unterscheidungsmerkmale ergeben sich leicht aus den nachstehenden Tabellen.

Prognose der praeglenoidalen Luxationen.

Die Prognose der Luxationen nach vorn ist im Allgemeinen eine gute, da die Reposition bei richtiger Ausführung meist gelingt und die Function des Armes sich dann wiederherstellt. Es bleiben jedoch oft genug auch nach leichter Reposition Störungen in der Beweglichkeit des Armes zurück. Diese beruhen dann zumeist auf einer Läsion des Nervus axillaris, der zu Folge der Arm kaum zur Horizontalen erhoben werden kann, da die Antagonisten des Deltoides dies nicht zulassen. Der Zustand kann eine Ankylose des Gelenkes vortäuschen, jedoch überzeugt man sich von der Bewegungsmöglichkeit leicht in der Narcose.

Es können aber nach der Reposition auch noch schwere Lähmungen des ganzen Armes zurückbleiben. Nach *Wigand*'s sorg-

fältiger Zusammenstellung sind in der Litteratur bisher 59 Fälle derartiger aus den verschiedensten Gründen entstandener Luxationslähmungen bekannt geworden. Die Prognose dieser Fälle ist immer eine zweifelhafte, wenn nicht etwa ein operativer Eingriff noch eine Besserung erzielt. Wir werden später sehen, dass *R. Müller* ein solches operatives Vorgehen mit Erfolg eingeschlagen hat.

Missglückt die Reduction oder wird sie gar nicht ausgeführt, dann leidet die Gebrauchsfähigkeit der oberen Extremität bedeutend. Im günstigsten Falle bildet sich eine gute Nearthrose. In andern Fällen wird der ausgetretene Gelenkkopf an seiner falschen Stelle wie ein Fremdkörper durch eine regenerative Gewebswucherung mit nachfolgender Schrumpfung des frisch gebildeten Bindegewebes fest mit seiner Unterlage verlöthet, während sich die alte Gelenkhöhle mit fibrösen Schwarten ausfüllt.

Nicht selten resultirt auch durch Calluswucherung und Osteophytenbildung eine Ankylose des Gelenkes. Ferner kann der Kopf durch fortdauernden Druck auf den Plexus brachialis nicht allein eine Lähmung des Armes, sondern auch trophoneurotische Störungen aller Art hervorbringen. Ein Glück hierbei ist es, dass man die Reposition noch längere Zeit nach der Verletzung ausführen kann. Es gelingt dann zwar nicht, den Arm wieder vollständig mobil zu machen, aber doch dem Patienten ein erträgliches Dasein zu verschaffen.

So reponirte *Wutzer* mit Erfolg noch nach 8, *Baum* und *Chassaignac* nach 9 Monaten, *Sedillot* nach 1 Jahre, *Simon* sogar noch nach 2 Jahren. Die Regel aber wird doch die sein, dass nach der 6ten bis 8ten Woche die Luxation als eine veraltete anzusehen ist.


Die Schulterluxationen haben verhältnismässig oft die Neigung zu recidiviren, so dass gerade hier die **habituellen Luxationen** ziemlich häufig sind. Es giebt Menschen, welche ihre Schulter 60, 70mal und noch mehr luxirt haben, bei denen die Luxation durch eine einfache Muskelaction entsteht oder sogar willkürlich hervorgebracht werden kann.

Der Ursachen dieser habituellen Luxationen giebt es verschiedene, und es combiniren sich in der Regel mehrere derselben. Einmal findet man eine unvollständige Vernarbung des Kapselrisses (*Malgaigne*), andere Male eine vergrösserte Communicationsöffnung der Gelenkhöhle mit dem Schleimbeutel des M. subscapularis (*Roser*).

Wieder in anderen Fällen tragen complicirende Knochenbrüche, Absprengungen des Pfannenrandes, Defecte des Kopfes, welche das Herausgleiten desselben begünstigen, die Schuld. Häufiger aber als durch die genannten Veranlassungen wird das Habituellwerden der Luxation dadurch bedingt, dass beim Zustandekommen der letzteren die Mm. supra- und infraspinatus vom Tuberculum majus total abreissen, sich dann hinter das Acromion zurückziehen, nicht wieder am Humerus anheilen und nunmehr die concentrische Fixation der beiden Gelenkkörper sehr mangelhaft wird (*Joessel*).

Ist dies der Fall, so wird durch die eigene Schwere des Armes und die Wirkung der Adductoren und Einwärtsroller der Kopf nach innen gegen den vorderen Rand der Cavitas glenoidalis gleiten und mit dieser mehr und mehr an seiner hintern äussern Fläche articuliren. Es schleifen sich dann schliesslich der vordere innere Rand der Cavitas und die eben genannte Partie des Kopfes gegen einander ab. Dieser letztere verliert dadurch an seiner hinteren äusseren, an das Tuberculum majus grenzenden Hälfte seine Wölbung, an der Scapula aber bleibt von der ursprünglichen Gelenkfläche nur eine kleine äussere Hälfte bestehen (Fig. 108 a), während nach innen von dieser, theilweise den Hals des Schulterblattes einnehmend, eine neue Pfanne entsteht (Fig. 108 b). Diese grössere innere Hälfte liegt dann mit der äusseren nicht in einer Ebene, sondern stösst mit ihr in einer senkrecht abfallenden Kante unter einem Winkel zusammen. Gelenkkopf und Cavitas glenoidalis passen dann also so aufeinander, dass der relativ normale innere Abschnitt des Kopfes mit der inneren neuen Hälfte der Gelenkfläche articulirt, die Furche dagegen, welche diesen normalen Theil des Kopfes mit dem ihm angrenzenden Defect seines hinteren Abschnittes verbindet, auf der vorspringenden

Fig. 108.



Kante der Cavitas reitet (*Löbker*). Bei einer solchen Veränderung des Skelettes ist aber das Austreten des Kopfes aus seiner Kapsel durch geringe Gewalten leicht erklärlich.

Bei einem kürzlich von *Sick* beschriebenen Fall fand sich als Sectionsbefund eine ausgedehnte Abreissung der Kapsel von der Fossa glenoidalis, wobei das Labrum glenoideum zerstört wurde. Die Heilung war dann mit starker Erweiterung der Gelenkhöhle durch Dehnung der Kapsel und der sie verstärkenden Sehnen der Schulterblattmuskulatur zu Stande gekommen. Eine Abreissung einer Sehne oder eines Tuberculum hatte nicht stattgefunden.

Therapie der praeglenoidalen Luxationen.

Es empfiehlt sich im Allgemeinen, die frische traumatische Luxation möglichst gleich nach der Verletzung zu reponiren. Dies ist aber keineswegs eine sehr leichte Aufgabe, und man muss vor allen Dingen wissen, welche Hindernisse sich der Einrichtung in den Weg stellen können.

Die erste Schwierigkeit bietet bei der grossen Beweglichkeit des Schulterblattes die Fixation dieses letzteren. Man erreicht dieselbe, indem man auf das Acromion von oben nach unten einen Druck und gleichzeitig auf den äusseren Rand der Scapula von aussen nach innen einen Zug ausübt.

Das zweite Hindernis wird von den Muskeln gebildet, und zwar entweder durch die elastische Retraction ihres zerrissenen und infiltrirten Gewebes oder durch eine active Contraction derselben im Momente der beabsichtigten Einrenkung. In beiden Fällen wird das Hemmniss durch die Chloroformnarkose gehoben.


Von viel grösserer Bedeutung für die Reposition ist die Gelenkkapsel. Denn selbst in der Chloroformnarkose oder nach Durchschneidung aller Muskeln bleibt die abnorme Fixation des Kopfes noch bestehen. Besonders spielt hier die Spannung des Lig. coracohumerale eine wichtige Rolle. Es kann aber auch der Kapselriss relativ zu klein sein, so dass der Kopf in demselben wie in einem Knopfloch fest umschnürt wird, und schliesslich können sich Kapselfetzen zwischen Kopf und Pfanne eingeklemmt haben. Alle diese Hindernisse wird man umgehen, wenn man die Kapsel stark erschlafft, und dies geschieht dann, wenn man den Arm über die Schulterhöhe erhebt und ihn gleichzeitig etwas retrovertirt.

Durch dieselbe Bewegung wird auch die eingeklemmte Bicepssehne freigemacht

In sehr seltenen Fällen misslingt die Reposition trotz Zuhülfenahme zweckmässiger Reductionsmanöver und der Narcose. In diesen Fällen liegen von aussen her unüberwindliche Repositionshindernisse vor. Als solche fanden sich die Interposition eines abgesprengten Randstückes der Cavitas glenoidalis oder die Zwischenlagerung der abgerissenen Tubercula. *Gillepsie* fand bei einer 7 Wochen alten Luxation als Reductionshinderniss den Kapselriss schon theilweise vernarbt und dadurch zu klein geworden, nebenbei aber noch eine Verschiebung der langen Bicepssehne aus der Furche. Die gleiche Luxation der Bicepssehne sah *Körte*. *Malgaigne* hebt die Interposition von Muskeln hervor, *Gurlt* den gleichzeitigen Bruch des anatomischen Halses des Humerus.

Ehe wir die **Repositionsmethoden** selbst besprechen, wollen wir noch erwähnen, dass man bei denselben und namentlich bei älteren Leuten mit rigiden Gefässen nicht zu grosse Gewalt anwenden soll, weil man sonst diese Gefässe zerreissen und grosses

Fig. 109.



Unglück anrichten kann. Im Allgemeinen schreibt uns die genaue anatomische Kenntniss der örtlichen Verhältnisse und unsere Erfahrung über den Luxationsmechanismus den Weg der Reduction vor. Es ist daher überflüssig, die Unzahl aller der erfundenen

Repositionsmanöver hier anzuführen, wir beschränken uns vielmehr darauf, die zur Zeit noch gebräuchlichen zu beschreiben und durch Abbildungen möglichst anschaulich zu machen.

1. Impulsionsmethode nach Avicenna. (Fig. 109.)


Der Patient sitzt auf einem Stuhl. Die der Luxationsseite gleichnamige Hand des Arztes sucht den Kopf des Humerus von der Achselhöhle aus mit den halbgeschlossenen Fingern, die andere denselben von oben her zu umfassen und gegen die Gelenkhöhle zu schieben. Der luxirte, im Ellenbogengelenk flectirte und am besten etwas über einen rechten Winkel abducirte Arm des Patienten hängt über den Vorderarm des Arztes, so dass er auf diese Weise gestützt wird.

Bei der Luxatio supracoracoidea und axillaris kommt man auf diesem einfachen Weg zuweilen zum Ziele. Das Verfahren ist jedoch das alleinig anwendbare bei den mit Fractura colli humeri complicirten Luxationen.

2. Extension an dem perpendiculär erhobenen Arm, Elevationsmethode. (Fig. 110.)

a) *Mothe* lässt den Patienten einen niedrigen Sitz einnehmen, fixirt die Scapula mittelst Tüchern, stellt sich selbst auf einen Stuhl oder Tisch hinter den Patienten, umfasst den luxirten Arm über dem Ellenbogen, zieht ihn an, bis er etwas leichter beweglich ist, führt ihn dann sanft neben dem Kopf vorbei nach oben, bis er mit der Längsachse des Körpers parallel steht und macht nun eine Bewegung, als wolle er den Kranken in die Höhe ziehen. Bei diesem Manöver tritt dann der Gelenkkopf unter einem eigenthümlichen Geräusch in seine Höhle zurück. Ohne Gehülfen vollführte *Mothe* die Reposition so, dass er die Gegenextension mit dem auf die kranke Schulter aufgesetzten Fuss bewirkte, während der Patient auf einem niedrigen Bett lag.

Fig. 110.



b) *Rust* änderte dies Verfahren auf folgende Weise: Der Kranke sitzt auf einem auf dem Boden liegenden Kissen. Ein an der entgegengesetzten Seite des verrenkten Armes knieender Gehülfe umfasst mit beiden in einander gefalteten Händen die kranke Schulter und drückt sie abwärts. Ein zweiter, an der kranken Seite auf einem Stuhl stehender Gehülfe elevirt nun den Arm wieder senkrecht nach oben und extendirt dann kräftig. Der Chirurg setzt seine beiden Daumen auf den Gelenkkopf und drückt denselben in seine Höhle. Ist der Kopf eingeschnappt, so setzt der Chirurg nunmehr den Daumen der einen Hand fest in die Achselhöhle und ergreift mit der anderen den Arm im Ellenbogengelenke, um ihn allmählich in Adductionsstellnng an den Thorax herabzuführen.

c) *Kluge* bewirkte bei der *Mothe*'schen Methode die Fixirung des Schulterblattes dadurch, dass er durch einen an der gesunden Seite stehenden Gehülfen mit beiden Händen von oben her auf das Acromion drücken liess.

d) *Mayntzer* stellt sich, eine linksseitige Luxation angenommen, hinter den Rücken des Patienten, fasst über dessen linke Schulter hin mit der rechten Hand den luxirten Arm am unteren Humerusende, führt dieses in derselben senkrechten Ebene, in welcher der Humerus liegt (also nahezu in der Frontalebene), aufwärts und stellt es perpendiculär zur Clavicula. Während er nun mit der linken Hand, deren Daumen rückwärts, deren Finger brustwärts liegen, von oben her auf das Acromion drückt und dadurch die Scapula fixirt und contraextendirt, extendirt er an dem elevirten Arm und erreicht dadurch ohne jede weitere Assistenz die Reduction.

e) *Simon* legt den Patienten mit der gesunden Seite auf den Boden, lässt die Füsse desselben festhalten und den Arm mittelst einer Extension am Handgelenk kräftig nach oben ziehen. In dieser Stellung lässt er dann den Körper des Verletzten Pendelbewegungen machen, durch welche dann das Eingleiten des Kopfes bewirkt wird („Pendelmethode").


3. Hebelmethode.

Die Hebelmethode wird stets zugleich mit der Extension verbunden; sie ist vorzüglich von *Cooper* ausgebildet worden.

Der Kranke sitzt auf einem Stuhl, hinter welchem der Chirurg steht. Hierauf wird der Arm so weit abducirt, bis das Knie unter

denselben geschoben werden kann (Fig. 111). Mit der einen Hand drückt nun der Operateur auf das Acromion, mit der anderen umfasst er den Humerus oberhalb des Ellenbogengelenkes und drückt denselben fest nach unten und innen. Der Kopf wird dabei nach aussen extendirt und gleichzeitig über das Knie abgehebelt. In dem Augenblicke, wo der Kopf in der Nähe des Gelenkes angelangt ist, erhebt der Operateur den Fuss auf die Zehenspitze und drängt den Kopf nach oben in das Gelenk hinein.

Fig. 111.



Anstatt des Kniees kann man in die Achselhöhle bei liegender Stellung des Patienten auch die des Schuhes entledigte Ferse oder die Faust (Fig. 112) einstemmen. Namentlich die letztere Methode ist sehr zu empfehlen.

Die Wirkung dieser Manipulationen ist leicht zu verstehen. Der in die Achselhöhle eingestemmte Theil des Operateurs fixirt die Scapula und bildet gleichzeitig ein Hypomochlion, so dass der Gelenkkopf als Hebelarm der Last die entgegengesetzten Bewegungen machen muss, wie der lange Hebelarm der Kraft.

Man kann auch wohl diese Hebelmethode mit der nachher zu besprechenden *Kocher*'schen Rotationsmethode verbinden.


Man stemmt zu diesem Zwecke seine Ferse in die Achselhöhle des Patienten und extendirt nun am Arm, während man denselben stark nach auswärts rotirt. Dann elevirt man den so extendirten Arm unter Aufrechterhaltung des Zuges nach vorn hin in die Sagittalebene und erreicht so die Reposition.

Kocher empfiehlt dies Vorgehen für die Fälle, wo man es nicht wagt, bei seinem Rotationsverfahren stärkere Gewalt anzuwenden.

4. Die Rotationsmethoden.


Die Rotationsmethoden sind eigentlich erst in neuerer Zeit cultivirt worden. Man hat in dem rechtwinklig gebeugten Vorderarm einen sehr langen Hebelarm, an dem man die Rotation des Humerus vollführen kann. Sie geschieht zunächst nach aussen,

Fig. 112.



um den Kapselriss zu vergrössern, die gedehnten Kapseltheile und vor allem das Lig. coracohumerale zu entspannen. Durch eine Schlussrotation nach innen wird dann der Kopf dem geöffneten Kapselriss entgegengeführt.

Fig. 113.




Wir kennen zwei Rotationsmethoden:

a) Rotation in Adductionsstellung (*Schinzinger*), (Fig. 113). Der Patient sitzt auf einem Stuhl. Das Schulterblatt kann durch die aufgelegten Hände eines Gehülfen fixirt werden. Der gegenübersitzende Arzt fasst nun den rechtwinklig gebeugten Arm mit beiden Händen, drückt ihn fest gegen die Brust des Patienten an und rotirt ihn soweit nach aussen, bis die Hand gerade nach aussen und selbst etwas nach hinten vom adducirten Oberarm steht. In diesem Moment stemmt sich das

Tuberculum majus gegen den hintern Pfannenrand an. Fühlt man diesen Widerstand, so erhebt man nun den Oberarm etwas und lässt dann rasch die Rotation nach innen folgen.

b) Die Rotation mit Elevation (*Kocher*). Das *Kocher*'sche Verfahren berücksichtigt in erster Linie die pathologisch-anatomischen Verhältnisse und bezweckt vorzüglich, die sich über die Pfanne herüberlegende Kapsel, namentlich aber die obere Kapselwand von der Pfanne abzuheben und so das Lig. coraco-humerale zu entspannen.

Fig. 114.



Die Art und Weise, wie dies erreicht wird, ist folgende:

1. Tempo: Der abducirte Ellenbogen wird langsam, aber kräftig an den Leib angedrückt, um den Humeruskopf behufs der nun folgenden Rotation fest an den vordern Pfannenrand anzupressen. Ist der Ellenbogen am Leibe angelangt, so führt man ihn, um einen noch sichereren Halt zu gewinnen, etwas nach rückwärts und sucht ihn dabei soviel als möglich hinter dem Körper der Medianlinie zu nähern (Fig. 114).

2. Tempo: Nun erfolgt, bei rechtwinklig im Ellenbogen flectirtem Arm die Auswärtsrotation des Oberarmes, indem man mit einer Hand am Ellenbogen, mit der anderen am Handgelenk anfasst, bis der Vorderarm ganz lateralwärts gerichtet ist. Es


ist dabei zweckmässig, zugleich einen Zug am Arm nach abwärts auszuüben.

Zeigt sich bei diesem Manoever, dass der Deltoides durch den Schulterkopf nicht deutlich emporgehoben wird, so ist es zweckmässig, durch einen Zug mittelst einer Compresse unter dem Arm lateralwärts das Heraustreten des Kopfes zu fördern.

Ist der Arm möglichst nach auswärts rotirt, so wartet man 1 Minute, da bei allmählichem Nachlass der Spannung die Auswärtsrotation dann häufig noch etwas gesteigert werden kann. Nun folgt das

3. Tempo: Während man die Auswärtsrotation des Armes unverändert festhält, führt man den Ellenbogen in der Sagittal-

Fig. 115.



ebene des Körpers direct (Fig. 115) ganz langsam, aber mit Kraft nach vorn so hoch empor, als es geht.


4. Tempo: Hat man die möglichste Elevation erzielt, so lässt man nun allmählich mit der Auswärtsrotation nach, um zuletzt die Hand nach der Brustfläche der andern Seite zu führen, d. h. den Oberarm einwärts zu rotiren (Fig. 116).

Während der ganzen Reposition wird keine einzige plötzliche oder ruckweise Bewegung gemacht, trotzdem aber jede Bewegung

mit einer gewissen Kraft zu Ende geführt. Zu starke Gewalt darf man aber auch nicht anwenden, da man sonst den Humerus abbrechen kann.

Sollen wir nun schliesslich eine Kritik aller der von uns aufgezählten Repositionsverfahren geben, so haben die verschiedenen Kliniker und Aerzte ihre Lieblingsmethoden. Man kann allerdings mit jeder der angeführten Methoden zum Ziel kommen. Im Allgemeinen empfiehlt es sich aber doch, derjenigen Methode den Vorzug zu geben, welche die pathologische Anatomie der Luxation am meisten berücksichtigt, und das ist unzweifelhaft

Fig. 116.



die *Kocher*'sche Rotationsmethode. Wer einmal diese Methode angewendet und sich von ihrer auch ohne Narcose leicht zu ermöglichenden und verhältnissmässig schonenden Ausführbarkeit überzeugt hat, wird immer auf dieselbe zurückgreifen.

Dass die Luxation eingerichtet ist, erkennt man aus dem schnappenden Geräusch beim Zurücktreten des Kopfes in seine Pfanne, durch die Verminderung des Schmerzes, durch die Wiederherstellung der normalen Länge und der normalen Achsenrichtung des Humerus, durch das Verschwinden der Schulterdeformität und

die Möglichkeit, den Arm wiederum frei nach allen Richtungen hin bewegen zu können.

Gelingt es nicht, eine frische Luxation einzurichten, muss man eines der vorher genannten unüberwindlichen Repositionshindernisse annehmen, so ist die aseptische Arthrotomie, die sog. blutige Reposition auszuführen, d. h. man incidirt das Schultergelenk, lässt sich die Wunde auseinanderhalten, untersucht mit dem Auge das Hinderniss und beseitigt dieses je nach dem vorliegenden Fall.

Eine besondere Besprechung verdient die Frage der Behandlung **veralteter Luxationen.** Wie sich aus unserer früheren Betrachtung der pathol.-anatomischen Verhältnisse der nicht eingerichteten Luxationen ergiebt, wird das Zurückbringen des Kopfes in seine Pfanne bei einer veralteten Luxation in nicht complicirten Fällen dadurch erschwert oder verhindert, dass sich die alte Pfanne verlegt, indem sich die unverletzten Kapseltheile über die Pfanne herüberlegen, mit derselben verwachsen und so eine feste Brücke zwischen Pfannenrand und anatomischem Hals des Humerus bilden. Die Adhäsionen sind es vor allen Dingen, welche die Reposition veralteter Luxationen erschweren.

Nachdem man dies erkannt hat, wird man bei der Reposition veralteter Luxationen von vorneherein davon absehen, diese Adhäsionen durch rohe Gewalt zerreissen zu wollen. Dabei könnten zu viele Nebenverletzungen entstehen. Man wird aber auch nicht viel von der vielfach empfohlenen Dehnung der Adhäsionen durch permanente Extension des Oberarmes erwarten dürfen. Dieselbe hat bisher nur in sehr wenigen Fällen Nutzen gestiftet. Dagegen dürfte sich nach dem ausserordentlich günstigen Erfolge in der Praxis das *Kocher*'sche Rotationsverfahren ganz besonders zur Beseitigung dieser Adhäsionen eignen. Wir empfehlen also, dasselbe in jedem Falle von veralteter Luxation zunächst zu versuchen. Dasselbe berücksichtigt am besten die pathologisch-anatomischen Verhältnisse auch der veralteten Luxation, indem es eine gehörige Abhebung der oberen Kapselwand von der Pfanne und damit eine Dehnung der Kapselrissnarbe anstrebt und gleichzeitig ein Zerreissen der mit diesem Bandapparat unmittelbar zusammenhängenden Adhäsionen bewirkt. Die Resultate des *Kocher*'schen Verfahrens sind sehr gute. *Kocher* selbst konnte von 28 veralteten Luxationen mit demselben 25 Fälle einrichten, und von diesen waren 5 über 4 Monate alt.

Dem *Kocher*'schen Verfahren kann der einzige Vorwurf gemacht werden, dass bei der nothwendigen kräftigen Auswärtsrotation in einigen Fällen der Oberarm im chirurgischen Hals oder in der Diaphyse abgebrochen ist. Das sind aber sicher nur Ausnahmefälle, die dann eintreten, wenn die Adhäsionen der Zerreissung grösseren Widerstand bieten als der Knochen, und dies trifft in der Regel nur für ältere, gebrechliche Individuen zu. Bleibende üble Folgen hat eine solche Fractur aber nicht. Bricht der Kopf ab, so könnte man das Kopf-Fragment an Ort und Stelle lassen und das untere Fragment reponiren. *Kocher* hat das mit sehr befriedigendem Enderfolg gethan. Bricht aber der Humerusschaft, so würde man einfach einen Verband anlegen und die Fractur heilen lassen, ehe man weitere Versuche macht, die veraltete Luxation zu behandeln.

Vielleicht liessen sich solche Nachtheile der sonst so vorzüglichen *Kocher*'schen Methode dadurch beseitigen, dass man dieselbe mit der permanenten Extension des Oberarmes combinirt, d. h. zunächst durch stärkere Gewichtsbelastung des Oberarmes die Adhäsionen zu dehnen versucht und sie dann erst zerreisst. Bei einer älteren Frau, bei der ich eine Fractur des Oberarmes zu erleben befürchtete, habe ich so nach 14tägiger Extension die Reposition mit der *Kocher*'schen Methode anstandslos erzielt.

Es giebt nun aber gewisse Fälle veralteter Luxationen, bei denen es in der Natur der pathologisch-anatomischen Verhältnisse liegt, dass man auf unblutigem Wege unter keinen Umständen zum Ziele zu kommen vermag. Das sind diejenigen von uns oben geschilderten Fälle, die in Folge von begleitenden Fracturen eine zu grosse Missstaltung der normalen Verhältnisse in der Weise zeigen, dass die geschrumpfte Kapsel nicht nur mit der Pfanne verwachsen, sondern selbst auch mehr oder weniger verknöchert ist, während der Kopf dadurch deformirt ist, dass die Fragmente in falscher Stellung angewachsen sind.

Ist in solchen Fällen eine vollständige Unbrauchbarkeit des Armes vorhanden und lässt sich diese auch durch eine passende orthopädisch-gymnastische Behandlung nicht bessern oder haben die Patienten in Folge des Bestehens der Luxation Beschwerden durch Druck auf die Gefässe und Nerven, so ist bei denselben ein operatives Eingreifen gestattet.

Wir sehen hier ab von dem Vorgehen *Polaillon*'s, welcher subcutan die Kapsel und die fibrösen Verwachsungen durchschneiden will, weil bei diesem Vorgehen durch unerwünschte

Nebenverletzungen zu viel Schaden angerichtet werden kann. Wir lassen die Wahl vielmehr nur zwischen der sog. blutigen Reposition und der Resection des Humeruskopfes. Jede dieser beiden Operationen hat ihre Indication. In jedem Fall eröffnet man das Gelenk durch einen ausgiebigen Schnitt wie zur Resection. Liegen dann keine Complicationen vor, wird dasHinderniss vielmehr nur dadurch gegeben, dass die alte Pfanne durch Verwachsungen der geschrumpften Kapsel verlegt ist, so wird man mittelst Durchschneidung und Abhebelung dieser Weichtheilmassen die alte Pfanne frei machen. Liegt aber das Hinderniss wesentlich in der Deformirung des Kopfes oder in Verknöcherungen der Kapsel, so wird die Resection geboten sein.

Uebrigens sind die bisherigen Resultate der blutigen Reposition, wie dies kürzlich *Knapp* gezeigt hat, keine glänzenden. Sehr oft hat die Function des Armes nachher zu wünschen übrig gelassen, ja es sind sogar Ankylosen und Nekrosen des Kopfes beobachtet worden. Etwas besser waren die Resultate der Resection. Denn während von 12 Fällen blutiger Reposition nur 4 erhebliche Besserung zeigten, wiesen von 20 Resectionen 16 gute und zum Theil sehr gute Erfolge auf. *Knapp* kommt daher zu dem Schluss, dass im Allgemeinen die Resection der blutigen Reposition vorzuziehen sei; sicher ist sie jedenfalls das weniger verletzende Verfahren. Zu dem gleichen Resultat wie *Knapp* gelangte auch *Delbet*. *Schade* dagegen befürwortet die aseptische, blutige Reposition.

Haben wir es neben der Luxation noch mit einer **gleichzeitigen Fractur** des Humerus zu thun, so versucht man zunächst durch directe Impulsion den Kopf zu reponiren und dann die Fractur in gewohnter Weise zu heilen. Gelingt das nicht, so ist der alte Rath, zuerst die Fractur heilen zu lassen und dann erst nach 8—11 Wochen die Reposition zu versuchen, nicht empfehlenswerth, da man einmal wegen der starken nothwendig werdenden Manipulationen leicht den Callus wieder zerbrechen kann und man ausserdem mit dieser Methode bisher sehr wenig ermunternde Resultate erreicht hat. Entschieden besser ist es, nach dem Rathe von *v. Volkmann* u. A. zwischen den beiden Fragmenten eine möglichst bewegliche Nearthrose zu bilden, indem man durch permanente Extension des Oberarmes die Entfernung der beiden Bruchenden von einander zu erzielen sucht und bald active und passive Bewegungen folgen lässt.

Liegen beide Bruchenden sehr nahe bei einander, indem beide nach innen gewichen sind, so könnte man wohl heutzutage, ge-


stützt auf die guten Erfolge der Resection des Humeruskopfes, unter allen aseptischen Cautelen die Exstirpation des Kopfes vornehmen, um nachher den Arm im rechten Winkel zu extendiren und die sonst wohl unausbleibliche Ankylose zu vermeiden. Es würde ein solches Vorgehen vielleicht nur mit der Reposition des Kopfes nach freier Eröffnung des Gelenkes concurriren.

Selten ereignet es sich, dass das Trauma eine **doppelseitige Verrenkung** des Schultergelenkes erzeugt. *Eichhorn* konnte 1887 von 18 einschlägigen Fällen berichten. *Ried* resecirte in seinem Falle, in dem die Luxationen veraltet waren, beide Schultergelenke mit relativ gutem Erfolg. In frischen Fällen empfiehlt es sich, die Luxationen hinter einander auf dem gewöhnlichen Wege zu reponiren.

B. Luxation nach hinten, Luxatio retroglenoidalis.

Weit seltener als die eben besprochenen sind die retroglenoidalen Luxationen. *v. Geyer*, dem wir die letzte ausführliche Arbeit über die Luxationen verdanken, konnte aus der Litteratur nur etwa 30 Fälle zusammenstellen. Bei diesen durchbricht der Gelenkkopf die hintere Kapselwand zwischen dem Acromion und dem langen Kopf des Triceps, also in ihrem dicksten, durch die Insertion der Mm. supra- und infraspinatus verstärkten Theile und stellt sich entweder unter die Wurzel des Acromion an den hinteren Umfang des Halses der Scapula, Luxatio subacromialis, (Fig. 117) oder weiter nach hinten in die Fossa infraspinata, Luxatio infraspinata.


Fig 117.



Die Veranlassung ist in der Regel ein Fall auf die Hand oder auf den Ellenbogen des nach vorn gerichteten und stark

adducirten Armes. Viel seltener trägt die Schuld eine directe Gewalt, ein heftiger Stoss oder Schlag, welcher den Oberarmkopf direct von vorn nach hinten treibt. Relativ sehr oft entsteht die Luxation durch willkürliche (Schleudern) oder unwillkürliche (epileptische Krämpfe) Muskelaction oder durch eine gewaltsame Einwärtsrollung des Armes, welche ebensowohl durch active Muskelkraft, wie durch äussere Einwirkung eingeleitet werden kann.

Fig. 118.



A. Schmitt beschrieb kürzlich eine bei der Geburt entstandene Luxatio subacromialis, *Gaillard* und *Duval* hatten schon früher über solche Fälle berichtet.

v. Geyer konnte die Luxation an der Leiche dadurch herstellen, dass er den Oberarm nach innen rotirte, adducirte und nun einen Druck vom Ellenbogen aus gegen den Humerus nach oben hinzufügte. Die Kapsel ist stets ausgedehnt eröffnet, der Musc. Teres minor und der Infraspinatus sind oft zerrissen. In einigen Fällen fand sich auch der Subscapularis entweder in seiner Sehne oder mit dem Tuberculum minus zusammen abgerissen.

Fig. 119.



Die **Symptome** sind folgende: Die ganze Schulter ist nach

aussen umgeworfen, so dass sie von vornher verbreitert erscheint (Fig. 119). Der Proc. coracoideus und die vordere Ecke des Acromion sowie das Lig. coracoacromiale springen deutlich sichtbar hervor. Darunter sieht man an Stelle der Wölbung des Deltoides eine tiefe grubige Einsenkung, in deren Grund man die Cavitas glenoidalis fühlen kann. Auf der hinteren Seite der Schulter ist entweder unmittelbar unterhalb des Acromion oder weiter nach hinten gegen die Untergrätengrube zu eine starke Hervorwölbung vorhanden, welche den Bewegungen des Armes folgt und bei jeder Anteversion desselben noch stärker wird (Fig. 118). Die Achse des Armes fällt mit ihrem oberen Ende nach aussen und hinten von der Pfanne. Der Arm selbst steht adducirt, in alten Fällen leicht abducirt. Dabei ist er nach innen rotirt und etwas antevertirt. Er ist in dieser Stellung fixirt, lässt sich dem Körper nur sehr schwer nähern, ist entweder gleich lang wie der andere Arm oder etwas kürzer oder länger als dieser und hat seine Function vollständig eingebüsst. Die Supination des Vorderarmes ruft gewöhnlich heftige Schmerzen hervor.

Die **Prognose** ist günstig, denn die Einrichtung gelingt wegen des weiten Kapselrisses sehr leicht. Gerade wegen des letzteren besteht aber auch eine sehr grosse Neigung zu Recidiven.

Die **Therapie** bezweckt die Reposition ohne Mühe in der Weise, dass man den Arm bis zum rechten Winkel erhebt, leicht extendirt, auswärts rotirt und ihn dann schnell adducirt, während gleichzeitig auf den Gelenkkopf ein directer Druck von hintenher ausgeübt wird. Man kann auch wohl nach *Baum* noch spielender zum Ziele kommen, wenn man den Arm einfach stark abducirt und dann nach innen rotirt.

Die Nachbehandlung der eingerenkten Luxationen.

Es empfiehlt sich im Allgemeinen, den eingerenkten Arm für längere Zeit festzustellen, um die nothwendige Gewebsreparation in Ruhe vor sich gehen zu lassen. In den leichteren Fällen ohne Muskelzerreissung genügen dazu 8—10 Tage, bei den schwereren, durch stärkere Schwellung sich auszeichnenden Verletzungen sind dagegen mindestens 3—4 Wochen erforderlich. Die Fixation geschieht weniger gut durch eine Mitella oder einen Gypsverband als durch Bindentouren, welche den Arm an den Thorax fest anschliessen. Für den Fall einer stärkeren Entzündung im Gelenk

mit Anschwellung der ganzen Gelenkgegend oder einer intraarticulären Fractur oder lange dauernder Schmerzhaftigkeit des Gelenkes hält *Bardenheuer* die Extensionsbehandlung vom adducirten Oberarm aus nach oben aussen und hinten für indicirt, so dass aus der Extensionsrichtung eine Nachaussenführung resultirt. Dieselbe soll jedoch nur 14 Tage dauern.

Unmittelbar nach der Reposition leistet oft eine auf das Gelenk applicirte Eisblase gute Dienste. Sobald man den Kapselriss fest genug vernarbt glaubt, beginnt man die Massage des Gelenkes und fügt dieser dann weiterhin noch die gymnastische Behandlung, anfangs nur in leichten activen und passiven Bewegungen bestehend, hinzu.

Besondere Sorgfalt muss man von vorneherein der etwaigen, durch Läsion des Nervus axillaris bewirkten Parese oder Paralyse des Musculus Deltoides widmen. Es geschieht dies durch eine exact geleitete Behandlung mittelst Massage und Electricität, die am besten in der Form der faradischen und galvanischen Reizung applicirt wird.

Auch die schwereren Lähmungen der Muskeln an der Hand und dem Vorderarm sind noch einer Therapie zugänglich. So hat *W. Müller* kürzlich einen Fall veröffentlicht, in dem er bei hochgradiger Lähmung der vom Nervus ulnaris, radialis und medianus versorgten Muskeln die Achselhöhle durch einen Längsschnitt blosslegte und die Nerven und die Arteria brachialis von den sie comprimirenden bindegewebigen Adhäsionen befreite. Der Erfolg war ein sehr befriedigender, indem fast völlige Heilung eintrat.

Sollte man nach Entfernung des Verbandes eine Rigidität des Schultergelenkes erhalten haben, so wird dieselbe am besten durch allmähliche permanente Extension in verschiedenen Richtungen gehoben, nachdem man vorher durch vorsichtige Rotationsbewegungen das narbige Gewebe möglichst gelockert hat.

Gegen die Entstehung habitueller Luxationen muss man, wenn der gegebene Fall eine solche befürchten lässt, schon prophylaktisch vorgehen. Vor allem darf man den Gebrauch des Gliedes nicht zu früh, höchstens erst nach vier Wochen gestatten, um eine möglichst feste Verheilung des Kapselrisses zu erzielen. Gegen eine Erschlaffung der Kapsel würde sich auch die Anwendung der permanenten Extension des Armes in Rotationsstellung desselben empfehlen. Man müsste dann die Extremität nach aussen rotiren bei praeglenoidaler, nach innen bei retroglenoidaler Luxation.

Hat sich die habituelle Luxation erst ausgebildet, so hat man wohl empfohlen, den Arm längere Zeit ruhig zu stellen durch Gyps- oder Schienenverbände oder Anbandagirung desselben gegen den Thorax, hat auch wohl Jodinjectionen in das Gelenk hineingemacht, ist aber so selten zum Ziele gekommen. Auch complicirtere Bandagen helfen nichts, und man kann wohl nur auf operativem Wege eine Besserung herbeiführen. So könnte man bei einer bedeutenden Erschlaffung der Kapsel ein Stück derselben excidiren oder könnte, wenn diese die Schuld tragen, die abgerissenen Aussenrotatoren oder auch wohl das abgebrochene Tuberculum majus wieder annähen. In ganz hochgradigen Fällen hat man die Arthrodese des Gelenkes ausgeführt oder mit gutem Erfolg auch wiederholt schon den defecten Kopf ganz resecirt. Neuerdings hat *Ricard* in zwei Fällen die Naht der Gelenk-Kapsel ausgeführt, und da die Erfolge gute waren, verdient die Operation nachgeahmt zu werden. *Ricard* macht in der Grube zwischen Deltoides und Pectoralis major einen Hautschnitt von ca 12 cm Länge und verlängert ihn nach oben aussen, um die Insertion des Deltoides an Clavicula und Scapula abzulösen. Der Muskel wird dann umgeschlagen, worauf der M. coraco-brachialis zum Vorschein kommt. Ein Assistent zieht diesen Muskel kräftig an, um die Insertionsstelle des M. subscapularis an den Humerus und an der Scapula sichtbar zu machen. Der obere und untere Rand dieses Muskels wird so weit frei präparirt, dass die Kapsel blossliegt. Der Arm wird sodann stark nach innen rotirt, um die vordere Wand der Gelenkkapsel zu entspannen. In der ganzen Höhe dieser Wand werden durch die Kapsel hindurch und in der Dicke des Subscapularis 3 dicke Seidenfäden in Abständen von je 2 cm angelegt. Durch paarweises Knüpfen dieser Fäden wird die vordere Wand in einen dicken, starken, resistenten Strang umgewandelt. Nachher Blutstillung, Wiederannäherung der Muskelinsertionen und Hautnaht. Beide Patienten *Ricard*'s genasen mit völliger Erhaltung der Muskelkraft und ohne wieder Recidive zu bekommen.

Fracturen des Oberarmes.


Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Oberarmbein, der Humerus, ist der Träger der Drehungsachse des Schulter- und Ellenbogengelenkes, indem es an seinem oberen Ende durch den Gelenkkopf mit dem Schulterblatt, an seinem unteren durch besonders gestaltete Gelenkflächen mit den Vorderarmknochen articulirt. Die Anatomie des oberen Gelenkendes, des anatomischen und chirurgischen Halses und der Tuberkel, haben wir schon S. 194 besprochen. Vom Tuberculum majus verläuft nach unten die Spina tuberculi majoris zum Ansatze für den Pectoralis major, vom Tuberculum minus die Spina tuberculi minoris, zum Ansatze für den Teres major und den Latissimus dorsi. Die Spina tuberculi majoris führt nach abwärts zu einer an der äusseren Seite des Humerus befindlichen rauhen Stelle, der Insertion des Deltoides. Unterhalb dieser Tuberositas wird das früher nahezu cylindrische Mittelstück allmählich dreieckig. Die hintere Fläche wird durch eine innere und äussere Kante von der vorderen getrennt. Die äussere Kante endigt nach vorn umbiegend in einen stumpfen Fortsatz, den Epicondylus externus, den Ursprungsort der Strecker des Vorderarmes. Die innere Kante verdickt sich ebenfalls zu einem Fortsatz, der jedoch viel grösser ist als der äussere und an seiner rauhen Vorderfläche die Beuger des Vorderarmes entspringen lässt, Epicondylus internus. Zwischen diesen beiden Epicondylen ragt der Proc. cubitalis hervor, der durch eine vorspringende Kante in die nach aussen liegende Eminentia capitata und die nach innen gelegene Trochlea zerfällt. Ueber der letzteren findet sich hinten eine breite, tiefe, abgerundet dreieckige Grube, die Fossa supratrochlearis posterior sive Olecrani. Von dieser Grube nur durch eine dünne Knochenplatte getrennt, liegt auf der vorderen Fläche der Trochlea eine viel kleinere Einsenkung, die Fossa coronoidea sive supratrochlearis anterior.

Der Humerus hat noch im 15. Lebensjahr am unteren Ende eine eigenthümlich gestaltete Epiphyse, welche aus zwei Verknöcherungskernen, einem für die Eminentia capitata und einem für die Trochlea hervorgegangen ist. Die Knorpelscheibe verläuft unter der Fossa supratrochlearis quer von einem zum anderen Epicondylus. Am oberen Ende erhält sich die Epiphyse bis gegen das 18. oder 20. Lebensjahr. Sie umfasst die ganze Gelenkfläche und beide Tubercula. Die Knorpelfuge geht von dem unteren Ende

der Gelenkfläche schief nach aussen aufsteigend unter dem Tuberculum minus hinweg, dann quer in das Tuberculum majus und fällt medianwärts mit der Furche des anatomischen Halses zusammen (Fig. 120). Die Oberfläche des Knorpels ist eine convexe.

Fig. 120.



Seiner Architektur nach gehört der Humerus zu den Röhrenknochen mit starker compacter Rinde und einer durch sehr starkes Maschenwerk ausgefüllten Markhöhle. An beiden Gelenkenden findet sich eine dichtere Spongiosa, welche nur von einer dünnen, compacten Knochenlamelle überzogen ist. Im Kopfe kreuzen sich Bälkchen, welche von der inneren Seite des chirurgischen Halses und dem Tuberculum majus aus in schlanken Bogen aufsteigen und zu der Gelenkfläche hinziehen. Sie werden wiederum von flacheren, der Gelenkfläche nahezu parallel laufenden Bogen gekreuzt. Am unteren Gelenkende ziehen die Bälkchen auf der inneren Seite von oben her gegen den Epicondylus internus hin und ausserdem von der oberen Wand desselben gegen die Rolle. Aussen lösen sie sich in Bogen von der Compacta des Schaftes ab und dringen zur Eminentia capitata. Beide Bogenzüge werden dann noch von queren Bälkchen durchkreuzt.

Frequenz und Eintheilung der Oberarmfracturen.

Die Brüche des Oberarmes kommen sehr oft zur Beobachtung. In der Häufigkeitsscala der Fracturen sind sie mit 7—10 $^0/_0$ verzeichnet. Das grösste Contingent stellt nach *Bruns* das Mittelstück, dann kommt das untere Ende, schliesslich das obere. Aus einer Statistik dieses Autors ergiebt sich weiterhin, dass das kindliche Alter am meisten befallen wird und dass vom 1.—9. Decennium die Frequenz stufenweise ziemlich gleichmässig abnimmt.

Der besseren Uebersicht wegen theilt man die Fracturen des Oberarmes ein in solche des oberen Endes, des Schaftes und des unteren Endes. Nur ganz vereinzelt kommen Fissuren vor, welche die ganze Länge des Humerus durchsetzen. In einem solchen von *Krönlein* beobachteten Falle war eine starke Belastung

der Schulter und übermässige Hebeanstrengung des Armes die Ursache gewesen.

A. Fracturen am oberen Ende des Humerus.

Die Fracturen am oberen Ende des Humerus umfassen:

1) die Brüche des Kopfes,
2) die des anatomischen Halses,
3) die der Tubercula,
4) die der Epiphysenlinie,
5) die des chirurgischen Halses.

1) Fracturen des Humeruskopfes.

Die isolirten Brüche des Kopfes sind äusserst selten. Es handelt sich gewöhnlich um Knorpelfissuren, unter denen die unterliegende Knochensubstanz zertrümmert ist, so dass dann der Kopf eine deutliche Depression zeigt.

Pollosson fand an der Leiche einer an Eklampsie verstorbenen 30jähr. Frau an beiden Oberarmköpfen entsprechend dem vorderen unteren Rand Kompressionsfracturen derart, dass an den genannten Stellen die überknorpelte Knochenpartie in die Pars spongiosa eingedrückt war. Diese Depressionen waren wahrscheinlich dadurch entstanden, dass während eines eklamptischen Anfalles durch Muskelaction die betreffenden Theile des Kopfes gegen die Cavitas glenoidea angedrückt worden waren.

Etwas grösser ist die Zahl der Verletzungen, bei denen neben anderen Fracturen, wie des anatomischen Halses, der Scapula und ihrer Fortsätze auch der Humeruskopf entweder nur fissurirt oder mehrfach gebrochen ist.

Die Bruchstücke können dann stark dislocirt, ja der zerbrochene Kopf vollständig luxirt sein.

Die Fractur entsteht am häufigsten als Schussverletzung, seltener durch einen Fall auf die Schulter oder auf den Ellenbogen und zwar im mittleren und höheren Lebensalter.

Die **Symptome** stellen im Allgemeinen das Bild einer starken Quetschung des Gelenkes mit Bluterguss in dasselbe dar. Eine richtige Diagnose intra vitam zu stellen, ist wohl nur dann möglich, wenn es durch Umfassen des Kopfes und plötzliche Rotation und Abduction des Armes gelingt, Crepitation direct im Gelenk nachzuweisen. Im Uebrigen gilt von dieser Verletzung dasselbe wie von der

2) Fractur des anatomischen Halses.

Die Brüche des anatomischen Halses sind isolirt gleichfalls äusserst selten. Sie verlaufen dann, da sich die Gelenkkapsel unterhalb desselben inserirt, vollständig i n t r a c a p s u l ä r. In der überaus grossen Mehrzahl der Fälle erstreckt sich aber die Bruchlinie, die Kapselinsertion überschreitend, in den chirurgischen Hals hinein, liegt also dann theilweise wenigstens extracapsulär. Oefters brechen auch die Tubercula mit ab, indem der abgebrochene Kopf gleichsam wie ein Keil zwischen dieselben hinein getrieben wird, sie auseinander sprengt und wohl auch noch eine in den Schaft sich fortsetzende Längsfractur bewirkt.

Fig. 121.




Fig. 122.





Fig. 123.



Nach der Fractur ist entweder gar keine Verschiebung vorhanden (Fig. 121), oder es bleibt die Einkeilung des Kopfes zwischen den Tuberkeln bestehen (Fig. 122), oder es keilt sich die Diaphyse in die Epiphyse ein (Fig. 123). Oefter rutscht auch der Kopf an der inneren Seite des nach oben gezogenen Humerusschaftes nach unten (Fig. 124) oder nach vorn oder hinten; relativ am meisten findet man jedoch die sogenannte *Malgaigne*'sche Dislocationsform, d. h. das untere Fragment wird durch den Deltoides und Pectoralis major nach oben und innen zur Fossa glenoidalis gezogen und drängt den Kopf dabei nach aussen (Fig. 125). Haben wir den Bruch ganz intracapsulär, so liegt der Kopf als loser Körper in der Gelenkhöhle und kann sich in derselben sogar um seine Querachse herumdrehen. Diese Verdrehung kann eine derartig

vollständige sein, dass die Bruchfläche des Kopfes gerade nach oben gekehrt ist und die Gelenkpfanne berührt, während seine überknorpelte Gelenkfläche auf der Bruchfläche des unteren Fragmentes aufliegt. (Fig. 127). Schliesslich kommt es noch zuweilen vor, dass der Kopf die Kapsel durchbohrt und nach aussen luxirt, und ebenso

Fig. 124.





Fig. 125.



kann gelegentlich das nach oben gezogene untere Fragment die Kapsel durchtrennen und in der Achselhöhle zum Vorschein kommen oder nach hinten und aussen weichen.

Die Ursache dieser Fracturen ist meistens eine directe Gewalt, ein Sturz auf die Schulter. Sie betreffen vorzugsweise ältere Personen, bei denen sie in Folge einer Rarefaction des Knochengewebes schon durch eine mässige Kraft zu Stande kommen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie auch gelegentlich durch einen Fall auf die Hand entstehen.

Die **Symptome** der Fractur sind nicht sehr ausgesprochen. Wir haben eine starke Schwellung des Gelenkes (Fig. 126) und müssen bei der Diagnose vor Allem eine einfache Gelenkcontusion ausschliessen. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir auf das später bei der Differentialdiagnose der Schultergelenksver-

letzungen Gesagte. Wir heben hier nur hervor, dass man sich vor Allem über eine etwa bestehende Crepitation, abnorme Beweglichkeit und Deformität klar werden muss. Es ist dies jedoch keineswegs leicht und erfordert gewisse Kunstgriffe. Diese bestehen darin, dass man entweder den Arm stark erhebt und dann von der Axilla aus die beiden Bruchenden zu verschieben sucht,

Fig. 126.




Fig. 127.



oder dass man den Kopf durch Druck unterhalb des Acromion nach hinten drängt und nun starke Elevationen und Rotationen mit dem Oberarm ausführt.

Die **Prognose** ist eine zweifelhafte, wenn der Kopf lose im Gelenk liegt, weil dann die Lebensfähigkeit desselben in Frage gestellt ist. Es wird nämlich seine Ernährung besorgt durch einen Zweig der Art. circumflexa humeri anterior, welcher sich in den vorderen Rand des Tuberculum majus einsenkt. Wird nun dieser Zweig bei der Fractur zerrissen, so kann es, wenn nicht noch einzelne Ernährungsbrücken des Periostes erhalten sind, zu einer Necrose des Fragmentes und damit sogar zur Eiterung in dem Gelenk kommen. Immerhin ist ein solches Ereigniss eine Seltenheit.

Die Function kann ferner dauernd gestört werden durch die Ausbildung einer Ankylose des Gelenkes, sei es nun, dass diese

die Folge einer übermässigen Callusproduction oder einer secundären Entzündung des Gelenkes ist, oder dass sie bedingt ist durch die narbige und elastische Retraction der Muskeln und der Kapsel oder eine consecutive Verfettung der Muskeln bei der langdauernden Ruhigstellung des adducirten Armes. Die Heilungsdauer, die bei der bisher üblichen Behandlung mehrere Monate beanspruchte und trotzdem nie eine vollständige Beweglichkeit des Armes herbeiführte, soll bei der Extensionsbehandlung auf nur 4—5 Wochen abgekürzt werden (*Bardenheuer*).

Die **Therapie** kann bei einer Fractur mit Einkeilung in Anlegung einer einfachen Mitella bestehen. Bei stärkerer Dislocation rühmt *Bardenheuer* sehr die permanente Gewichtsextension und zwar gleich anfangs, um das Eintreten einer elastischen Retraction der Gewebe zu verhüten, mit Gewichten von 10—20 Pfund. Im Allgemeinen empfiehlt es sich dabei, die Extension nach unten parallel der Medianebene des Humerusschaftes zu leiten, während gleichzeitig an einem Keilkissen in der Achselhöhle die Contraextension ausgeübt und der nach aussen dislocirte Kopf durch einen circulären Heftpflasterstreifen nach innen gedrängt wird. Die ambulante Behandlung könnte mit der *Bardenheuer*'schen Federextensionsschiene für diese Fracturen, wie auch für alle übrigen am oberen Humerusende in derselben Weise geschehen, wie wir dies bei den Fracturen des chirurgischen Halses des Humerus besprechen werden.

Eine besondere Beachtung verdienen noch die Folgezustände. Wenn eine Necrose oder secundäre Eiterung eintreten sollte, so würde man die Resection des Kopfes ausführen. Eine Ankylose würde am besten durch eine kräftige permanente Extension und nachfolgende Behandlung mit Massage und Gymnastik beseitigt werden.

3) Brüche der Tubercula.

Man unterscheidet den q u e r e n und den l o n g i t u d i n a l e n Bruch der Tubercula.

Unter der **queren Fractur der Tubercula** versteht man den Bruch, welcher durch das obere Ende des Humerus in dem Theile verläuft, welcher zwischen dem anatomischen Hals und der Epiphysenlinie gelagert ist. (Fractura transtubercularis).

Die U r s a c h e ist gerade wie bei den Brüchen des anatomischen Halses eine directe Gewalteinwirkung.

Die Bruchlinie verläuft bald mehr schräg, bald mehr der Quere nach. Eine Dislocation fehlt meist, da die Fractur gerade in der Gegend der Insertionslinie der sich das Gleichgewicht haltenden Aus- und Einwärtsroller des Oberarmes sitzt. Zuweilen soll sich indess der Kopf etwas mehr nach unten und innen verschieben und die Diaphyse sich in die nach aussen stehende Bruchfläche desselben einbohren.

Symptome, Prognose und Therapie fallen mit jenen der Brüche des anatomischen Halses zusammen.

Die **longitudinalen** Fracturen können das Tuberculum majus und minus betreffen.

a. Fracturen des Tuberculum majus. Die isolirte longitudinale Fractur des Tuberculum majus kommt sehr selten zur Beobachtung. Relativ oft dagegen beobachtet man diesen Bruch als Abreissungs- oder Abquetschungs-Fractur bei einer Luxation des Humerus nach vorn oder einer Fractur des anatomischen Halses (Fig. 128). Zuweilen sind nur Theile des Tuberkulums und zwar mit Vorliebe seine beiden vorderen Facetten abgerissen; in der Regel ist es jedoch an seiner Basis abgebrochen und weicht dann durch den Zug der Auswärtsroller 2—3 cm weit nach oben- und aussenhin ab. Es kommt weiterhin vor, dass es in mehrere Splitter gespalten oder ganz zermalmt wird; auch kann es in die Diaphyse hineingetrieben sein und letztere noch weit nach unten fissuriren.

Fig. 128.




Die Ursache der isolirten Fractur ist fast ausnahmslos eine directe Gewalteinwirkung, sei es ein Schlag oder Fall, selten eine active Muskelcontraction beim Fortschleudern eines Gegenstandes.

Wenn das Tuberculum majus abgesprengt ist, so sind die Mm. supra- und infraspinatus ausser Thätigkeit gesetzt, und es wird daher durch ihre Antagonisten, d. h. den M. subscapularis, den vorderen Theil des Deltoides und den Pectoralis major der Humerus nach innen gegen die innere Kapsel gezerrt, welche selbst durchbohrt werden kann. Das kleine abgelöste Fragment wird durch

die an ihm entspringenden Muskeln nach oben, aussen und hinten gegen die äussere Kapsel und Fossa glenoidalis gezogen.

Das wichtigste **Symptom** ist die durch die eben genannte Dislocation bedingte Verbreiterung der Schulter, deren Querdurchmesser von vorn nach hinten bedeutend zugenommen hat. Das Bild ähnelt dem einer Luxation des Humerus nach vorn (Fig. 129). Das Acromion kann ziemlich stark vorspringen, doch steht der Ellenbogen nicht abducirt, sondern hängt im Gegentheil schlaff am Körper herunter und kann mit Leichtigkeit noch mehr adducirt werden.

Fig. 129.



Die örtliche Untersuchung ergiebt zwei getrennte Vorwölbungen. Die eine, deren Betastung äussert schmerzhaft ist, das Tuberculum majus, liegt unterhalb und etwas nach hinten vom Acromion, die andere breitere, der Gelenkkopf, nach aussen von der Basis des Proc. coracoideus. Diese beiden Vorsprünge sind oft durch eine deutlich sichtbare Furche geschieden. Drückt man unter dem Acromion ein, so fühlt man eine Vertiefung zwischen den beiden Höckern, zuweilen sogar die Bruchfläche am Humerus. Der Arm hat seine normale Länge und ist höchstens verkürzt, wenn der Kopf nach vorn und innen gewichen

ist. Wenn man den Arm perpendiculär oder über die Horizontale hinaus erhebt und nun die beiden Höcker fixirt und den Arm rotirt, oder wenn man das abgesprengte Stück von hinten her umfasst und es seitlich verschiebt, so gelingt es, Crepitation nachzuweisen. Die Function des Armes ist ziemlich behindert, indem die active Auswärtsrollung unmöglich und die Abduction nur bis zur Horizontalen ausführbar ist.

b. Fractur des Tuberculum minus. Eine isolirte Fractur des Tuberculum minus ist bis jetzt noch sehr selten beobachtet worden. Combinirt kommt sie bei der Luxation des Oberarmes durch Zug des Subscapularis oder in Begleitung einer Fractur des Tuberculum majus, besonders aber bei Brüchen des anatomischen Halses vor, bei denen sich der Kopf in den Schaft einkeilt und beide Tubercula auseinandersprengt.

Die **Symptome** gleichen ebenfalls sehr denen einer Luxation des Humerus nach vorn (Fig. 130). Man kann jedoch in der Gegend des Tuberculum minus einen kleinen Tumor bemerken, den man von einer Seite zur anderen verschieben kann, wobei Crepitation entsteht. Der Arm ist nach aussen rotirt, der Kopf dagegen nach innen gewichen und in der Axilla leicht zu fühlen. Man sollte eigentlich erwarten, dass die Auswärtsroller den Kopf eher nach auswärts zögen, indess ist das Gewicht des Armes zu gross, und es wird ausserdem noch die Kapsel an der vordern und hintern Seite des Gelenkes, vielleicht auch die Bicepssehne zerrissen, letztere wohl auch in den Bruchspalt luxirt, so dass schliesslich doch die Adductoren das Uebergewicht erhalten. Die Function des Armes leidet bedeutend, so dass man desshalb sogar das Tuberculum resecirt hat.

Fig. 130.



Die **Prognose** für die Brüche beider Tubercula ist insofern keine ganz günstige, als bei stärkerer Entfernung beider

Fragmente von einander selten eine knöcherne Vereinigung eintritt. War die Fractur des Tuberculum minus mit einer Luxation combinirt, so bleibt eine grosse Neigung letzterer zu Recidiven zurück. Es erklärt sich dies daraus, dass jetzt der Druck auf den Kopf seitens des M. subscapularis fehlt.

Die **Therapie** der Brüche des Tuberculum majus und minus muss zunächst die Reposition der Fragmente besorgen. Das Tuberculum majus wird in der Weise coaptirt, dass man den Arm bis zum rechten Winkel erhebt und in dieser Stellung extendirt oder auch wohl die Extension mittelst eines Keilkissens in adducirter Stellung senkrecht nach oben und etwas nach aussen anbringt. Es klemmt sich dabei das Tuberculum zwischen dem Schaft und dem Acromion ein. Aus dem gleichen Grunde empfiehlt es sich, bei der Fractur des Tuberculum minus den Arm nach innen zu rotiren, an den Leib mittels eines das obere Humerusende umfassenden Heftpflasterstreifens zu adduciren und vom Oberarm aus eine leichte longitudinale Extension nach oben und innen zu führen. (*Bardenheuer.*)

4) Brüche der Epiphysenlinie.

Die Epiphysenlinie, deren Anatomie wir vorher schon besprochen, liegt um so weiter vom Kopfe des Humerus entfernt, je jünger das Individuum ist. Es wird also auch im Falle eines Bruches das betreffende obere Fragment um so kleiner werden, je älter der Patient ist. Die traumatischen Epiphysentrennungen sind zwischen dem 10. und 19. Lebensjahre gar nicht selten und kommen bis zum 25. Lebensjahre vor. Nur bei sehr jungen Kindern sitzt der Bruch ganz in der Knorpelschicht, so z. B. bei den intra partum durch das Lösen der Arme erzeugten Trennungen. Ist einmal die Knorpelschicht zum grössten Theil verknöchert, so verläuft die Bruchlinie stets auch gleichzeitig in die Diaphyse hinein, oder es ist ein Theil des anatomischen Halses mit abgerissen. Sehr häufig ist die Fractur dabei nur eine unvollständige. Es entspricht diese Verletzung der Luxation der Erwachsenen.

Die Ursache ist demgemäss auch meist eine Hyperabduction, z. B. ein Zug am Arme in dieser Richtung, seltener ein Fall oder Schlag auf die Schulter.

Die Dislocation ist oft so gering, dass beide Fragmente in genauester Berührung mit einander stehen. In anderen Fällen weicht das untere Fragment etwas nach innen, bis sein convexer

Rand sich in dem concaven des oberen fängt. Dieses letztere aber wird dadurch so gedreht, dass sein innerer Rand nach oben steigt, während sein äusserer so weit heruntergeht, als es die Spannung der äusseren Kapsel erlaubt. Zuweilen verlassen sich aber beide Fragmente vollständig, und es wird dann das untere vom Pectoralis major, Latissimus dorsi und Teres major nach innen und oben zum Proc. coracoideus hingezogen, wo es dicht unter der Haut stehen bleibt oder dieselbe sogar perforirt (Fig. 131). Bei intra partum entstehenden Epiphysenlösungen dislociren sich nach *Küstner* die Fragmente so, dass neben einer Auswärtsdrehung des oberen eine Innenrotation des ganzen unteren Fragmentes zustande kommt.

Die **Symptome** bei fehlender oder nur geringer Dislocation sind zunächst Schmerzen an der Bruchstelle. Der Patient lässt den Arm meist schlaff am Körper herunter hängen und kann denselben nicht bewegen. Die Gelenkgegend ist angeschwollen. Man weist abnorme Beweglichkeit dicht unterhalb des Gelenkes nach und fühlt bei der Palpation den Kopf in der Gelenkhöhle, constatirt aber, dass er sich bei Rotation des Oberarmes nicht mitbewegt.

Haben sich die Fragmente in der zuletzt geschilderten Weise verschoben, so sind die Symptome ausgesprochener. Man findet dann an der Vorderseite des Gelenkes mehr oder weniger nahe dem Proc. coracoideus einen scharfen Vorsprung, welcher die ganze Schulter stark verbreitert erscheinen lässt (Fig. 131 und 132). Der Ellenbogen steht abducirt und nach hinten gerichtet, kann aber dem Körper leicht genähert werden. Die nach oben verlängerte Achse des Armes fällt nach innen und vorn vor das Gelenk. Etwa 3—4 Centimeter unterhalb des Acromion befindet sich nach aussen oder nach hinten eine Vertiefung. Findet man abnorme Beweglichkeit, so bewegt sich der an der Innenseite des Oberarmes befindliche Vorsprung mit. Man fühlt ferner durch die Haut hindurch, je nachdem der Knorpel ganz abgerissen oder noch theilweise adhärirt, entweder einen scharfen Bruchrand, oder eine mehr glatte, convexe Fläche. Die Deformität kann leicht durch Extension mit gleichzeitiger Adduction des Ellenbogens und Druck auf den Vorsprung nach hinten reponirt werden, kehrt aber beim Aufhören dieser Manipulationen schnell wieder zurück. Bei diesen Versuchen fühlt man dann auch wohl eine weiche, sanfte Knorpelcrepitation. Wenn man das obere Fragment mit

der einen Hand in Adductionsstellung fixirt und dann den **Arm** am Ellenbogen stärker abducirt, kann man öfter eine winkelige Knickung des Oberarmes im oberen Drittel des Deltoides

Fig. 131.




Fig. 132.



erzeugen. Der so gebildete Winkel sieht dann mit dem Scheitel nach innen. Der Arm ist in der Regel etwas verkürzt, seine Function aufgehoben; die passiven Bewegungen sind dagegen frei.

Die **Prognose** ist insoferne eine ungünstige, als nach der Heilung eine Wachsthumshemmung des Oberarmes zurückbleiben kann. Die Heilung des Knorpelbruches erfolgt nämlich wie die aller anderen Knorpelbrüche innerhalb 4—5 Wochen durch einen knöchernen Callus. Nur wenn die Fractur so verläuft, dass eine Knorpelschicht entweder der Epi- oder der Diaphyse adhärirend vollständig intact geblieben ist, kann das Wachsthum des Humerus ungestört weiter schreiten. Die Verkürzungen, die im ersten Falle resultiren, können namentlich, wenn die Continuitätstrennung im frühen Alter erfolgte, sehr bedeutend werden und 5—6 cm betragen. Ausser der Wachsthumshemmung ist dann noch die Heilung der

Fragmente in fehlerhafter Stellung zu erwähnen. Namentlich bei den intra partum acquirirten Epiphysenlösungen kann dadurch eine schwere Schädigung der Armfunction entstehen, indem die Insertionspuncte aller Rotatoren einander so genähert werden, dass eine weitere Action dieser Muskeln unmöglich wird.

Die **Therapie** ist derjenigen der Brüche des chirurgischen Halses analog. Bei sehr starker Dislocation des untern Fragmentes nach innen kann man, um spätere Störungen zu vermeiden, nach *Helferich* die Bruchstelle aseptisch blosslegen, die Fragmente reponiren und die Retention durch Aneinandernagelung derselben besorgen.

Bei veralteten, mit starker Dislocation geheilten Fracturen, bei denen starke Verkürzung des Armes und schwere Functionsstörung desselben besteht, geht man nach *P. Bruns* am besten operativ vor. Man löst die Zusammenwachsung der Fragmente an der Bruchstelle mit Meissel und Raspatorium und versucht nun die Reposition der Fragmente, die aber meist erst nach Resection eines ca. $1^1/_2$ cm grossen Stückes der Diaphyse gelingt. Die Retention wird dann durch Vernagelung der Fragmente besorgt. Nach einer solchen Operation vermag das Längenwachsthum des Armes fast wieder in normaler Weise fortzuschreiten (*Bruns-Lejars*).

Bei den intra partum entstandenen Epiphysenlösungen empfiehlt *Küstner*, den Oberarm in starker Auswärtsrotation zu fixiren, um die Heilung der Fragmente in richtiger Stellung zu erzwingen. Zu dem Zweck soll man den Unterarm stark supiniren, ihn in dieser Stellung mittelst eines circulären, von der Ulnarseite ausgehenden Heftpflasterstreifens an den Oberarm in äusserster Flexion fixiren und dann diesen letzteren über ein Axillarkissen hinweg, mittelst eines Heftpflasterstreifens, der im Sinne der Auswärtsrotation um den Oberarm herumgeführt wird und von diesem zunächst über den Rücken hinwegzieht, an den Thorax binden.

In einem kürzlich veröffentlichten Falle dieser Art, wo die 13 Jahre alte Patientin nach der intra partum erfolgten Verletzung eine starke Deformität zurückbehalten hatte, gelang es *Heusner* durch Anlegung einer Spiraldrahtschiene die Gebrauchsfähigkeit der sonst ständig stark pronirt stehenden Hand wesentlich zu bessern.

5. Brüche des chirurgischen Halses.

Die Brüche des chirurgischen Halses sind die häufigsten des oberen Humerusendes. Die Fractur sitzt zwischen den Tuberculis

und der Insertionsstelle des Pectoralis major und Latissimus dorsi und zwar meist an der Stelle, wo der feste Theil der Diaphyse in den spongiösen übergeht. Da mit dem zunehmenden Alter die Corticalis hier noch mehr atrophirt, so finden wir diese Fractur meistens bei alten Leuten. An der Leiche eines alten Mannes genügt ein einziger Meisselschlag, um den chirurgischen Hals in zahlreiche Splitter einzubrechen.

Die Ursache der Fractur ist zumeist eine directe Gewalt, in der Regel ein Sturz auf die Schulter. Sie betrifft in diesem Fall vorzugsweise ältere Leute und durchsetzt den Knochen der Quere nach. Sie kann aber auch, und zwar mit Vorliebe in den mittleren Jahren, durch Fall auf die Hand oder auf den abducirten Ellenbogen entstehen und verläuft dann vorzugsweise schräg. Schliesslich liegen auch noch Beobachtungen vor, in denen Querbrüche beim Fortschleudern schwerer Gegenstände durch active Muskelkraft entstanden waren.

Was die pathologisch-anatomischen Charaktere betrifft, so kommen, wie schon gesagt, quere und schräge, ausserdem aber noch Splitterbrüche und solche mit Absprengung kleinerer Theile vor.

Fig. 133.





Fig. 134.



Die Querfracturen finden sich entweder in unmittelbarer Nähe der Tubercula oder etwas weiter nach unten in dem anschliessenden dünneren Theile des Halses. Sie verlaufen meist extracapsulär, können sich aber auch, zumal an der inneren Seite durch die Kapsel hindurch erstrecken. Sehr oft findet sich bei

ihnen eine Einkeilung, und zwar entweder so, dass das untere Fragment mit seiner ganzen Fläche in das obere eindringt, während dieses selbst in seiner normalen Lage bleibt (Fig. 133), oder in der Weise, dass sich die Diaphyse nur mit ihrer inneren Corticalwand in die Epiphyse einbohrt, diese letztere aber sich mit ihrer Bruchfläche so nach aussen wendet, dass sie an der inneren Seite des Schaftes nach unten wandert (Fig. 134). [Fracture par pénetration du col chirurgical de l'Humerus avec abaissement et rotation en arrière de la tête humerale (*Poirier-Altiges*)].

Es kann ferner das obere Fragment durch die Rotatoren nach aussen und oben (Fig. 135) oder nach innen, oben und vorn gedreht werden (Fig. 136). Aeusserst selten hat es sich selbst in die Diaphyse eingekeilt. (Fig. 137).

Fig. 135.




Fig. 136.




Fig. 137.



Die beiden Bruchflächen können ferner ihren Contact ganz verlieren. Das untere Fragment wird dabei fast stets durch den Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi nach innen und durch den Deltoides nach aufwärts gezogen, während das obere durch den Supra- und Infraspinatus und Teres minor so gedreht wird, dass sich seine untere Fläche nach aussen und vorn wendet. Das Diaphysenende findet sich dann in gleicher Höhe mit der Gelenkpfanne, während die Bicepssehne abgelöst oder zerrissen ist. (Tafel V.)

Bei den Schrägfracturen ist die Dislocation der Bruchenden derjenigen der Querfractur sehr ähnlich. Sie kann auch hier von dem oberen oder dem unteren Fragmente allein oder von beiden gemeinschaftlich ausgehen. Mit Vorliebe bilden beide einen aussen offenen Winkel, sie können aber auch im entgegengesetzten Sinne verschoben sein.

Es hängt die Dislocation vor allen Dingen ab von der Richtung der Gewalt, erst in zweiter Linie von der Muskelcontraction und der elastischen Retraction der Weichtheile. Sie ist um so grösser, je mehr das Periost zerrissen und je schiefer die Bruchlinie ist.


Die Schrägbrüche sind sehr häufig mit Weichtheilverletzungen complicirt und zwar desshalb, weil das untere Fragment, indem es gewaltsam nach oben und innen gedrängt wird, die ihm im Wege stehenden Mm. pectoralis major und Latissimus dorsi zerreissen, durch dieselben hindurchtreten, ja sogar die Haut anspiessen und perforiren kann. Sehr viel seltener werden auf diese Weise die grossen Nerven und Gefässe lädirt.

Einen Fall der letzteren Art, der sich durch eine eigenthümliche gabelförmige Gestalt der peripheren Bruchfläche auszeichnete, hat vor kurzem *Angerer* mitgetheilt. Die Gabel hatte sich tief in den Pectoralis major eingebohrt und dabei das ganze Gefässpacket mitgenommen, so dass dieses gewissermassen in der Gabel ritt. Durch die bedeutende Verschiebung des Humerusschaftes nach innen war dabei eine solche Compression der Gefässe erfolgt, dass es zu Gangrän des Armes kam nnd dieser exarticulirt werden musste.

Die Splitterfracturen betreffen vorzugsweise das Kopffragment, senden jedoch nur selten Fissuren in das Gelenk hinein.

Symptome der Brüche des chirurgischen Halses des Humerus.


Die **Symptome** sind meist leicht zu erkennen. Wir finden zunächst den Schmerz, welcher an eine bestimmte vom Gelenk entfernte Stelle gebunden ist und nicht nur bei Druck auf diese selbst, sondern auch bei einem solchen auf einen entfernten Punkt des Armes oder bei Bewegungen desselben sehr gesteigert wird. Wir erkennen ferner meist eine Sugillation der Gelenkgegend oder der Innenseite des Oberarmes und eine fast typische Deformität der Schulter (Tafel V). Der Deltoides erscheint ab-



geflacht; das Acromion springt hervor, doch nicht so scharf wie bei einer Luxation, sondern mehr abgerundet. Unterhalb des Acromion, und zwar um mehrere Centimeter von ihm entfernt, ist die Haut zu einer flachen Vertiefung eingezogen.

Der Ellenbogen steht in Abduction, ist jedoch nicht starr fixirt, sondern kann, wenn auch unter Schmerzen, dem Leib genähert werden. Die verlängerte Achse des Armes fällt nach innen und vorn vor das Gelenk. In der Achselhöhlung sieht und fühlt man eine Hervorragung, welche durch das obere Ende des unteren Fragmentes gebildet wird. Hat dieses die Haut angespiesst, so ergiebt die Betastung, dass die Haut dem Vorsprunge unverschieblich aufsitzt und bei Bewegung mit dem Gliede sich trichterförmig einzieht und vorwölbt (Fig. 138).

Fig. 138.



Der Arm erscheint bedeutend verkürzt. Es ist dies Zeichen differential diagnostisch, besonders zur Unterscheidung von der Luxation sehr wichtig. Man erkennt diese Längendifferenz meist auf den ersten Anblick, besonders wenn man den Patienten die Arme auf der Brust kreuzen lässt und ihn von hinten betrachtet. Geringere Verkürzungen constatirt man in der Weise, dass man beiderseits die Schulterblätter gleichstellt und die Entfernung des Acromion vom Epicondylus externus humeri misst. Die Palpation ergiebt Crepitation, abnorme Beweglichkeit, während der Kopf in seiner natürlichen Lage bleibt und an den Bewegungen nicht Theil nimmt, und zeigt ferner die Möglichkeit, den Arm an der Bruchstelle winkelig abzuknicken. Drückt das untere Bruchende in der Achselhöhle auf den Plexus brachialis, so kann in dem Arm das Gefühl Ameisenkriechen und Taubheit in den Fingern entstehen.

Viel weniger ausgesprochen sind die Symptome, wenn eine Einkeilung besteht. Im Allgemeinen kann man dann eine eingekeilte Fractur diagnosticiren, wenn bei einer älteren Person nach einem Fall auf die Hand oder die Schulter die Bewegungen des Schultergelenkes aufgehoben sind, wenn die Deformität, dagegen keine Luxation vorhanden und wenn Crepitation gar nicht oder nur undeutlich nachweisbar ist, sobald man den Kopf fixirt und dann den Arm rotirt.

Die **Prognose** ist eine günstige, wenn es gelingt, die Coaptation der Fragmente, die durch Extension am flectirten Ellenbogen und directen Druck auf die Bruchenden geschieht, aufrecht zu erhalten. Dann heilt die Fractur ohne wesentliche Deformität und Functionsstörung des Armes etwa innerhalb 30 Tagen durch knöchernen Callus. Im anderen Falle kann durch einen deformirenden Callus die Beweglichkeit des Armes sehr leiden, oder auch wohl eine Ankylose eintreten, indem das untere Fragment mit der Scapula verwächst. Pseudarthrosen sind sehr selten.

Fig. 139.





Fig. 140.




Die **Therapie** hängt vollständig von der Art der Dislocation ab.

Hat eine genaue Untersuchung das Fehlen einer solchen oder nur eine geringe Verschiebung der Fragmente ergeben, so soll man im Allgemeinen auch keine grossen Repositionsversuche machen, um nicht die in gutem Contacte stehenden Fragmente zu lockern. Es empfiehlt sich dann nur eine einfache Papp- oder Gypsschiene anzulegen und den Vorderarm in einer Mitella (Fig. 139) zu fixiren.

Ist eine Dislocation vorhanden, so muss dieselbe auf das sorgfältigste ausgeglichen werden. Es geschieht dies in der Weise, dass ein Assistent die Contraextension von der Achselhöhle aus macht. Ein zweiter Assistent kniet sich neben den Patienten und extendirt mit der einen Hand den rechtwinkelig gebeugten in geringer Supinationsstellung stehenden Vorderarm mit der einen Hand, während er die Finger der andern Hand dicht unterhalb des Ellenbogengelenkes von der Volarseite her auf den Vorderarm auflegt und nun

Fig. 141.



kräftig mit demselben nach abwärts zieht. So kann dieser zweite Assistent eine kräftige Correction vornehmen, ohne den Arzt, welcher den Verband anlegt, im mindesten zu geniren (Fig. 141). Der zweite Assistent hat vor allem dafür zu sorgen, dass der Arm richtig steht. Dies ist dann der Fall, wenn bei flectirtem und adducirtem Ellenbogen die Spitze des Condylus externus gerade nach vorn und senkrecht unter der Spitze des Acromion steht.

Ist diese richtige Stellung des Armes wiederhergestellt und hat man ebenso durch Zug in der Richtung der Oberarmachse die richtige Länge des Armes wieder erhalten, so richtet sich die Anlage des Fracturverbandes nach der Lage, welchen das obere Fragment eingenommen hat.

Hat das obere Fragment, also der Humeruskopf, wie dies die Regel ist, seine normale Lage annähernd beibehalten, so schiebt man ein Kissen oder einen starken Wattebausch in die Achselhöhle und befestigt den redressirten Oberarm über diesem Kissen an die Brust. Diese Befestigung kann mittelst einer Pappschiene (Fig. 139) oder einer *Beely*'schen Gypshanfschiene (Fig. 140) geschehen. Der beste und einfachste Verband ist aber unbedingt die *Albers*'sche Kragenschiene (Fig. 142 und 143). Da sich diese für die Mehrzahl aller Oberarmbrüche ausgezeichnet eignet, wollen wir sie hier

Fig. 142.





Fig. 143.



gleich ausführlicher beschreiben. Die Schiene wird aus einfachen Gypsmullbinden von der Breite des Armes gefertigt, die vor dem Anlegen in heisses Wasser ohne Zusatz von Alaun eingetaucht werden. Während nun in oben beschriebener Weise die Redression des gebrochenen Armes stattfindet, werden die angefeuchteten Gypsbinden auf der leicht eingeölten Haut des Patienten in der Weise abgerollt, dass sie in Längstouren von der Mitte des Halses, wo ihr Anfang von einem Assistenten fixirt wird, über die Schulter, das Acromion, die Streckseiten des Ober- und Unterarmes und den Handrücken hinweg bis an die Köpfchen der Mittelhandknochen läuft. Hier wird die Binde umgeschlagen, fixirt und dann in umgekehrter Richtung wieder bis zur Mitte des Halses hinaufgeführt.

In dieser Weise deckt man die Hälfte des Halses, die ganze Schulter, die laterale Hälfte des Oberarmes, die Streckseite des Vorderarmes und den Handrücken mit 8—10fachen Gypsbindenlagen zu. Die einzelnen Lagen werden stets gut verstrichen; sind sie fertig angelegt, so drückt man sie mit an der Hand beginnenden und bis in die Achsel hinaufreichenden Cirkel- resp. Achtertouren von Cambricbinden gut gegen die Unterlagen an. Ist man an den Hals gekommen, so schlägt man den am Hals in die Höhe geführten Theil der Schiene als Kragen nach aussen um. Indem man diesen durch einige Bindentouren, welche unter der Achselhöhle der gesunden Seite durchlaufen, befestigt, gewinnt die Schiene nach oben einen guten Halt. Ist der Gyps erstarrt, so wird die Schiene abgenommen, am Rande etwas aufgebogen, mit einer dünnen Watteschicht gepolstert und wieder angelegt. Der ganze Arm kommt schliesslich in eine Mitella.

Fig. 144.





Fig. 145.



Die *Albers*'sche Kragenschiene ist unserer Ansicht nach das Normalverfahren. Man kann aber natürlich auch noch in anderer Weise vorgehen. So empfahl *Stromeyer* ein dickeres Kissen in die Achselhöhle zu legen und über diesem den Arm am Thorax zu befestigen. *Middeldorpf* dagegen construirte seinen sogenannten Triangel (Fig. 145), auf dem er den Arm in abducirter Stellung anbandagirte. *Bardenheuer* verwendete mit grossem Erfolge auch hier seine Federextensionsschiene.

Andere Bestrebungen gehen dahin, die Fracturen am oberen

Humerusende nach möglichster Reduction ganz ohne Verband zu behandeln. Namentlich *Heusner* empfahl nach dem Vorgange *Hamilton*'s zur Extension nur die Eigenschwere des herabhängenden Armes zu benutzen. Die beim Aufstehen, Gehen, Hinlegen unvermeidlichen Bewegungen der Bruchstelle sollen keinen Schaden bringen, sondern eher günstig wirken, ebenso nach den Versuchen *Helferich*'s, die bei anhaltendem Herabhängen entstehende venöse Hyperämie. Nachts legt der Kranke den gebrochenen Arm einfach neben sich. Bei Ermüdungsschmerzen am Tage dürfen die Kranken im Sitzen den Vorderarm auf den Schoos stützen oder auch ab und zu in eine schlaffe Mitella legen. Ich möchte diese *Heusner*'sche Behandlungsweise nur dann zu versuchen rathen, wenn man den Patienten unter ständiger Aufsicht haben kann. Man kann sonst durch Wiederkehr der Dislocation schwere Schädigungen des Patienten erleben.

Während *Hamilton* und *Heusner* nur die Eigenschwere des Armes zur Extension benutzten, hatte *Petrequin* versucht, den Zug während des Tages durch ein an den Arm gehängtes Gewicht zu bewerkstelligen; ebenso verfuhr *Clark*, dessen Verfahren wir beistehend abbilden. (Fig. 146). Während der Kranke geht, steht oder sitzt, ruht der rechtwinklig gebeugte Vorderarm in einer Schlinge; vom Oberarm hängt dagegen das mit zwei Längsstreifen und einer Bindeneinwickelung befestigte Gewicht, welches bei horizontaler Lage über eine Rolle geführt wird, frei herab.

Fig. 146.



Wir haben bisher angenommen, dass der abgebrochene Humeruskopf seine normale Lage annähernd beibehalten hatte. Liegt nun aber die seltene Verletzung vor, dass das untere Fragment in typischer Weise verschoben ist, das obere aber nach oben und aussen steht, so kommt man mit all den angeführten Verbandmethoden nicht zum Ziel, erreicht aber eine gute Coaptation der Fragmente dadurch, dass man den Arm mittelst Heftpflasterstreifen und Gewichten im rechten Winkel nach aussen extendirt. Die Contraextension braucht im Allgemeinen nur 8—14 Tage zu liegen, die Extension soll dagegen von Anfang an mit den stärksten Gewichten (10—20 Pfund) geschehen, um der elastischen und reparativen Retraction der Gewebe entgegen zu arbeiten.

Besteht eine Anspiessung der Haut durch das untere Fragment, so versucht man, die Haut durch Erfassen mit den Fingern und Emporheben oder durch sanftes Drücken und Reiben frei zu machen. Gelingt das nicht, so geht man mit einem Tenotom ein und trennt die Haut resp. die betreffende Muskelpartie durch. Kommt man auch so nicht zum Ziel, so bleibt nichts anderes übrig, als unter aseptischen Cautelen die Haut zu incidiren und die Spitze des Fragmentes frei zu machen resp. abzutragen.

Differentialdiagnose der Schultergelenksverletzungen.

Wir haben jetzt nach Besprechung der Fracturen des oberen Humerusendes alle die Verletzungen kennen gelernt, die am Schultergürtel statthaben können. Es erübrigt uns nun noch, die Differentialdiagnose der einzelnen Fracturen und Luxationen untereinander und von der einfachen Contusion des Gelenkes zu stellen. Um dieselbe möglichst übersichtlich zu gestalten, lassen wir zunächst die Symptome der Contusion folgen und vergleichen dann nach dem Vorbild von *Hamilton* und *Bardenheuer* in den nachstehenden Tabellen mit denselben diejenigen der andern Verletzungen. Es entsprechen sich in der angefertigten Zusammenstellung die einzelnen Ziffern, und zwar beziehen sie sich 1) auf das Lebensalter, 2) die Entstehung der Verletzung, 3) das Verhalten der Schulterwölbung, 4) das des Acromion und Deltoides und 5) der Weichtheile unter dem Acromion, 6) auf das Vorhandensein abnormer Vorsprünge oder Vertiefungen an der Schulter, 7) auf die Existenz von Schmerzen an bestimmten Punkten, 8) auf die Richtung von Oberarmachse, 9) Stellung des Armes, 10) Länge, 11) Function desselben, 12) auf das Verhalten des Gelenkkopfes oder der Bruchenden, 13) auf den Nachweis von Crepitation und 14) abnormer Beweglichkeit und schliesslich, 15) auf die Möglichkeit die Reduction zu vollführen. Wir hoffen auf diese Weise die Erkenntniss einer vorliegenden Verletzung mit möglichster Sicherheit fördern zu helfen.

Contusion der Schulter.

1) Kommt in jedem Lebensalter vor.
2) Entsteht durch direkte Gewalt.
3) Es besteht eine starke gleichmässige Schwellung der ganzen Schulter, welche von Tag zu Tag abnimmt und nach etwa 8 Tagen verschwunden ist.

4) Das Acromion springt nicht stärker hervor.
5) Unterhalb desselben kann man zuweilen durch Wegdrücken des blutigen Exsudates eine scheinbare Vertiefung erzeugen.
6) Vor und hinter dem Acromion entdeckt man des öftern eine schwappende, durch einen Hämarthros bedingte Geschwulst.
7) Es besteht ein heftiger Schmerz im Gelenk, welcher durch Druck unterhalb des Acromion, an der vordern und hintern Seite des Gelenkes und von der Achselhöhle aus gesteigert wird.
8) Die Achse des Armes fällt in das Gelenk.
9) Der Arm steht normal, der Ellenbogen kann leicht stärker adducirt werden. Patient kann die Hand leicht auf die gesunde Schulter legen, während der Ellenbogen die Brust berührt.
10) Die Länge des Armes ist unverändert.
11) Seine Function, für die ersten Tage bedeutend behindert, wird rasch wieder normal.
12) Der Oberarm bewegt sich unverändert im Gelenk.
13) Crepitation fehlt.
14) Ebenso abnorme Beweglichkeit oder starke Fixation.
15) Es ist durch Massage möglich, die Schwellung des Gelenkes in kurzer Zeit bedeutend zu mindern.

II. Luxatio claviculae supraacromialis.

1) Kommt besonders im mittleren Lebensalter vor.
2) Entsteht durch directe Gewalt.
3) Die Schulterwölbung ist bedeutend verändert.
4) Das Acromion selbst verhält sich normal. Es ist auch
5) Unter ihm selbst keine Einsenkung der Haut vorhanden.
6) Das acromiale Ende der Clavicula bewirkt aber über dem Acromion einen starken Vorsprung, der zum letzteren in einem concaven Bogen abfällt. Die Schulter könnte daher, insofern man das Ende der Clavicula für das Acromion anspräche, eine bedeutende Abflachung zeigen. Das acromiale Ende der Clavicula ist aber viel schmäler als das Acromion und ausserdem glatt, abgerundet und wenig schmerzhaft In der Vertiefung unter ihm sucht man vergebens nach der Cavitas glenoidalis. Die ganze Schulter ist nach vorn, unten und innen gesunken,
7) Schmerzen bestehen besonders, wenn der Deltoides verletzt ist, auf der prominirenden Kuppe, ausserdem bei Druck auf diese und bei stärkeren Bewegungen des Armes.

8) Die Achse des Armes fällt ins Gelenk.
9) Der Arm hängt am Leibe herab, erscheint höchstens mit dem oberen Ende abducirt.
10) Seine Länge ist scheinbar bedeutend vergrössert, dabei kann er
11) Leicht activ und passiv bewegt werden.
12) Crepitation fehlt.
13) Die Clavicula ist nach allen Seiten hin abnorm beweglich.
14) Der Gelenkkopf des Oberarmes rotirt unverändert unterhalb des wirklichen Acromion.
15) Durch Auf- und Abwärtsbewegung der Schulter und durch Herabdrücken des Vorsprunges über dem Acromion nach unten gelingt sofort die Beseitigung der Deformität.

III. Luxatio claviculae infraacromialis.

1) Kommt im mittleren Lebensalter vor.
2) Entsteht durch directe Gewalt.
3) Die Schulter erscheint etwas abgeflacht, jedoch eckiger. Die Fossae supra- und infraclavicularis sind verstrichen.
4) Das Acromion springt spitzig hervor, seine Gelenkfacette kann durch die Weichtheile hindurchgefühlt werden.
5) Unter demselben ist keine Vertiefung vorhanden, im Gegentheil kann
6) Von dem acromialen Ende der Clavicula nach vorn unter dem Acromion ein Vorsprung gebildet werden.
7) Schmerzen bestehen bei aktiven und passiven Bewegungen. Im Arm kommt zuweilen das Gefühl des Ameisenkriechens vor.
8) Die Achse des Armes fällt ins Gelenk.
9) Derselbe liegt dem Körper dicht an,
10) Erscheint etwas verlängert und ist
11) In seiner Function stark behindert.
12) Der Oberarmkopf zeigt nichts Abnormes.
13) Crepitation fehlt.
14) Die Clavicula, deren sternales Ende hervorspringt, ist am acromialen Ende abnorm beweglich.
15) Die Reduction gelingt leicht durch Auswärtsziehen des Oberarmes und directen Druck auf die Clavicula nach vorn und oben.

IV. Fractura Acromii.

1) Kommt in jedem Alter vor, am häufigsten jedoch im mittleren.
2) Entsteht meist durch directe Gewalt.
3) Die Schulter erscheint abgeflacht.
4) Das Acromion steht im Vergleich mit dem der gesunden Seite etwas tiefer.
5) Es findet sich jedoch keine Vertiefung unter demselben.
6) Es gelingt zuweilen eine vermehrte Wölbung des Acromion nachzuweisen oder beim Herabziehen des Armes über der Bruchstelle eine winkelige Knickung herbeizuführen.
7) Es besteht eine grosse Schmerzhaftigkeit auf der Höhe des Acromion, die bei Druck und starker Abduction des Armes noch gesteigert wird.
8) Die Achse des Armes fällt ins Gelenk.
9) Derselbe hängt am Leib herab, doch kann die Hand auf die gesunde Schulter gelegt werden.
10) Der Arm ist scheinbar verlängert.
11) Seine active Erhebung ist unmöglich oder erschwert, die Rotation frei.
12) Der Oberarmkopf bewegt sich dabei in seinem Gelenk.
13) Crepitation ist in der Regel leicht nachweisbar,
14) Ebenso abnorme Beweglichkeit.
15) Bei perpendiculärer Erhebung des Armes verschwindet die Deformität, kehrt aber beim Nachlass der Repositionsversuche sofort wieder.

V. Fractura colli scapulae.

1) Kommt meist im mittleren und höheren Alter vor.
2) Entsteht durch directe Gewalt.
3) Die Schulter erscheint sehr abgeflacht uud nach unten gesunken.
4) Das Acromion springt stark hervor, der Deltoides ist in seinem mittleren Theile sehr gespannt.
5) Direct unter dem Acromion bald mehr nach vorn, bald mehr nach hinten befindet sich eine Vertiefung, in die man bequem den Finger hineindrücken kann.
6) Unterhalb des Acromion fühlt man in grosser Tiefe an Stelle der glatten Fossa glenoidalis die Zacken der Bruchfläche, deren Palpation
7) Sehr schmerzhaft ist.
8) Die Achse des Armes fällt ins Gelenk.

9) Derselbe hängt schlaff herunter oder steht leicht adducirt. Die Hand kann, wenn auch unter Schmerzen auf die gesunde Schulter gelegt werden.
10) Der Arm erscheint, besonders von hinten gesehen, verlängert; das Olecranon steht tiefer.
11) Active Bewegungen sind fast unmöglich, passive sehr schmerzhaft, indess leicht ausführbar.
12) Der Oberarmkopf wird zwar in der Axilla gefühlt, rotirt indessen in seinem Gelenk und kann mit demselben leicht an seine richtige Stelle geschoben werden.
13) Crepitation lässt sich leicht nachweisen, ebenso
14) Ist abnorme Beweglichkeit vorhanden.
15) Die Reduction gelingt leicht durch senkrechtes Erheben des Armes. Die Deformität kehrt jedoch wieder.

VI. Luxatio humeri subcoracoidea.

1) Kommt im kindlichen Lebensalter sehr selten vor, sonst häufiger.
2) Entsteht in der Regel durch indirecte Gewalt, zuweilen aber auch durch directe und selbst durch Muskelaction.
3) Die Schulter ist kantig abgeflacht.
4) Das Acromion springt stark hervor. Der Deltoides ist gespannt. An seiner Ansatzstelle erscheint eine förmliche Abknickung des Armes.
5) Unterhalb des Acromion sieht und fühlt man eine Einsenkung der Weichtheile, in deren Tiefe die Cavitas glenoidalis zu palpiren ist.
6) In der *Mohrenheim*'schen Grube bildet der Gelenkkopf unterhalb des Proc. coracoideus eine Hervorwölbung und ist dort auch von der Axilla aus zu fühlen.
7) Es besteht eine grosse Schmerzhaftigkeit des Armes, besonders bei Bewegungsversuchen.
8) Die Achse des Armes fällt nach innen von der Fossa glenoidalis.
9) Derselbe steht abducirt; es ist unmöglich, den Ellenbogen dem Leib zu nähern; Patient kann die Hand nicht auf die gesunde Schulter legen.
10) Der Arm erscheint etwas verlängert und ist
11) In der falschen Stellung vollständig starr und fest fixirt; bei jedem Bewegungsversuch fühlt man einen federnden Widerstand. Nur bei gleichzeitigem Bruch der Tubercula kann er beweglich sein.

12) Der Kopf steht unter dem Proc. coracoideus, hat also die Gelenkhöhle verlassen.
13) Crepitation fehlt.
14) Es ist abnorme Fixation vorhanden.
15) Die Reduction gelingt nur durch besondere Manipulationen, bleibt aber nachher bestehen.

VII. Fractura capitis humeri.

1) Kommt meist im höhern Alter vor.
2) Entsteht durch directe Gewalt.
3) Die Schulterwölbung ist normal oder doch nur minimal abgeflacht.
4) Das Acromion springt nicht hervor, ebenso findet man unter demselben
5) Keine Vertiefung.
6) Es ist nirgends ein abnormer Vorsprung zu fühlen.
7) Es bestehen Schmerzen im Gelenk.
8) Die Achse des Armes zieht ins Gelenk.
9) Der Arm hängt meist am Körper herunter, ist selten und sehr wenig abducirt.
10) Seine Länge ist unverändert.
11) Der Arm kann passiv frei bewegt werden, ebenso zuweilen auch activ.
12) Der Kopf folgt wegen der Einklemmung der eventuell abgebrochenen Fragmente stets den Bewegungen des Oberarmes.
13) Crepitation ist zwar im Gelenk vorhanden, indess schwer deutlich zu machen.
14) Abnorme Beweglichkeit lässt sich nicht nachweisen.
15) Die Dislocation fehlt meist oder ist ganz gering.

VIII. Fractura humeri transtubercularis.

1) Kommt im höhern Lebensalter vor.
2) Entsteht durch directe Gewalt.
3) Die Schulter ist sehr wenig abgeflacht.
4) Das Acromion springt etwas hervor.
5) Unter demselben befindet sich eine seichte, nahe dem Gelenk liegende Depression.
6) Es besteht eine starke Verbreiterung des obern Humerusendes.
7) Es besteht eine grosse Schmerzhaftigkeit bei Druck auf die Fracturstelle, auf die Gegend der Tubercula und bei stärkeren Bewegungen des Armes.

8) Die Achse des Armes fällt in das Gelenk, zuweilen ein wenig mehr nach innen.
9) Der Ellenbogen ruht dem Körper an, die Hand kann leicht auf die gesunde Schulter gelegt werden.
10) Der Arm ist nur bei bestehender Einkeilung etwas verkürzt.
11) Seine Beweglichkeit ist nicht besonders behindert.
12) Der Kopf steht in der Gelenkgrube, folgt jedoch nur bei bestehender Einkeilung den Rotationen des Armes.
13) Crepitation wird entdeckt, wenn man die Höcker umfasst und dann den Arm rotirt oder plötzlich abducirt. Bei diesen Manipulationen fühlt man auch
14) Abnorme Beweglichkeit ziemlich dicht unter dem Gelenk.
15) Es besteht keine starke Dislocation der Fragmente.

IX. Fractura Tuberculi majoris.

1) Kommt besonders im mittleren Lebensalter vor.
2) Entsteht durch Absprengung oder Abreissung.
3) Die Schulter erscheint stark verbreitert, ihr Querdurchmesser von vorn nach hinten vergrössert.
4) Das Acromion kann ziemlich stark vorspringen.
5) Dicht unterhalb des Acromion ist eine flache Depression vorhanden.
6) Man fühlt hinter und unterhalb des Acromion ein leicht bewegliches Fragment.
7) Es entsteht heftiger Schmerz bei starker Elevation des Armes und bei Druck auf das nach hinten und oben stehende Tuberculum majus.
8) Die Achse des Oberarmes fällt in das Gelenk.
9) Die Stellung des Armes kann unverändert sein; zuweilen ist jedoch der Ellenbogen leicht abducirt, da das obere Humerusende nach innen gezogen sein kann.
10) Der Arm hat seine normale Länge.
11) Es sind active Bewegungen unterhalb der Horizontalen möglich, dagegen keine Aussenrotation.
12) Der Gelenkkopf ist etwas mehr nach innen dislocirt und von der Axilla aus leicht abzupalpiren. Zwischen Kopf und Tuberculum majus liegt eine deutliche Rinne.
13) Crepitation fühlt man bei Rotationen des rechtwinkelig abducirten Armes und gleichzeitiger Fixation des Tuberculums.
14) Das Tuberculum lässt sich leicht hin- und herschieben.

15) Die Reduction des abgebrochenen Fragmentes an seine normale Stelle ist leicht durch directes Hinschieben desselben, die Retention desselben jedoch schwer.

X. Fractura tuberculi majoris cum luxatione humeri subcoracoidea.

1) Kommt besonders im mittleren Alter vor.
2) Entsteht meist durch Hyperabduction des Armes.
3) Die Schulter ist nicht so stark abgeflacht wie bei der Luxation allein, dagegen durch das Vorhandensein zweier Hervorwölbungen stark verbreitert.
4) Das Acromion springt weniger stark hervor.
5) Die Abflachung unter ihm ist weniger ausgesprochen, da unterhalb desselben das abgebrochene Tuberculum majus liegt.
6) Dieses ist hier als abnormer Vorsprung zu entdecken, der Gelenkkopf wölbt dagegen die *Mohrenheim*'sche Grube hervor.
7) Es bestehen nicht so heftige Schmerzen im Gelenk wie bei der Luxation.
8) Die Achse des Armes schiesst nach innen an der Cavitas glenoidalis vorbei.
9) Der Ellenbogen steht weniger abducirt als bei der Luxation und lässt sich dem Leib leichter nähern; die Hand kann nicht auf die gesunde Schulter gelegt werden.
10) Der Arm erscheint etwas verlängert.
11) Er kann trotz der Luxation ziemlich gut bewegt werden.
12) Der Kopf steht unter dem Proc. coracoideus und kann von der Axilla aus leicht palpirt werden.
13) Wenn man das Tuberculum dem Kopfe andrückt und dann verschiebt, fühlt man zuweilen Crepitation.
14) Der Arm ist nicht so stark fixirt wie bei der Luxation, auch lässt sich das Tuberculum hin- und herschieben.
15) Die Reduction gelingt leichter als bei der einfachen Luxation.

XI. Fractura Tuberculi minoris.

1) Kommt besonders im höhern Alter vor.
2) Entsteht meist als Complication einer Luxation, als Abreissungsfractur durch den Zug des M. subscapularis.
3) Die Schulter ist wenig abgeflacht; der Arm erscheint an der Deltoidesinsertion wie abgeknickt.
4) Das Acromion springt nicht hervor, ebenso ist
5) Keine Vertiefung unter demselben vorhanden.

6) An der Innenseite des obern Humerusendes fühlt man einen leicht verschieblichen Vorsprung, der durch eine Furche von dem Tuberc. majus getrennt ist.
7) Ueber dem ersteren werden heftige Schmerzen localisirt, ebenso ist die Aussenrotation sehr empfindlich.
8) Die Achse des Armes fällt ins Gelenk,
9) Der Arm steht zuweilen abducirt und nach aussen rotirt.
10) Seine Länge ist unverändert,
11) Seine Function sehr behindert.
12) Der Kopf ist zuweilen nach innen gewichen.
13) Crepitation lässt sich deutlich machen durch Umfassen des Tuberculum und Hin- und Herschieben desselben.
14) Das Tuberculum lässt sich leicht abnorm bewegen.
15) Die Reduction ist leicht, die Retention schwer. Es besteht grosse Neigung des Armes zur Luxation nach vorn.

XII. Fractura colli humeri anatomici.

1) Kommt besonders im mittleren und höhern Alter vor.
2) Entsteht durch directe Gewalt.
3) Die Schulter ist wenig abgeflacht.
4) Das Acromion springt undeutlich hervor.
5) Unter demselben ist nur eine geringe Depression vorhanden.
6) Man fühlt zuweilen das untere Bruchende in der Achselhöhle.
7) Das Gelenk ist auf Druck sehr schmerzhaft, ebenso bei passiven Bewegungen.
8) Die Achse des Armes fällt ins Gelenk.
9) Der Arm hängt am Leibe herab, selten steht der Ellenbogen etwas abducirt, ist dann aber leicht adducirbar; die Hand kann leicht auf die gesunde Schulter gelegt werden.
10) Der Arm ist gleich lang wie der andere, selten minimal verkürzt.
11) Seine Beweglichkeit ist weder vermehrt noch vermindert.
12) Der Kopf ist im Gelenk vorhanden, zuweilen nach vorn und innen verschoben.
13) Crepitation ist vorhanden, lässt sich aber nur durch die früher geschilderten Manipulationen deutlich machen.
14) Es ist zuweilen abnorme Beweglichkeit vorhanden und kann man dann den Arm unter dem Gelenk nach aussen abknicken. Es kann aber auch, ohne dass Einkeilung besteht, der Kopf den Rotationen des Armes folgen, wenn er nämlich zwischen Humerusschaft und Pfanne eingeklemmt wird.

15) Es lässt sich die Deformität durch ein in die Achselhöhle eingeschobenes Kissen ausgleichen.

XIII. Fractura colli humeri chirurgici.

1) Kommt als Querfractur meist in hohem Alter, als Schrägbruch bei jugendlichen Individuen vor. Ist der häufigste am oberen Humerusende vorkommende Bruch.
2) Die Querfractur entsteht meist durch directe, der Schrägbruch durch indirecte Gewalt.
3) Die Schulter erscheint etwas abgeflacht.
4) Das Acromion springt stark hervor.
5) Mehrere Centimeter unter dem Acromion findet sich eine Depression. Diese liegt also tiefer wie bei den bisherigen Verletzungen.
6) Das untere Bruchende bewirkt nach innen und etwas nach unten vom Proc. coracoideus eine Hervorwölbung der Weichtheile, und es kann durch diese hindurch die zackige Bruchfläche gefühlt werden.
7) Unterhalb des Acromion besteht ein heftiger Schmerz an der Fracturstelle.
8) Die Achse des Armes schiesst nach innen an der Cavitas glenoidalis vorbei.
9) Der Ellenbogen steht abducirt, kann aber leicht adducirt werden, die Hand kann die gesunde Schulter erreichen.
10) Der Arm ist erheblich verkürzt.
11) Die passiven Bewegungen sind unter Schmerzen möglich.
12) Der Kopf liegt in der Gelenkgrube, nimmt nicht Theil an den Rotationen, wenn keine Einkeilung besteht.
13) Crepitation ist leicht zu erzeugen.
14) An der Fracturstelle lässt sich leicht abnorme Beweglichkeit und eine winkelige Abknickung des Armes erzielen.
15) Die Reduction gelingt unschwer, die Dislocation kehrt dagegen sofort wieder.

XIV. Fractura colli humeri anatomici sive chirurgici cum Luxatione capitis humeri subcoracoidea.

1) Kommt meist im mittleren und höheren Alter vor.
2) Entsteht durch eine einleitende indirecte und folgende directe Gewalt.
3) Die Schulter ist stark abgeflacht.
4) Das Acromion springt stark hervor.

5) Dicht unter dem Acromion befindet sich eine tiefe Depression, in deren Grund man die leere Cavitas glenoidalis fühlt.
6) Unter dem Proc. coracoideus steht der Kopf fest fixirt.
7) Es bestehen heftige Schmerzen der ganzen Schulter.
8) Die Achse des Armes schiesst nach innen am Gelenk vorbei.
9) Der Arm hängt meist schlaff herunter, ist bisweilen etwas abducirt. Der Ellenbogen lässt sich dann leicht adduciren. Die Hand erreicht die gesunde Schulter.
10) Der Arm erscheint verkürzt, denn der Humerusschaft steht in der Axilla.
11) Die Function des Armes ist aufgehoben.
12) Der Kopf liegt nach vorn und innen vom Gelenke, nimmt aber an den Rotationen des Armes nicht Theil.
13) Crepitation lässt sich hervorrufen durch Aneinandernäherung der Fragmente.
14) Der Arm lässt sich nach allen Richtungen hin abnorm bewegen.
15) Die Reduction ist nur auf besonderem Wege zu erreichen.

XV. Fractura seu Diastasis Epiphyseos.

1) Kommt im jugendlichen Alter bis zum 20. Lebensjahre vor.
2) Entsteht meist durch indirecte Gewalt
3) Die Schulterabflachung ist gering.
4) Das Acromion springt hervor.
5) Die Depression unter demselben ist flach, liegt etwa 2—3 Centimeter unter dem Acromion, tiefer als bei der Fractura colli humeri anatomici, höher als bei der des chirurgischen Halses.
6) Das untere Fragment springt an der vorderen inneren Seite des oberen Humerusendes vor.
7) Es besteht an der Stelle der Verletzung ein sich bei Druck und Bewegungen steigernder Schmerz.
8) Die Achse des Armes zieht bei stärkerer Dislocation des unteren Fragmentes etwas nach innen an dem Gelenke vorbei.
9) Der Arm hängt am Körper herunter oder steht bei stärkerer Dislocation leicht abducirt und nach hinten gerichtet.
10) Der Arm ist etwas verkürzt,
11) Seine Function aufgehoben.
12) Der Kopf liegt unterhalb des Acromion und macht die Bewegungen des Armes nicht mit.
13) Es besteht eine weiche Knorpelcrepitation, ebenso

14) Abnorme Beweglichkeit.
15) Die Reduction ist leicht, die Retention der Fragmente dagegen schwer.

B. Fracturen der Diaphyse des Humerus.

Die Diaphyse des Humerus erstreckt sich von der Insertionsstelle des Pectoralis major bis zur Ursprungsstelle des Supinator longus. Fracturen können an jedem Punkt derselben eintreten. Ihr Sitz wechselt ausserordentlich.

Sie kommen am häufigsten vor im ersten Decenium, werden im zweiten bedeutend seltener, nehmen im dritten wieder an Frequenz zu, um von dort an allmählig abzufallen.

Die Ursache ist entweder eine directe Gewalt wie ein Stockschlag, Ueberfahrenwerden, Anstossen des Armes gegen einen festen Körper, oder eine indirecte Gewalt z. B. ein Fall auf den Ellenbogen oder die ausgestreckte Hand. Auch der Muskelzug spielt hier eine Rolle. Unwillkürliche Muskelcontraction kann die Fractur erzeugen bei Krampfanfällen, Epilepsie; willkürliche beim Fortschleudern eines schweren Gegenstandes, beim Verfehlen eines Zieles während eines Schlages, beim Schlagen von Lufthieben u. s. w. Der Arm wird in solchen Fällen ebenso abgeknickt wie ein Stock, den man am Schlusse eines kräftigen Hiebes gewaltsam zurückhält. Die so entstehende Fractur liegt gewöhnlich in seiner Mitte oder dicht unterhalb des Deltoidesansatzes.

Die Fracturen können unvollständige und vollständige sein.

Die Infractionen sind im Allgemeinen sehr selten und kommen wohl nur bei rhachitischen Kindern vor.

Die vollständigen Fracturen sind bezüglich ihrer Ausdehnung, der Richtung der Bruchlinie, der Dislocation sehr verschieden. Man unterscheidet im Allgemeinen Quer-, Schräg- und Längsbrüche, einfache und mehrfache, comminutive und complicirte Brüche.

Die Längsbrüche haben wir schon gelegentlich der Anatomie erwähnt.

Die Querfracturen entstehen meist durch directe Gewalt oder auch wohl durch Muskelzug. Bei Kindern sind sie zuweilen subperiostal, bei Erwachsenen oft sehr stark gezackt, so dass die einzelnen Zacken ineinandergreifen. Die Dislocation ist



meist sehr gering, oft besteht sie nur in der Bildung eines Winkels, indem die Zähne an der offenen Winkelseite in einander greifen, während sie sich an der geschlossenen Seite mit der Spitze verfangen haben. Aeusserst selten verlassen sich die Fragmente. Es tritt dann dieselbe Dislocation ein, wie bei den völlig ausser Contact stehenden Schrägbrüchen.

Bei diesen Schrägbrüchen ist die Bruchlinie selbst an keine bestimmte Richtung gebunden. Sie entstehen mit Vorliebe durch indirecte Gewalt und zwar durch forcirte Biegung bei einem Fall auf den Ellenbogen oder auf die ausgestreckte Hand. Die Dislocation ist grösstentheils abhängig von der Richtung der äusseren Gewalt und der Richtung und Beschaffenheit der Bruchlinie. Ist das Periost erhalten, so findet sich oft auch nur eine Winkelstellung der Fragmente. Ist dasselbe dagegen zerrissen, so wird die Verschiebung beträchtlicher, denn es wirkt jetzt auf die Bruchenden die elastische Kraft der Muskeln. Die Dislocation ist dann verschieden, je nachdem die Fractur oberhalb oder unterhalb des Deltoidesansatzes oder am unteren Ende der Diaphyse sitzt.

Beim Bruch oberhalb des Deltoidesansatzes wird das obere Fragment durch den Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi nach innen, das untere dagegen durch den Deltoides nach vorn und auswärts gezogen. Es entsteht also an der Bruchstelle ein nach aussen offener Winkel. (Tafel VI.)

Beim Bruch unterhalb des Deltoidesansatzes zieht dieser das obere Fragment nach vorn und auswärts, während das untere durch die elastische Retraction des Triceps nach hinten und oben gelangt (Tafel VI.) Es entsteht also ein bald mehr nach hinten, bald mehr nach vorn sehender Winkel. Viel seltener sinkt das untere Fragment, der Schwere des Vorderarmes folgend, gerade nach unten.


In der unteren Partie der Diaphyse ist eine Dislocation nicht gut möglich, weil der Knochen hier an beiden Seiten mit den von ihm entspringenden Muskeln, Triceps und Brachialis internus, bedeckt ist. Es kann indess auch hier gelegentlich durch die Schwere des abfallenden Armes und durch die Contraction des Triceps ein nach hinten offener Winkel gebildet werden. Sehr selten besteht eine Einkeilung der Fragmente, dagegen kann das untere Fragment eine Dislocation ad peripheriam eingehen.

Doppel- und Splitterbrüche haben am Oberarm nichts Charakteristisches, ebensowenig die durch Torsion entstehenden

Spiralbrüche. Wir bilden einen solchen Spiralbruch am unteren Humerusende nach einer Beobachtung *Lauenstein*'s nebenstehend ab (Fig. 147).

Von Nebenverletzungen bei den Oberarmfracturen hat man besonders die durch Schuss und Ueberfahrenwerden entstehenden Zerreissungen der Art. brachialis beobachtet. Relativ häufiger ist aber das Gefäss nicht zerrissen, sondern nur abgeplattet und gequetscht. In gleicher Weise können auch die Nerven lädirt werden, so am oberen Ende der Plexus axillaris, ganz besonders aber häufig der sich um den Oberarm herum schlängelnde Nervus radialis. Den Fracturlähmungen dieses Nerven hat *Goldstein* kürzlich eine eigene Arbeit gewidmet. Die Lähmung kann als directe Folge des Knochenbruches und unmittelbar im Anschluss an denselben entweder durch einfache Quetschung oder durch Aufspiessung des Nerven seitens eines Fragmentes oder durch völlige Zerreissung des Nerven oder schliesslich durch eine Interposition desselben zwischen die Fragmente eintreten. Im letzteren Fall kann man die Diagnose oft dadurch stellen, dass beim Reiben der Bruchflächen gegeneinander sehr lebhafte Schmerzen eintreten.

Fig. 147



Die Lähmung kann aber auch erst secundär einsetzen durch besondere Complicationen während der Heilung der Fractur. Es handelt sich hier fast durchweg um Druckparalysen, die durch Compression des Nerven durch Narben oder Callusmassen zu Stande kommen.

Die **Symptome** bei fehlender Dislocation sind der fixe Bruchschmerz, eine Sugillation, abnorme Beweglichkeit und die Möglichkeit, den Knochen abzuknicken. Ist eine Verschiebung in der oben angegebenen Weise vorhanden, so findet man ausserdem noch die charakteristische Deformität, Crepitation, sieht auch wohl die hervorstehenden Bruchenden und constatirt die Functionsstörung des Armes. Die Verletzung der Arterie giebt sich zu erkennen durch Kälte der Extremität, Abwesenheit des Radialpulses, rasche Verfärbung

der Haut und selbst durch Eintreten einer Gangrän. Die Nervenverletzung zeigt sich an durch motorische Störungen, Anästhesie und Hyperästhesie. Wenn die Fractur, wie dies zuweilen vorkommt, mit einer Luxation im Schultergelenk combinirt ist, so findet man noch nebenbei die Symptome dieser.

Die **Prognose** ist im Ganzen sehr günstig. Bei fehlender Dislocation erfolgt die knöcherne Heilung bei jüngeren Leuten innerhalb 20—30 Tagen, bei älteren innerhalb 32—40 Tagen. Bei stärkerer Dislocation oder bei Splitterbrüchen verzögert sich die Consolidation um einige Wochen. Besteht eine reine Querfractur, so bleibt meist keine Deformität zurück, aber auch bei stärkerer Verschiebung bleibt sie, eine passende Behandlung vorausgesetzt, meist gering. Wenn sich Muskelbündel zwischen die Fragmente eingeklemmt hatten oder die Fragmente mangelhaft fixirt waren, so kommt es zuweilen zu Pseudarthrosenbildung. Zu ihrer Verhütung ist ein genauer Contact der Bruchflächen dringend erforderlich. Durch eine hypertrophische Callusbildung kann der Nervus radialis gedrückt werden und so eine complete Lähmung desselben entstehen, die nur durch Resection des Callus geheilt werden kann.

Die **Therapie** vollzieht zunächst die Reposition der Fragmente in üblicher Weise durch Extension und Contraextension. Dabei muss man vor allem auch auf eine etwaige Dislocation des unteren Fragmentes ad peripheriam achten. Der Arm steht dann richtig, wenn der Epicondylus externus gerade nach vorn und senkrecht unterhalb des Acromion steht und Epicondylus externus, Acromion und Tuberculum majus eine Linie bilden. Die Bruchflächen sollen sich nach der Coaptation möglichst in ihrer ganzen Länge berühren, der Vorderarm aber vollständig immobilisirt werden, damit nicht seine Bewegungen auf das untere Fragment übertragen werden.


Zur Retention der Fragmente ist eine Mitella wenig zu empfehlen. Sie giebt leicht zu Pseudarthrosen Veranlassung, indem einmal bei locker liegendem Verband das untere Bruchstück sich durch seine Schwere vom oberen entfernen kann, andere Male beim zu festen Anziehen der Mitella dasselbe neben dem oberen in die Höhe geschoben wird.

Besser eignet sich der Gyps, entweder in der Form der *Beely*-schen Gypshanfschiene oder der *Braatz*'schen Gypstricotschiene (Fig. 140) oder als circulärer Gypsverband. Will man den letzteren wählen, so wird der ganze Arm in rechtwinklig flectirter Stellung

von der Hand bis zur Schulter und ebenso der Thorax mit Flanellbinden eingewickelt. Sodann wird von dem flectirten Ellenbogen aus eine kräftige Extension nach unten, von der Axilla aus die Contraextension nach oben ausgeübt, nun der Vorderarm und Oberarm mit Gypsbinden umgeben und gleich anschliessend mit der Gypsbinde einige Spicatouren über die kranke Schulter zur gesunden Achselhöhle geführt. Dann erst wird der ganze Oberarm mittelst Gypszirkeltouren am Thorax befestigt, während die Extension bis zum Trocknen des Verbandes fortbesteht. In Frankreich wird vielfach und wie es scheint, mit Erfolg die Behandlung der Oberarmbrüche mittelst der *Hennequin*'schen präparirten Gypsschienen — ähnlich den in Deutschland neuerdings vielfach empfohlenen *Breiger*'schen Gypswatteschienen — geübt.

Anstatt dieser etwas umständlichen Manipulation mit Gyps empfiehlt *König* zwei Pappeschienen, von welchen die innere von der Achsel bis zum Condylus internus reicht, die äussere, an ihrem oberen Ende zur Anpassung an die Schulter mit einem Längschnitt versehen, von der Schulter rechtwinklig gebeugt um den Ellenbogen bis zur Hand verläuft. Sie hat in der Gegend des Condylus internus einen Ausschnitt. Die Schienen werden in heisses Wasser eingetaucht, nach dem Arm modellirt und mit feuchten Gazebinden an demselben befestigt. Dieser Verband ist bequemer und leichter abnehmbar als der Gypsverband. Er eignet sich besonders für die Fälle, in denen eine starke Schwellung des Armes besteht. In solchem Falle sind auch Holzschienen empfehlenswerth, deren Application aus der vorstehenden Figur 148 erhellt.

Fig. 148.



Um die Fragmente in abducirter Stellung zu fixiren und auf dem Planum inclinatum duplex gleichzeitig eine mässige Extension auszuführen, ist der *Middeldorpf*'sche Triangel sehr geeignet. Andere zur Extension angegebene Apparate sind unpraktisch und brauchen daher nicht erwähnt zu werden.

Hamilton benutzt zur Extension das Gewicht des unterhalb der Bruchstelle liegenden Armtheiles. In ganz zweckmässiger Weise streckt er den Vorderarm und fixirt ihn auf einer festen langen, den ganzen Arm entlang laufenden Schiene. *Kovács* übt den Zug und Gegenzug an einer concav-convexen Holzschiene aus, die etwas länger als der Oberarm und an ihren beiden Enden mit Einkerbungen versehen ist. Diese Schiene wird an der äusseren,

eine kürzere an der inneren Seite des Oberarmes mit Bindentouren befestigt in der Weise, dass die oberen Touren um die Achselhöhle herum und an die oberen Einkerbungen, die unteren um das gebeugte Ellenbogengelenk herum an die unteren Einkerbungen angezogen werden. Selbstverständlich ist eine durchaus gute Polsterung aller Theile (Fig. 149). Die Heftpflastergewichtsextension ist wiederum von *Bardenheuer* besonders ausgebildet worden. Die Heftpflasterstreifen werden, wenn die Fractur nahe am oberen Humerusende liegt, nur unterhalb der Bruchstelle angelegt. Sobald sich die letztere jedoch dem Ellenbogengelenk nähert, sollen sie unbeschadet der Extensionswirkung bis unterhalb des Schultergelenkes reichen. Die Contraextension geschieht von einem Keilkissen in der Achselhöhle aus. Der Arm liegt bei der Extension in supinirter Stellung auf einem neben dem Kranken befindlichen Brette, um die Reibung zu vermindern, läuft dem Körper parallel und ist demselben ganz genähert. Wenn an der Fracturstelle ein mit der Spitze nach innen schauender Winkel besteht, so kann man einen um ihn herumgelegten Heftpflasterstreifen quer nach aussen extendiren, muss aber dabei gleichzeitig den Oberarm oberhalb der Fracturstelle mit Heftpflaster adduciren.

Fig. 149.




Die Behandlung der Diaphysenfracturen kann auch wiederum mit der *Bardenheuer*'schen Federextensionsschiene ambulant geleitet werden (Fig. 150). Durch die Ansa *d* wird die Schulterkappe fixirt, durch *a* das obere Fragment nach innen gedrückt, durch *b* das untere nach aussen gezogen, durch *c* die Längsverschiebung behoben.

Die Therapie darf sich mit der Heilung der Fractur nun aber nicht begnügen; man muss auch etwa bestehenden Lähmungen

im Gebiete des Nervus radialis Rechnung tragen. Geht die Lähmung durch eine geeignete Behandlung mittelst Elektricität und Massage nicht zurück, so empfiehlt es sich möglichst bald den Nerven operativ aufzusuchen und das drückende lähmende Moment

Fig. 150.



zu beseitigen. Derartige Operationen sind schon wiederholt mit Glück ausgeführt worden. Alle die bis jetzt bekannt geworden sind, hat *Goldstein* zusammengestellt.

C. Fracturen am unteren Ende des Humerus.

Zum Verständniss der hierher gehörigen Fracturen ist es vor allem nöthig, sich über die Nomenclatur der Gelenktheile klar zu sein.

Den aus Trochlea und Rotula (Eminentia capitata) bestehenden Gelenkfortsatz des Humerus bezeichnet man als Proc. cubitalis. Seitlich von diesem erheben sich zwei rauhe Höcker, von denen der breitere und spitzere innen gelegen ist und Epicondylus internus heisst, während der schmalere, flachere an der Aussenseite vorspringt und Epicondylus externus genannt wird. Der Epicondylus internus sitzt der Trochlea nach innen auf und heisst mit dieser zusammen Condylus internus. Umgekehrt nennt man die Eminentia capitata plus dem Epicondylus externus Condylus externus Alle diese Theile haben eigene Epiphysenkerne, die zwischen dem 8. und 18. Lebensjahre knöchern verwachsen.

Wir haben nun am unteren Humerusende folgende Fracturen zu besprechen:

1) Die Brüche über den beiden Condylen, Fractura supracondylica. Dieselben umfassen also nach dem oben Gesagten das ganze untere Gelenkende.
2) Brüche, welche die beiden Condylen abtrennen, gleichzeitig aber noch mit einer in das Gelenk hineinragenden Fractur verbunden sind, T- oder Y-Fracturen; Fractura supracondylo-intercondylica.
3) Brüche der Epiphysenlinie.
4) Brüche des Proc. cubitalis.
5) Brüche des Epicondylus internus.
6) Brüche des Condylus internus.
7) Brüche des Epicondylus externus.
8) Brüche des Condylus externus.

I) Fractura supracondylica.

Die Brüche innerhalb der Condylen liegen im Allgemeinen unterhalb der Insertionsstelle des Supinator longus und verlaufen meistenteils extracapsulär, können aber auch einzelne Fissuren in das Gelenk hineinsenden. Die Bruchlinie ist in der Mehrzahl der Fälle eine quere. Es kommen aber auch Schrägfracturen vor, die dann in der Regel von oben und aussen nach unten und innen verlaufen. Die Dislocation der Fragmente ist eine verschiedene. Meist zieht der Triceps das untere Bruchstück nebst dem ganzen Vorderarm nach hinten und oben. Das erstere erleidet zugleich eine Drehung um seine Querachse, so dass der Gelenktheil nach hinten, die Bruchfläche aber nach vorne gerichtet wird. Das obere oder Diaphysenfragment steht ferner vor dem Gelenkfragment und

ist in der Ellenbeuge als prominirender Körper fühlbar. Oberes und unteres Fragment bilden also einen nach vorn vorspringenden Winkel und sind zuweilen noch gleichzeitig medialwärts oder lateralwärts gegen einander verschoben (Tafel VII).

In anderen selteneren Fällen wird das ganze untere Bruchstück durch die fracturirende Gewalt nach vorn getrieben, während das obere nach hinten ausweicht. Es besteht dann ein nach hinten vorspringender Winkel. *Schüller* hält diese Dislocation für eine Folge der normalen Gestaltung des Knochens. Das untere Drittel der Diaphyse sammt dem Cubitalende ist nämlich nach hinten convex. Beim Fall auf den Ellenbogen wird aber diese Convexität noch vergrössert, es entsteht ein Biegungsbruch mit dem nach hinten vorspringenden Winkel.


Die Fractur ist oft complicirt mit Verletzung der Weichtheile, und zwar handelt es sich gewöhnlich um Durchstechungsfracturen, indem das obere Fragment mit seiner Spitze die Weichtheile der Ellenbeuge durchbohrt. Es kann ferner auf gleiche Weise der Nervus medianus gequetscht oder zerrissen und die Art. cubitalis angespiesst werden.

Die Fractur kommt vorzugsweise häufig vor bei Kindern, seltener bei Greisen und fast gar nicht im mittleren Alter.

Die Ursache ist in der Mehrzahl der Fälle eine directe Gewalt, ein Schlag, Stoss oder Fall, der auf das Ellenbogengelenk einwirkt. Oefter entsteht der Bruch auch durch Hyperextension des letztern, so beim Fall auf die ausgestreckte Hand. Dabei wird das Olecranon, entsprechend der Länge des durch den ganzen Vorderarm dargestellten Hebelarmes, mit grosser Gewalt von hinten her gegen die Condylen getrieben und sprengt sie ab, während die Gelenkkapsel Stand hält. Auch nach einem Fall auf die Innenfläche des Vorderarmes beobachtet man die Fractur. Sie entsteht dann nach *Schüller* durch Combination der Pronation oder Supination mit einer forcirten Abduction des Vorderarmes.

Die **Symptome** hängen ab von dem Fehlen oder Vorhandensein einer Dislocation.

Fehlt dieselbe, so findet man oberhalb des Ellenbogengelenkes eine starke Anschwellung und an dieser Stelle den charakteristischen Bruchschmerz. Nach einigen Tagen erscheint dort eine Sugillation. Man vermag an der Bruchstelle den Knochen winklig zu knicken oder auch abnorm zu bewegen und fühlt Crepitation, wenn man die Bruchenden umfasst



und mit dem Vorderarme drehende Bewegungen ausführt.

Die Diagnose kann also erschwert werden, wenn ein starker Bluterguss in das Gelenk hinein stattgefunden hat. Einen solchen findet man aber gar nicht so selten, sei es nun in Folge einer gleichzeitigen Quetschung des Gelenkes, sei es in Folge einer in das Gelenk hinein sich erstreckenden Fissur. Die Fracturschwellung geht dann unmittelbar in diejenige des Gelenkes über, und nur die genaue Untersuchung in der Narkose kann dann die Verletzung klar stellen. Wir wollen übrigens gleich hervorheben, dass man Kinder am besten bei einigermassen zweifelhafter Ellenbogengelenkverletzung zur Stellung der Diagnose sofort chloroformirt.

Fig. 151.




Ist die typische Dislocation der Fragmente durch den Triceps eingetreten (Fig. 151), so steht der Arm im Ellenbogengelenk gebeugt, die Hand in Pronation, das Olecranon stark nach hinten und höher als gewöhnlich, hat dabei aber seine normale Beziehung zu den beiden Epicondylen nicht geändert. Vom Olecranon ziehen die Weichtheile mit einem scharf ausgeprägten nach hinten offenen Winkel in die Weichtheile der unversehrten Humerusdiaphyse über. In der Ellenbeuge sieht und fühlt man oberhalb der Cubitalfalte einen kleinen, schmalen, durch das obere Bruchende gebildeten Vorsprung. Abnorme Beweglichkeit ist leicht zu fühlen, Crepitation dagegen erst, wenn man die Bruchenden wieder in Apposition gebracht hat. Zuweilen gelingt es, von der abnormen Beweglichkeit die darunter stattfindende glatte Beweglichkeit des Gelenkes zu unterscheiden. Zu diesen Symptomen kommt dann noch eine messbare Verkürzung des Humerus vom Acromion bis zu dem Epicondylus externus. Selbstverständlich besteht wiederum Schmerz, Anschwellung, Sugillation und Functio laesa.

2) Fractura supracondylo-intercondylica, T- oder Y-förmige Fractur (Fig. 152).

Es handelt sich hier um einen Splitterbruch, indem die Humerusbasis in 3 Fragmente getrennt wird. Die einfachste Form ist die T- oder Y-förmige Gestalt der Fracturlinie, indem von einer quer oder schräg verlaufenden Fractura supracondylica ein verticaler oder schräger Spalt nach unten in das Gelenk zieht. Die Fragmente können so ohne stärkere Dislocation bestehen bleiben. In anderen Fällen dringt aber das obere wie ein Keil zwischen die unteren ein und treibt sie auseinander. Es kann auch wohl hinter dieselben, selbst bis zum Olecranon gelangen oder mit diesem einen nach vorn oder hinten offenen Winkel bilden. Man muss hierher auch die Splitterfracturen rechnen, bei denen neben der Querfractur das obere und die unteren Fragmente noch mehrfach der Länge nach gebrochen sind und entweder ihre normale Lage beibehalten oder nach verschiedenen Richtungen hin auseinander weichen.

Fig. 152.



Die beiden unteren Fragmente selbst können ebenfalls ihre Lage ändern. So kann der Condylus externus sammt dem Radius nach hinten, der Condylus internus mit der Ulna nach innen weichen. Schliesslich können auch die beiden Condylen nach vorn gewichen sein, während beide Vorderarmknochen vollständig nach hinten luxirt sind.

Die Ursache der Fractur ist meist ein Fall auf den Ellenbogen, wobei zuerst die Querfractur oberhalb der Condylen eintritt und dann secundär das obere Fragment sich beim Weiterwirken der Gewalt in das untere einschiebt und dasselbe auseinandertreibt. Es kann aber auch der Bruch zwischen den beiden Condylen in der Art entstehen, dass dieselben von dem Olecranon wie von einem Keil auseinander gesprengt werden, und endlich können sie durch eine direct auftreffende Gewalt auseinander bersten.

Die Fractur tritt fast ausnahmslos zwischen dem 18. und 40. Lebensjahre auf und ist gemäss der zu ihrem Zustandekommen

nothwendigen intensiven Gewalt häufig mit einer äusseren Wunde complicirt. Dieselbe kann auch hier einer Durchstechung ihr Dasein verdanken.

Die **Symptome** sind zunächst eine starke Anschwelllung des Gelenkes durch einen Bluterguss und bedeutende Schmerzhaftigkeit desselben. Als Zeichen der supracondylären Fractur finden wir dann ferner den Vorsprung des Olecranon, den sichelförmigen Verlauf des Triceps, die Crepitation oberhalb des Gelenkes, nachweisbar beim Nachhintendrücken des oberen Fragmentes und Vorschieben des Olecranon. Dass dann weiterhin daneben noch die Fractura intercondylica besteht, erkennt man in der Regel schon durch die Inspection, indem das Gelenk bedeutend verbreitert erscheint und die Condylen von einander entfernt stehen. Dabei kann man beide Condylen unabhängig von einander bewegen und durch Druck auf die Epicondylen unter heftigen Schmerzen und dem Gefühl der Crepitation die Verbreiterung des Gelenkes heben. Sobald man aber diesen Druck nachlässt, entsteht letztere wieder. Wenn zwischen den beiden Condylen eine sehr starke Diastase besteht, so weicht die Ulna oft in diesen Spalt hinein und wird dort eingekeilt. Die Folge davon ist, dass ein Stück Trochlea an der inneren Seite frei wird, die Entfernung des Epicondylus internus vom Olecranon bedeutend vergrössert erscheint und der innere Trochlearrand frei zu fühlen ist.

Durch Druck des unteren Fragmentes auf den Nervus ulnaris besteht öfter eine Lähmung im Gebiete desselben, und ebenso kann der Nervus medianus stark gespannt und selbst durchrissen werden.

Der Arm ist im Ellenbogen gebeugt, Bewegungen sind activ und passiv kaum möglich. Bei starken und plötzlichen Rotationen des Vorderarmes fühlt man auch wiederum Crepitation. Hat sich das obere Fragment hinter die unteren geschoben, so kann das Olecranon scheinbar fehlen.

Bei den unregelmässigen Splitterbrüchen ist eine ausgedehnte, unter lauter Crepitation einhergehende abnorme Beweglichkeit der Fragmente vorhanden.

3) Brüche der Epiphysenlinie.

Die traumatischen Trennungen der unteren Humerusepiphyse wurden früher im Allgemeinen für seltene Verletzungen gehalten. Nach *Schüller* sind sie jedoch bei Kindern zwischen 3 und 4 Jahren und bis zum 12. Lebensjahre ziemlich häufig.

Bei jüngeren Kindern ist mit der Lostrennung der Trochlea und Eminentia capitata immer auch die Trennung der Epiphysen des Epicondylus externus und internus verbunden. Bei älteren Kindern kann die letztere jedoch bestehen bleiben, da sie dann seitlich und fast senkrecht auf der Trochleaepiphyse steht.

Die Ursache ist entweder eine directe Gewalt, z. B. ein Fall auf das Olecranon, dann wird das untere Fragment nach vorn dislocirt, oder ein Fall auf die Hand, starke Ab- und Adduction des gebeugten Vorderarmes, oder endlich eine forcirte Pronation oder Supination. Bei allen diesen indirecten Gewalten wird das untere Fragment nach hinten dislocirt.

In beiden Fällen, sei es nun, dass die Verschiebung nach vorn oder hinten stattgefunden hat, ist das Periost mehr oder weniger weit vom Diaphysenende losgelöst und unter demselben ebenso wie in den benachbarten Weichtheilen und im Gelenk selbst ein Blutextravasat vorhanden. Die Gelenkkapsel ist entweder intact oder meist über dem Olecranon und in der Ellenbeuge etwas eingerissen.


Die **Symptome** variiren je nach der Dislocation. Im gewöhnlichsten Fall der Verschiebung des unteren Fragmentes nach hinten erscheint ein Bild, das sehr an die Fractura supracondylica oder an das einer Luxation beider Vorderarmknochen nach hinten erinnert. Der Humerus erscheint unten wie verbogen: vorn ist er convex, während hinten das Olecranon weiter vorspringt und der Triceps und die ihn bedeckende Haut sichelförmig gespannt ist. Die Cubitalfalte ist deutlich markirt. Unmittelbar über ihr findet man eine vorspringende rauhe Knochenkante, welche sogar in die Haut gespiesst sein kann. Die Epicondylen sind meist wegen starker Schwellung nicht zu fühlen. Sonst steht das Olecranon nicht in einer Linie mit ihnen, sondern über denselben, besonders über dem Epicondylus internus. Der Vorderarm steht in leichter Pronation, das Ellenbogengelenk gebeugt. Bewegungen sind in dem letzteren nach allen Richtungen hin ohne Widerstand möglich, sogar eine Ueberstreckung. Crepitation fehlt meist oder ist nur als Knorpelreiben vorhanden.

Ist sie stärker ausgeprägt, so war die Epiphysenlinie nicht scharf eingehalten.

Die **Symptome** bei Dislocation des unteren Fragmentes nach vorn schildert *Pitha* folgendermassen. Das Ellenbogengelenk ist geschwollen, steht in leichter Beugung, weitere Beugung oder Streckung ist unmöglich. Die Ellenbeuge ist verstrichen, gewölbt. Der Biceps und Brachialis internus sind durch eine harte rundliche Geschwulst emporgehoben. Der Durchmesser des Gelenkes von vorn nach hinten ist verbreitert, der Triceps verläuft normal. Das Olecranon steht mitten zwischen und in gleicher Höhe mit den deutlich zu fühlenden Epicondylen. Fasst man mit der einen Hand den Epicondylus internus, mit der anderen die in der Armfalte vorspringende Trochlea, so lässt sich die letztere unter Crepitation bewegen. Ebenso bewegt sich die Trochlea und Rotula, wenn man bei fixirtem Humerus den Vorderarm beugen oder strecken will.

Es kann schliesslich auch die Epiphyse mit den Vorderarmknochen nach innen gewichen sein, so dass eine incomplete Luxa-

Fig. 153.



tion nach innen vorgetäuscht wird. Die beistehende Figur 153 nach einer Beobachtung *Bardenheuer*'s lässt dies deutlich erkennen.

4) Brüche des Processus cubitalis.

Die Brüche des Proc. cubitalis umfassen den intracapsulär gelegenen, aus Trochlea und Eminentia capitata bestehenden, überknorpelten Gelenkfortsatz. Man findet sie bei Erwachsenen, bei denen sie den Epiphysentrennungen der Kinder entsprechen.

Nach *Pinner* sind sie als isolirte Fracturen noch nicht beobachtet worden, sie können vielmehr nur bei gleichzeitigem Bruch des Olecranon vorkommen.

Sie entstehen nur durch directe Gewalt, die schräg zum Querdurchmesser des Fortsatzes vom Ellenbogen aus unter den Condylen einwirken muss. Indirecte Gewalten, z. B. ein Fall auf die Hand können nur partielle Abbrüche hervorrufen, so z. B. eine Abquetschung der Eminentia capitata durch das Capitulum radii.

Die **Symptome** eines solchen unvollständigen Bruches sind folgende: Es besteht ein Bluterguss im Gelenk und Schwellung der Weichtheile. Die hervorragenden Knochenpunkte stehen im normalen Verhältniss zu einander. Die passiven Beweguugen sind möglich, die Pronation und Supination frei. Man fühlt eine rundliche harte Erhabenheit vor dem Epicondylus externus, die, wie die Pronation und Supination zeigt, dem Radius nicht angehört. Es steht vielmehr dessen Capitulum hinter diesem Vorsprung. Bei Pronation und Supination ist mittelst der auf diese abnorme Erhabenheit und an das Capitulum radii gelegten Finger Crepitation wahrzunehmen.

Das abgesprengte Fragment kann sich bisweilen auch nach der Rückseite des Gelenkes verschieben und hier gefühlt werden. Das Bruchstück würde alsdann seinen Standort hinter dem Epicondylus externus und Capitulum radii haben.


Die **Symptome** des vollständigen Bruches sind nicht sehr in die Augen fallend, da stets eine Fractur des Olecranon vorhanden, das Gelenk stark geschwollen ist und die Weichtheile suffundirt sind. Das Gelenk steht leicht gebeugt, seine Contouren sind verwischt, der gesunde Arm unterstützt die kranke Hand. Von activen Bewegungen ist Pronation und Supination fast vollständig, Flexion in mässigem Grade, Extension gar nicht ausführbar. Beim Versuch, mit dem Vorderarm passive Bewegungen zu machen, entsteht ein deutliches Crepitationsgeräusch, und es fällt eine bedeutende abnorme Beweglichkeit des Vorderarmes auf. Er lässt sich seitlich nach aussen und innen verschieben und in bedeutendem Maasse nach vorn führen. Die durch die letztere Bewegung entstehende Formänderung ist sehr charakteristisch. Es kann dabei nämlich eine Vergrösserung des Diameter anteroposterior bis zu 3 cm entstehen, während man von der Rückseite mit den Fingern tief in das Gelenk hineingreifen kann. Fixirt man die beiden Epicondylen, so fühlt man deutliche Crepitation, wenn man den Vorderarm besonders in seit-

licher Richtung bewegt. Dies ist das wichtigste Zeichen. Die Diagnose ist sicher, wenn man neben dieser Crepitation unterhalb der Epicondylen noch abnorme Beweglichkeit fühlt, was natürlich nur bei gleichzeitigem Bruch des Olecranon möglich ist. Bei Pronations- und Supinations-Bewegungen muss sich das Radiusköpfchen mitdrehen. Oberhalb der Epicondylen darf keine abnorme Beweglichkeit vorhanden sein.

5) Brüche des Epicondylus internus (Fig. 154).

Die Brüche des Epicondylus internus gehören ebenso, wie die nachher zu besprechenden des Epicondylus externus mit zu den häufigsten am Ellenbogengelenk. Sie kommen vorzugsweise bei Patienten vom 10.—20. Lebensjahre vor. Da die Epiphysenlinie zwischen dem Epicondylus internus und der Trochlea erst mit dem 18. Jahre verknöchert, so muss die Fractur oft als traumatische Epiphysentrennung aufgefasst werden. Sie sitzt entweder an der Spitze des Fortsatzes oder an seiner Basis und liegt stets extracapsulär, wenn nicht Fissuren bis ins Gelenk dringen. Eine Dislocation des Fragmentes fehlt zuweilen ganz; meistens ist es indess nach unten oder auch wohl nach der Seite und zwar bald mehr nach hinten bis zum Olecranon, bald mehr nach vorn verschoben.

Fig. 154.



Sehr häufig begleitet diese Verletzung die seitliche Luxation der Vorderarmknochen. Sie entsteht dann als Abrissfractur vermittelst des Lig. laterale internum. In anderen Fällen entsteht die Fractur durch eine stumpf einwirkende directe Gewalt und zwar durch einen Fall auf die innere Seite des Ellenbogens. Schliesslich kann sie auch auf indirectem Wege wiederum als Abrissfractur zu Stande kommen durch Fall auf die Volarfläche des abducirt gehaltenen Armes. Dabei wird die Gewalt sich besonders an der inneren Seite geltend machen und der Arm wird, da er schon physiologisch etwas abducirt steht, noch mehr in die Abductionsstellung hineingetrieben werden, wobei dann das stark gezerrte Lig. laterale internum den Fortsatz abreisst. Ein Abriss desselben durch Muskelzug ist zwar behauptet, jedoch nicht bewiesen worden.

Die **Symptome** sind starke Anschwellung der Gelenkgegend an der inneren Seite, auch wohl in der ganzen Circumferenz, wenn gleichzeitig ein Haemarthros besteht. Es findet sich ferner genau der Stelle des abgequetschten Epicondylus entsprechend und ziemlich circumscript an der inneren Gelenkseite eine Ecchymose. Weiterhin besteht ein deutlicher Bruchschmerz bei Betastung der Epicondylenlinie, wenn man den Daumen und Mittelfinger auf beide Epicondylen legt und dieselben dann zusammendrückt. Beugung und Streckung des Ellenbogengelenkes sind vollkommen frei und schmerzlos, so lange sich diese Bewegungen in mittleren Grenzen halten. Es entsteht dagegen ein plötzlicher heftiger Schmerz, sobald man sich dem Schlusse der Beugung oder Streckung nähert.

Dann tritt nämlich eine Spannung der Lig. lateralia des Gelenkes ein, wodurch an dem abgebrochenen Epicondylus gezerrt wird. Bei mittleren Excursionen fehlt diese Spannung. Auch bei der Supination entsteht Schmerz, weil der Pronator gedehnt wird, und ebenso bei der Pronation, weil der von dem Epicondylus internus entspringende Pronator sich contrahirt und den Epicondylus bewegt.

Besteht gleichzeitig eine Luxation, so kann man den Epicondylus internus oft gar nicht auffinden. Der Condylus internus ist dann abgeflacht, und man spricht die innere Trochlearkante für den Epicondylus internus an. Es ist hier von Wichtigkeit, die Lage des Nervus ulnaris durch Druck auf denselben und die dadurch im kleinen Finger entstehenden Schmerzen nachzuweisen. Hat man den Nerven, so erkennt man dann sein Verhältniss zur Trochlea und eventuell das Vorhandensein des Vorsprunges. Fühlt man diesen, so kann man denselben abnorm bewegen und dabei Crepitation nachweisen.


6) Brüche des Condylus internus.

Unter dieser Fractur versteht man die Absprengung des Epicondylus internus sammt der Trochlea. Die Epiphyse zwischen Trochlea und Eminentia capitata verknöchert etwa im 13. Jahr. Die bis dahin stattfindenden Zusammenhangstrennungen sind also Epiphysenlösungen. Die Epiphysenlinie erstreckt sich aber nur bis etwa in die Mitte der Trochlea, indem im frühen Lebensalter das laterale Stück dieser letzteren noch der Eminentia capitata angehört.

Die Bruchlinie geht nun mit Vorliebe entsprechend der Epiphysenlinie vom inneren Rande des Humerus schief nach unten, durch die Fossa olecrani und endigt in der Trochlea oder reicht selbst bis in die Eminentia capitata (Fig. 155).

Die Dislocation hängt ab von der Ausdehnung der gleichzeitigen Verletzung der Kapsel und des Periostes und kann entweder das abgebrochene Fragment allein betreffen oder in Gemeinschaft mit der Ulna erfolgen. Selten findet sie nur direct nach

Fig. 155.



innen oder nach innen und oben statt, wobei dann die Ulna und das Radiusköpfchen ebenfalls nach innen und oben weichen und sich der Arm in ulnare Adduction stellt. Am häufigsten verschiebt sich das Fragment nach innen oben und gleichzeitig nach rückwärts. Hierbei folgt die Ulna dem Fragmente und zieht, mit demselben in Contact bleibend, den Radius nach, so dass dieser vollständig oder unvollständig luxirt. Es kann aber auch die ulnare Gelenkverbindung nachgeben, so dass beide Vorderarmknochen nach hinten verrenkt sind. Schliesslich kann der Condylus auch nach unten und vorn weichen, so dass der Vorderarm jetzt in radialer Abduction steht.

Die **Symptome** sind Schwellung des inneren Gelenkabschnittes, Ecchymose dortselbst, Schmerzen bei starker Beugung, Streckung und Pronation, abnorme Beweglichkeit und Crepitation. Dazu kommen noch die durch die Dislocation des Fragmentes bedingten Zeichen. Ist dasselbe nach innen gewichen, so ist der Querdurchmesser des Gelenkes verbreitert, der Abstand zwischen den Epicondylen vergrössert. Steht es nach innen und oben, so liegt der Epicondylus internus zugleich höher als der externus. Sind dabei Ulna und Radius luxirt, so sind der Epicondylus externus und die Eminentia capitata frei geworden und der Vorderarm steht adducirt, so das die innere Convexität des Gelenkes ausgeglichen ist. Versucht man den Vorderarm zu strecken, so weicht er nach innen ab.

Wenn sich das Fragment nach hinten gewendet hat, so wird dort das Olecranon stark vorspringen, seine relative Lage zum Epicondylus internus jedoch bewahrt haben, indess viel

höher stehen, als der Epicondylus externus. Das Radiusköpfchen folgt hierbei der Ulna und springt hinten stark hervor, so dass seine Gelenkgrube leicht palpirt werden kann. Der Vorderarm steht dabei in Abductionsstellung. Sind beide Vorderarmknochen luxirt, so wird man das Radiusköpfchen, das Olecranon und den Proc. cubitalis frei durchfühlen und besonders nach Einrichtung der Luxation Crepitation und abnorme Beweglichkeit des Condylus, sowie abnorme Ab- und Adductionsfähigkeit des Vorderarmes nachweisen können.

Bei allen diesen Verletzungen können der Nervus ulnaris, medianus und die Weichtheile gleichzeitig verletzt werden.

7) Brüche des Epicondylus externus (Fig. 156).

Die Fractur des äusseren Epicondylus ist etwas häufiger als die des innern. Der letztere scheint zwar seiner hervorragenden spitzigen Gestalt wegen mehr zum Abbrechen geneigt, allein der Fall auf den Ellenbogen erfolgt doch häufiger bei adducirtem als bei abducirtem Oberarm, so dass der Epicondylus externus öfter directen Gewalten ausgesetzt ist als der internus.

Diese sind die häufigsten Veranlassungen zu der Fractur. Dieselbe kann jedoch auch durch forcirte ulnare Adduction in Verbindung mit forcirter Pronation entstehen und begleitet auch oft die Luxationen des Vorderarmes nach hinten und nach der Seite.

Der Epicondylus externus verschmilzt schon im 8. Jahre mit der Eminentia capitata. So lange die Knorpelscheibe noch besteht, kann eine extracapsuläre Epiphysenfractur eintreten. Nach geschehener Verknöcherung muss die Bruchlinie mehr oder weniger ins Gelenk eindringen, also intracapsulär sein.

Die **Symptome** sind wiederum Schwellung, blutige Suffusion, Schmerz an der Bruchstelle, besonders bei Druck, ferner Crepitation bei starken Pronations- und Supinationsbewegungen sowie bei ulnarer Adduction und abnorme Beweglichkeit. Der Arm steht ulnarwärts adducirt und gestattet eine abnorme Seitenbewegung. Seine Function ist meist nur wegen des Schmerzes bedeutend behindert.

8) Brüche des Condylus externus (Fig. 157).

Die Brüche umfassen den Epicondylus externus sammt der Eminentia capitata. Sie kommen besonders vor bei Kindern, so-

wohl nach Fall auf die ausgestreckte Hand, indem dabei das Radiusköpfchen gegen die Rotula anstösst, als durch forcirte Seiten-

Fig. 156.




bewegungen (*Schüller*). Die Bruchlinie verläuft wiederum gern entlang der Epiphyse: also nach aussen vom Epicondylus externus schräg über die Eminentia hinweg durch die Grube der Trochlearolle in das Gelenk hinein. (Fig. 155.)

Das Bruchstück ist in der Mehrzahl der Fälle durch eine grosse Beweglichkeit ausgezeichnet und nach hinten und aussen verschoben, wobei dann die Fractur oft mit einer Luxation des Radius nach aussen complicirt ist.

Es besteht Crepitation und abnorme Beweglichkeit. Der Ellenbogen ist rechtwinklig gebeugt. Alle Gelenkbewegungen sind äusserst schmerzhaft. In der Gegend des Condylus externus besteht eine starke Ecchymose und im Gelenk ein Haemarthros.

Ziemlich typisch erscheint eine Gruppe von Verletzungen, die dadurch charakterisirt ist, dass das abgebrochene Fragment — in der Regel der Condylus externus mitsammt einem Theil der Trochlea — nach hinten und oben dislocirt wird, während gleichzeitig eine complete Luxation beider Vorderarmknochen nach aussen und oben in Form einer vollständigen

Fig. 157.



Umdrehungsluxation besteht. *Schmitz* und *Bischoff* haben derartige Fälle beschrieben. Wir bilden beistehend den Fall von *Bischoff* ab (Fig. 157). Bei demselben war es zu einer Pseudarthrose zwischen der Cavitas sigmoidea major der Ulna und dem Schaft des Humerus oberhalb der Bruchlinie gekommen. Der Nervus ulnaris war um die Trochlea herum mit dem Olecranon nach aussen luxirt und paretisch.

Die Prognose aller der genannten Fracturen des Humerusendes ist bei passender Behandlung im Allgemeinen eine gute, indem die Heilung durch knöcherne Callusbildung mit guter Function des Gelenkes innerhalb 3—4 Wochen erfolgt. Auch die complicirten Fracturen heilen gewöhnlich gut aus, wenn nicht Zerreiss-

ungen der Nerven und Gefässe schwere Störungen, wie motorische und sensible Lähmungen und selbst Gangrän des Gliedes bedingen. Von den Nerven kann namentlich wieder der Nervus radialis durch die scharfen Kanten der Bruchstelle betroffen werden *(Schüller, Claus)*.

In anderen Fällen freilich bleibt eine Ankylose des Gelenkes zurück, sei es nun eine wahre, durch einen unregelmässigen Knochenbrückencallus, sei es, wie gewöhnlich, eine falsche in Folge einer narbigen Schrumpfung der Gelenkkapsel, der elastischen Retraction und Verfettung der Muskeln oder auch infolge einer übermässigen Callusproduction, welche die Bewegung des Gliedes mechanisch hemmt. Die hauptsächlichste Ursache bildet jedoch eine Anheilung der abgebrochenen Fragmente in dislocirter Stellung, wodurch dann eine bedeutende Deformität entsteht und die Excursion des Gelenkes ausserordentlich beeinträchtigt wird. Im Allgemeinen hängt die spätere Functionsfähigkeit ab von der Beschaffenheit der Fractur, ob das Gelenk eröffnet wurde oder nicht, von der Zahl der Fragmente, ob einfache, mehrfache oder Splitterbrüche bestehen, von der Dislocation derselben, ob dieselbe klein oder gross ist, und von der Art der Heilung, ob dieselbe in normaler Stellung erfolgte oder mit winkliger Dislocation und grosser Callusproduction. Wenn ein starker Bluterguss in das Gelenk stattgefunden hatte, so kann eine Synechie der Gelenkflächen zurückbleiben. Wenn Knorpel- oder Knochensplitter abgesprengt worden waren, können sie sich als freie Gelenkkörper entwickeln und bei Bewegungen bedeutende Schmerzen verursachen. Bei den Epiphysenbrüchen kann eine Wachsthumshemmung zurückbleiben. Auch Pseudarthrosen kommen vor. Nicht selten entwickelt sich bei prädisponirten Individuen im Anschluss an das Trauma auch eine tuberculöse Gelenkentzündung oder Arthritis deformans.

Die Prognose wird schlecht, wenn bei complicirter Gelenkfractur die Asepsis nicht gewahrt wurde.


Therapie der Fracturen des unteren Humerusendes.

Die Therapie dieser Fracturen soll die Reposition der Fragmente bewirken, für die Wiederherstellung der normalen Form des Ellenbogengelenkes sorgen und vor allem eine Steifigkeit des Gelenkes verhüten.

Die Reposition richtet sich ganz nach der bestehenden Dislocation. Wir empfehlen nach *Lauenstein*'s Vorgang, behufs Aus-

führung der Reposition der Fragmente dem Arm stets erst eine gestreckte Stellung zu geben. In dieser gestreckten Stellung drückt man die einzelnen Fragmente in ihre richtige Stellung hinein und überzeugt sich dann weiterhin, ob die Achsen des Ober- und des Vorderarmes normal verlaufen oder ob nicht, wie dies namentlich bei den Condylenbrüchen vorkommen kann, der Vorderarm in der Varus- oder Valgusstellung vom Oberarm abweicht.

Fig. 158.




Ist dies letztere der Fall, so giebt man durch Ausgleichung der Abknickung im Ellenbogengelenk dem Vorderarm seine normale Stellung und legt dann den Fracturverband in gestreckter Stellung des ganzen Armes an. Es empfiehlt sich nun nach den neuen Erfolgen bei allen schweren Fracturen des Ellenbogengelenkes die Patienten die ersten 14 Tage im Bett zu halten und am gestreckten supinirten Vorderarm einen Extensionsverband mit Heftpflasterstreifen und Spreizbrettchen anzulegen. *Bardenheuer*, der sich wesentlich um die Einführung des Extensionsverfahrens verdient gemacht hat, hat zuerst empfohlen, die Extension nicht nur in der Längsrichtung einwirken zu lassen, sondern auch noch Seitenzüge anzubringen. Dies ist aber, wie die Erfahrungen der Praxis gezeigt haben, nur für die schwersten Fälle mit rebellischer Dislocation nothwendig. Für die Mehrzahl der Fälle genügt die Ausführung eines kräftigen Zuges in der Längsrichtung des Vorderarmes, während man die Seitenzüge durch zweckmässige Lagerung des verletzten Gliedes zwischen Sandsäcken ersetzen kann. Den Streckverband lässt man, wie gesagt, 14 Tage liegen, um dann allmählig mit dem Gelenk in Beugestellung überzugehen. Kann man aus irgend einem Grund die Patienten nicht im Bett halten, muss man sie ambulant behandeln, so lässt sich die Behandlung in Streckstellung des ganzen Armes auch ganz gut durchführen. Man wählt dann als fixirenden

Verband einen Schienenverband oder einen circulären Gypsverband oder eine Gypsschiene von *Beely-Schönborn* und *Albers*.

Geht man nicht in der beschriebenen Weise vor, legt man vielmehr ohne Rücksicht auf etwaige Varus- oder Valgusstellung des Ellenbogengelenkes den Fracturverband, wie dies bis vor kurzer Zeit als Regel galt, sofort in gebeugter Stellung des Armes an, so heilt die Fractur meistens mit der bestehenden Ab- und Adductionsstellung des Ellenbogengelenkes aus, wodurch dann nicht nur eine Deformität, sondern auch eine mehr weniger hochgradige Functionsstörung zurückbleibt. Wir bilden einen solchen Cubitus varus traumaticus in Figur 158 nach *Lauenstein* ab.

Für die Fälle, in denen bei gestrecktem Arm kein Cubitus valgus oder varus nachweisbar ist und bei denen keine stärkere Dislocation besteht, so bei extraarticulären Epicondylenbrüchen kann man wohl auch schon von vorneherein nach der Regel verfahren, d. h. das Ellenbogengelenk rechtwinklig beugen und den Vorderarm so stellen, dass seine Radialseite direct nach oben schaut. Bei Extension und Contraextension am Vorder- und Oberarm schiebt man dann die Fragmente mit den Fingern in ihre richtige Lage zurecht In dieser werden sie mittelst Bindenzügeln zurückgehalten und durch den Fracturverband fixirt. Die Hand so stark zu supiniren, dass der Kranke bei gebeugtem Vorderarm in dieselbe hineinblicken kann, ist besonders bei intracapsulären Fracturen nicht zu empfehlen, weil in der

Fig. 159.



Supinationsstellung eine Spannung der Kapsel entsteht und dadurch wieder eine Verschiebung der Fragmente verursacht werden kann.


Die Retention erfolgt nun, wenn die Fragmente coaptirt sind, entweder durch einen circulären Gypsverband, der Hand- und

Schultergelenk mit umfassen muss, durch eine *Beely*'sche Gypshanfschiene oder durch eine Reihe von anderen seitlich oder auch an der Rückseite verlaufenden und zuweilen mit Charniergelenk versehenen Schienen, von denen die aus Guttapercha (*Hamilton*) oder die von *Oberst* modificirten *Levis*'schen Schienen (Fig. 159) sich noch am besten eignen.

Im allgemeinen ist es räthlich, wenn man nicht die Extensionsbehandlung vorzieht, als ersten Verband einen leicht abnehmbaren Schienenverband anzulegen, damit man die Resorption eines etwaigen stärkeren Blutergusses im Gelenk noch durch eine elastische Compression – Umwickeln einer elastischen Gummibinde über die Schiene an dem suspendirten Arme — befördern kann.

Welchen Schienen- oder Contentivverband man nun auch wählt, nie darf dieser, wenn man nicht ein steifes Gelenk haben will, zu lange liegen gelassen werden. Nach etwa 5 Tagen muss er gewechselt werden. Dabei muss man leichte passive Bewegungen ausführen, die richtige Lage der Fragmente controlliren und vor Anlegung des neuen Verbandes die Winkelstellung

Fig. 160.



des Armes ändern. Im weiteren Verlaufe ist dann alle 4—5 Tage in gleicher Weise zu verfahren. Man soll also von vorneherein beim jedesmaligen Verbandwechsel leichte passive Bewegungen und vom zweiten Verbandwechsel ab daneben auch ausgiebige Massage des Gelenkes sowie der Musculatur des Vorder- und Ober-

armes vornehmen und diese mechano-therapeutischen Massnahmen noch längere Zeit nach eingetretener Consolidation der Fragmente fortsetzen.

Zur ambulanten Behandlung dieser Fracturen hat *Bardenheuer* auch wieder seine Extensionsschiene empfohlen. Fig. 160 zeigt dieselbe für die Fractura supracondylica mit Dislocation des Olecranon nach hinten angelegt. Man sieht aus der Abbildung, wie durch die Brücke *b* der Oberarm nach hinten geleitet und dadurch dem untern Fragment entgegengeführt wird, während durch *a* der supinirte rechtwinklig gebeugte Arm nach den Fingern zu extendirt und dadurch die Coaptation des untern Fragmentes gegen das obere erreicht wird.

Hat sich eine Ankylose oder falsche Stellung des Gelenkes entwickelt, so verwerfen wir das Brisement forcé, empfehlen dagegen zunächst die permanente Extension. Erst wenn man mit dieser nicht zum Ziele kommt, ist die atypische oder typische Resection der Gelenkenden in Betracht zu ziehen oder die lineäre, supracondyläre Osteotomie, wie sie zuerst von *Piéchaud* bei einem mit Dislocation geheilten Bruch des Condylus externus mit Erfolg ausgeführt wurde.

Luxationen des Ellenbogengelenkes.

Anatomisch - physiologische Vorbemerkungen.

Von Seiten des Oberarmes betheiligen sich bei der Bildung des Ellenbogengelenkes die Trochlea und Eminentia capitata. Die Gelenkfläche der Trochlea stellt einen Schraubengang dar, der am rechten Arm nach links, am linken nach rechts gewunden ist. Die auf ihr hin- und hergleitende Fossa sigmoidea ulnae bildet einen concaven im Sinne der convexen Trochlea gekrümmten Körper. Die Eminentia capitata ist ein Kugelsegment, das mit der Trochlea eine gemeinsame Achse besitzt und mit der tellerförmigen Grube des Radiusköpfchens articulirt. Die Gelenkfläche steht dabei schief in der Weise, dass der mediale Theil der Trochlea 1 cm tiefer liegt als die Eminentia capitata.

Radius und Ulna stehen miteinander in dem oberen Radio-Ulnargelenk in Verbindung. Dieses entsteht dadurch, dass sich die Circumferentia articularis des Radiusköpfchens in einen

halbmondförmigen Ausschnitt der Ulna (sinus lunatus) einbettet und hier durch ein breites, derbes, den Radiushals ringförmig umfassendes Band, Lig. annulare, festgehalten wird.

Die beiden Vorderarmknochen werden am Humerus zunächst fixirt durch die fächerförmig ausstrahlenden Seitenbänder, von denen das innere, Lig. laterale internum, von dem Rande der Fossa sigmoidea ulnae entspringend, sich an die Wurzel des Epicondylus internus, das äussere, Lig. laterale externum, vom Lig. annulare und dem vordern und hintern Ende des Sinus lunatus ulnae ausgehend, sich an die Rauhigkeiten neben der Eminentia capitata ansetzt. Das Ganze umgibt dann noch eine gemeinschaftliche Kapsel, die die ebengenannten kurzfaserigen Bänder zu ihrer Verstärkung aufnimmt. Sie setzt sich am Humerus auf beiden Seiten in der rinnenförmigen Vertiefung an, die zwischen den Epicondylen und dem Proc. cubitalis liegt. Nach vorn umfasst sie die Fossae supratrochleares major und minor, indem sie vor jeder Grube eine kleine Ausbuchtung bildet. Von vorn geht sie dann nach hinten, hier die ganze Fossa olecrani einschliessend, und dortselbst zu beiden Seiten des Olecranon eine grössere medianwärts gelegene und eine kleinere laterale Ausstülpung erzeugend. Bei einem Bluterguss ins Gelenk werden diese beiden Ausbuchtungen vorgewölbt und lassen Fluctuation erkennen. Vom Humerus zieht die Kapsel dann als weiter langfaseriger Sack zu den beiden Vorderarmknochen, um sich an der Ulna vor dem Proc. coronoideus, am Radius an dessen Hals anzusetzen. Hier stülpt sie sich dem Lig. annulare vor, so dass das Radiusköpfchen vollständig von ihr umgeben wird. Sie umgeht dann die Gelenkflächen der Ulna und des Radius und setzt sich hinten an der Spitze des Olecranon an.

Die Kapsel ist nach vorn dünn. Sie wird hier nur durch einige schwache, bandartige, vom Humerus entspringende Fasern verstärkt. Noch schwächer ist sie hinten, besonders über der Fossa olecrani, wo sie nur aus einer sehr zarten, mit Fettklümpchen durchsetzten Membran besteht. Hier verleiht ihr jedoch der M. triceps eine Stütze. Als einen Spanner der Kapsel betrachtet man den M. anconaeus quartus.

Die Gelenklinie befindet sich etwa 1,5 cm unter der die Epicondylen verbindenden Linie. Sie wird durch die obere jener Hautfalten angezeigt, die sich bei der Beugung des Gelenkes zu bilden pflegen.

Das Olecranon und die beiden Epicondylen sind normaler Weise gut durch die Haut zu palpiren. Ihre Stellung

zu einander ändert sich aber je nach der Einstellung des Gelenkes. Streckt man nämlich den Arm und lässt ihn senkrecht herabhängen, so steht das Olecranon in gleicher Höhe mit den beiden Epicondylen und hinter ihnen. Die diese drei Knochenvorsprünge verbindende Linie ist also eine gerade und horizontale. Beugt man dagegen den Vorderarm, so rückt das Olecranon vor die Epicondylen und unter sie. Die Verbindungslinie stellt dann ein Dreieck mit der Spitze nach unten dar.

Das vereinte Ellenbogen- und Radio-Ulnargelenk hat einen zweifachen Bewegungsmodus, indem zwischen Humerus, Radius und Ulna die Beugung und Streckung des Gelenkes, im Radio-Ulnargelenk die Pronation und Supination vor sich gehen.

Das Humero-Ulnargelenk gestattet die Beugung und Streckung etwa in einem Umfange von 150°. Der Radius folgt dabei den Bewegungen der Ulna, welche vermöge ihres Baues und der Ansatzverhältnisse der Kapsel den Gang der Bewegungen vorzeichnet. Die Hemmung dieser Excursionen geschieht durch die Spannung der Bänder und durch gewisse ineinandergreifende Vorsprünge und Vertiefungen des Gelenkkörpers. So stemmt sich bei stärkster Beugung der Proc. coronoideus ulnae gegen die Fossa supratrochlearis anterior, bei stärkster Streckung die Spitze des Olecranon gegen die Fossa olecrani. Es berühren sich übrigens bei der Beugung und Streckung des Gelenkes nicht alle Theile der Trochlea und Fossa sigmoidea ulnae gleichmässig. Die Gelenkflächen kommen vielmehr bei der Beugung vorzugsweise nur vorn und innen, bei der Streckung nur hinten und aussen in Contact.

Da die Trochlea mit ihrer Achse nicht senkrecht auf den Schaft des Humerus aufgesetzt ist, sondern schiefwinklig, so wird der Vorderarm sowohl in der Beuge- als auch in der Streckstellung aus der Richtung des Oberarmes abgelenkt, und zwar so, dass der gebeugte Vorderarm die Hand nie dem Schultergelenke gegenüberbringen, sondern sie immer nur auf die Brust legen kann, gleichwie andererseits bei vollständiger Streckung der supinirte Vorderarm sich an den Oberarm in einem nach aussen offenen Winkel ansetzt — physiologische Abduction des Vorderarmes.

In dem zwischen Capitulum radii und Sinus lunatus ulnae gebildeten Radio-Ulnargelenk vollziehen sich, mag die Stellung des Vorderarmes zum Oberarm sein, wie sie will, also bei Beugung oder Streckung desselben, die Rotationsbewegungen des

Radius, die man Pronation und Supination nennt und die in einer Grenze von etwa 180° möglich sind. Die Achse dieser Bewegung, bei der sich der Radius um die Ulna dreht, geht von dem Centrum der Eminentia capitata durch das Köpfchen des Radius zu dem am unteren Ulnaende gelegenen Capitulum ulnae. Der Radius dreht sich also oben um sein eigenes, unten um das Capitulum der Ulna.

Pro- und Supination sind die Bewegungen, welche bald die volare, bald die dorsale Fläche der Hand nach vorn bringen. Schaut die Vola bei herabhängendem Vorderarm nach vorn oder bei gebeugtem nach oben, so ist Hand und Vorderarm supinirt. Schaut sie nach hinten oder unten, so steht sie in Pronation. Die Supination wird gehemmt durch die Spannung des obersten, besonders verdickten Theiles des Ligamentum interosseum, den man als Chorda obliqua bezeichnet, ferner durch die Spannung des Kapsel- und Bandapparates an der radialen Hälfte des Ellenbogengelenkes und des unteren Radio-Ulnargelenkes und schliesslich durch Wirkung des Pronator teres und quadratus und Flexor carpi radialis, die gegen das Ende der Supination übermässig gedehnt werden und ihr daher Widerstand entgegensetzen. Als Hemmung der Pronation hat man bisher vielfach eine Berührung der Ulna und des Radius angesehen, indem bei einer solchen extremen Bewegung der sich um die Ulna drehende Radius gegen diese anstossen sollte. Dies ist jedoch nur an dem skelettirten Arm der Fall. Am Lebenden existirt eine solche Knochenhemmung thatsächlich nicht. Es verhindern dieselbe vielmehr die zwischen Ulna und Radius an der Palmarfläche des Armes liegenden Weichtheile. Die wirkliche Hemmung der Pronation ist ebenso wie die der Supination eine elastische, federnde, indem sie ebenfalls durch den oben genannten Kapsel- und Bandapparat, das Lig. interosseum und die Spannung der Antagonisten — der Supinatoren — geschieht *(Schüller)*.

Frequenz und Eintheilung der Ellenbogengelenks-Luxationen.

Das Ellenbogengelenk besitzt durch die charnierartige Verbindung seiner Gelenkkörper sowie durch die Stärke seiner Bänder einen hohen Grad von Festigkeit. Es sind daher grosse Gewalten nöthig, um Verrenkungen desselben hervorzubringen. Trotzdem

sind dieselben aber gar nicht so selten, so dass sie sogar mit 18 % nächst den Verrenkungen des Oberarmes die häufigsten unter allen Luxationen sind. Dabei kommen sie vorzugsweise bei Kindern und jüngeren, an der Grenze zwischen dem kindlichen und erwachsenen Alter stehenden Individuen, besonders weiblichen Geschlechtes, vor, und zwar deshalb, weil bei diesen die Höcker, Vorsprünge, Kanten und Furchen der Gelenkkörper viel weniger scharf ausgeprägt sind wie bei kräftigen Erwachsenen und vielleicht auch wohl deshalb, weil bei Kindern und jugendlichen Individuen vielfach eine Ueberstreckung des Ellenbogengelenkes möglich ist, eine solche aber sicherlich das Zustandekommen der Ellenbogengelenksluxationen begünstigt *(Petersen)*. Nach *Krönlein* entsprechen die Ellenbogengelenksluxationen der Kinder als Verletzungen den durch indirecte Gewalt, d. h. durch Fall auf den ausgestreckten Arm entstandenen Schultergelenksluxationen der Erwachsenen.

Die Luxationen können nun entweder beide Vorderarmknochen zugleich oder nur einen derselben betreffen und dabei nach verschiedenen Richtungen hin erfolgen. Es ergeben sich die verschiedenen Luxationsmöglichkeiten aus dem folgenden Schema:

A. Verenkungen beider Vorderarmknochen.

a) nach hinten α) ohne
β) mit Bruch des Proc. coronoideus.
b) nach vorn α) ohne
β) mit Bruch des Olecranon,
c) zur Seite α) nach aussen,
β) nach innen,
d) nach verschiedenen Richtungen, sog. divergirende Luxation.

B. Verrenkungen eines Vorderarmknochens.

a) Verrenkung der Ulna nach hinten,
b) Verrenkung des Radius
α) nach vorn,
β) nach hinten,
γ) nach aussen.

A. Verrenkungen beider Vorderarmknochen.

a) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach hinten.

Dieselbe ist unter allen Luxationen im Ellenbogengelenk die häufigste und kann eine vollständige oder unvollständige sein. Bei der vollständigen ruht das cubitale Gelenkende des Humerus vor dem Proc. coronoideus der Ulna und auf dem Halse des Radius. Der Proc. coronoideus steht dabei in der Fossa supratrochlearis posterior, hat also die Stelle des Olecranon eingenommen (Taf. VIII). Bei der unvollständigen steht er nicht ganz in dieser Grube, sondern bleibt mit seiner Spitze gegen die untere Trochleafläche angestemmt, während das Radiusköpfchen mit seinem Rande unter der Eminentia capitata steht.

Der **Entstehungsmechanismus** dieser Luxation kann ein mehrfacher sein. In den meisten Fällen ist eine Hebelwirkung bei Hyperextensionsstellung des Gelenkes anzuschuldigen. Bei einem Fall auf die Hand des gestreckten Armes wird derselbe durch die Wucht des fallenden Körpers im Ellenbogengelenke hyperextendirt. Es geht dies soweit, bis durch das Anstemmen der Olecranonspitze in der Fossa supratrochlearis posterior die Bewegung gehemmt wird. Wirkt nun jetzt die Gewalt noch weiter, so bildet sich an dieser Stelle ein Hypomochlion, um welches das Gelenkende des Humerus nach vorn abgehebelt wird, so dass es dort die stark gespannte Kapsel zerreisst und aus derselben heraustritt. Während sich nun der Humerus von oben her durch die Gewalt des Falles an den Vorderarmknochen nach unten verschiebt, werden diese gleichzeitig durch einen elastischen Zug der vorher übermässig gespannten Mm. biceps und brachialis internus in leichter Beugestellnng fixirt. Je nachdem sich nun der Humerus dabei zum Proc. coronoideus stellt, bekommen wir die vollständige oder unvollständige Luxation.

Ausser durch eine solche Hyperextension oder, wie man auch wohl sagt, Dorsalflexion kann die Luxation nach *Malgaigne* auch entstehen durch eine Einwärtsdrehung der Ulna bei halbgebeugtem Gelenk. Der Proc. coronoideus soll dabei nach innen, unten und hinten bewegt werden, die Kapsel und das Lig. laterale internum zerreissen und so die Verschiebung der Gelenkenden einleiten. *Malgaigne* hält demgemäss für die häufigste Ursache der Verrenkung einen Fall oder Schlag auf den inneren Rand des Unterarmes.

Es ist jedenfalls nicht zu leugnen, dass Luxationen bei Beugestellung des Gelenkes eintreten können. So vermochte *Schüller* sie an der Leiche durch einen kräftigen gegen den Oberarm von hinten her geführten Schlag zu erzeugen, und so behauptet auch *Stetter* sie durch Hyperflexion entstanden beobachtet zu haben. Wenn man nach ihm an der Leiche eine solche Hyperflexion des Gelenkes darstellt, so soll sich bei gehörig langem Proc. coronoideus und möglichst flacher Fossa snpratrochlearis anterior der erstere in die letztere so einstemmen, dass beide Gelenkflächen so weit von einander abgehebelt werden, dass sie sich an keinem Punkte mehr berühren.' Wenn nun bei einer solchen Gelenkstellung von der Hand her eine heftige Gewalt einwirkt, so soll dieselbe den Vorderarm an dem Humerus vorbeitreiben, die hintere Kapselwand durchreissen und bei nachfolgender Streckung des Armes eine primäre Luxation nach hinten erzeugen können.

Schliesslich wollen wir nicht zu erwähnen vergessen, dass nach *Schüller's* Experimenten auch eine forcirte Seitenbewegung, sei es nun eine Abduction oder Adduction, die Luxation veranlassen kann. Es steht diese Behauptung im Einklang mit der thatsächlich häufig gemachten Angabe, dass die Luxation nach einem Fall auf den gebeugten oder mässig gestreckten Arm entstand, während die Wucht des fallenden Körpers bei Aufstemmen der Hand oder des Vorderarmes auf den Boden den Ellenbogen nach der einen oder anderen Seite abknickte.

Was die **pathologische Anatomie** betrifft, so liegt der Kapselriss bei den durch Hyperextension entstehenden Luxationen vorn in der Ellenbeuge und verläuft dabei fast durchweg in querer Richtung. Bei den durch forcirte Seitenbewegungen, Rotationen und Hyperflexion veranlassten ist die Kapsel dagegen in grosser Ausdehnung vorn und hinten, regelmässig auch innen, seltener dagegen aussen zerrissen. Ebenso ist meist auch das Lig. laterale internum erheblich verletzt, während das äussere nur wenig von seinem Epicondylus abgelöst ist. Es kann jedoch auch die Luxation namentlich durch Hyperextension eintreten, ohne dass die Seitenbänder ganz zerstört sind, während diese wiederum in andern Fällen ihre Epicondylen abgerissen haben.

Regelmässig ist der Brachialis internus mehr oder weniger zerrissen. Die zerrissenen Muskelmassen verschieben sich in das Gelenk hinein, so zwar, dass sie die Fossa sigmoidea major des Olecranon vollständig ausfüllen können, ein Verhältnis, das sehr gut anschaulich gemacht wird durch einen von *F. Fischer* herrührenden

Längsschnitt durch ein gefrorenes, luxirtes Gelenk. Zuweilen tritt das cubitale Gelenkende geradezu durch den zerrissenen Muskel hindurch, ja es kann sogar die Haut der Ellenbeuge von innen nach aussen perforiren, während es sich vorn gegen die in einem Bogen darüber hinziehende Bicepssehne anstemmt. Dabei können die Nerven und Gefässe der Ellenbeuge stark lädirt werden. *Molitor* konnte im Jahre 1889 11 Fälle aus der Litteratur zusammenstellen, in denen es zu einer subcutanen Ruptur der Arteria brachialis gekommen war. In diesen Fällen kommt es zu einem mächtigen Blutextravasat, und in Folge des Druckes von Seiten dieses Extravasates zu starker venöser Stauung und ischämischer Veränderung der Vorderarmmuskeln. Seltener zerreisst bei complicirter Luxation der Nervus radialis. *(Ledderhose)*. Bei der Luxation durch Hyperextension wird der Nervus ulnaris aus seiner Rinne am Epicondylus internus gelöst und mit der Ulna nach hinten verschoben.

Als Complicationen der Luxation nach hinten finden sich nicht selten Fracturen. Einmal solche des Proc. coronoideus, und zwar kann derselbe an seiner Basis abbrechen, besonders im kindlichen Alter, wo er noch knorpelig ist, oder an seiner Spitze. Auch eine Fractura supracondylica kann die Luxation compliciren. So erwähnt *Hüter* eines Falles, wo das abgebrochene untere Gelenkende nach vorne dislocirt, gleichzeitig aber auch das Olecranon an seiner Basis abgebrochen und das Radiusköpfchen infracturirt war. Dieses letztere findet sich aber gar nicht so selten auch allein abgesprengt. Besonders typisch ist ferner als Complication der hinteren Luxation die gleichzeitige Fractur des Epicondylus externus. Dieselbe entsteht, wenn im Momente der stärksten Hyperextension der stark pronirte Vorderarm radialwärts im Ellenbogengelenke abgeknickt, dann gebeugt wird. Das Radiusköpfchen quetscht dann die Eminentia capitata mit dem Epicondylus ab, das abgebrochene Fragment aber wird so dislocirt, dass es sich mit seinem Gelenktheil nach der Ellenbeuge hin verschiebt, mit seiner Bruchfläche dagegen vor das luxirte Radiusköpfchen nach der Streckseite des Gelenkes stellt. Es erleidet mithin eine Drehung um einen Winkel von fast 90 Grad *(F. Fischer)*.

Die **Symptome** der **vollständigen** Luxation sind sehr in die Augen fallend, wenn dieselbe ganz frisch zur Beobachtung kommt. In den nächsten Tagen nach der Verletzung schwillt das Gelenk dagegen in Folge des Haemarthros und der reactiven Infiltration der Weichtheile in der Regel ganz bedeutend an, so dass man


in solchem Falle nur nach längerer Massage des Gelenkes behufs Zertheilung des Extravasates oder in Narcose die Diagnose stellen kann.

Sind die Contouren des Gelenkes nicht durch eine solche Schwellung verwischt, so erscheint zunächst die ganze Extremität verkürzt (Tafel VIII). Das Gelenk steht dabei in leichter Beugung (120—135°), seltener gestreckt, der Vorderarm schwach supinirt oder in Mittelstellung zwischen Pro- und Supination. Die Achsen des Vorder- und Oberarmes schneiden sich nicht im Gelenk, sondern etwas tiefer am ersteren. Der Diameter antero-posterior des Gelenkes erscheint stark verbreitert. Die Tricepssehne springt firstartig in einem nach hinten concaven Bogen hervor. Zu ihren beiden Seiten ist die Haut grubig eingesunken. Das Olecranon mit der Fossa sigmoidea ulnae und das Radiusköpfchen treten nach hinten frei heraus, so dass die tellerförmige Gelenkgrube des letzteren einen deutlichen Vorsprung bildet. Die Cubitalfalte ist nach unten verschoben. Ueber ihr sieht man eine walzenförmige Erhebung, welche bei der Palpation als das Gelenkende des Humerus erkannt wird, indem man die Eminentia capitata oder doch wenigstens den medialen Rand der Trochlea durchzufühlen vermag.

Das Verhältniss des Olecranon zu den beiden Epicondylen hat sich verändert. Bei Streckung des Armes steht es oberhalb, bei der Beugung gerade nach hinten von denselben, während es, wie schon oben gesagt, bei normalem Gelenk in Streckstellung eine Linie mit ihnen bildet, bei rechtwinkliger Beugung vertical unter, bei spitzwinkliger ein wenig vor ihnen steht. Es steht weiterhin das Olecranon in erheblich grösserer Entfernung, oft 3—4 cm von der Epicondylenlinie ab und kann ebenfalls gut abgetastet werden.

In selteneren Fällen hat sich der Vorderarm gleichzeitig etwas seitlich verschoben. Dann trifft die verlängerte Humerusachse nicht mehr die Ulna, sondern geht nach aussen oder innen neben derselben vorbei.


Die Function des Gelenkes ist bedeutend beeinträchtigt. Die Beugung ist activ ganz aufgehoben und auch passiv wegen der starken Spannung der Seitenbänder nicht über einen rechten Winkel hinaus möglich. Dass diese starke Spannung der Seitenbänder in der That das Hinderniss der Beugung abgibt,



hat vor Kurzem *Zuckerkandl* in überzeugender Weise festgestellt. Sie erhellt unmittelbar aus der Betrachtung der Fig. 161. Ebenso sind auch die Streckung, Pro- und Supination stark gehemmt. Es setzt sich der gewaltsamen Ausführung derselben stets ein federnder Widerstand entgegen.

Bei dem Druck, den die Nerven der Ellenbeuge erfahren, sind leichte Lähmungen im Bereich derselben immer nachweisbar.

Fig. 161.



Eine gleichzeitige Fractur des Proc. coronoideus kann man dann vermuthen, wenn nach Reposition der Luxation die Vorderarmknochen sich leicht wieder nach hinten verschieben lassen. Sehr selten wird man Crepitation fühlen, zumal bei Kindern, wo der ganze Fortsatz noch knorpelig ist. Die Diagnose anderer Fracturen der Gelenkkörper bietet dagegen keine Schwierigkeit, wenn man nach geschehener Reposition die einzelnen Knochen genau abtastet.

Die **Symptome** der **unvollkommenen** Verrenkungen, welche am meisten bei Kindern vorkommen, sind nicht so ausgesprochen. Die Spitze des Olecranon liegt hier kaum höher als die Epicondylen, ragt aber nach hinten noch mehr hervor,

wie bei der completen Luxation. Der Arm erscheint nicht verkürzt, sondern im Gegentheil etwas verlängert. Er steht mehr gestreckt und gestattet fast gar keine Bewegung. Der Radiuskopf — und das ist im Verein mit den oben genannten Zeichen das wichtigste — ist nur unvollständig nach hinten zu fühlen und kann bei stärkerer Geschwulst ganz verdeckt werden.

Aus dem Gesagten leuchtet die grosse Aehnlichkeit dieser Luxation mit der Fractura supracondylica deutlich hervor. Die Unterscheidungsmerkmale beider finden sich S. 319 und 321.

Die **Prognose** ist bei den einfachen frischen Verrenkungen eine günstige, da die Reposition meist leicht gelingt. Sobald diese jedoch nicht gemacht worden war und nun nach Verlauf weniger Wochen versucht werden soll, missglücken oft alle Versuche. Wenn auch Fälle vorliegen, wo man noch nach 3—4 Monaten zum Ziele kam, so kann man doch im Allgemeinen die Luxation in 5—6 Wochen für eine irreponible halten. Die Beweglichkeit des Armes ist dann besonders bezüglich der Beugung, Supination und Pronation sehr beschränkt. Ebenso kann die Function des Armes sehr leiden, wenn Fracturen vorhanden, aber nicht erkannt waren. Dann können durch Callusbildungen im Gelenk die Bewegungen desselben vollständig aufgehoben werden, so dass man eine Ankylose des Gelenkes in guter Stellung in solchen Fällen noch als ein günstiges Resultat betrachten muss. Es versteht sich von selbst, dass nicht aseptisch gehaltene Gelenkwunden zur Vereiterung des Gelenkes und all deren Folgen führen können. Das Heraustreten des Gelenkendes durch die Haut hindurch ist an und für sich kein so schlimmes Ereigniss. Der Segen der Aseptik hilft auch hier über die Gefahren hinweg. Von übler Prognose sind dagegen die Luxationen mit gleichzeitiger Läsion der Arteria brachialis. *Czerny* musste in einem solchen Fall wegen ischämischer Gangrän des Vorderarms den Oberarm amputiren.

Recht selten sind habituelle Luxationen des Ellenbogengelenkes. *Heusner* hat vor kurzem einen derartigen Fall beobachtet und durch Operation gebessert.


Die **Therapie** muss, soll sie anders erfolgreich sein, zunächst die Hindernisse kennen, welche sich der Reposition in den Weg stellen können. Die Fixation des Proc. coronoideus in seiner falschen Stellung geschieht durch die erhalten gebliebenen gespannten und gezerrten Theile der Kapsel und der Seitenbänder, besonders häufig aber auch durch die ver-

drehten Ausstrahlungen der derben dorsalen Vorderarmfascie, welche sich mit den unter ihnen lagernden Muskeln zu den Condylen des Oberarmes hinbegeben. Weiterhin sind dann hier zu beschuldigen Interpositionen von Kapseltheilen, Fetzen der Bänder, Muskeln, besonders des Brachialis internus, und abgesprengter Knochentheile zwischen die Gelenkenden.

Zur **Reposition** selbst empfehlen wir von den vielen angegebenen Methoden die folgenden, von denen wohl keine bei richtiger Ausführung im Stiche lassen wird.

1) Die forcirte Beugung ist die älteste Methode (Fig. 162). Man beugt zuerst den kranken Arm bis zum rechten Winkel, übergiebt dann den Vorderarm einem Gehilfen zur Extension. Indem dieser nun den Zug ausübt, stemmt man selbst seinen eigenen Vorderarm in die Ellenbeuge und übt nun, während der Gehilfe durch immer stärker werdende spitzwinkelige Beugung über dem ein Hypomochlion bildenden eigenen Vorderarm die Verhakung des Proc. coronideus löst, mit der anderen Hand von hinten her einen Druck auf das Olecranon aus, wobei unter schnappendem Geräusch die Einrichtung gelingt. Anstatt des Vorderarmes kann man wohl auch das Knie in die Ellenbeuge einstemmen und über diesem das Gelenk beugen.

Fig. 162.



2) *v. Dummreicher's* Distractionsmethode (Fig. 163). Der Kranke liegt auf einem Tische. Ein hinter demselben stehender Gehilfe übt an einem unter der Achselhöhle durchgeführten Tuch die Contraextension aus, ein zweiter umfasst zur besseren Fixirung noch den Oberarm. Der Operateur beugt den oberhalb des Handgelenkes gefassten Vorderarm bis zu einem rechten Winkel, wobei der Proc. coronoideus herabgleitet, und zieht nun mit einer dicht unter der Ellenbeuge angelegten Schlinge den Kronenfortsatz noch mehr nach abwärts. Fühlt er das Flottwerden des Fortsatzes, so streckt er nun rasch den Vorderarm, ihn dabei gleichzeitig extendirend, und überzeugt sich nun von der geschehenen Einrichtung durch die Möglichkeit, den Arm spitzwinklig beugen zu können.

Die Manipulation besteht also im rechtwinkligen Beugen, Anziehen in der Verlängerung der Oberarmachse, Streckung und in der darauffolgenden Beugung des Vorderarmes.

Fig. 163.





Fig. 164.



3) Hyperextensionsmethode nach *Roser*. (Fig. 164). Der Operateur legt den kranken Arm auf sein Knie, überstreckt denselben soweit, dass Ober- und Vorderarm einen nach hinten offenen Winkel bilden, beugt dann rasch den Vorderarm, während er denselben gleichzeitig nach vorn zieht, und hat damit die Reposition vollbracht. Es ist zweckmässig, in dem Moment, in welchem man von der Ueberstreckung zur Beugung übergeht, von einem Gehilfen die Spitze des Olecranon nach abwärts drücken zu lassen. Die Befürchtung, dass bei der Ueberstreckung die Weichtheile an der Beugeseite des Gelenkes, insbesondere der Nervus medianus oder die Arteria cubitalis, zerreissen könnten, wurde durch die Erfahrung widerlegt. Der Mechanismus dieses Verfahrens ist leicht zu verstehen. Das Olecranon, unterstützt vom Knie, stellt ein Hypomochlion dar, um welches der Oberarm als zweiarmiger, der Vorderarm als einarmiger Hebel bewegt wird. Je stärker der auf Ober- und Vorderarm ausgeübte Druck das obere Ende des Oberarmes und untere Ende

des Vorderarmes nach hinten bewegt, desto mehr entfernt sich der Proc. coronoideus vom Proc. cubitalis humeri, und das Reductionshinderniss fällt fort, sobald diese Entfernung so gross geworden ist, dass die Spitze des Proc. coronoideus nicht mehr in der Fossa supratrochlearis steckt. Durch die nachfolgende Beugung werden die normalen Verhältnisse wieder hergestellt.

Bei der Luxation mit complicirender Zerreissung der Art. brachialis empfiehlt es sich, behufs Aufhebung des Druckes von Seiten der Extravasate, durch breite Incision das Blutextravasat wegzuräumen und den zerrissenen Arterienstumpf sorgfältig zu unterbinden.

Bei veralteter Luxation würde man nach misslungener Reposition in Chloroformnacrose den Arm rechtwinklig beugen und so fixiren, um eine günstige Stellung desselben zu erzielen, oder man könnte durch Arthrotomie oder besser noch durch partielle oder totale Resection der Gelenkenden wieder ein brauchbares Glied herzustellen suchen.

Monteils erreichte die Beweglichkeit des Gelenkes durch eine Osteoclase des Olecranon. Dieselbe würde aber wohl besser durch eine lineäre Osteotomie an der Basis des Olecranon oder nach dem Vorschlage von *Trendelenburg* und *Völker* durch eine temporäre Resection des Olecranon ersetzt werden. Letztere Operationen können nur dann einen Erfolg haben, wenn das Olecranon selbst nicht zu atrophisch geworden ist, was leider vielfach der Fall ist.

b) Verrenkung beider Vorderarmknochen nach vorn.

Dieselbe ist sehr selten und kann erfolgen mit oder ohne gleichzeitige Fractur des Olecranon. Das erstere ist der Fall, wenn die Luxation in Streckstellung zu Stande kam, das letztere, wenn sie bei starker Beugung eintrat. Denn nur bei einer solchen kommt die Olecranonspitze so tief zu stehen, dass ein Stoss auf diesen Fortsatz von hinten her die beiden Vorderarmknochen direct nach vorn verschieben kann.

Die Litteratur kennt nur wenige derartige Luxationen, die durch Fall auf den spitzwinklig gebeugten Ellenbogen entstanden waren. Ebenso führt eine Nachahmung dieses Mechanismus an der Leiche nur äusserst selten zu dieser Verletzung *(Colson)*, da viel lieber eine Fractur des Olecranon oder des unteren Humerusendes entsteht. Es gelingt dagegen leichter, die Luxation durch „Ab-

drehen“ zu erzeugen, d. h. durch gewaltsame Rotation des Vorderarmes um die Achse des Humerus *(Streubel).* Auch Abduction des stark gebeugten Vorderarmes nach vorheriger Luxation des Radius nach vorn lässt sie in die Erscheinung treten.


Die Luxation ist entweder eine unvollständige (Tafel IX), dann bleibt das rauhe obere Ende des Olecranon gegen die Trochlea angestemmt stehen, oder sie ist eine vollständige (Tafel X), dann ist der Olecranonhöcker an der vorderen Fläche der letzteren heraufgeglitten und ruht ganz vor ihr. Dies letztere ist nur möglich, wenn nicht nur die Bänder sehr ausgedehnt zerrissen sind, sondern auch die Tricepssehne bedeutend gespannt und der M. brachialis internus stark abgelöst ist.

Die **Symptome** sind in beiden Fällen sehr deutlich.


Bei der **unvollständigen** Luxation (Tafel IX) ist der Arm um die Länge des Olecranon, also um etwa 3 cm verlängert. Der Diameter antero-posterior des Gelenkes ist verkürzt. Die Prominenz des Olecranon fehlt. Die Gelenkfalte ist kaum sichtbar. Man fühlt die leere Fossa olecrani und bei nicht zu erheblicher Schwellung die Gelenkfläche des Humerus, unter welcher nach unten der Proc. coronoideus als sicht- und fühlbarer Körper hervorspringt. Neben und nach aussen von diesem steht der Radius. Zwischen Ulna, Radius und Proc. cubitalis findet sich eine ringförmige Furche der ziemlich stark gespannten Weichtheile. Der Arm steht mässig gebeugt oder fast gestreckt.

Bei der **vollständigen** Luxation (Tafel X) ist der Arm leicht verkürzt und fast spitzwinklig flectirt. Der Diameter antero-posterior erscheint bedeutend verlängert. In der Ellenbeuge findet man nach innen von der Bicepssehne den Proc. coronoideus, die Cavitas sigmoidea und die Spitze des Olecranon dicht unter der Haut und nach aussen davon den Radiuskopf. Der Nervus ulnaris ist stark gezerrt und verursacht die entsprechenden leichten Innervationsstörungen. Das Cubitalende des Humerus steht hinten dicht unter der Haut, kann jedoch wegen seiner walzenförmigen Gestaltung kein Olecranon vortäuschen.

Bei gleichzeitiger Fractur des Olecranon ist der Durchmesser des Gelenkes von vorn nach hinten noch mehr vergrössert, der Vorderarm leicht flectirt und supinirt und ziemlich stark verkürzt. Die Spitze des Olecranon hat



Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.





ihren natürlichen Platz inne, die Basis lässt sich dagegen abnorm bewegen und zeigt über ihrer Bruchfläche eine Vertiefung der Haut. Weiterhin findet man dann noch die übrigen Zeichen der Luxation sowie Crepitation nach geschehener Reposition.

Die **Prognose** ist gut, da bei den ausgedehnten Bänderzerreissungen die Reposition keine Schwierigkeiten bietet und in den beobachteten Fällen die Funktion des Armes erhalten blieb.

Die **Reposition** geschieht durch mässige Extension, während gleichzeitig ein directer Druck von vorn nach hinten auf die Ulna und von hinten nach vorn auf den Humerus ausgeübt wird. Man kann auch den Arm stark flectiren und den Vorderarm sammt Olecranon nach hinten über die Trochlea hinüber schieben.

c) Verrenkung der beiden Vorderarmknochen zur Seite.

Die seitlichen Verrenkungen der Vorderarmknochen sind sehr seltene Verletzungen und sind in der Weise, dass die Luxation rein nach aussen oder innen stattgefunden hätte, nur in äusserst wenigen Fällen beobachtet worden. Es fanden sich vielmehr die seitlich verschobenen Vorderarmknochen fast stets auch zugleich nach hinten verrenkt. Weiterhin handelt es sich in den durch die Litteratur bekannten Fällen nur ganz ausnahmsweise um vollständige Luxationen, so dass die beiden Vorderarmknochen gänzlich zur Seite stehend gefunden wurden. Es kommt dies allerdings vor, ja die Vorderarmknochen können dabei sogar noch eine Rotation erfahren, so dass sich die Ulna gegen den Condylus externus stützt oder gar mit ihrem Gelenkausschnitt auf der äusseren Kante des Oberarmes reitet (Umdrehungsluxation"). (Fig. 165).


Die Mehrzahl der Fälle betrifft unvollständige Luxationen, die meist nach aussen, viel seltener nach innen erfolgt waren. Es rührt dies daher, dass der innen tiefer reichende Rand der Trochlea der Verschiebung einen grösseren Widerstand entgegensetzt als die glatte Eminentia capitata.

Wir finden vorzugsweise Kinder betroffen, weil bei diesen die Gelenkkörper noch nicht so scharf ausgeprägt und besonders die Seitenbänder noch weit weniger fest sind als bei Erwachsenen.

Nach den Angaben, welche die Anamnese über die Entstehung der Verrenkung giebt, ist die Ursache bald ein Fall auf die Hand bei ausgestrecktem oder mässig gebeugtem Arm oder ein Fall auf den Arm selbst oder auf den Ellenbogen.

Der Mechanismus der Luxation ist dabei ein verschiedener. Beim Fall auf die ausgestreckte Hand ist er nach *Hüter* zunächst ein gleicher wie bei der Luxation nach hinten. Die secundäre Bewegung ist aber hier keine Beugung, sondern eine seitliche Abknickung, indem in dem Moment stärkster Hyperextension, wo eben die Kapsel einreisst und der Körper durch Aufhebung des Knochencontactes seine Stütze verliert, dieser nun nach innen oder aussen von dem stützenden Vorderarm zu Boden fällt. Bei gestreckter Haltung des Gelenkes kann die Luxation ferner entstehen durch eine Gewalt, welche, wie z. B. eine den Vorderarm erfassende Maschine, diesen direct radial oder ulnar flectirt, d. h. ihn kräftig ab- oder adducirt. Wird ferner das Ellenbogengelenk rechtwinkelig gebeugt, der Oberarm fixirt, dann der Vorderarm kräftig adducirt, während gleichzeitig auf die Ulnarseite desselben ein Stoss in der Richtung nach aussen einwirkt, so kann eine jetzt folgende Streckung des Gelenkes eine Luxation nach aussen erzeugen, während umgekehrt eine forcirte Abduction bei rechtwinkliger Beugestellung des Gelenkes mit gleichzeitigem Stoss auf das Radiusköpfchen nach einwärts eine Luxation nach innen hervorbringen kann.

Fig. 165.



Die Luxation nach aussen setzt voraus, dass zuerst die Bänder an der inneren Seite des Gelenkes nachgeben, umgekehrt die Luxation nach innen, dass zuerst das äussere Seitenband zerreisst. Bei der Luxation nach aussen kommt es in der Regel nicht zur Trennung des inneren Seitenbandes, sondern es wird eher der Epicondylus internus entweder durch eine kraftvolle Contraction der Flexoren und des Pronator teres abgerissen, oder, was wohl noch häufiger der Fall sein dürfte, durch einen directen Stoss oder Fall abgesprengt. Das innere Band selbst verliert dann natürlich alle Spannung und wird sammt dem Epicondylus und den an diesem inserirenden Muskeln nach vorn und eventuell medianwärts verschoben. Wenn man an der Leiche den Epicondylus internus mit einem Meisselschlag absprengt, so führt nach *Sprengel* schon eine blosse Hyperextension des Vorderarmes zur Entstehung dieser Luxation. Auch das Lig. laterale externum findet sich meist zer-

rissen. Das Lig. annulare kann intact sein oder dadurch nachgiebiger werden, dass ein entsprechendes Stück vom äusseren Rande des Proc. coronoideus abgequetscht wird. Bei der Luxation nach innen finden sich in der Regel beide Bänder gleichmässig zerrissen. Das innere hie und da vielleicht etwas mehr als das äussere. Seltener reisst der Epicondylus externus ab.

Bei beiden Luxationen ist stets ein beträchlicher Kapselriss und zwar sowohl an der vorderen und hinteren Seite, als ganz besonders in den seitlichen Theilen vorhanden. Ebenso sind in diesem Bereich die das Gelenk deckenden Weichtheile erheblich lädirt. Von den Nerven wird am meisten der Ulnaris betroffen, gelegentlich aber auch der tiefe Ast des Radialis und der Medianus.

Eine exacte Beschreibung der pathologischen Verhältnisse verdanken wir einer Beobachtung *Heinlein*'s. Es zeigte sich in diesem Fall nach Eröffnung des Gelenkes das schmale Ende des inneren Seitenbandes hart an dem Condylus internus abgerissen. Der Riss setzte sich direct fort in den vorderen und hinteren Kapselabschnitt und zwar vorn fast die ganze Fossa supratrochlearis ant. umkreisend, hinten nur eine kurze Strecke weit verlaufend bis in die Nähe der medialen Begrenzung der hinteren Grube der Trochlea. In der Verlaufsrichtung analog, aber weniger ausgedehnt, stellte sich eine Continuitätstrennung des äusseren Seitenbandes dar. An dem Musc. extensor carpi radialis waren wenige Bündel einige Centimeter weit aufgerissen, im Uebrigen erschien das Parenchym dieses Muskels und des Supinator longus mit Blut unterlaufen, ebenso auch das Neurilemm des Nervus radialis profundus. Völlig intact waren der Nervus medianus und ulnaris. Das Radiusköpfchen zeigte an seiner vorderen inneren Circumferenz einen 2 cm langen, segmentären Defect. Unterhalb dieses Defectes ist das Periost des Radius mit den adhärirenden Weichtheilen abgehoben. Der Proc. coronoideus ulnae zeigt einen vertical verlaufenden Bruch, das Lig. annulare ist mit seiner Ansatzstelle vom letzteren Fortsatz abgerissen. In dem Gelenk befanden sich frische Blutgerinnsel.

Es handelt sich also meist um schwere Verletzungen, welche nicht nur von einem beträchtlichen Bluterguss begleitet sind, sondern gelegentlich ausser den bereits erwähnten Brüchen des Epicondylus internus, externus und Proc. coronoideus auch Fracturen des Radiusköpfchens und der Trochlea im Gefolge haben.

Die **Symptome** der **vollständigen Luxation nach aussen** sind unverkennbar (Fig. 166). Der Vorderarm ist so stark nach

aussen gewichen, dass er ganz und gar neben dem Humerus zu liegen scheint. Aussen ragt der Radius weit hervor, einwärts die Trochlea sammt der Eminentia capitata, so dass das Gelenk nahezu die doppelte Breite zeigt. Die Haut über demselben ist aufs Aeusserste gespannt, so dass die Conturen der abgewichenen Knochen scharf markirt sind, so sehr, dass die Kante der Trochlea durchzuschneiden droht und selbst die Leiste zwischen Trochlea und Eminentia capitata zu fühlen ist. Das Radiusköpfchen springt so deutlich hervor, dass man seine tellerförmige Grube nicht nur fühlen, sondern sehen kann. Der Vorderarm steht gebeugt oder gestreckt, zuweilen nach innen rotirt und in starker Pronation (Fig. 167). Diese wird bis zum Extrem getrieben bei der Umdrehungsluxation. Die hintere Fläche des Olecranon schaut alsdann nach vorn, und man entdeckt, in der Richtung von innen nach aussen fortschreitend, alle Knochenvorsprünge so deutlich, als hätte man über einen skelettirten Arm ein Stück Haut gelegt *(Pitha)*. In dem Falle *Heinlein*'s bewirkte der stark gespannte und nach aussen gezogene Musc. biceps eine schwach radialflectirte Stellung des Vorderarmes.

Fig. 166.






Fig. 167.




Taf. 11.



Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

Die **Symptome** der häufigsten seitlichen Luxation, der **unvollständigen nach aussen,** können zuweilen durch eine starke Schwellung des Gelenkes verdeckt werden. Ist eine solche nicht vorhanden, so fühlt man, dass die Cavitas sigmoidea die vom Radius verlassene Eminentia capitata eingenommen hat, während der Radius nach aussen verschoben ist und gar keinen Contact mehr mit dem Gelenkkörper des Humerus hat. (Tafel XI). Es wird hierdurch der seitliche Durchmesser des Gelenkes entsprechend dessen horizontaler Achse vergrössert. An der Innenseite springt der Epicondylus internus stark hervor, wenn er nicht abgebrochen ist. Ist dies der Fall, so lagert er an der Vorderfläche der leeren Trochlea oder findet sich zwischen die Gelenkflächen interponirt. Der palpirende Finger dringt in einen Theil der Fossa olecrani ein und tastet zuweilen auch die freie Trochlea ab. An der Aussenseite steht nach abwärts und nach aussen

Fig. 168.



vom Condylus externus ein Vorsprung, der sich bei Pro- und Supinationsbewegungen als das Radiusköpfchen erweist. Der Arm ist mehr oder weniger flectirt und lässt sich bis zu einem spitzen Winkel beugen. Die Hand steht in Pronation.


Bei den bisher beobachteten **Verrenkungen** der Vorderarmknochen **nach innen** handelte es sich auch meist um **unvollständige**. Die Gelenkgrube der Ulna umgreift bei solchen den Epicondylus internus. Das Radiusköpfchen

steht auf der Trochlea. (Tafel XII) Der Vorderarm steht flectirt und pronirt. Der Ellenbogen ist verbreitert. An der inneren Seite tritt eine deutliche Hervorragung zu Tage, welche dem inneren Rande der Cavitas sigmoidea major entspricht. (Fig. 168). Man kann dieselbe leicht bis zur Spitze des Olecranon verfolgen. Der Epicondylus externus prominirt deutlich auf der Aussenseite. Der Biceps und Triceps sind nach innen verschoben, der Nervus ulnaris wird stark gequetscht.

Die **Prognose** dieser Verletzungen ist wegen der nothwendigen Complicationen nicht so günstig als die der Luxationen nach hinten, besonders werden gleichzeitige Fracturen die Function sehr schädigen können.

Die **Reposition** ist wegen des ausgedehnten Kapselrisses leicht auszuführen. Bei der **Luxation nach aussen** lässt man an der Hand den Vorderarm extendiren und drückt dabei letzteren nach innen und den Oberarm nach aussen. Gelangt man so nicht zum Ziel, so hat sich höchst wahrscheinlich der abgebrochene Epicondylus internus oder auch wohl die Bicepssehne zwischen die Gelenkenden interponirt. Man thut in solchen Fällen gut, den hyperextendirten Arm zu abduciren, dann eine rasche Adductionsbewegung folgen und dabei gleichzeitig den Oberarm nach aussen, den Vorderarm nach innen drücken zu lassen. Anstatt der letzteren Bewegung kann man das Gelenk auch beugen, so dass die Manipulation also in Hyperextension, Abduction, rascher Adduction und Flexion des Vorderarmes besteht. Wenn der Epicondylus internus auch jetzt noch ein Hemmniss bildet, so kann man ihn unter aseptischen Cautelen entfernen. Auch in älteren Fällen kann man durch die Exstirpation des interponirten Epicondylus die Functionsfähigkeit des Gelenkes noch sehr bessern.

Die **Reposition** der **Luxation nach innen** geschieht durch Extension an der Hand und Contraextension bei gleichzeitiger Impulsion der Gelenkenden oder durch Hyperextension, Adduction und Flexion des Vorderarmes.




d) Die sogenannte divergirende Verrenkung der beiden Vorderarmknochen. (Fig. 169.)

In sehr seltenen Fällen wird unter Zerreissung des Lig. annulare die Ulna nach hinten, der Radius nach vorn verschoben. Der Mechanismus ist wohl derselbe wie bei einer Luxation nach hinten, nur dass der losgerissene Radius bei starker Zerreissung des Lig. interosseum nach vorn dislocirt wird.

Die **Symptome** dieser Verrenkung setzen sich aus denen der Verrenkung jedes einzelnen Knochens zusammen. Das Gelenk ist in seinem sagittalen Durchmesser verbreitert, der Arm verkürzt, supinirt, das Olecranon hinten, das Radiusköpfchen vorn zu fühlen. Jeder einzelne Knochen muss für sich reponirt werden.

Fig. 169.



Petzhold beobachtete einen Fall, in welchem die Ulna nach hinten, der Radius aber nicht nur nach vorn, sondern auch nach innen luxirt war, so dass es auf der Trochlea aufstand. *Petzhold* reponirte erst die Ulna, es gelang dann aber die Reposition des Radius nicht; die Luxation der Ulna musste erst wieder hergestellt und der Radius zuerst reponirt werden, dann gelang auch die Reposition der Ulna. Auf Grund dieser Beobachtung empfiehlt *Petzhold* stets zuerst den Radius und dann erst die Ulna zu reponiren.

Eine divergirende Luxation beider Vorderarmknochen nach aussen und innen, in der Weise, dass das Capitulum radii auf dem äusseren, das Olecranon auf dem inneren Epicondylus ruhte, wurde von *Bisell* und *Guersant* beobachtet. In beiden Fällen war gleichzeitig ein Bruch der Vorderarmknochen in der Mitte vorhanden.


B. Verrenkungen eines Vorderarmknochens.

a) Verrenkungen der Ulna.

Die isolirten Verrenkungen der Ulna sind ziemlich selten und können nur nach hinten oder nach hinten und innen er-

folgen. Sie sind entweder unvollständig, dann ist der Proc. coronoideus nur ein wenig einwärts und nach hinten über den Rand der Trochleakante getreten, oder sie sind vollständig, dann hat er sich in der Fossa olecrani verhakt. (Fig. 170). Im ersten Falle ist das innere Seitenband mit den umgebenden Kapselpartien, im letzteren auch das Lig. annulare zerrissen. Trotzdem nimmt auch der Radius an der abnormen Bewegung meist etwas Theil, wenn nicht das Lig. interosseum weithin zerstört ist.

Fig. 170.



Die Veranlassung ist ein Stoss oder Fall auf den Ulnarrand der Hand oder des Vorderarmes, wobei der extendirte Arm eine Radialflexion im Ellenbogengelenk erfährt, welche wiederum zur Zerreissung des Lig. laterale internum führt. Auch durch forcirte Adduction und ebenso durch forcirte Pronation kann die Ulna nach hinten treten, zumal, wenn sie dabei noch einen kräftigen Stoss von der Hand her erfährt oder die Gewalt die hintere Fläche des Humerusendes nach vorn treibt.

Die **Symptome** der **vollständigen** Luxation sind sehr ähnlich denen der Verrenkung beider Vorderarmknochen nach hinten. Die Tricepssehne springt mehr wie normal hervor, nach innen von ihr findet sich eine tiefere, nach aussen eine flachere Grube der Haut. Hinten springt das Olecranon besonders mit seiner Fossa sigmoidea, vorn besonders die innere Kante der Trochlea vor, während der Epicondylus internus eher etwas zurücktritt. Das Radiusköpfchen steht an seiner normalen Stelle, zuweilen etwas mehr nach innen. Die Achse des Vorderarmes bildet mit der des Oberarmes in Streckstellung nicht wie normal einen nach aussen offenen Winkel, sondern setzt sich entweder gerade fort oder bildet sogar mit ihr einen nach einwärts offenen Winkel. Der Ulnarrand des Vorderarmes ist verkürzt. Dieser steht mehr oder weniger gebeugt und auffallend pronirt. Beugung über einen rechten Winkel, ebenso vollständige Streckung sind unmöglich. Pro- und Supination völlig frei.

Die **unvollständige** Luxation lässt sich bei der Palpation genau erkennen, wenn man am gebeugten Arme eine mässige Rotations- oder Abductionsbewegung macht, indem sich dabei der Rand der Cavitas sigmoidea mehr von der Trochleakante abhebt.

Die **Reposition** muss die Spannung der hinteren Kapselwand und die Verhakung des Proc. coronoideus beseitigen. Man versucht zunächst einen einfachen Zug nach vorn unter gleichzeitiger Impulsion des Olecranon oder wählt die Hyperextensionsmethode wie bei der Luxation beider Vorderarmknochen oder richtet die Verrenkung auf demselben Wege ein, auf dem sie entstanden ist, d. h. man streckt den Arm, abducirt ihn im Ellenbogengelenk und lässt dann bei nach aussen rotirtem Oberarm eine schnelle Beugung folgen.


b) Verrenkungen des Radius.

Die isolirten Verrenkungen des Radius, die nach vorn auf die Eminentia capitata, nach hinten neben das Olecranon und nach aussen neben den Epicondylus externus erfolgen können, sind im Allgemeinen seltene Verletzungen, indem sie nach *Kroenlein*'s Statistik nur etwa 4 % sämmtlicher Luxationen bilden. Sie kommen ungleich viel häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen vor, was sich durch die anatomischen Verhältnisse leicht erklären lässt.

Fig. 171.



Fig. 172.



Das Radiusköpfchen ist nämlich bei Kindern im Verhältniss weit schmäler zum Schafte und geht in diesen, da seine Knopfform noch nicht so ausgesprochen ist, mit viel geringerer Einschnürung über als bei Erwachsenen (Fig. 171 und 172). Es lässt sich daher viel leichter als bei diesen im Lig. annulare auf- und niederschieben. Dieses selbst ist überdies bei ihnen verhältnissmässig weiter, liegt dem Radiushalse nicht so knapp an und ist dabei viel weniger fest und widerstandsfähig als im höheren Alter, indem es besonders leicht an seiner Verbindung mit dem äusseren Seitenband nachgiebt. Schliesslich ist der Radius noch mehr an der Ulna in der Längsrichtung verschieblich, so dass sein Köpfchen durch einen kräftigen Stoss von der Hand her durch einen etwa vorhandenen Kapselriss viel eher nach aufwärts getrieben werden kann, als später, wo die fester werdenden Bandmassen dies verhüten.

Die **Ursachen** dieser Verletzungen sind selten directe Gewalten, so ein Fall oder Stoss auf die äussere Ellenbogengegend, wobei das Radiusköpfchen direct von vorn oder hinten her getroffen und nach Zerreissung des Ringbandes nach hinten oder vorn getrieben wird. Weit häufiger greift die Gewalt an der Hand oder am Vorderarm an, sei es nun, dass der Verletzte auf die vorgestreckte Hand fällt, sei es, dass bei einem Fall auf die Seite der Arm unter den Körper zu liegen kommt. Dabei kann sowohl der Vorderarm gegen den Oberarm als auch bei fixirtem Vorderarm der Humerus gegen letzteren bewegt werden.

Was nun den hierbei stattfindenden **Mechanismus** betrifft, so war man bis auf die neueste Zeit der Ansicht, dass die Luxation des Radiusköpfchens durch eine forcirte Pronation entstehe. Am Schluss dieser Bewegung sollte der Radius die Ulna berühren und an der Kreuzungsstelle beider Knochen ein Hypomochlion entstehen, über welchem das Radiusköpfchen derart gegen das Lig. annulare und die vordere Kapselwand über dem Humero-Radialgelenke abgehebelt würde, dass es beide auseinandersprengend luxirte. Es sollte dann entweder nach hinten (*Boyer*, *Hüter*) oder nach vorn (*Streubel*) zu stehen kommen. Wir haben nun schon bei den anatomischen Vorbesprechungen hervorgehoben, dass eine solche Knochenhemmung thatsächlich nicht existirt, sondern dass die Hemmung der Pronation durch den federnden Bandapparat zwischen den oberen und unteren Gelenkenden der beiden Vorderarmknochen, durch die Spannung der Ellenbogengelenkkapsel, des Lig. interosseum, sowie bestimmter Muskeln geschieht. Demgemäss ist der früher angenommene, eben erwähnte Mechanismus nicht gut denkbar.

In der That haben auch die neueren Autoren auf diesem Gebiet, *Radestock*, *Schüller* und *Löbker*, *Barros*, in zahlreichen Untersuchungen bewiesen, dass eine einfache forcirte Pronation bei Erwachsenen niemals, bei Kindern höchst selten eine Luxation nach vorn erzeugt. Wenn aber eine solche entsteht, so reponirt sie sich fast immer wieder von selbst.

In ähnlicher Weise entsteht bei einer einfachen forcirten Supination viel eher eine andere Verletzung des Ellenbogengelenkes als eine Luxation des Radiusköpfchens nach hinten. Nur wenn der Epicondylus externus oder der Processus coronoideus ulnae im Zusammenhange mit dem äusseren Band oder dem Lig. annulare vorher abgesprengt war, bringt die forcirte Supination zuweilen eine Subluxation des Radius nach hinten hervor. *Radestock*

erzeugte durch forcirte Supination eine Radiusluxation nach aussen, welche in eine Luxation nach vorn überging, sobald nach geschehenem Kapselriss die Hand in Pronation übergeführt wurde.

Es ist diese Thatsache, dass wenigstens bei Erwachsenen weder durch forcirte Pronation noch durch forcirte Supination eine Radiusluxation erzeugt werden kann, erklärlich, wenn man sich der straffen Befestigung des Radius an der Ulna und an der Hand erinnert. Dieselbe verhindert es, dass selbst nach Sprengung der Bandmassen das Radiusköpfchen nach oben verschoben werden kann. Anders gestaltet sich die Sache, wenn durch die Gewalt gleichzeitig eine Fractur im oberen Drittel der Ulna entsteht. Dann vermag sich der Radius leicht zu dislociren, und es genügt schon eine einfache Hyperextension oder kräftige Pronation zur Entstehung der Luxation nach vorn, eine Supination zur Luxation des Köpfchens nach hinten oder aussen.

Wenn nun eine einfache Pro- oder Supination eine Luxation nicht zu Stande kommen lässt, so spielen diese Bewegungen nichts desto weniger doch eine Rolle bei der Entstehung unserer Verrenkungen, indem diese dadurch hervorgerufen werden, dass sich mit den Pro- und Supinationsbewegungen jeweils noch forcirte Seitenbewegungen combiniren.


Wenn man an dem gestreckten oder leicht gebeugten Arm eine kräftige Pronation vornimmt, während man ihn gleichzeitig stark abducirt oder adducirt, so zerreisst das Lig. annulare, oder das Radiusköpfchen schlüpft nach unten aus demselben heraus und stellt sich nun beim Nachlassen der forcirten Bewegung nach aussen, hinten oder nach vorn. Eben dorthin kann es gelangen durch forcirte Supination unter gleichzeitiger forcirter Abduction. Die Entstehung der Luxation wird hierbei dadurch begünstigt, dass bei diesen Manipulationen häufig ein Stück vom äusseren, dem Radius zugewendeten Rande des Proc. coronoideus abbricht und die Bruchlinie sich bis in den Bereich des Ringbandes erstreckt.

Am häufigsten entstehen wohl die Luxationen unter Zerreissung des Ringbandes und der Kapsel durch Combination der Pronation und Abduction. *Gysen* macht wohl mit Recht noch auf die Wirkung des Musc. biceps. aufmerksam. Bei starker Pronation wird durch einen Sturz auf den leichtgebogenen Arm eine starke Bicepscontraction entstehen, welche das Zustandekommen der Luxation be-


günstigen kann. Wenn nach Zerreissung der Kapsel das Köpfchen die letztere verlassen hat, so kann daraus durch irgend eine secundäre Bewegung eine vordere, hintere oder seitliche Luxation sich entwickeln.

Die Richtung, in welche das Radiusköpfchen gelangt, hängt wohl vornehmlich ab von der Richtung der einwirkenden Gewalt, sowie vom Verhalten des Kapselrisses, der sich vorn, hinten oder aussen über dem Humero-Radialgelenk befinden kann. Soll eine Luxation nach vorn resultiren, so muss in der Regel das Lig. annulare zerrissen sein, soll sie nach hinten stattfinden, der hintere Abschnitt des äusseren Seitenbandes, und soll sie eine äussere werden, nicht allein das Lig. laterale externum und annulare, sondern auch das Lig. interosseum und das zwischen Sinus lunatus ulnae und Collum radii gelegene Lig. quadratum. Es kann aber auch, wie schon erwähnt, bei Kindern der Kopf aus dem Lig. annulare herausschlüpfen (Fig. 173) und sich dann nach allen drei Richtungen hin begeben.

Fig. 173.



Relativ oft wird die Radiusluxation begünstigt durch begleitende Fracturen des Ulnaschaftes, des Proc. coronoideus und des Epicondylus externus. Im letzteren Fall wird natürlich das äussere Seitenband entspannt. Es kommen hier aber auch gar nicht selten Fracturen des Radiusköpfchens selbst in Betracht. Durch directen Schlag auf dasselbe von hinten und aussen, aber auch durch Radialflexion des gestreckten Ellenbogens entstehen nämlich zuweilen Absprengungen an der äusseren Peripherie seines Gelenkrandes, wobei dann die Bruch-



Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

linie schräg von aussen und unten in das Gelenk dringt, das Köpfchen selbst aber nach vorn und innen getrieben wird. Eine solche Fractur liegt stets theilweise extracapsulär, und deshalb pflegt die Heilung mit nur geringer Verschiebung des Fragmentes nach unten einzutreten, während die Luxation oft bestehen bleibt. Umgekehrt kann aber auch ein Stück der inneren Peripherie des Gelenkrandes abbrechen. Das Radiusköpfchen weicht dann nach aussen, während das kleine, dann völlig intraarticulär gelegene Fragment nicht wieder anheilt, sondern sich zu einem gestielten freien Gelenkkörper umgestaltet *(Löbker, W. Wagner)*.

Je nach der Entstehungsweise der Radiusluxationen erfahren die über die Radialseite des Gelenkes hinziehenden Muskeln, besonders der Supinator brevis, gelegentlich aber auch der Brachialis internus Dehnungen, Zerrungen und Zerreissungen. Von den Nerven wird besonders der Radialis lädirt werden können, da er bei Luxationen nach vorn mit seiner Theilungsstelle gerade über das luxirte Köpfchen zu liegen kommt.

Die Symptome der Radiusluxationen sind in frischen Fällen leicht wahrnehmbar.

Bei der Luxation nach vorn (Tafel XIII) steht das Radiusköpfchen vorn auf resp. über der Eminentia capitata und macht hier vorn unter dem Wulste des Supinator brevis eine Vorwölbung, während hinten unter der Eminentia capitata eine Einsenkung bemerkbar wird, in welcher man die seitliche Gelenkgrube der Ulna fühlen kann, wenn nicht die Bicepssehne jetzt darüber verläuft. Die Vorwölbung in der Ellenbeuge wird besonders deutlich, wenn man eine Streckung des Armes versucht. Der Unterarm steht leicht flectirt, in mässiger Pronationsstellung und kann activ weder rotirt, noch über einen rechten Winkel hinausgebeugt werden. Bei einem jeden solchen Versuch stemmt sich das Radiusköpfchen gegen die Vorderfläche des Oberarmes an. Die Radialseite des Vorderarmes ist verkürzt, Pro- und Supination unmöglich. Der Epicondylus externus tritt, besonders von hinten gesehen, sehr deutlich hervor, während unter ihm eine Abflachung der Weichtheile auffällt.

Nach *Goyrand*, *Malgaigne, Hutchinson* und *Lindemann* giebt es bei Kindern auch eine unvollkommene Luxation, eine Subluxation des Radius nach vorn. *Streubel* und namentlich *v. Volk-*

mann jedoch führen die darauf bezogenen Symptome auf eine Interposition der unverletzten hinteren Kapselwand zwischen den Gelenkkopf des Radius und die Eminentia capitata zurück. Die Verletzung entsteht, wenn kleine Kinder an der pronirten Hand in die Höhe gezogen werden, oder wenn sie bei gestrecktem Arm auf die Hand fallen. Sie ist nach den Statistiken von *Hoffmann* und *Koehl* sehr häufig (1 Subluxation auf rund 200 chirurgisch-poliklinische Patienten) und kommt namentlich bei Mädchen vor. Prädisponierend wirkt bei diesen die wohl unzweifelhaft bestehende Weite und Nachgiebigkeit der Kapsel.

Nach der Verletzung lassen die Kinder den Arm schlaff herabhängen, scheuen selbst die geringste Bewegung desselben, schreien besonders beim Versuche, den in Pronation stehenden Unterarm zu supiniren. Eine nachweisbare Deformität fehlt in der Regel. Man fühlt dagegen meist ein knackendes Geräusch, wenn man unter Extension des Unterarmes eine Supination und Beugung ausführt. Unmittelbar darauf machen die Kinder wieder von ihrem Aermchen ungestörten Gebrauch. Dasselbe muss jedoch zur Verhütung von Recidiven etwa 1 Woche lang rechtwinklig fixirt werden.

Fig. 174.



Bei der **Luxation des Radiusköpfchens nach hinten** (Fig. 174) steht dasselbe hinter der Eminentia capitata neben dem Olecranon und kann hier deutlich gefühlt werden, während unterhalb derselben eine Vertiefung durchzutasten ist. Die durch das Radiusköpfchen verschobenen Muskeln verdecken den Epicondylus externus, während der internus an der vorderen Seite besonders deutlich hervorragt. Der Abstand des ersteren, sofern er deutlich fühlbar ist, vom Proc. styloideus radii ist verkürzt. Der Unterarm bildet mit dem Oberarm einen nach aussen offenen Winkel. Der Unterarm steht dabei in halber Pronationsstellung und kann nicht gestreckt und supinirt werden.

Bei der **Luxation nach aussen** steht das Capitulum radii nach aussen von der Eminentia capitata und macht hier eine abnorme, aber durch ihre Form sofort charakteristische Vorwölbung, während hinten unterhalb der Eminentia

eine grubige Einsenkung zu bemerken ist, in welcher man bei der Beugung ihre halbkugelige Gelenkfläche fühlen kann. Der Vorderarm ist mässig gebeugt, ist pronirt und steht in radialer Abduction *(Schröter)*.

Man erkennt die abnorme Stellung des Radiusköpfchens bei allen Luxationen am leichtesten, wenn man während der Untersuchung bald in der Streck- bald in der Beugestellung passive Pronations- und Supinationsbewegungen macht. Diese letzteren Bewegungen sind bei der Luxation nach aussen nicht so sehr beschränkt wie bei den anderen. Die Erscheinungen, welche bei dieser Luxation die gleichzeitige Fractur der Ulna im oberen Drittel hervorruft, werden wir bei dieser kennen lernen.

Die **Prognose** der Radiusluxationen ist nicht so günstig, da gerade bei ihnen die Reposition nicht gelingt. Die Hindernisse, die sich derselben in den Weg stellen können, sind einmal in der Kapsel gelegen, indem es leicht vorkommen kann, dass die gerade bei Kindern so schlaffe Gelenkkapsel zwischen Köpfchen und Eminentia capitata eingeklemmt wird. Es kann aber ferner auch das Köpfchen, wenn es bei der Entstehung der Luxation aus dem Lig. annulare herausgeschlüpft war, bei Repositionsversuchen dieses sammt den anhängenden Kapselpartien vor sich herstülpen und so die Einrichtung unmöglich machen. In gleicher Weise werden dieser abgesprengte Knochen- und Knorpelstückchen hinderlich sein. Schliesslich kann bei länger bestehender Luxation das Radiusköpfchen auf's äusserste atrophiren oder besonders nach begleitenden Fracturen sehr stark hypertrophisch werden. Bei irreponirter Luxation kann aber die Function des Gelenkes sehr leiden, ja sie kann bei gleichzeitigen intracapsulären Fracturen vollständig aufgehoben werden.

Die **Therapie** muss in der möglichst zeitigen Reposition und der gerade hier nicht leichten Retention bestehen. Die Reposition kann, einerlei nach welcher Richtung die Luxation erfolgte, zuweilen in der einfachen Weise gelingen, dass man bei fixirtem Oberarm am Handgelenk kräftig extendirt und dann den Unterarm rasch beugt, während man gleichzeitig mit der anderen Hand das Radiusköpfchen an seine richtige Stelle presst. Kommt man so nicht zum Ziel, so empfiehlt sich für Luxationen nach vorn und nach aussen ein kräftiger Zug am supinirten, hyperextendirten und gleichzeitig adducirten Vorderarm in der Richtung seiner Achse und gleichzeitige Im-

pulsion des Köpfchens, bei Luxationen nach hinten die gleichen Bewegungen aber nach Pronationsstellung der Hand.

Vermuthet man ein Herausschlüpfen des Radiusköpfchens aus seinem Ringband, so adducirt man bei Luxationen nach vorn den gestreckten Vorderarm so stark, bis das Köpfchen wieder unter der Eingangspforte der Kapsel steht, und lässt dann eine kräftige Supination folgen, macht dagegen bei Luxationen nach hinten die Adduction bei leichter Beugung des Gelenkes, fügt dann eine mässige Streckung hinzu und zum Schluss eine Pronation.

Stellt sich die Unmöglichkeit der Reposition oder der dauernden Retention des Köpfchens heraus oder hat man es mit veralteten Luxationen zu thun, so macht man unter aseptischen Cautelen die Arthrotomie des Gelenkes, beseitigt die Hindernisse und näht über dem reponirten Köpfchen die Kapsel zusammen (*Sprengel*) oder vollzieht, wenn dieses Vorgehen nicht angebracht erscheint, die Resection des Köpfchens (*Löbker*, *Wagner* und *v. Lesser*). Die Resection hat dann stets durch den *Hüter*'schen radialen Längsschnitt zu geschehen, nicht dagegen durch einen vorderen Schnitt, da man bei einem solchen zu leicht den Nervus radialis verletzen könnte. Nach einer neueren Zusammenstellung von *Schröter* ist die Resection des Radiusköpfchens bisher etwa 14 mal, die Arthrotomie mit blutiger Reposition etwa 5 mal ausgeführt.

Die Nachbehandlung aller Luxationen des Ellenbogengelenkes geschieht am besten bei rechtwinklig gebeugtem Gelenk und so gestelltem Vorderarm, dass seine Radialseite nach oben sieht, durch einen gut angelegten Gypsverband oder eine *Beely*'sche Gypshanfschiene. Die Verbände bleiben 14 Tage liegen, worauf man mit systematisch durchgeführter Gymnastik, Massage und Electrizität beginnt.

Differentialdiagnose der Ellenbogengelenksverletzungen.

Wenn man eine frische Ellenbogengelenksverletzung zur Behandlung bekommt und das Gelenk in Folge des Blutergusses und der Quetschung der Weichtheile mächtig angeschwollen ist, so ist die Stellung einer richtigen Diagnose selbst für den Geübten oft eine schwierige Aufgabe. Man nimmt dann am besten die Narcose zu Hilfe und massirt in derselben die Schwellung möglichst weg. Nun betastet man systematisch die einzelnen Knochen genau und ver-

gleicht am besten die gewonnenen Eindrücke mit den Contouren eines Skelettes, an dem man wo möglich die vermuthete Verletzung herstellt. Ohne Weiteres klar werden einem die vollständigen Verrenkungen des Vorderarmes nach einer oder der anderen Seite, die divergirende und Umdrehungsluxation, die vollständigen oder unvollständigen Luxationen nach vorn, die Luxation der Ulna nach hinten, sowie die des Radius nach allen Richtungen. Man vergesse nie, bei einer Luxation des Radius nach aussen auf eine Fractur der Ulna im oberen Drittel zu untersuchen und versäume ebenfalls nicht, bei den Luxationen beider Vorderarmknochen auf eine etwaige Fractur des Epicondylus externus und internus, der Condylen, des Proc. coronoideus und des Olecranon zu achten.

Wir haben nun aber am Ellenbogengelenk eine Reihe von Verletzungen, welche bei oberflächlicher Betrachtung mit einander verwechselt werden könnten. Wir lassen diese nun folgen und vergleichen dann wieder ihre einzelnen Symptome in der Weise, dass sich in den Tabellen die einzelnen Ziffern entsprechen. Es ergeben sich dann die Unterscheidungsmerkmale von selbst.

Eine einfache Contusion des Gelenkes erkennt man daran, dass bei beträchtlicher Schwellung und intraarticulärem Erguss sämmtliche Knochenvorsprünge sich normal verhalten.

1. Fractura supracondylica.

1. Der Oberarm erscheint, von dem Epicondylus externus zum Acromion gemessen, deutlich verkürzt.
2. Das Ellenbogengelenk steht gebeugt, die Hand in Pronation.
3. Die Achse des Oberarmes fällt nicht in die Ellenbeuge, sondern mehr nach dem Vorderarm hin.
4. Der Querdurchmesser des Gelenkes erscheint normal, der von vorn nach hinten verbreitert.
5. Die Tricepssehne läuft concav in einem nach hinten offenen Winkel.
6. In der Ellenbeuge fühlt man oberhalb der Cubitalfalte einen schmalen zackigen Vorsprung.
7. Das Olecranon und Radiusköpfchen stehen stark nach hinten und höher als auf der anderen Seite.
8. Das Verhältniss des Olecranon zu den beiden Epicondylen ist dabei normal.
9. Der Vorderarm kann, wenn auch unter Schmerzen, passiv nach allen Richtungen hin abnorm bewegt werden. Dabei fühlt man über den Epicondylen

10. Abnorme Beweglichkeit und
11. Crepitation.
12. Es gelingt durch Zug am Vorderarm leicht, die Deformität auszugleichen, sie kehrt jedoch beim Nachlass des Zuges sofort wieder.

II. Fractura supracondylo-intercondylica.

1. 2. 3. 5. 6. 9. 10. und 12. sind ebenso wie bei der Fractura supracondylica vorhanden. Es ist dagegen
4. Der Querdurchmesser des Gelenkes bedeutend verbreitert.
7. Das Olecranon scheint zuweilen zu fehlen, wenn sich der Schaft zwischen den Condylen eingekeilt hat.
8. Die beiden Condylen stehen weiter von einander und vom Olecranon ab. Wenn man dieselben gegen einander verschiebt, so fühlt man zwischen ihnen selbst
11. Crepitation.

III. Fractura Epiphyseos.

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. und 12. sind dieselben wie bei den vorhergehenden.
6. Der Vorsprung in der Ellenbeuge liegt näher dem Gelenk und ist breiter.
10. Die abnorme Beweglichkeit findet sich ebenso näher dem Gelenk, und es ist sogar Ueberstreckung möglich.
11. Crepitation ist, wenn vorhanden, nur als weiches Knorpelreiben nachweisbar.

IV. Fractura proc. cubitalis.

1. Eine Verkürzung des Armes ist nicht nachweisbar.
2. Wie bei den vorigen.
3. Die Achse des Oberarmes fällt ins Gelenk.
4. Der Tiefendurchmesser ist normal, kann aber durch Zug am Vorderarm um fast 3 cm vergrössert werden. Ebenso kann
5. Die sonst normal verlaufende Tricepssehne durch einen solchen Zug eher nach vorn angespannt werden.
6. Die Cubitalfalte ist wegen starker Schwellung des Gelenkes meist verstrichen.
7. Das Olecranon ist stets gebrochen, in Folge dessen
8. Steht seine Spitze höher als die beiden Epicondylen.
9. Der Vorderarm kann activ nicht bewegt werden, wohl aber lässt sich

10. Abnorme Beweglichkeit unter den Epicondylen dicht über der Gelenklinie nachweisen und
11. Crepitation, besonders wenn man den Vorderarm seitlich bewegt.
12. Die Reduction ist leicht und bleibt bestehen.

V. Luxatio cubiti posterior.

1. Der Oberarm hat seine normale Länge.
2. 3. 4. 5. und 7. wie bei der Fract. supracondylica.
6. In der Ellenbeuge findet man einen runden, breiten, walzenförmigen Körper.
8. Das Olecranon steht weiter nach hinten und höher als die Epicondylen.
9. Das Gelenk kann activ nicht bewegt und auch
10. Passiv nicht über einen rechten Winkel hinaus gebeugt werden.
11. Crepitation ist nicht vorhanden. Man darf bei nicht ganz frischen Verrenkungen etwaiges Schneeballknirschen im Gelenk nicht für eine solche halten.
12. Die Reduction ist nur durch bestimmte Manipulationen möglich. Ist sie erreicht, so bleibt sie aber bestehen. Nur bei gleichzeitigem Bruch des Proc. coronoideus besteht eine Neigung der Luxation zu recidiviren.

VI. Luxatio cubiti lateralis incompleta.

Verwechslung könnte vorkommen mit einer traumatischen Epiphysentrennung, bei der das untere Fragment mit dem Vorderarm stark seitlich verschoben ist (Fig. 153). Es besteht bei der Luxation aber keine abnorme Beweglichkeit, und man kann höchstens solche ebenso wie Crepitation an einem abgebrochenen Epicondylus fühlen.

Fracturen der Vorderarmknochen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Skelett des Vorderarmes wird durch zwei gegen einander bewegliche Knochen, die Ulna und den Radius gebildet. Beide haben einen schlanken, S-förmigen Bau, berühren sich mit ihren

Enden in Drehgelenken und bilden mit einander den Rahmen, in welchem das Lig. interosseum ausgespannt ist. Sie haben beide eine dreiseitig prismatische Gestalt. Die schärfste Kante ist dem Zwischenknochenraum zugewendet und dient als Ursprungsstelle der diese ausfüllenden Membran, welche die Muskeln der vorderen und hinteren Seite, die Beuger und Strecker der Hand, von einander trennt.

Die Ulna liegt an der Kleinfingerseite des Vorderarmes und kann hier in ihrer ganzen Länge durch die Haut abgetastet werden. Sie trägt an ihrem oberen Ende das Olecranon und den Proc. coronoideus, an ihrem unteren das Capitulum mit dem Proc. styloideus. Ihre S-förmige Gestalt reicht nur bis zum unteren Ende, welches gerade und nahezu cylindrisch ist. Sie bildet mit ihrer die Trochlea umfassenden Cavitas sigmoidea major das eigentliche Ellenbogengelenk. Sie erhält eine obere Epiphyse nur am Olecranon. Der Proc. coronoideus ossificirt vom Körper aus. Die untere Knorpelfuge umfasst das Capitulum und den Proc. styloideus und erhält sich bis zum Beginn des 20. Lebensjahres. Die compacte Substanz ist besonders am oberen Ende sehr stark entwickelt. Sie wird um so dünner, je weiter man nach unten geht. Gleichzeitig nimmt aber die ganze Ulna von oben nach unten an Dicke ab.

Der Radius liegt an der Daumenseite des Vorderarmes, ist aber in seiner oberen Hälfte von dicken Muskellagen so verdeckt, dass er nicht durch die Haut hindurch gefühlt werden kann. Erst etwa handbreit von seinem unteren Ende tritt er mehr an die Oberfläche, so dass er von da an nach abwärts leicht abzupalpiren ist. An seinem oberen Ende trägt er sein Köpfchen, unter diesem den Hals und am Uebergang von diesem in den dreikantigen Schaft einen rauhen Höcker, Tuberositas radii zum Ansatz für den Biceps. In seiner Mitte ist er bogenförmig ausgeschweift, hat hier seine dünnste Stelle und wird an dem unteren Ende dicker und breiter. An diesem besitzt er ulnarwärts die Fossula ulnaris zur Aufnahme der Ulna, an der Daumenseite seinen Proc. styloideus, dorsalwärts mehrere durch rauhe Höckerchen geschiedene Leitfurchen für die Sehnen, unten eine Gelenkfläche für die Handwurzel. Die Epiphyse unterhalb des Capitulum radii ist im 16. Lebensjahre verknöchert, während die Verschmelzung der unteren über der Wurzel des Proc. styloideus gelegenen Epiphyse mit der Diaphyse erst im 19.—20. Lebensjahre vollendet ist. Eine besondere Epiphyse der Tuberositas radii sowie

des Proc. styloideus verknöchert schon vor dem 8. Jahre. Der Radius besitzt eine ziemlich starke compacte Substanz in seiner Diaphyse. Dieselbe nimmt jedoch von der Tuberositas nach oben und etwa von einer Linie, die 2—3 cm über dem unteren Gelenkende liegt, nach unten hin rasch ab. Die Bälkchen der Spongiosa laufen am unteren Ende theils in sagittaler und frontaler Richtung, theils parallel der Gelenkfläche.

Frequenz der Vorderarmfracturen.

Die Brüche des Vorderarmes sind mit etwa 18—20 % die häufigsten aller zur Beobachtung kommenden Fracturen. Das Hauptkontingent dazu stellt das carpale Ende des Radius. Dann kommen die Brüche der beiden Vorderarmknochen und dann erst die des Radiuskörpers und der Ulna allein. Die Fracturen kommen in jedem Lebensalter vor, doch ist das kindliche und das kräftige Mannesalter prädisponirt.

A. Brüche beider Vorderarmknochen.

Die Brüche beider Vorderarmknochen sind meistens vollständige und entstehen durch directe Gewalt, Stoss, Schlag, Ueberfahrenwerden, kommen aber auch vor nach einem Fall auf die Hand. Im ersteren Fall kann die Fractur in jeder Höhe der Knochen sitzen, im letzteren betrifft sie mit Vorliebe das untere Drittel. In solchem Fall handelt es sich bei Kindern zuweilen nur um Infractionen. Sonst sind die Brüche einfache, complicirte oder Splitterbrüche. Bei der directen Fractur brechen die Knochen meist in gleicher Höhe, bei der indirecten liegt die Fractur an der Ulna zuweilen höher als am Radius.

Am häufigsten wird betroffen das mittlere Drittel, dann das untere. Im oberen sind Brüche wegen des Schutzes der starken Weichtheile sehr selten.

Was nun zunächst die Infractionen betrifft, so ist der Knickungswinkel in der Regel ein bedeutender, mitunter sogar ein rechter und öffnet sich gegen die Beuge- oder Streckseite. Der Widerstand gegen die Geraderichtung ist dabei verschieden, indem mitunter ein blosser Zug am Vorderarm ausreicht, ein ander Mal aber die Knochen gänzlich gebrochen werden müssen, um die Knickung ihrer Achsen zu beseitigen.

Die vollständigen Brüche verlaufen entweder quer und sind dann oft durch erhebliche Zahnung der Fragmente ausge-


zeichnet, oder sie haben eine schräge Richtung. Ist das Periost mehr oder weniger erhalten, so können die Fragmente ihre gegenseitige Lage inne behalten. Sind aber alle Weichtheile zerrissen, dann sind sie verschoben, und zwar hängt die Richtung der Dislocation ab von der Art der einwirkenden Gewalt, von der Schwere des hängenden verletzten Gliedes, von zufälligen Bewegungen desselben und schliesslich von der Wirkung der Muskeln, die sich an die vier Fragmente ansetzen.


Im Grossen und Ganzen finden wir die Fragmente entweder gegen den Zwischenknochenraum oder nach der Radial- oder Ulnarseite abgewichen. Sie können dabei ferner über einander geschoben sein oder bilden, während sie gleichzeitig Rotationen eingehen, einen nach der Volar- oder Dorsalseite offenen Winkel miteinander. Kommt die Muskelwirkung vollständig zur Geltung, dann ist die Dislocation eine typische und verschieden je nach dem Sitze der Fractur. In dem häufigsten Falle, dem Bruche im mittleren Drittel unterhalb des Ansatzes des Pronator teres, bleibt das obere Fragment der Ulna wegen seiner festen Gelenkverbindung in der Regel in seiner natürlichen Lage. Die übrigen drei Fragmente werden dagegen durch die Pronatoren zunächst in das Spatium interosseum gezogen, so dass sie dieses verengern und die Muskeln aus demselben verdrängen. Weiterhin nimmt das obere Fragment des Radius, da der Pronator teres seinen Antagonisten, dem Biceps und Supinator brevis, das Gleichgewicht hält, eine Mittelstellung zwischen Pro- und Supination ein. Die beiden unteren Fragmente des Radius und der Ulna werden aber durch den Pronator quadratus in volle Pronation gestellt, gehen also eine Dislocatio ad peripheriam ein, indem sich gegenüber den oberen Fragmenten das untere Bruchstück des Radius volarwärts, das der Ulna dorsalwärts wendet. (Tafel XIV.)

Sitzt die Fractur oberhalb des Ansatzes des Pronator teres, so bleibt die eben beschriebene Dislocation der drei Fragmente bestehen, nur das vierte obere Fragment des Radius stellt sich jetzt in volle Supination, da die sich an ihm ansetzenden Mm. biceps und supinator brevis jetzt ohne ihren Antagonisten, den Pronator teres, wirken.

Bei den Brüchen im unteren Drittel oberhalb der früheren Epiphysenlinie werden beide oberen Fragmente durch den Pronator teres und quadratus, welch letzterer dabei in seinen unteren Theilen meist zerrissen ist, in Pronation gestellt, durch den letzteren aber gleichzeitig gegen das Spatium interosseum hingedrängt. Die beiden


Taf. 14.






Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

Taf. 15.





Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen

unteren Fragmente dagegen werden durch den Supinator longus dorsal- und zugleich radialwärts gezogen, so dass ein nach der Radialseite hin offener Winkel entsteht und die Bruchfläche des oberen Ulnarfragmentes scharf hervorspringt. (Tafel XV.)

Zu diesen Dislocationen kommen dann noch die durch die Richtung der Gewalt bedingten dorsalen oder volaren Winkelbildungen. Entsteht die Winkelstellung ebenfalls durch Muskelzug, so ist sie stets nach der volaren Fläche gerichtet, da die Flexoren stärker sind als die Extensoren. Sehr selten besteht eine Einkeilung der Fragmente.

Die **Symptome** sind verschieden ausgeprägt, je nachdem es sich um einfache Infractionen oder um vollständige Fracturen handelt.

Die unvollständigen sowie die ohne Dislocation einhergehenden Vorderarmbrüche weisen nämlich oft nur den localen Bruchschmerz, die leichte Schwellung und den nach einigen Tagen auftretenden Bluterguss auf. Ist dagegen die oben beschriebene Verschiebung der Bruchenden vorhanden, so erscheint sofort die dadurch bedingte Deformität. Dieselbe giebt sich zu erkennen als winklige oder seitliche Knickung des Armes, Verkürzung desselben und Verlust seiner platten Gestalt. Durch das Hereindrängen der Knochen in den Zwischenknochenraum werden ja die Weichtheile aus demselben herausgedrängt, wodurch der Arm eine mehr cylindrische Form erhält. Der Unterarm hängt schlaff herab, ist jeder activen Bewegung unfähig. Seine Haltlosigkeit ist ganz besonders ausgeprägt bei den so oft durch Maschinengewalt entstehenden Splitterbrüchen. Bei complicirten Fracturen schauen die Bruchenden häufig genug selbst aus der Wunde heraus. Die Palpation subcutaner Fracturen des unteren und mittleren Drittels ergiebt leicht abnorme Beweglichkeit und Crepitation an beiden Knochen. Im oberen Drittel ist der Nachweis dieser Symptome wegen der dicken Weichtheile nicht so einfach.

Die **Prognose** der Vorderarmbrüche ist hauptsächlich von der Art der Behandlung abhängig. Geschieht dieselbe richtig, so erfolgt die Heilung meist ohne merkliche Verschiebung innerhalb 20 bis 30 Tagen durch knöchernen Callus. Zuweilen erfordert ein Knochen, so besonders die Ulna, längere Zeit zur Consolidation. Dieselbe kann aber auch bei beiden auf sich warten lassen, ja es sind gar nicht so selten Pseudarthrosen beschrieben worden, die

dann entweder auf einer Interposition von Sehnen, Muskeln zwischen die Fragmente oder zu frühzeitigen Bewegungen mit der Hand oder einer schlechten Ernährung der Fragmente beruhen. Sehr selten kommt es in Folge der Zerreissung von Gefässen und Nerven zu einer Gangrän der Hand. Wo man eine solche beobachtet, kann sie aber auch wohl die Folge einer schlechten Behandlung sein. Diese ist auch die Schuld, wenn nach der Verletzung eine starke Behinderung der Supination zurückbleibt, die selbst wieder

Fig. 175.




Fig. 176.



Fig. 177.





Fig. 178.




durch eine knöcherne Verwachsung der neben einander liegenden Fragmente der Ulna und des Radius (Fig. 175 und 176), durch einen zu starken Callus oder eine sogenannte laterale Pseudarthrose bedingt sein kann. Diese letztere besteht darin, dass die in demselben Niveau befindlichen Bruchenden durch knöcherne Vereinigung heilen, ihre Callusmassen aber in den Zwischenknochenraum hineinwachsen, jedoch so, dass sie nicht mit einander verschmelzen, sondern durch ein falsches Gelenk verbunden werden (Fig. 177). Neben den genannten Mo-

menten liegt die Hauptschuld der behinderten Supinationsmöglichkeit wohl noch darin, dass bei der typischen Dislocation der Fragmente keine Reposition stattfand, so dass die Heilung erfolgte, während die oberen Bruchenden in Mittelstellung zwischen Pro- und Supination, oder in vollständiger Supination, die unteren sammt der Hand dagegen in voller Pronation verharrten (Tafel XIV). Bei etwas winkliger Zusammenheilung der Knochen, besonders des Radius, kann aber auch ein Hemmniss der Supination durch das Lig. interosseum gegeben sein, zumal wenn es selbst noch dazu straff vernarbt oder sogar theilweise verknöchert ist, indem es dann für die durch die winklige Verbiegung der Knochen bedingte grössere Excursion derselben zu kurz wird (Fig. 178).

Die **Therapie** hat auf die oben genannten Momente Rücksicht zu nehmen. Die Reposition soll bei rechtwinklig gebeugtem Ellenbogengelenk durch Extension und Contraextension am Oberarm und an der Hand die Verkürzung ausgleichen und durch Stellung der Hand in Supination, so dass der Patient selbst in ihre Vola hineinsehen kann, das Lig. interosseum entfalten und die vier Fragmente in richtige Lage zu einander


Fig. 179.



stellen. Die Hand des Arztes muss dabei oft noch durch directen Druck auf die Fragmente deren winklige Verschiebung beseitigen. Es sollen ferner die aus dem Spatium interosseum herausgetriebenen Weichtheile wieder in dasselbe hineingedrängt und die platte Form des Armes wieder hergestellt werden. Jede circuläre Einwickelung des Gliedes ist daher zu vermeiden, da dieselbe ja, wie sich aus beistehender Figur unschwer erkennen lässt, das Gegentheil bewirkt (Fig. 179). Es sind vielmehr recht breite Schienen zu verwenden, die auf die Dorsal- und Volarfläche aufgelegt, jede Berührung des Vorderarmes selbst mit der circulären Binde verhüten. Die Schienen selbst können aus Holz, Pappe oder Kautschuk be-

stehen. Relativ am einfachsten und doch durchaus zweckentsprechend ist der *Middeldorpf*'sche Pressschienenverband. Derselbe besteht aus zwei gepolsterten, vorher in heissem Wasser geschmeidig gemachten, dünnen Ahornfournieren, die auf die Dorsal- und Volarseite aufgelegt und mittelst zweier Heftpflasterstreifen befestigt werden (Fig. 180). Sie lassen die Fracturstelle dem Auge zugänglich und können leicht loser und fester angezogen werden.

Fig. 180.



Will man Gyps anwenden, so ist eine *Beely*'sche Gypshanfschiene mehr zu empfehlen als ein circulärer Gypsverband. Mit diesem muss man überhaupt recht vorsichtig sein. Jedenfalls darf man ihn bei irgendwie erheblicher Schwellung nicht anwenden. Die Gefahren, welche dem circulären Gypsverbande anhaften, haben schon manchen Arzt vor das Gericht gebracht. Wir müssen dieselben daher zur Warnung etwas näher besprechen. Durch einen zu festsitzenden derartigen Contentivverband können die an und für sich schon oberflächlich liegenden und vielleicht schon durch die Fragmente gedrückten Gefässe noch mehr comprimirt, dadurch aber thrombosirt werden, so dass es zu einer Gangrän der Hand und nachträglich zur Amputation kommt. Ist aber der schliessliche Ausgang kein so schlimmer, so kann doch eine dauernde Unbrauchbarkeit des Armes entstehen dadurch, dass die Blutleere in den comprimirten Gefässen zu einer sog. ischämischen Muskelentzündung, d. h. einem rapiden Zerfall der contractilen Substanz und Infiltration des Muskelgewebes mit Rundzellen, führt. In Folge der Circulationsunterbrechung und der Degeneration der Muskeln schwellen, sobald sich eine solche Affection unter dem Verband entwickelt, die Finger schon nach wenigen Stunden stark an, nehmen alsbald eine starke Flexionsstellung ein und sind ebenso wie der ganze Vorderarm der Sitz heftiger Schmerzen. Wenn man dann den Verband abnimmt, so fühlen sich die Muskeln bretthart an, während der Kranke nicht im Stande ist, auch nur die geringste Bewegung auszuführen. Jetzt kann es noch bei einer

blossen Bewegungsbeschränkung der Finger bleiben. Hatte man den Verband jedoch nicht sofort abgenommen, so schwillt der Arm in Folge der entzündlichen Infiltration der Gewebe in den nächsten Tagen bedeutend an. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu einer narbigen Schrumpfung der Muskeln. Dieselben verlieren vollständig ihre elektrische Erregbarkeit und werden bald so verkürzt, dass nie mehr oder sehr schwer zu beseitigende Contracturstellungen der Hand und der Finger resultiren. Diese sog. Klauenstellung der Finger kann so hochgradig werden, dass sich die Fingernägel in das Fleisch der Hohlhand einbohren und alle Versuche zur Geraderichtung derselben erfolglos bleiben.

Soll der Gypsverband also seinen Zweck erfüllen, so muss er gut gepolstert und öfters revidirt werden. In jedem Fall muss er von der Mitte des Oberarmes bis zum Ansatze der Finger reichen und bei nur einigermassen heftigen Schmerzen abgenommen werden.

Empfehlenswerth ist auch die *Bardenheuer*'sche Federextensionsschiene. Dieselbe extendirt bei fehlender Dislocation den supinirten Arm einfach fingerwärts. Bei bestehender Winkelstellung werden die Fragmente durch passend eingeschaltete Brücken in ihre richtige Lage gebracht und in dieser eventuell noch durch rotirende Extension festgehalten.

Welchen Verband man auch anwendet, stets soll derselbe nach 3—4 Wochen zeitweise abgenommen werden, um so frühzeitig als möglich eine kunstgerechte Massage sowie die Ausführung activer und passiver Bewegungen zu ermöglichen.

B. Brüche der Ulna.

Wir unterscheiden an der Ulna Brüche des Körpers und der Fortsätze: des Olecranon und des Proc. coronoideus.

a) Brüche des Olecranon.

Das Olecranon besitzt ein festes Knochengefüge, das besonders auf seiner oberen Fläche entwickelt ist und sich hier zu einer Tuberositas gestaltet. Dieser Höcker ist relativ breit, geht aber dann ziemlich rasch in eine etwas nach einwärts gekrümmte Spitze über. Auf der inneren Fläche des Olecranon befindet sich die Cavitas sigmoidea, die Gelenkgrube der Ulna. Diese zeigt in ihrer Mitte einen von der Olecranonspitze zum Kronenfortsatz verlaufenden senkrechten First und fällt von diesem nach beiden Seiten hin ab. Sie wird ferner halbirt von einer leichten queren Ein-

schnürung oder manchmal auch von einem förmlichen Einschnitte, welcher dann die Grenze gegen den Proc. coronoideus bildet und der früheren Epiphysenlinie entspricht. An dem vorher genannten Höcker inserirt mit einer derben Sehne der M. triceps, und ebenso erstrecken sich von beiden Seiten dieser selbst sehnige Fasern zur Gelenkkapsel und zur Fascie des Vorderarmes. Zwischen der Sehne des Triceps und der Tuberositas olecrani liegt gewöhnlich ein accessorischer Schleimbeutel.

Trotz seiner oberflächlichen Lage sind Fracturen des Olecranon doch im Ganzen seltenere Verletzungen, betragen sie doch nur etwa 1,2 % aller überhaupt vorkommenden Brüche.


Sie entstehen in der überaus grossen Mehrzahl der Fälle durch eine directe Gewalt, so einen Stoss, Schlag oder Fall auf die Rückseite des Ellenbogens, während der Unterarm rechtwinklig gebeugt ist. Viel seltener trägt eine Hyperextensionsbewegung des Gelenkes beim Fall auf die Hand die Schuld. Dabei stemmt sich die Spitze des Olecranon gegen die Fossa supratrochlearis posterior und findet hier, während der Condylus humeri und die Gelenkkapsel Stand halten, einen solchen Widerstand, dass der Fortsatz selbst abgeknickt wird. Fracturen allein durch Muskelzug, d. h. durch kräftige Contraction des Triceps z. B beim Fortschleudern von Gegenständen, sind schon beobachtet worden, sind aber sehr selten.

Der Bruch betrifft alsdann meist die Spitze des Fortsatzes und zwar nur eine dünne Corticalschicht, die an der Tricepssehne haften bleibt. Im übrigen verlaufen die Brüche in der Regel quer oder leicht schräg. Seltener sind Längs-, wieder häufiger Splitterbrüche. Nächst der Spitze betreffen sie vorzugsweise die Mitte oder die Basis des Fortsatzes. In der Mitte sitzen sie gerne dort, wo sich die vorher beschriebene, der früheren Epiphysenlinie entsprechende Einschnürung befindet. An der Basis zieht die Bruchlinie gewöhnlich schräg von vorne nach hinten und unten, so dass nicht nur der ganze Fortsatz, sondern auch ein Theil des Ulnarschaftes mit abgesprengt ist.

Sehr häufig sind die Brüche complicirte. Das Gelenk kann dabei direct durch die Gewalt eröffnet sein oder die Complication erst dadurch entstehen, dass die bei der Verletzung stark gequetschte Haut secundär gangränös wird. Stets ist in dem Gelenk ein Bluterguss vorhanden. Derselbe hat oft eine eigenthümlich rundlich ovale Abgrenzung, wenn sich das Blut in den Schleimbeutel unter der Tricepssehne ergossen hat.

Die Dislocation des abgebrochenen Fragmentes hängt ab von dem Verhalten des Periostes, der Tricepssehne und den von dieser zu der Gelenkkapsel hin verlaufenden sehnigen Fasern. Sind diese Weichtheile intact oder nur theilweise zerrissen, so bleiben die beideu Bruchenden soweit in Contact, dass eine Diastase derselben kaum mit dem Fingernagel durch die Haut hindurch entdeckt werden kann. Sind sie aber vollständig getrennt, dann kommt an dem oberen Fragment die elastische Retraction des Triceps zur Geltung. Diese äussert sich aber darin, dass das Fragment nach oben und meist auch etwas nach innen an der Hinterfläche des Oberarmes in die Höhe rückt, so dass eine Entfernung der Bruchflächen von einander bis zu 5 cm entstehen kann (Fig. 181). Diese Diastase der Fragmente wird durch Beugung des Gelenkes vermehrt, durch Streckung desselben vermindert. Sie

Fig. 181.



wird zuweilen erst durch unvorsichtige Bewegungen mit dem Gelenke hervorgerufen, indem durch solche die bis dahin die Bruchenden zusammenhaltenden, noch unverletzten Sehnenfasern zerrissen werden.

Dass die Fractura olecrani die Begleiterin einer Luxation beider Vorderarmknochen nach hinten oder eines Bruches des Proc. cubitalis sein kann, ist früher schon erwähnt worden.

Die **Symptome** des Olecranonbruches sind meist deutlich ausgesprochen. Das Ellenbogengelenk ist in Folge des intraarticulären

Blutergusses und der gewöhnlich starken Quetschung der Weichtheile in der Regel Sitz einer starken Geschwulst und zeigt in seiner bedeckenden Haut mannigfache Suffusionen. Der Arm steht meist in halber Beugung. Der Vorderarm ist der Schwere folgend in diese Stellung gesunken. Active Streckung ist unmöglich, passiv lässt sich dagegen der Arm beugen und strecken. Es tritt bei solchen Versuchen allerdings heftiger Schmerz ein, weil die passive Spannung auf der Streckseite des Gelenkes die Diastase der Bruchflächen zu vermehren trachtet. Bei der Palpation entdeckt man die Bruchlinie, das Klaffen der Fragmente, so dass man oft die Finger zwischen dieselben legen kann, und die abnorme Beweglichkeit des abgebrochenen Stückes, welches trotz der Beugung des Vorderarmes höher und zuweilen auch mehr nach hinten liegt als die beiden Epicondylen. Es könnte dadurch der Verdacht einer Verrenkung des Vorderarmes nach hinten entstehen, es sichert jedoch die Möglichkeit der passiven Beugung und Streckung des Armes sofort die Diagnose. Bei blosser Abreissung der Spitze des Olecranon pflegt das losgelöste Knochenstück so klein zu sein, dass man eine blosse Abreissung der Tricepssehne vermuthen könnte. Bei Brüchen in der Mitte und an der Basis des Fortsatzes kann man durch Extension des Armes, Herabdrängen des in die Höhe gezogenen Fragmentes und Verschiebung desselben von einer Seite zur anderen Crepitation hervorrufen.

Die **Prognose** ist abhängig von der Qualität der Fractur und der Art der Behandlung. Längsfracturen sowie solche Querbrüche, bei denen die beiden Fragmente in gegenseitiger Berührung geblieben sind, heilen durch knöchernen Callus. Besteht jedoch eine Diastase, so ist die knöcherne Heilung die Ausnahme, die Bildung einer Pseudarthrose die Regel. Je nachdem sich nun die Bandmasse zwischen den beiden Fragmenten straffer oder schlaffer entwickelt, wird die Function des Armes sich mehr oder weniger brauchbar wiederherstellen. Es ist ja klar, dass nur vollständig festes, strammes, fibröses Gewebe die Bewegung des Gelenkes annähernd in normalen Grenzen ermöglichen wird, während durch eine schlaffe Zwischensubstanz eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung in der Kraft des Gliedes stattfinden muss.

Die Ursache der mangelnden Callusbildung liegt in solchen Fällen begründet in der zu grossen Entfernung der Bruchflächen von einander und der Schwierigkeit, sie durch geeignete Mittel in dauernder Apposition zu halten. Weniger kommt wohl eine

ebenfalls angeschuldigte schlechte Ernährung des abgebrochenen Stückes oder das Fehlen eines eigentlichen Periostes auf dem Olecranon — dasselbe wird bekanntlich durch die gefässarme Sehneninsertion vertreten — in Betracht.

Trotz der regelmässigen Eröffnung des Gelenkes durch die Fractur sind Ankylosen desselben bei passender Behandlung nicht sehr häufig, sind aber bei complicirten und Splitterbrüchen zuweilen nicht zu vermeiden. Bei letzteren kommt es gar nicht so selten zur Necrose der Fragmente.

Die **Therapie** der Olecranonbrüche hat drei Indicationen zu genügen, nämlich 1) den intraarticulären Bluterguss, 2) die Diastase der Fragmente zu beseitigen und 3) eine Ankylose des Gelenkes zu verhüten.

Was die erste Aufgabe betrifft, so kann der mit der aseptischen Technik vertraute Arzt ohne Gefahr das Gelenk sofort punctiren und so dasselbe direct vom Blute befreien *(Lauenstein)*. Wem jedoch die Asepsis nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist oder wer dieselbe im gegebenen Falle aus irgend einem Grunde nicht anwenden kann, dem rathen wir von der dann gefährlichen Punction ab, zumal da man die Resorption des Extravasates durch Ruhe, Compression des suspendirten Gelenkes mit einer Gummibinde und tägliche Massage ebenfalls im Verlaufe von acht Tagen erreichen kann.

Sei es nun, dass man die Punction wählt oder den letzteren Weg einschlägt, in jedem Falle wird nach Beseitigung des Blutergusses der vorher eingewickelte Arm in gestreckter Stellung auf einer volaren, von der Hand bis zur Achsel reichenden, wohl gepolsterten Schiene oder in einem Gypsverband bandagirt, um so die Reposition und Retention des Fragmentes zu erstreben.

Die Reposition geschieht in der Weise, dass man das nach oben dislocirte Bruchstück mit den Fingern umgreift und nach unten drängt. Dabei muss man verhüten, dass sich die Haut faltet und zwischen die beiden Bruchenden einklemmt.

Es ist nun eine grosse Anzahl von Apparaten und Verbänden angegeben worden, um diesen reponirenden Fingerdruck dauernd zu ersetzen und so das Fragment in seiner richtigen Lage zu erhalten.

Von den Apparaten ist allein die *Malgaigne*'sche Klammer nennenswerth. Aber auch sie ist entbehrlich, da man mittelst einfacher Heftpflasterstreifen gerade so gut zum Ziele kommt.

Das Heftpflaster wird meistens in der Form des *Alcoock*'schen Verbandes empfohlen, bei dem die Streifen nach Art der oberen Touren einer Testudo inversa spiralig um das Fragment herum verlaufen. Da hierbei jedoch eine Compression der Gefässe nicht ausgeschlossen ist, rathen wir lieber, nur einen Streifen und zwar in der Längsrichtung anzulegen. Derselbe wird, nachdem man durch Verziehen der Haut über dem Olecranon dafür Sorge getragen hat, dass keine Hautfalte unter ihm entsteht, auf der Hinterfläche des Oberarmes aufgeklebt, von dessen Mitte abwärts über das Olecranon bis zur Mitte des Vorderarmes geführt und in dieser Stellung entweder durch die obengenannte volare Schiene oder auch durch einen Gypsverband fixirt. Diesen Verband lässt man dann vier bis fünf Wochen, innerhalb welcher sich ein knöcherner Callus entwickelt haben kann, ruhig liegen. Dann entfernt man ihn und giebt nun dem Gelenk, eventuell in Narkose, eine allmählich stärker werdende Beugestellung.

In rechtwinkliger Beugung muss das Gelenk von vorne herein fixirt werden, wenn sich, wie bei complicirten Splitterbrüchen, eine Ankylose ziemlich sicher erwarten lässt, denn ein steifer, gestreckter Arm ist dem Patienten später sehr unbequem, ein rechtwinklig ankylosirter dagegen erlaubt ihm die Functionen des täglichen Lebens in zufriedenstellender Weise auszuführen.

Nach Verlauf von 5–6 Wochen — wenn man nur auf eine straffe Pseudarthrose reflectirt, auch schon früher — ist es, um ein Steifwerden des Gelenkes zu verhindern, nothwendig, mit activen und passiven Bewegungen zu beginnen und sie nicht zu kurze Zeit fortzusetzen. Bei denselben muss man in der ersten Zeit stets das obere Fragment mit den Fingern herunterdrücken, um die gebildete Zwischensubstanz nicht zu zerren.

In der angegebenen Weise erreicht man wohl meist eine knöcherne Consolidation. Um aber eine solche sicher zu erzielen, ist man auch operativ vorgegangen.

Wir meinen hier nicht die von *Dieffenbach* ausgeführte Tenotomie der Tricepssehne und nachherige Exasperation der Bruchenden, sondern die directe Knochennaht der Fragmente. Dieselbe wurde zuerst unter antiseptischen Cautelen ausgeführt von *Lister* und hat sich seitdem auch bei frischen Fracturen vielfach bewährt *(Gigon-Vercoustre)*. Wir würden sie nur empfehlen bei schlaffer, die Brauchbarkeit des Armes sehr schädigender Pseudarthrose nach vorheriger Exstirpation des fibrösen Zwischengewebes und ebenso bei complicirten Fracturen, wenn das Fragment

nicht zu klein ist. Ein solches kleines Stück wird zu leicht necrotisch. Man schneidet es daher lieber gleich heraus und entfernt ebenso am besten sofort stark gesplitterte Fragmente. Wir würden dann nachher, um die Tricepswirkung nicht auszuschalten, die Sehne desselben an dem stehenbleibenden Fragment und den paraarticulären Weichtheilen festnähen.

Selbstverständlich ist bei allen complicirten Fracturen strengste Asepsis.

Neuerdings hat man bei den subcutanen Olecranonfracturen in ähnlicher Weise wie bei den Patellarfracturen die Massagebehandlung eingeführt. So erreichte *Grimm* in einem Falle, in dem die Massage vom 5. Tage nach der Verletzung an begonnen wurde, nach 6 wöchentlicher Behandlung eine feste, kurzbänderige Pseudarthrose mit normaler Beuge- und annähernd normaler Streckfähigkeit. Namentlich von *Kraske-Sachs* wird die Massagebehandlung der subcutanen Olecranonfracturen neuerdings sehr gerühmt und geradezu als Normalverfahren hingestellt. *Kraske* verfährt dazu in folgender Weise. Der verletzte Arm wird die ersten 2—4 Tage eingewickelt und in einer fast gestreckten, dem Kranken möglichst bequemen Stellung auf einer Schiene fixirt. Bei stärkerem Blutextravasat kann man den Arm dann noch suspendiren und über das Gelenk hinweg nicht zu fest eine Gummibinde herüberlegen. Nach 2—4 Tagen, je nach der Empfindlichkeit des Patienten beginnt man mit der Massage, die in Streichen und Kneten der Muskeln besteht. Nach der Massage werden active und passive Bewegungen gemacht, zuerst natürlich wenig ausgiebig und erst allmählich immer mehr zunehmend. Während mit dem Beginne der Massage die Fixation des Gelenkes wegfällt, gestattet man dem in einer Mitella ruhenden Arm schon frühzeitig allerhand kleine Verrichtungen vorzunehmen und erreicht so schon nach kurzer Zeit freie Beweglichkeit des Gelenkes und fast normale oder absolut normale Kraft der Bewegungen. Die Fragmente können dabei entweder knöchern verheilt oder nur straff ligamentös vereinigt sein.

b) Brüche des Processus coronoideus.

Der Proc. coronoideus, der Kronenfortsatz der Ulna, umgreift hakenförmig die Trochlea des Humerus. Seine freie, in den Gelenkraum hineinsehende Spitze ist relativ lang und dünn. Seine Basis, welche dem Schafte der Ulna breit aufsitzt, hat etwa die Form einer vierseitigen Pyramide. Auf seiner vorderen Fläche

verlaufen zwei Knochenfirste nach abwärts convergirend zur Tuberositas ulnae.


Der ganze Fortsatz wird von den zwei Seitenbändern des Ellenbogengelenkes umfasst, indem das Lig. laterale internum sich breit an seiner inneren Seite inserirt, das Lig. laterale externum dagegen durch seine Verschmelzung mit dem Ringbande des Radius indirect mit ihm in Verbindung steht.

An der vorderen Fläche des Proc. coronoideus und zwar an den vorher beschriebenen Knochenfirsten setzt sich der Musc. brachialis internus an, indem er gleichzeitig noch einige Sehnenbündel nach abwärts zur Tuberositas ulnae hinsendet.

Isolirte Brüche des Proc. coronoideus sind nun sehr selten. Es existiren in der Litteratur kaum zwanzig zweifellose Beobachtungen. Häufiger findet man sie, wie das an der betreffenden Stelle schon erwähnt ist, als Begleiterin der Luxation beider Vorderarmknochen nach hinten.

Der Bruch kann an der Spitze oder an der Basis erfolgen. Im ersteren Falle verläuft er entweder quer oder entlang dem inneren oder äusseren Rande der Spitze und kann sich dabei bis in den Bereich des inneren Seitenbandes oder des Ringbandes erstrecken. Es handelt sich entweder um einfache Fissuren oder vollständige Continuitätstrennungen. Bei diesen letzteren kann das Bruchstück noch an der Kapsel hängen oder ganz abgesprengt sein und lose im Gelenke liegen. An der Basis sind entweder nur die oberflächlichen Corticallamellen abgerissen oder der ganze Fortsatz abgesprengt (Fig. 182). Vor der vollständigen, erst mit dem 16. Lebensjahr beendeten, von dem Schafte der Ulna aus erfolgenden Verknöcherung des Fortsatzes könnte man wohl auch von einem Epiphysenbruch sprechen. Stets ist in dem Gelenk ein Bluterguss vorhanden.

Fig. 182.



Die **Ursache** der Fractur ist selten eine directe Gewalt. In dieser Weisse kann ein Schuss wirken, doch sind dann stets noch anderweitige Verletzungen vorhanden, neben denen die Fractur

nur von untergeordneter Bedeutung ist. Ebenso sind Fracturen, entstanden durch kräftige Contractionen des Brachialis internus sehr selten. Dieselben können nach dem oben Gesagten niemals die Spitze betreffen; und es kann ebenso wenig der Brachialis internus das abgerissene Stück von dem unteren entfernen, es müssten denn auch die Sehnenbündel desselben, die zur Tuberositas ulnae hinziehen, mit abgelöst sein. Die weitaus häufigste Veranlassung war in den vorliegenden Fällen eine indirecte Gewalt. Dabei haben wir drei Entstehungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Meistens war die Fractur durch Auffallen auf die Kleinfingerseite der Hand bei mässig gestrecktem Vorderarm entstanden. Dabei drängte das in der Achse der Ulna wirkende Körpergewicht den Fortsatz so stark gegen die Trochlea an, dass diese wie ein Keil denselben abquetschte. Andere Male wurde die Spitze des Fortsatzes abgeknickt durch eine starke Beugung des Vorderarmes, indem der Proc. coronoideus sich übermässig in die Fossa intercondyl. ant. humeri anstemmte. Schliesslich kann ebenfalls die Spitze abbrechen durch forcirte Seitenbewegungen des Gelenkes, besonders wenn diese noch durch stärkere Pro- oder Supination unterstützt werden. Sie wird dann entweder an der inneren oder äusseren Kante der Trochlea oder der Eminentia capitata abgedrückt.

In allen Fällen kann sich das Olecranon mit dem Schafte der Ulna nach hinten von der Trochlea abheben, so dass eine Diastase zwischen beiden entsteht. Zu einer vollständigen Luxation kann es nur kommen, wenn auch die Seitenbänder des Gelenkes vollständig eingerissen sind.


Die **Symptome** sind oft wenig markant. Immerhin haben wir, auch wenn in Folge des intraarticulären Blutergusses oder einer starken Contusion der Weichtheile das Gelenk sehr angeschwollen ist, doch eine Reihe von Zeichen, welche die Fractur annähernd sicher diagnosticiren lassen. Im Moment der Verletzung hört und empfindet der Patient ein lautes, höchst schmerzhaftes Krachen. Es stellt sich sofort, besonders in der Ellenbeuge, ein heftiger Schmerz ein. Dieser Schmerz wird bei Betastung der Gegend des Fortsatzes lebhafter und ebenso gesteigert bei activer Beugung des pronirten Vorderarmes, weil in dieser Stellung der Brachialis internus die ganze Arbeit verrichten muss. Die passive Beugung kann dadurch behindert werden, dass sich das abgebrochene Stück in die Plica cubiti einkeilt. Auch die Streckung ist schmerzhaft, weil da-

bei eine Zerrung des oberen Fragmentes statthat. Als besonders charakteristisch wird eine Sugillation angegeben, die sich bald nach der Verletzung in der Ellenbeuge entwickelt. Selten wird es gelingen, unterhalb dieser den abgebrochenen Theil als kleinen, beweglichen, festen Körper durchzufühlen oder gar beim Herunterdrücken desselben Crepitation zu erzeugen. Das Olecranon steht, sobald der Bruch die Basis betrifft, immer etwas mehr nach hinten und bedingt dadurch eine Zunahme des Gelenkdurchmessers von vorn nach hinten. Auch der Radius wird dann meistens eine kleine Verschiebung nach der Trochlea hin erleiden. Sind die beiden Vorderarmknochen vollständig nach hinten verrenkt, so erkennt man den Bruch des Kronenfortsatzes daran, dass sich die Luxation durch den leichtesten Zug einrichten lässt, beim Nachlass des Zuges aber sogleich wiederkehrt.

Die **Prognose** ist im Ganzen günstig zu stellen. Die Heilung der Brüche kann nur dann mit knöchernem Callus erfolgen, wenn dieselben an der Basis sitzen und keine Diastase der Fragmente besteht. In allen anderen Fällen wird sie durch Pseudarthrose stattfinden. Es ist dies jedoch kein Nachtheil, weil die Function des Gelenkes dadurch nicht leidet. Wohl aber würde dies der Fall sein, wenn sich ein intraarticulärer Callus entwickeln würde. Die ligamentöse Verbindung lässt höchstens eine Neigung der Ulna, sich nach hinten zu dislociren, zurück. Ganz ausnahmsweise hat man im Verlauf der Heilung eine Luxation des Radius nach aussen entstehen sehen.

Die **Therapie** kann einen irgend belangreichen Einfluss auf die Anheilung des Fragmentes nicht ausüben, sie soll bloss eine Ankylose des Gelenkes verhindern. Sie erreicht dies am besten dadurch, dass man — event. nach geschehener Einrichtung einer Luxation — in rechtwinkliger oder spitzwinkliger Flexion des Ellenbogengelenkes einen Gyps- oder Schienenverband anlegt, denselben etwa 14 Tage liegen lässt und dann mit vorsichtiger Gymnastik und Massage des Gelenkes beginnt. Selbstverständlich muss das Gelenk nach den ersten Bewegungsversuchen noch für einige Zeit festgestellt werden.

Taf. 16



Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

c) Brüche im oberen Drittel der Ulna, complicirt mit Luxation des Radius.

Die Fracturen der Ulna im oberen Drittel kommen für sich allein ausserordentlich selten vor. Meist ist gleichzeitig das Radiusköpfchen luxirt, und es gilt daher die practische Regel, bei allen Fracturen im oberen Drittel der Ulna stets auch die Lage des Radiusköpfchens zu untersuchen.

Die Combination dieser beiden Verletzungen ist so regelmässig und ihre Erkenntniss für die spätere Gebrauchsfähigkeit des Armes so wichtig, dass wir ihr einen besonderen Abschnitt widmen wollen.

Die Verletzung ist an und für sich nicht so häufig. Nach einer sorgfältigen Arbeit von *Stanaulescu* wurde sie bisher 18 mal beschrieben. Sie kommt bei Kindern und Erwachsenen vor und kann, wie klinische Ergebnisse und experimentelle Untersuchungen von *Grenier* und *Dörffler* dargethan haben, durch einen zweifachen Mechanismus entstehen. Einmal kann eine directe Gewalt, wie ein Hufschlag, Ueberfahren, Fallen gegen feste Körper, ein Schuss oder Stockschlag die Ulna in ihrem oberen Drittel brechen und dann noch fortwirkend den Radius luxiren. Das ist die häufigste Entstehungsart. Zweitens kann die Ulna wieder durch directe Gewalt brechen, der Radius aber durch eine indirecte luxirt werden. In dieser Weise wird ein Fall auf die vorgestreckte Hand nach vorhergegangenem Anstossen des Armes gegen einen festen Körper wirken. Nehmen wir z. B. an, dass der Patient eine Treppe hinabstürzt, so kann er zunächst mit der ulnaren Seite seines Vorderarmes gegen eine Treppenstufe anstossen und dadurch die Ulna brechen. Sucht er sich nun mit der vorgestreckten Hand zu stützen, so kann er noch durch die Wucht des Körpergewichtes und das gleichzeitige Andrängen der dislocirten Ulnafragmente gegen den Radius die Luxation dieses letzteren acquiriren.

Die Fractur der Ulna liegt gewöhnlich im oberen oder an der Grenze des oberen und mittleren Drittels. Die Bruchrichtung ist eine leicht schräge, die Dislocation der Fragmente eine verschiedene. Das untere bleibt meist parallel zum Radius liegen. Das obere weicht dagegen gewöhnlich volarwärts (Taf. XVI), selten dorsalwärts ab. Sie sind dabei stets in der Längsrichtung an einander verschoben, so dass eine Verkürzung um mehrere Centimeter entsteht.

Das Radiusköpfchen ist, je nachdem die Gewalt von hinten, innen oder vorn eingewirkt hatte, nach vorn, aussen oder hinten luxirt und nimmt dann die gleiche Stellung ein, die wir für die isolirte Luxation kennen gelernt haben. Als Complication findet man gar nicht selten eine Zerreissung der bedeckenden Weichtheile, weiterhin aber gelegentlich auch eine Dehnung oder Zerreissung des Nervus radialis, eine Subluxation des Proc. styloideus ulnae und einen Bruch des Epicondylus oder Condylus externus humeri.

Die **Symptome** dieser Verletzung sind sehr charakteristisch (Taf. XVI), können jedoch durch eine starke Anschwellung der Gelenkgegend verdeckt werden. Neben dem gewöhnlichen Fracturschmerz finden wir zunächst eine Behinderung in der Function des Vorderarmes. Derselbe steht gewöhnlich halb gebeugt und in mittlerer Pronation. Pronation und Streckung desselben gehen frei von Statten, Supination schon weniger, Beugung aber über einen rechten Winkel hinaus ist unmöglich. Die Inspection ergiebt eine sofort in die Augen fallende Verkürzung des kranken Armes gegen den gesunden und lässt am Ellenbogengelenk nach vorn aussen oder hinten eine deutliche Vorwölbung erkennen, hervorgebracht durch das dislocirte Radiusköpfchen. Der Umfang des kranken Ellenbogengelenkes ist gegen den des gesunden um $2^1/_2$—4 cm vergrössert. An seiner hinteren Seite zeigen sich drei gewöhnlich in einer gleichen horizontalen Linie liegende Knochenvorsprünge, gebildet vom Radiusköpfchen, Epicondylus externus humeri und Olecranon. Ueber der Fracturstelle sind die Weichtheile deprimirt. Verbindet man diese eingezogene Stelle mit den Endpunkten der eben genannten Horizontalen, so erhält man ein Dreieck, an dessen Spitze die Fractur, an dessen Basis die drei Knochenvorsprünge liegen.

Die Palpation lässt an der Fracturstelle die dislocirten Fragmente und deren abnorme Beweglichkeit fühlen und ergiebt dazu noch Crepitation, die besonders bei Pro- und Supinationsbewegung hervortritt. Durch letztere kann man ebenfalls das prominirende Radiusköpfchen erkennen. War der Nervus radialis verletzt, so findet man dann schliesslich noch eine Lähmung der von ihm versorgten Strecker.

Die **Prognose** ist bei rechtzeitiger und richtiger Behandlung eine ganz günstige. Geschieht dieselbe nicht, so können die Frag-

mente consolidiren, das Radiusköpfchen sich eine Nearthrose bilden und so wird die Function des Armes wieder einigermassen hergestellt werden. Es kann jedoch die knöcherne Vereinigung des Bruches ausbleiben. Dann wird der Arm ganz unbrauchbar, da die belastete Hand nirgends eine genügende Stütze findet. Das Gleiche ist der Fall bei einer Radialislähmung. Schliesslich kann sich noch bei alten Leuten in dem Gelenk eine Arthritis deformans entwickeln.

Die Therapie der frischen Verletzung bewirkt zunächst die Reposition der Luxation. Dieselbe geschieht durch kräftige Extension am gestreckten Vorderarm und nachherige Beugung desselben, verbunden mit einer gleichzeitigen Impulsion des Köpfchens an seine richtige Stelle. Nun bringt man die Bruchfragmente in ihre richtige Lage und fixirt dann zur Retention des Ganzen den spitzwinklig gebeugten und in halber Supinationsstellung stehenden Vorderarm in einem Gypsverband. Derselbe bleibt etwa 4—6 Wochen liegen, worauf man, wenn die Consolidation eingetreten ist, mit der Gymnastik und Massage des Gelenkes beginnt.

Hat man es mit einer veralteten Verletzung und starker Functionsstörung des Armes zu thun, so wird man die Reposition versuchen, falls dieselbe aber im Stich lässt, das Radiusköpfchen reseciren und, wenn nöthig, noch die Osteotomie der Ulna hinzufügen *(Helferich-Dörffler)*.

d) Brüche des Ulnaschaftes.

Da soeben die Fracturen im oberen Drittel der Ulna besprochen worden sind, betrachten wir hier die Brüche des mittleren und unteren Drittels.


Dieselben bieten nicht viel Charakteristisches und kommen nicht sehr häufig vor.

Sie entstehen in der überaus grossen Mehrzahl der Fälle durch directe Gewalt, einen Hufschlag, Fall gegen eine Treppenkante insbesondere häufig als sogenannte Parirfracturen in der Weise, dass ein heftiger Schlag den zum Schutze des Kopfes erhobenen Vorderarm auf seinen Ulnarrand trifft. Der Bruch ist dann meist ein querer und sitzt in der Mitte der Ulna oder etwas näher unterhalb dieser. Hier ist der Knochen am dünnsten und am wenigsten von Weichtheilen gedeckt. Ziemlich selten ist ein Fall auf die ausgestreckte volar- oder dorsalflectirte Hand die Veranlassung der Fractur, da sich die Gewalt hierbei eher auf den

Radius fortpflanzt. Es kommen aber solche indirecte Fracturen bei Kindern und bei Erwachsenen vor. Ebenso sollen dieselben gelegentlich durch eine starke Torsion z. B. beim Ausringen der Wäsche entstanden sein, und schliesslich kann auch eine forcirte Supination unvollständige subperiostale Brüche erzeugen. Die Dislocation der Fragmente ist verschieden. Sie fehlt ganz bei subperiostalen Brüchen und ist gering bei noch theilweiser Erhaltung des Periostes. Ist dieses ganz zerrissen, so treibt die einwirkende Gewalt das untere Fragment in der Regel gegen das Spatium interosseum. Später wird dann, während das obere Fragment infolge seiner festen Charnierverbindung im Ellenbogengelenk in seiner normalen Lage bleibt, die Verschiebung des unteren gegen den Radius hin dauernd erhalten durch die elastische Retraction des Musc. pronator quadratus (Taf. XVII).

Eine stärkere Uebereinanderschiebung der Fragmente kann nicht stattfinden, da der intacte Radius, gleichsam wie eine Schiene


Fig. 183.



wirkend, dies verhindert. Wohl aber kann sich eine Dislocatio ad axin ausbilden, wie z. B. in dem nebenstehenden Fall eine stumpfwinklige Knickung der Fragmente nach der Dorsalseite hin stattfand (Fig. 183).

Fracturen des Proc. styloideus ulnae werden wir als Begleiterinnen der typischen Radiusfractur bei Besprechung dieser kennen lernen. Isolirt kommen sie nur äusserst selten vor, so durch die Einwirkung eines kantigen Körpers. Man findet dann das abgebrochene Stück nach der Richtung der Gewalt hin dislocirt.

Sehr häufig handelt es sich bei höher liegenden Brüchen um complicirte. Es ist dies bei der oberflächlichen Lage der hinteren



Ulnarkante nicht wunderbar. Die Weichtheile werden besonders oft auch von innen nach aussen durchstossen.

Die **Symptome** dieser Brüche sind derart, dass die Diagnose wohl keinem Zweifel unterliegen kann. Wenn keine Dislocation besteht, so haben wir den localen Schmerz, die Anschwellung und den Bluterguss dort selbst, weiterhin Crepitation und abnorme Beweglichkeit. Man fühlt diese letzteren, indem man die Ulnarkante abtastend an die Bruchstelle gelangt, nun zu beiden Seiten derselben die Ulna umfasst und die Fragmente in entgegengesetzter Richtung an einander verschiebt. Man kann auch wohl bloss die Daumen auf beiden Seiten der schmerzhaften Stelle aufsetzen und abwechselnd gegen die Fragmente drücken. Haben sich die Fragmente verschoben, so entdeckt man die Deformität durch die winklige Knickung der Achse (Fig. 183) oder die Depression der Haut über dem radialwärts getriebenen unteren Fragment durch die einfache Inspection (Taf. XVII). Sind aber die äusseren Contouren durch starke Schwellung verwischt, so kann man doch durch Palpation den unregelmässigen Stand der Bruchenden erkennen, muss aber dabei oft energisch in die Tiefe greifen.

Die **Prognose** der Verletzung ist im Ganzen eine günstige. Die Heilung erfolgt durch knöchernen Callus. Selten sind Pseudarthrosen oder Störungen der Pro- und Supination durch Consolidation der Fragmente in ihrer falschen Stellung. Bei der Fractur des Proc. styloideus bleibt zuweilen die Callusbildung aus, weil das Periost desselben durch das gefässlose Gewebe des Lig. laterale ulnare vertreten ist. Es bildet sich dann nur ein fibröses Gewebe, welches sich zwischen die Bruchflächen einlagert.

Die **Therapie** hat zunächst die Reposition der Fragmente zu besorgen. Es geschieht dies durch Extension am Handgelenk, Contraextension am Oberarm und directes Zurechtdrücken der Bruchenden in ihre normale Lage. Es ist dies letztere oft schwer, und muss man namentlich tief in das Spatium interosseum hereindrücken, um das untere Fragment aus demselben herauszudrängen. Sind die Schmerzen dabei zu heftig, so nimmt man am besten die Narcose zu Hülfe.

Ist der Bruch eingerichtet, so stellt man die Hand in halbe Supination und besorgt die Retention wie bei den Brüchen? beider Vorderarmknochen, am einfachsten durch einen Pressschienenverband. Bei isolirten Brüchen des Proc. styloideus reponirt man das Fragment, befestigt es mit einem Heftpflaster-

streifen, legt die Hand und den Vorderarm in eine Schiene und beide in eine Mitella, welche, um nicht auf das Fragment zu drücken, stets bis über die Finger reichen muss.


C. Brüche des Radius.

Am Radius haben wir Brüche des Köpfchens, des Halses, des Schaftes und des unteren Endes zu besprechen.

a) Brüche des Radiusköpfchens.

Das Radiusköpfchen hat die Form einer runden Scheibe, welche ringsum von einem glatten, breiten Rand, Circumferentia articularis, umgeben ist. Seine obere Fläche articulirt mittelst einer tellerförmigen Vertiefung mit der Eminentia capitata humeri. Diese Gelenkfläche liegt nicht horizontal, sondern fällt nach innen ab, indem die äussere Peripherie des Gelenkrandes etwas höher entwickelt ist. Nach unten geht das Köpfchen in den Hals des Radius über. Seinen vorderen Rand umschlingt gerade die Theilungsstelle des Nervus radialis. Die Epiphysenfuge zwischen Köpfchen und Schaft des Radius erhält sich bis zum 17. oder 18. Lebensjahr (Fig. 184). Das Radiusköpfchen wird vollständig von der Gelenkkapsel umgeben, da diese sich ja am Halse des Radius unterhalb des Ringbandes ansetzt.

Fig. 184.




Die Fractur des Radiusköpfchens ist also eine rein intraarticuläre. Sie ist entweder eine unvollständige oder vollständige und stellt sich in der Weise dar, dass eine längs oder schräg verlaufende Bruchspalte ein Segment des Köpfchens abtrennt.

Bei der **unvollständigen** Fractur, der sogenannten Fissur des Radiusköpfchens, durchsetzt die Bruchspalte die tellerförmige Grube bald mehr nach der Peripherie, bald mehr nach dem Centrum derselben zu und dringt in verticaler Richtung bis zur Grenze des


Radiushalses vor (Fig. 185). Sie trennt also die Pfanne in zwei Theile, welche an ihrer Basis noch in knöchernem Zusammenhange mit dem Halse bleiben. Es kommen auch mehrfache Fissuren vor, so T-förmige, welche die Gelenkfläche in drei Theile theilen. Die Bruchflächen befinden sich bald in genauer Berührung, bald besteht starkes Klaffen derselben durch Divergenz des abgebrochenen Stückes.

Fig. 185.



Bei der **vollständigen** Fractur wird ein grösseres oder kleineres Segment des Köpfchens in der Regel von dessen vorderem, selten von seinem hinteren oder äusseren Umfange vollständig abgesprengt (Fig. 186). Nur selten ist das Köpfchen in mehrere Fragmente zertrümmert. Das losgebrochene Stück hängt entweder noch an einem Streifen der Kapsel fest oder liegt frei in dem Gelenk. Wenn sich die Bruchlinie noch theilweise in den Radiushals hineinerstreckt, so liegt sie theilweise extracapsulär. Dann kann ebenfalls das gabelförmige Klaffen der Fragmente durch das den Hals umgreifende Ringband verhütet oder nur eine geringe Verschiebung des abgebrochenen Stückes nach unten und aussen zugelassen werden.

Fig. 186.



Der Bruch des Radiusköpfchens tritt entweder selbständig für sich in die Erscheinung oder kommt als Complication anderer Verletzungen des Ellenbogengelenkes vor. Von diesen sind zu nennen vor allem Fracturen des Proc. coronoideus ulnae, dann des Condylus externus humeri, des Olecranon, des Collum radii und Luxationen beider Vorderarmknochen nach hinten. Dass Absprengungen des Gelenkrandes das Zustandekommen der Luxation des Radiusköpfchens selbst begünstigen können, haben wir bei dieser schon erwähnt.

Die **Ursache** des Bruches ist entweder eine d i r e c t e Gewalt, die das Köpfchen von hinten und aussen trifft, ein Stoss Schlag oder Schuss, entschieden häufiger aber eine i n d i r e c t e Gewalt. So ist die gewöhnlichste Veranlassung ein Fall auf die Hohlhand bei extendirtem und pronirtem Vorderarm. In dieser Stellung berührt nur der vordere Theil des Radiusköpfchens die Eminentia capitata humeri und wird bei gewaltsamem Anprall

gegen dieselbe von dieser abgedrückt oder abgequetscht. Wir haben es also mit einer sogenannten Meisselfractur zu thun. Wenn der Stoss das Ellenbogengelenk gleichzeitig radialwärts abknickte, so betrifft der Bruch mehr die äussere Peripherie des Köpfchens, wenn dies letztere gegen die Gelenkfläche der Ulna gepresst wird, seinen inneren Rand. Auch ein Fall auf den flectirten Ellenbogen kann den Bruch erzeugen. Es handelt sich hier ebenfalls um eine Abquetschung, indem ja in dieser Stellung des Gelenkes die beiden Gelenkflächen sich vollständig berühren.

Bei forcirter Pronation entstehen bei Kindern zuweilen Lösungen der Epiphyse zwischen Köpfchen und Schaft.

Die **Symptome** der Fractur können durch die bald eintretende Schwellung des Gelenkes verdeckt werden, so dass die Diagnose schwierig sein kann. Man wird sie aber zu stellen vermögen, wenn man die Art der Gewalteinwirkung berücksichtigt und sich an das Vorkommen der Fractur erinnert. Nehmen wir einen typischen Fall derselben an, so bildet sich bald nach der Verletzung neben einer Anschwellung der bezüglichen Gelenkgegend ein heftiger Schmerz am Ellenbogen aus. Dieser Schmerz wird bei Druck auf das Radiusköpfchen äusserst heftig. Palpirt man das letztere, so wird man es bei unvollständiger Fractur mit stark klaffender Bruchspalte vergrössert und abnorm prominirend finden, so dass selbst eine unvollständige Luxation vorgetäuscht werden könnte. Bei einer vollständigen Fractur wird man dagegen das abgebrochene Segment als ganz beweglichen Knochentheil fühlen und ausserdem bei Druck auf dasselbe und gleichzeitiger Pro- und Supinationsbewegung des Vorderarmes Crepitation hervorbringen können. Intelligente Patienten geben dabei auf das Bestimmteste an, selbst das Reiben deutlich wahrzunehmen. Das Radiusköpfchen bewegt sich bei den Rotationen des Vorderarmes mit, oft allerdings nur mit geringerer Excursion als auf der gesunden Seite. Wenn der tiefe Ast des Nervus radialis, der, wie vorher erwähnt, über die Vorderfläche des Köpfchens wegläuft, durch das dislocirte Fragment gedrückt oder gezerrt wird, so können zu den genannten Symptomen noch die der Lähmung dieses Nerven hinzutreten. Die Finger stehen dann in mittlerer Beugestellung, der Daumen adducirt flectirt, und beide können nicht extendirt und der letztere auch nicht abducirt werden, während die Bewegungen des Handgelenkes vollständig frei sind. In den Streckmuskeln fehlt dazu noch jede elektrische Erregbarkeit.

Die **Prognose** der Verletzung ist im Ganzen eine günstige. Die Heilung erfolgt entweder durch knöchernen Callus, wobei allerdings die Dislocation meist bestehen bleibt und zuweilen auch eine Verwachsung des Bruchstückes mit dem Proc. coronoideus stattfindet. Das abgebrochene Stück kann sich aber auch in einen freien Gelenkkörper umwandeln, und schliesslich kann sich eine sogenannte isolirte Vernarbung beider Fragmente einstellen, indem dieselben durch Resorption eine gleichmässige Oberfläche erhalten, sich mit compacter Substanz überziehen und sich gegenseitig an einander abschleifen. Die Function des Gelenkes leidet in der Regel nicht, ebenso bilden sich die nervösen Störungen im Lauf der Zeit bei passender Behandlung zurück.

Die **Therapie** besteht im Anlegen eines Contentivverbandes, welcher in rechtwinkliger Beugung des Gelenkes und Mittelstellung der Hand zwischen Pro- und Supination von der Mitte des Oberarmes bis zum Fingeransatz reicht. Derselbe bleibt 3—4 Wochen liegen, wonach die Gymnastik und Massage des Gelenkes, eventuell die electro-therapeutischen Massnahmen folgen. Freie Gelenkkörper muss man durch Arthrotomie des Gelenkes entfernen. Sollten durch abnorme Verdickungen des Radiusköpfchens starke Functionsbehinderungen des Gelenkes eintreten, so würde man das Köpfchen am besten reseciren.

b) Brüche des Radiushalses.

Als Hals des Radius bezeichnet man den cylindrischen Theil des Knochens, welcher oben das Köpfchen trägt und unten durch die Tuberositas radii begrenzt ist.

Fracturen in diesem Theil, der durch starke Muskeln, besonders die Mm. supinatores und Mm. extensores carpi radiales bedeckt und geschützt wird, sind ziemlich selten. Sie können eine Luxation im Ellenbogengelenke oder einen Bruch des Proc. coronoideus begleiten, kommen aber auch für sich vor.

Die Ursache ist dann nicht sowohl eine indirecte Gewalt, wie z. B. eine forcirte Pronation, als besonders eine directe und zwar bedeutende Gewalt, so ein kräftiger Stockschlag oder ein Auffallen der Radialseite des Vorderarmes gegen einen kantigen Körper.

Bei jüngeren Individuen handelt es sich in der Regel um eine Epiphysentrennung.

Ist die Fractur eine vollständige, so wird das u n t e r e B r u c h e n d e d u r c h d e n B i c e p s n a c h v o r n u n d o b e n

gezogen. Zugleich kann dabei eine Luxation der Ulna nach hinten entstanden sein.

Die **Symptome** werden wie bei der Fractur des Radiusköpfchens in dem localen Schmerz, Druckempfindlichkeit, Anschwellung und Crepitation bestehen. Bei der Prüfung auf abnorme Beweglichkeit wird man fühlen, dass das Radiusköpfchen bei Pro- und Supination den Bewegungen der Hand nicht folgt. Schliesslich wird man an der Vorderseite des Ellenbogengelenkes eine knöcherne Hervorragung finden. Der Vorderarm steht in Pronation und hat die Fähigkeit zu stärkerer Pro- und Supination verloren.

Die **Prognose** ist günstig, da trotz der oft bedeutenden Weichtheilverletzung die Heilung anstandslos vor sich geht.

Die **Therapie** besteht wie bei den Fracturen des Radiusköpfchens in Anlegung eines Contentivverbandes, während man vermittelst eines Polsters und Bindenzügels das nach vorn gewichene untere Fragment nach hinten und aussen drängt.


c) Brüche des Radiusschaftes.

Die Fracturen des Radiusschaftes sind trotz der exponirten Stellung des Knochens an der Aussenseite des Unterarmes im Ganzen selten. So wurden sie z. B. von *Hamilton* unter 109 Radiusbrüchen nur 5 mal, von *Falkson* unter 155 nur 4 mal beobachtet.

Sie entstehen entweder durch directe Gewalt und verlaufen dann in querer Richtung oder kommen als leichte Schrägbrüche auf indirectem Wege zu Stande. Im letzteren Fall muss die Gewalt von beiden Enden des Radius her denselben übermässig zu biegen suchen, bis der Elasticitätscoëffizient überwunden wird. So wirkt z. B. ein Fall auf die Hand, wobei die Körperlast die auf das obere Radiusende wirkende Kraft vorstellt. Auch Spiralfracturen kommen vor und zwar durch forcirte Pronation, indem die oberen und unteren Band- und Kapselverbindungen, die ja die Pronation hemmen, hinlängliche Widerstandsfähigkeit besitzen. Die gewaltsame pronirende Bewegung dreht dabei den an seinen beiden Gelenkenden fixirten Radius gewissermassen auseinander.

Der Bruch selbst kann entweder über oder unter der Insertion des Pronator teres sitzen.

Taf. 18.



Hoffa Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

Im ersteren Fall wird das obere Fragment durch die Mm. biceps und supinator brevis vollständig supinirt und durch den Biceps zu gleicher Zeit nach vorn gezogen, d. h. gegen das Ellenbogengelenk flectirt. Das untere Fragment dagegen wird durch die Mm. pronator teres und quadratus in vollständige Pronation gestellt und gleichzeitig nach der Ulna hin dislocirt. Es tritt also eine hochgradige Verschiebung der Fragmente ein, ohne dass eine bedeutende Deformität vorhanden ist.

Sitzt die Fractur unterhalb des Pronator teres, so kann die einwirkende Gewalt die beiden Fragmente in einen dorsal- oder volar offenen Winkel zu einander stellen und sie gleichzeitig seitlich an einander verschieben. Wir haben jedoch sehr oft eine typische Dislocation und zwar dann, wenn nach vollständiger Zerreissung der den Knochen unmittelbar deckenden Weichtheile die Muskelwirkung zur Geltung kommt.

Das obere Fragment stellt sich dann, da der supinirenden Wirkung des Biceps und Supinator brevis durch den Pronator teres das Gleichgewicht gehalten wird, in Mittelstellung zwischen Pronation und Supination. Auch das untere Fragment stellt sich nicht in so starke Pronation, wie bei den oben beschriebenen Brüchen, da jetzt allein der Pronator quadratus wirkt. Es wird dagegen durch diesen Muskel gegen das Spatium interosseum gezogen und noch mehr gegen die Ulna hin dislocirt durch den Supinator longus, der durch einen Zug am Proc. styloideus nach aussen sein oberes Ende nach innen drängen muss. (Tafel XVIII).

Die **Symptome** dieser Fracturen sind so deutlich ausgesprochen, dass die Diagnose keinem Zweifel unterliegen kann. Wir finden Schmerz, Schwellung, die oben beschriebene Deformität, Crepitation, abnorme Beweglichkeit, die letzteren beiden beim Auflegen der Finger auf die Bruchstelle und Ausführung passiver Pro- und Supinationsbewegungen. Activ sind diese unmöglich, überhaupt der Arm nicht mehr brauchbar. Durch die Verschiebung des unteren Bruchstückes wird eine veränderte Richtung des Handgelenkes bedingt, welche um so auffälliger ist, je tiefer unten der Bruch seinen Sitz hat. Während das Handgelenk nämlich im normalen Zustand an der Radialseite tiefer steht als an der Ulnarseite, nähert es sich nun der horizontalen Richtung, wodurch zugleich ein abnormes Hervorragen des Capitulum ulnae entsteht *(Bardeleben)*.

Bezüglich der **Prognose** und **Therapie** gilt im Wesentlichen das bei den Brüchen beider Vorderarmknochen Gesagte. Es muss

vermieden werden, dass die Heilung in der vorgenannten Stellung der Fragmente stattfindet, weil sonst die Supination unmöglich wird. Die Hand soll also in Supination gestellt und der Arm so durch einen Pressschienenverband, einen Gypsverband oder eine Gypshanfschiene fixirt werden.

d) Brüche des unteren Radiusendes, Fractura radii loco classico.

Die Anatomie des unteren Radiusendes haben wir schon Seite 322 besprochen. Hier wollen wir nur noch einmal daran erinnern, dass die compacte Substanz der Diaphyse etwa 2 cm oberhalb der Gelenklinie in die schwammige, wenig widerstandsfähige Epiphyse übergeht. Diese letztere dient zum Ansatz des die Handwurzelknochen an ihrer volaren Seite zusammenhaltenden sehr starken Lig. carpi volare proprium und ebenso des die gleiche Function auf der Dorsalseite verrichtenden Lig. carpi dorsale. Die Gelenkfläche des Radius, die nicht gerade nach vorn, sondern leicht nach der Volarseite schaut, trägt an ihrer ulnaren Seite eine leicht ausgehöhlte Grube, den Sinus lunatus, für das Köpfchen der Ulna. Sie vermittelt ferner allein die Verbindung mit der ersten Handwurzelreihe, indem diese von der Ulna durch die sogenannte Cartilago interarticularis, die an das Gelenkende des Radius anstösst, getrennt ist. Die untere Epiphyse des Radius liegt vollständig extrakapsulär.

Die Brüche am unteren Ende des Radius sind die häufigsten, die überhaupt vorkommen, indem sie allein 10% ausmachen. Das weibliche Geschlecht scheint etwas bevorzugt vor dem männlichen. So kamen in einer Statistik von *Morris* auf 169 dieser Brüche 114 bei Frauen und 55 bei Männern. Bezüglich des Alters stellt das grösste Kontingent das 50.—60. Lebensjahr, dann folgt das 4., dann das 1. Decennium, während das 10.—30. Jahr relativ wenig betroffen wird.

Was nun die **pathologisch-anatomischen Charaktere** betrifft, so haben wir zunächst Fissuren zu erwähnen, die an dem Gelenkende vorkommen können. Sie durchsetzen dieses entweder in der Längsrichtung, indem sie von der Mitte der unteren Gelenkfläche ausgehend das untere Drittel des Knochens in zwei fast gleiche Hälften trennen (Fig. 187), oder sie treten als sternförmige, nicht klaffende Spalten auf, die sich ebenfalls weit in die Diaphyse hinein erstrecken können (Fig. 188). Solche Fissuren liegen wohl

in einer grossen Zahl derjenigen Fälle vor, die unter dem Namen „Verstauchung des Handgelenkes“ behandelt werden.

Gleichfalls in diese Rubrik fälschlich gedeuteter Verletzungen gehört zweifellos eine Reihe derjenigen, in welchen die Gewalt zu einer Absprengung kleinerer, vollständig intraarticulär liegender Stücke vom Rande der überknorpelten Gelenkfläche geführt hat. Aber auch diejenigen Brüche werden wohl häufig übersehen, in denen ein grösseres, in der Regel dreieckiges Fragment durch eine von der Gelenkfläche über die Grenze der Kapsel hinaus schräg nach der einen oder anderen Seite hin verlaufende Bruchlinie vom Gelenkende gelöst wurde (Fig. 189).

Fig. 187.




Fig. 188.




Fig. 189.




Alle diese eben genannten Variationen sind nun aber als Ausnahmen zu betrachten gegenüber der so häufigen Verletzung, bei welcher der Bruch das ganze untere Gelenkende des Radius abtrennt.

Dieser Bruch sitzt an der Stelle, wo sich die compacte Diaphyse in die schwammige Epiphyse aufzulösen beginnt, also etwa 1—2 cm über der Gelenkfläche des Radius. Die Bruchlinie verläuft an dieser Stelle in so typischer Weise, dass man diese Brüche geradezu als Fracturen des Radius „loco classico“ bezeichnet. Vielfach führen sie auch nach dem Autor, der sie zuerst genauer beschrieben, den Namen „Colles fracture“.

Nicht ganz so regelmässig wie der Sitz des Bruches gestaltet sich die Richtung der Bruchlinie. Am häufigsten ver-


läuft sie quer von einer Seite zur anderen, dagegen schief von der Palmar- nach der Dorsalfläche, so zwar dass sie schräg ansteigend von unten (Vola) und vorn nach oben (Dorsum) und hinten zieht, die dorsale Fläche des Bruchstückes also etwas länger ist als die volare (Fig. 190). Sie hat dabei oft eine muschelförmige Krümmung in der Weise, dass die Bruchfläche des unteren Fragmentes leicht concav, die des oberen convex gestaltet ist. Auch stärkere Zahnung beider kommt vor, während bei jüngeren Individuen die Trennung in der Epiphysenlinie erfolgen kann. Das Periost

Fig. 190.



ist bei diesen Querbrüchen leichterer Art auf der Extensorenseite gewöhnlich erhalten, auf der Beugeseite dagegen zerrissen. Das untere Bruchstück kann ferner noch in verticaler Richtung gesprengt sein, so dass die Bruchlinie in das Gelenk eindringt. Seltener ist es isolirt zersplittert oder zerschmettert. Solche Splitterung ist dann entweder direct durch die einwirkende Gewalt bedingt oder rührt daher, dass sich das obere Fragment in das untere eintreibt und dasselbe auseinander sprengt. Eine derartige Folge der Einkeilung ist jedoch nicht häufig. Man findet vielmehr meist nur, dies aber allerdings ziemlich häufig, die Einkeilung in der Weise, dass sich allein der Dorsalrand oder auch wohl die nahe der Ulna zu gelegene Kante

Fig. 191.



des oberen in das untere Fragment einschiebt, während sein Volarrand volarwärts gegen die Beugesehnen hingleitet. (Fig. 191 und 192). Das untere Bruchende wird dabei noch nach der Dorsalseite umgewendet, so dass dann sein Dorsalrand höher liegt als der Volarrand des oberen. Auf diese Weise kommt an der Bruchstelle ein nach dem Dorsum hin offener Winkel zu Stande, da ja die Gelenkfläche des Radius nach dem Dorsum hin elevirt wird (Fig. 191).

In gleicher Weise, aber noch viel ausgesprochener, erfolgt die Dislocation des unteren Fragmentes nach dem Dorsum bei den ohne Einkeilung einhergehenden Brüchen mit querem Verlauf. Da aber das untere Fragment mittelst der Cartilago interarticularis am Proc. styloideus ulnae befestigt ist, so kann seine Verschiebung nicht gerade aus in der Richtung der Vorderarmachse erfolgen. Es muss vielmehr eine Drehung in der Weise erfahren, dass sein oberer Rand gegen die Ulna hinrückt, sein lateraler aber stärker vorspringt und seine Gelenkfläche anstatt wie normal nach volar- und ulnarwärts, nunmehr gerade nach oben, d. h. dorsal- und etwas radialwärts sieht. Die Hand folgt immer dem untern Bruchstück. Die Richtung ihrer Achse wird dementsprechend verändert und radialwärts geneigt. Die ulnare Dislocation des unteren Fragmentes kann so stark werden, dass sie das Gelenkende der Ulna ulnarwärts über den Carpus hinausdrängen kann.

Fig. 192.



Das obere Fragment dreht sich gewöhnlich nach innen und stellt sich mit dem oberen Theil des Vorderarmes in Pronation.

Findet sich der viel seltenere Verlauf der Bruchlinie von der Volarseite und oben nach der Dorsalseite und unten, so erfolgt die Dislocation in entgegengesetzter Weise. Der dorsale Theil der Gelenkfläche bildet dann das untere Ende des oberen Bruchstückes, welches sich nunmehr dorsalwärts über dem nach der Vola verschobenen unteren Fragment befindet.

Nicht so häufig als die queren sind die exquisiten Schrägbrüche. Sie ziehen meistens von der Radialseite und oben schief nach dem Ulnarrande der Gelenkfläche hin und dringen nicht selten neben derselben in das Gelenk selbst hinein.

Häufige **Complicationen** der Fractur sind Abquetschungen des Proc. styloideus ulnae oder Absprengungen kleinerer Fragmente von der volaren, dem Lig. interosseum abgewendeten Kante des unteren Ulnarrandes, ferner Zerreissungen der Cartilago interarticularis oder des Lig. subcruentum, welches den Proc. styloideus ulnae mit der Cartilago interarticularis verbindet. Selbst Luxationen der Ulna im unteren Radio-Ulnargelenk, ja sogar Zerreiss-

ungen der Handgelenkskapsel hat man beobachtet. Die mit gleichzeitiger Trennung der Ulna von der abgebrochenen Radiusepiphyse einhergehenden Verletzungen stellen gewissermassen ein Analogon der *Dupuytren*'schen Fibulafractur dar und sind von *Gérard* und *Marchant* geradezu als „fracture de *Dupuytren* au membre supérieur" beschrieben worden. In all diesen letzteren Fällen ist natürlich ein Bluterguss im Handgelenk vorhanden.

Weiter findet man häufig die dorsalen Sehnenscheiden auf dem Radiusende verletzt, den subfascialen Raum hinter den Mm. extensor pollicis brevis und abductor pollicis longus eröffnet und dementsprechend in jenen wie in diesem ein Blutextravasat oder auch ein fibrinöses Exsudat. Sogar der grosse Sehnenscheidensack der Beugeseite kann durch das dislocirte obere Bruchstück verletzt werden, ja dieses kann sogar die Haut der Palmarseite durchbohren. In solchem Fall kann dann auch die Art. radialis platt gedrückt oder zerrissen werden. Von den an der Bruchstelle vorbeiziehenden Nerven können der Medianus, der oberflächliche sensible Ast des Radialis, die zu dem Gelenk hinziehenden Interossealzweige des Medianus und Radialis und schliesslich der Ramus dorsalis des Ulnaris in Mitleidenschaft gezogen werden.


Aetiologie. Die Fractura radii loco classico erfolgt nur in äusserst seltenen Fällen durch eine directe Gewalt, z. B. einen Schuss. Sie entsteht vielmehr meist als combinirte Riss- und Abknickungsfractur. Die Veranlassung zu derselben bildet fast stets ein Fall auf die pronirte und stark dorsal flectirte Hand. Bei einer solchen starken Dorsalflexion erfährt das Lig. carpi volare propr. eine bedeutende Spannung, überträgt aber die Spannung, da es wegen seiner Stärke der Gewalt selbst Stand hält, auf das untere Radiusende, an dessen ganzem volarem Umfang es sich ansetzt, und reisst dasselbe ab. Dieses Abreissen wird noch dadurch unterstützt, dass sich gleichzeitig die obere Carpalreihe an dem dorsalen Vorsprung des unteren Radiusendes anstemmt und das untere Radiusende so im Sinne des Rissbruches abknickt *(Bähr)*. Ist aber der Bruch zu Stande gekommen, so treibt die Gewalt fortwirkend das untere Fragment nach dem Dorsum, während sich das obere in das untere einkeilt oder an diesem vorbei nach der Vola hin zu stehen kommt.

Wenn so die Dislocation durch die Gewalt zu Stande kommt, soll sie durch Muskelaction erhalten werden. Wir geben hier die Ansicht von *Colles*, *Smith* und *Lucas* wieder. Das Lig. carpi dorsale hält die Extensorensehnen mit Ausnahme von zweien zusammen.

Wenn nun der Radius dicht über diesem Band gebrochen ist, so werden nicht nur der Supinator longus und die Extensores pollicis, sondern auch der Extensor carpi radialis longus und brevis, der Extensor digitorum communis und Extensor indicis das Bestreben haben, das Fragment zurückzuziehen. Dieses wird ihnen aber ermöglicht dadurch, dass ihre Antagonisten durch den mangelnden Halt des Lig. carpi dorsale in ihrer Wirkung sehr geschwächt sind. Der Supinator longus und Extensor carp. rad. würden dann gleichzeitig das Bruchstück zu abduciren, d. h. in Radialflexion zu stellen suchen. Bewiesen soll diese Ansicht dadurch sein, dass in einem Fall die Dislocation erst durch die Todtenstarre eintrat, während sie an der lebenden Person einer Lähmung des Armes wegen nicht vorhanden war.

Sehr selten kommen Fracturen am unteren Radiusende durch übertriebene Volarflexion, also Fall auf den Handrücken zu Stande. Es spielt dann das Lig. carpi dorsale dieselbe Rolle, wie sonst der volare Bandapparat. Das untere Bruchstück wird dann volarwärts, das obere centrale dorsalwärts dislocirt, so dass die folgende Deformität (Fig. 193) entsteht.

Fig. 193.




Die **Symptome** der gewöhnlichen Radiusbrüche beschränken sich bei mangelnder Dislocation der Fragmente, so bei den Fissuren und vollständigen Querbrüchen mit erhaltenem Periost oft auf den localen Schmerz und eine Anschwellung an der Bruchstelle. Man kann aber auch dann schon die Fractur ziemlich sicher diagnosticiren, wenn die Verletzung durch Fall auf die dorsalflectirte Hand entstanden war. Diese Entstehungsart des Bruches hilft uns auch zur Erkenntniss der eingekeilten Brüche, bei denen allerdings dann weiter noch eine Verdickung des unteren Radiusendes und eine charakteristische mit der Spitze des Winkels gegen die Volarfläche gerichtete Achsenknickung hinzukommt.


Ist aber in der oben beschriebenen Weise die typische Dislocation des untern Fragmentes dorsalwärts, die des obern dagegen volarwärts eingetreten, dann sind die Zeichen des Bruches so auffällig, dass er manchmal schon auf den ersten Blick erkannt werden kann (Taf. XIX.) Nehmen wir einen solchen typischen Fall, so hat der Verletzte im Momente der Entstehung der Fractur oft selbst ein deutliches Krachen oberhalb des Handgelenkes empfunden. An dieser Stelle tritt alsbald ein heftiger Schmerz ein, die Hand wird kraftlos, kann nicht pro- oder supinirt werden und wird in der Regel von der gesunden Hand unterstützt. Sie selbst steht mehr der Supination zugeneigt, während der Vorderarm pronirt ist. Sehr rasch entwickelt sich über dem Handgelenk eine Anschwellung, die oft recht bedeutend wird, so dass man sie erst wegmassiren muss, um die weiteren Symptome zu erkennen. Diese geben sich zunächst dadurch kund, dass der Arm an der gebrochenen Stelle statt seiner normalen abgeplatteten Gestalt nunmehr eine mehr cylindrische Form besitzt. Betrachtet man ihn weiterhin im Profil, so fallen ausser einer nach der Ulna hinschauenden Einknickung des Radius und vielleicht einer geringen Verkürzung desselben zwei Vorsprünge auf, und zwar einer an der Dorsal-, der andere an der Volarseite des Vorderarms dicht oberhalb des Handgelenkes (Fig. 194).

Die Vorwölbung auf der Dorsalseite liegt knapp über dem Gelenk, ist an der Radialseite am stärksten, wird nach der Ulna zu schwächer, hängt nach abwärts mit dem Carpus zusammen, ist dagegen nach aufwärts durch eine etwas schräg nach innen und abwärts nach der Ulna zu verlaufende Rinne vom Schafte des Radius abgegrenzt.

Die Vorwölbung auf der Volarseite ist etwas schwächer ausgeprägt, liegt mit der vorigen nicht in einer Ebene, sondern weiter entfernt vom Handgelenk, ist von diesem durch eine Furche geschieden und geht unmittelbar in die Diaphyse des Radius über. Diese Vorwölbungen geben der Extremität die eigenthümliche Deformität, die man gewöhnlich mit einer französischen Tischgabel vergleicht und daher als „Fourchette“-stellung bezeichnet.


Fig. 194.





Die Achse des Vorderarmes und damit der Hand ist aber nicht allein in dieser Gabelstellung verändert, sondern zeigt gleichzeitig noch eine bayonettförmige Knickung, indem sie in Folge der Abductionsstellung des unteren Fragmentes nicht wie normal, durch den Mittelfinger der Hand, sondern durch deren 4. Finger verläuft. Dadurch erscheint die ganze Hand stark radial flectirt, während das untere Ende der Ulna auffallend stark hervorspringt und anscheinend eine grössere Breite des Armes über dem Carpus bewirkt (Fig. 195).

Fig. 195.



Ist die Dislocation nicht so stark ausgesprochen, so können die obengenannten Veränderungen der Vorderarmcontour weniger hervortreten, wir haben aber dann auch eine Deformität, die uns bei der Diagnose nicht im Stiche lässt. Die Seitenfläche des Radius zeigt nämlich normaler Weise eine leichte dorsale Convexität, welche besonders in der Gegend des Handgelenkes durch das Umbiegen der seitlichen Kante des Knochens nach vorn deutlich sichtbar ist. Diese dorsale Convexität ist nach der Fractur ausgeglichen, ja es zeigt sich im Gegentheil leichte volare Convexität *(König)*.

Charakteristisch ist ferner eine Sugillation an der Volarseite des Carpus. Abnorme Beweglicheit und Crepitation fehlen meist, weil die Bruchflächen sich gar nicht berühren, oder sind nur schwer nachweisbar. Will man sie fühlen, so muss man sich vergewissern, dass man wirklich das untere Fragment in der Hand hat, und dazu braucht man nur den Proc. styloideus desselben aufzusuchen. Hat man denselben gefunden, so umgreift man ihn mit dem Daumen und Zeigefinger der einen Hand, fasst dann ebenso das obere Bruchstück dicht über der Bruchstelle, stemmt den Arm des Patienten gegen die eigene Brust, extendirt die Fragmente und verschiebt dieselben dann in entgegengesetzter Richtung an einander. Abnorme Beweglichkeit lässt sich auch so nachweisen, dass man die Hand in der Richtung der ursprünglichen Gewalt nach der Dorsalseite hindrängt und so das Bruchstück verschiebt.

Wird der Ramus dorsalis des Ulnaris durch das vorspringende Capitulum ulnae gezerrt, so klagen die Patienten über Schmerz an der Innenseite des Handgelenkes, der oft noch in

den Zwischenraum des IV. und V. Metacarpus irradiirt resp. in die betreffenden Finger geht. Ebenso können Paresen und Schmerzen im Verlaufe der Medianusverzweigungen vorhanden sein.

Wie schon öfters betont, wird die Fractur der Radiusepiphyse sehr häufig für eine Distorsion gehalten. Auch diese entsteht durch Fall auf die dorsalflectirte Hand und geht einher mit heftigen Schmerzen und Anschwellung des Gelenkes. Abgesehen nun davon, dass derartige reine, ohne gleichzeitigen Bruch des Radius einhergehende Distorsionen grosse Seltenheiten sind, kann eine einfache Palpation sofort jeden Zweifel beseitigen, denn bei der Distorsion sitzt der Schmerz in der Gelenklinie, bei der Fractur aber 1—2 cm über dieser im Radius selbst. Ist man im Zweifel, so soll man im Interesse des Patienten lieber eine Fractur annehmen und die Verletzung wie eine solche behandeln.

Auch mit einer Luxation des Handgelenkes kann die typische Radiusfractur verwechselt werden. In der That hat man sie bis zu *Dupuytren*'s Zeiten für eine solche gehalten, hat aber dann eingesehen, dass wirkliche Luxationen des Handgelenkes grosse Raritäten sind, während die Fractur so ausserordentlich häufig vorkommt. Die nähere Differentialdiagnose beider Verletzungen besprechen wir später, nachdem wir erst die Handgelenksluxationen kennen gelernt haben.

Die **Prognose** der tyischen Radiusfractur hängt ab vom Alter der Patienten, der Qualität der Verletzung und der Art der Behandlung. So consolidiren reine Quer- oder Schrägbrüche jugendlicher Individuen bei passender Behandlung innerhalb 3—4 Wochen durch einen knöchernen Callus ohne Beeinträchtigung der Function des Armes. Nach Epiphysentrennungen kann allerdings eine Wachsthumshemmung des Radius eintreten, da die Längenentwicklung desselben vorzugsweise von seiner unteren Epiphyse ausgeht. Im Ganzen sind solche Wachsthumshemmungen aber sehr selten. Wir verfügen bisher nur über 13 einschlägige Beobachtungen *(Stehr)*. Pseudarthrosen sind äusserst selten.

Weniger gut vollzieht sich auch unter den eben genannten Bedingungen die Heilung bei älteren Leuten. Bei denselben bleibt oft eine Rigidität des Hand- und des Ellenbogengelenkes zurück; die Patienten haben dann monatelang zu thun, bis die Hand frei von Schmerzen wird, nicht mehr ödematös anschwillt und wieder eine gute Beweglichkeit erlangt. Häufig genug kehrt aber die

frühere Feinheit der Fingerbewegungen gar nicht mehr zurück, während die Hand gleichzeitig kraftloser geworden ist.

Vielfach bleibt an der Bruchstelle eine mehr weniger erhebliche Deformität zurück, da die Dislocation der Fragmente, z. B. bei bestehender Einkeilung derselben nicht in wünschenswerther Weise beseitigt werden kann oder sich unter schlecht sitzenden Verbänden wiederherstellt. Eine solche deforme Heilung kann sehr störend auf die Brauchbarkeit der Hand einwirken. Eine Compensation kann aber zuweilen dadurch geschaffen werden, dass die Verbindung der mittleren Carpalknochen unter einander nachgiebiger wird und sich eine grössere Beweglichkeit zwischen ihnen entwickelt. Eine abnorme Beweglichkeit der Hand kann entstehen, wenn die Fractur die Handgelenkskapsel zerrissen hatte.


Diese letztere Verletzung kann aber auch das entgegengesetzte Verhalten nach sich ziehen. Wenn nämlich neben dem Radiusbruch noch gleichzeitige Läsionen des Radiocarpalgelenkes und des unteren Radio-ulnargelenkes vorhanden sind, wie Zerreissung der Kapseln dieser Gelenke oder des Lig. interarticulare oder Fissuren oder Splitterungen der carpalen Ulnar- oder Radiusepiphyse, so findet sich regelmässig in dem Handgelenke ein Bluterguss, und es kann dann durch Nichtbeachtung desselben selbst eine vollständige Ankylose des Gelenkes eintreten. Glücklicherweise ist dies nicht oft der Fall. Es beruht vielmehr die so häufig beobachtete Steifigkeit der betreffenden Gelenke meist nicht auf einer wirklichen Verwachsung ihrer Gelenkflächen, sondern viel öfter auf einer Retraction des periarticulären Gewebes.

Diese letztere entsteht entweder durch eine Verletzung dieser Theile oder durch eine schlechte Behandlung, vorzüglich eine zu lange Immobilisirung derselben in Verbänden. Kein anderes Gelenk verträgt eine dauernde Ruhigstellung so schlecht als das Hand- und die Fingergelenke, indem hier oft schon wenige Wochen genügen, um nur mit vieler Mühe zu beseitigende Contracturen entstehen zu lassen. Ein zu fest angelegter Verband kann weiterhin auch eine ischämische Muskelentzündung mit ihren früher beschriebenen Folgen veranlassen, so dass dann, während die Muskulatur vollständig vernarbt, Hand und Finger sich in Krallenstellung begeben und nur schwer wieder gerade gemacht werden können. Selbst Gangrän der Hand hat man in solcher Weise beobachtet, darf diese aber nicht immer dem Arzt zur Last legen, da sie auch durch Zerreissungen der Art. radialis und ulnaris erzeugt werden kann.

Waren die das Gelenk umgebenden Sehnen und Sehnenscheiden verletzt worden, so kann es in diesen letzteren zunächst zu einem fibrinösen Exsudat kommen. Man findet dann in den ersten Tagen nach der Verletzung an der Dorsal-, besonders aber auch an der Volarseite der Bruchstelle eine harte, feste, allmählich in die Muskeln übergehende Geschwulst. Später organisirt sich dann das Exsudat, es kommt zur Verwachsung der Sehnen mit ihren Scheiden und so zur Pseudoankylose der Gelenke. Gelegentlich kann auch wohl ein stärkerer Callus zwischen die Sehnenscheiden hineinwuchern und diese so zur Schrumpfung bringen.

Die Pro- und Supinationsbewegungen des Vorderarmes können schon durch die eben genannten Verhältnisse gestört sein, sind aber zuweilen auch ganz aufgehoben und zwar dann, wenn es bei gleichzeitiger Fractur des untern Ulnaendes zu einer abnormen Callusbildung oder selbst zu knöcherner Verwachsung zwischen den carpalen Epiphysen des Radius und der Ulna gekommen ist. Zuweilen steigt auch das untere Fragment, besonders wenn der Bruch die untere Kante des Radius ausgiebiger betroffen hat, sammt den Handwurzelknochen im Spatium interosseum in die Höhe und ist dann nur durch eine kurze Bandmasse am Rande angeheftet (Fig. 196).

Fig. 196.



Schliesslich müssen wir erwähnen, dass Fracturen älterer Leute von einer Arthritis deformans des Gelenkes gefolgt sein können.

Wir haben also eine ganze Reihe von Störungen im Verlaufe der Heilung, die denn auch der Radiusfractur einen üblen Ruf verschafft haben. Für die Praxis ist dabei festzuhalten, dass sie sich durch zweckmässige Behandlung grösstentheils vermeiden oder doch auf ein geringes Mass zurückführen lassen.


Die **Therapie** hat die Aufgabe, die Form des Gliedes wieder herzustellen und für die Erhaltung seiner Function zu sorgen. Sie muss also die Reposition und Rentention der Fragmente erstreben und ein Steifwerden der Gelenke verhüten.

Was die Reposition der Fragmente betrifft, so ist dieselbe nur dann nicht nothwendig, wenn eine Einkeilung ohne besondere Deformität besteht. In diesem Falle, aber auch nur in diesem, kann man nach der alten *Cooper*'schen, neuerdings wieder von *Petersen* empfohlenen Weise die Behandlung in der einfachen Weise leiten,

dass man unter die Bruchstelle eine auf einen Kopf aufgerollte Binde mit Heftpflasterstreifen fixirt und den Arm dann so in eine Mitella hängt, dass der Rand dieser mit dem Proc. styloideus ulnae abschneidet, die Hand also ulnarwärts herabhängt und so durch ihre eigene Schwere gewissermassen eine Extension ausübt.

Ist aber die typische Dislocation der Fragmente vorhanden, dann soll in jedem Fall die Reposition geschehen und zwar in folgender Weise: Der Arm wird rechtwinklig gebeugt. Während nun ein Gehülfe mittelst eines Zügels die Contraextension am Oberarm ausführt, fasst ein anderer die gebrochene Hand so, dass er mit der einen Hand den abducirten Daumen, mit der andern die übrigen 4 Finger derselben umgreift. Darauf macht er zunächst eine kräftige Extension in der Richtung der Vorderarmachse, gleicht damit die Dislocatio ad longitudinem aus, giebt dann der extendirten Hand eine starke ulnare Abduction, um die Dislocatio ad latus zu beseitigen, und fügt dann schliesslich noch eine starke Volarflexion der extendirten und ulnarflectirten

Fig. 197.



Hand hinzu, womit er auch die Dislocatio ad axin gehoben hat (Fig. 197). Der Arzt selbst setzt darauf seine beiden Daumen auf die zwei Knochenvorsprünge am Dorsum und an der Vola und drückt sie in entgegengesetzter Richtung an einander. Gelingt die Coaptation der Fragmente nicht auf diesem Wege, so thut man gut, die Hand zuerst stark dorsal zu flectiren *(Roser)* und dann die übrigen Bewegungen folgen zu lassen.

Ist die Reposition in gehöriger Weise gelungen, so sollen nun, während der Zug und Gegenzug noch fortbesteht, die Verbände angelegt werden, welche die dauernde Retention zu bewirken bestimmt sind. Dieselben müssen im Allgemeinen den Arm in Mittelstellung zwischen Pronation und Supination umfassen. Nur bei gleichzeitigen Fracturen des unteren Ulnaendes thut man gut, der


Hand gleich von Anfang an die volle Supinationsstellung zu geben und dann im Verlaufe der Heilung mit Supinations- und Pronationsstellung abzuwechseln.

Das erste Princip aller Verbände muss das sein, die Finger frei zu lassen. Sie dürfen nur bis zu den Metacarpophalangealgelenken reichen.

Es gibt nun eine grosse Reihe von Verbandmethoden, die zum Zwecke der Retention empfohlen worden sind. Wir führen von diesen wiederum nur die an, die sich leicht herstellen lassen und sich bewährt haben. Zunächst kommt der circuläre Gypsverband in Frage. Viele Chirurgen haben sich besonders wegen der Gefahr der ischämischen Muskelentzündung gegen denselben ausgesprochen, und wir würden ihn auch nur dann empfehlen, wenn man gute Assistenz hat und in der Technik seiner Anlegung geübt ist. Jedenfalls muss er schon nach wenigen Tagen erneuert werden, da dann die Geschwulst an der Bruchstelle vergangen ist und damit die Gypshülse gelockert wird. Der Gypsverband muss an dem rechtwinklig gebeugten Gliede von der Mitte des Oberarmes bis zu den Metacarpophalangealgelenken reichen.

Bei irgendwie erheblicher Anschwellung des fracturirten Vorderarmes steht der Gypsverband in seiner Wirkung entschieden zurück hinter den mannigfaltigen Schienenverbänden. Diese

Fig. 198.



Schienen sind entweder einfache volare oder ulnare, oder dorsale oder bilaterale.


Von den ersteren nennen wir die Schienen von *Schede*, *Kölliker* und *Carr*.

Die *Schede*'sche Schiene (Fig. 198) besitzt dem Handgelenk entsprechend eine starke, volare Beugung und ulnare Abknickung, wodurch die wünschenswerthe Combination der Flexions- mit der Abductionsstellung der Hand ermöglicht wird. Die Schiene wird mit einer Flanell- und einer über diese gelegten gestärkten Binde befestigt.

Die *Kölliker*'sche Schiene ist eine vollständig ulnare und wird in Flexion und Ulnarabduction angelegt.


Der *Carr*'sche Verband (Fig. 199) besteht aus einer leichten Holzschiene, auf die ein convexes hölzernes Lager aufgeschraubt

Fig. 199.



wird, das genau der concaven Radiusfläche entsprechend, auf der radialen Seite etwas über 1 cm dick ist, nach der ulnaren Seite sich abflacht und vor dem Handgelenk ganz niedrig wird, so dass hier Raum für das untere Fragment bleibt. Vorn ist schräg an diese Schiene ein rundliches Querstück befestigt, das der Hand als Stützpunkt dienen soll, indem dasselbe von den Fingern umgriffen wird, während der Daumen radial nach unten zu liegen kommt.

Fig. 200.




Nachdem der Patient mit seinen Fingern dies Querstück umfasst hat, wird die gepolsterte Schiene in ihrer Lage durch Bindentouren befestigt. Man kann auch wohl zur Sicherung noch ein gut gepolstertes leichtes Holzschienchen auf der Dorsalseite hinzufügen.

Von den d o r s a l e n Schienen sind als zweckentsprechend anzuführen: die N é l a t o n'sche P i s t o l e n s c h i e n e (Fig. 200), die B e e l y'sche G y p s h a n f s c h i e n e (Fig. 201) und die sogen. R o s e r'sche D o r s a l s c h i e n e (Fig. 202).

Die beiden ersten sind wohl aus den nebenstehenden Figuren ohne Weiteres verständlich. Sie werden angelegt, nachdem die


Reposition vollführt worden ist. Zur Anlegung der *Beely*'schen Schiene lässt man die Hand über einem unter das Handgelenk gelegten Rollkissen herunterhängen und in dieser Stellung extendiren und ulnarwärts abduciren, während ein Gehülfe am Oberarm die Contraextension ausübt. Die Technik des *Roser*'schen Verbandes ist folgende: Die gut gepolsterte Schiene, etwa von der Breite des

Fig. 201.



Armes, reicht vom Condylus externus mindestens bis zu den ersten Phalangen der Finger. Sie wird auf dem Rücken des Armes und der Hand so angelegt, dass man die Hand flectirt herabhängen lässt, liegt also dem ersteren nur bis zum Handgelenk an. Der von hier bis zu den Fingern freibleibende Raum wird durch feste in Form eines Keiles zusammengelegte Leinwandcompressen ausgefüllt. Das zugespitzte Ende dieses Keiles liegt direct auf dem nach dem

Fig. 202.




Dorsum abweichenden unteren Fracturende. Nun wird die Schiene mit einer Binde am Arm befestigt, während die Finger frei bleiben. Das dorsale Polster drückt dabei das prominirende untere Fragment direct nach abwärts. Das obere Fragment wird aber aus der Vola nach dem Dorsum gedrängt, indem es gegen den freien Raum

der Dorsalschiene angezogen wird, welcher jenseits der dorsalen Compresse unter der Schiene bleibt.

Die empfehlenswertheste der bilateralen Schienen ist der *Middeldorpf*'sche Pressschienenverband (Fig. 180), doch können selbstverständlich statt der Fourniere auch Papp- oder Kautschukschienen angewendet werden.

Gewissermassen eine Combination volarer und dorsaler Schienen stellt die von *Braatz* angegebene Spiralgypshanfschiene

Fig. 203.



(Fig. 203 und 204) dar. Die Gypshanfstreifen beginnen 3 Finger breit vom Olecranon entfernt, laufen die Ulna umgreifend um die Volarfläche des Vorderarmes und gehen über die gebrochene Stelle des Radius hinweg auf den Handrücken bis zu den Metacarpophalangealgelenken. Es werden soviel Streifen angelegt, dass der Handrücken ziemlich in seiner ganzen Breite

Fig. 204.




von ihnen bedeckt ist. Während der Gyps noch weich ist, wird nunmehr die Reposition der Fragmente ausgeführt, so dass der Gyps in der erwünschten Stellung erhärtet. Die Schiene kann auf die blosse Haut angelegt werden, wird mit Stärkebinden befestigt und nach 8–10 Tagen gewechselt. Soll dann keine neue Schiene gemacht werden, so muss unter die alte ein Stück Filz eingelegt werden, damit sie wegen der jetzt geschwundenen Geschwulst wieder genau anschliesst.

Bardenheuer hat in letzter Zeit eine Federextensionsschiene (Fig. 205) empfohlen, bei deren Gebrauch die Behandlungszeit ganz wesentlich abgekürzt wird.

Sollte man nun einen Gyps- oder einen der Schienenverbände bevorzugen, — jeder beschäftigte Arzt wird sich bald seinen Lieblingsverband aussuchen — so ist stets die Regel zu beherzigen, die Verbände nicht zu lange liegen zu lassen. Besonders wenn man dieselben bei stärkerer Schwellung angelegt hatte, muss man sie schon nach einigen Tagen abnehmen, um die Bruchstelle controlliren zu können. Die Resorption stärkerer Anschwellungen und stärkerer Blutergüsse befördert man am zweckmässigsten durch

Umlegen einer elastisch comprimirenden Binde über den Verband bei suspendirtem Arm. Es empfiehlt sich auch hier wie bei allen Gelenkbrüchen möglichst früh die Massage anzuwenden. Wir empfehlen die ersten fixirenden Verbände nur etwa 14 Tage liegen zu lassen. Dann beginnen wir mit der Massage und Gymnastik,

Fig. 205.



die nun täglich, am besten zweimal ausgeführt wird, während ein Assistent die richtige Lage der Hand erhält. Nach jeder Massagesitzung legen wir wieder den Verband an und lassen diesen erst 4 Wochen nach geschehener Verletzung ganz fort. Wir rathen also nicht zu der jetzt von verschiedener Seite empfohlenen Massagebehandlung schon vom Beginne der Verletzung an. Wir haben bei einer Reihe so behandelter Verletzungen starke Dislocationen zurückbleiben sehen. Für den Patienten sowohl wie für den Arzt ist es sicherer, erst 14 Tage zu fixiren, damit die Dislocation sicher ausgeglichen ist. Fängt man dann an zu massiren, so ist es noch früh genug und man nimmt nicht die Gefahr auf sich, dem Patienten zu schaden.

Von vornherein sollen die Finger fleissig geübt und stets bewegt werden. Man soll mit der Massage und Gymnastik erst dann aufhören, wenn die Function des Armes und der Hand wieder normal geworden ist.

Bekommt man schlecht geheilte Fracturen zur Behandlung, so kann man in frischeren Fällen durch eine starke Dorsalflexion den Callus wieder zu zerbrechen suchen und nachher die Hand in richtiger Stellung fixiren. Sind die Verletzungen älter, so kommt man damit nicht zum Ziel, muss vielmehr, wenn die Massagebehandlung im Stiche lässt oder zu langwierig sein sollte, die aseptische Osteotomie machen, eventuell abnorme Callusbrücken wegmeisseln. Bei knöcherner Verwachsung des untern Radius- und Ulnaendes und dadurch behinderter Supination haben *v. Lesser Lauenstein* u. A. mit Erfolg das untere Ende der Ulna resecirt.

Luxationen im unteren Radio-Ulnargelenk.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Im unteren Radio-Ulnargelenk articulirt das Köpfchen der Ulna mit dem Sinus lunatus des Radius und der diesen ergänzenden Cartilago triangularis. Dieser starke dicke Knorpel sitzt einerseits am ulnaren Rande des Radius fest, andererseits vermittelst des Lig. subcruentum am Proc. styloideus ulnae. Die Bewegungen des Gelenkes geschehen derart, dass der untere Abschnitt der Gelenkfläche und diese Knorpelscheibe sich wie die Glieder eines Fächers über einander verschieben. Der Drehpunkt liegt dabei an der Insertion der Scheibe am Proc. styloideus ulnae. Die Gelenkkapsel entspringt an den freien Rändern des Sinus lunatus radii, der Cartilago triangularis und des Capitulum ulnae, liegt noch auf eine kurze Strecke der Ulna an und bildet zwischen beiden Knochen eine verhältnissmässig weite sackartige Tasche, welche vorn nur durch wenige fibröse Faserzüge verstärkt wird.

Trotz dieser geringen Festigkeit der Kapsel sind Verrenkungen des Ulnaköpfchens wegen des starken, früher genannten Hemmungsapparates für die Rotationsbewegungen des Radius und besonders wegen des starken Lig. interosseum sehr selten. Sie können nach dem Dorsum und der Vola hin erfolgen. Kürzlich hat *Tillmanns* aus der Litteratur 18 dorsale und 16 volare Luxationen zusammengestellt. Etwas häufiger sind sie wohl als Begleiterinnen der typischen Radiusfracturen, obgleich es auch bei diesen meist nur zu einer Subluxation kommt. Eine vollständige Luxation kann nur dann eintreten, wenn neben der Kapselsprengung und der Ablösung der Cartilago triangularis auch der starke Bandapparat zerrissen ist, der sich am Proc. styloideus ansetzt.

Betrachten wir nun

1. Die dorsale Luxation.

Dieselbe kommt zu Stande durch einen Fall auf die pronirte Hand oder durch eine forcirte Pronation, so z. B. beim Ausringen der Wäsche.

Die **Symptome** sind charakteristische. Wir finden nach der Gewalteinwirkung Schmerzen, gestörte Funktion im Handgelenk, aufgehobene Supination. Die Hand steht in starker Pronation und Beugung. Die normale Prominenz des Ulnaköpfchens fehlt, dagegen springt es auf der Rückseite des Handgelenkes abnorm hervor. Die Ulna kreuzt dabei den Radius. Wir erkennen dies daraus, dass der Proc. styloideus derselben, der normaliter mit dem Ulnarrande des 4. Fingers correspondirt, jetzt mehr der Radialseite desselben zugewendet ist. Der Querdurchmesser des Vorderarmes erscheint dadurch an der betreffenden Stelle verschmälert.


Die **Prognose** ist günstig bei einfacher Verrenkung. Ist dieselbe jedoch nur eine Combination der typischen Radiusfractur, so kann eine Ankylose des Gelenkes resultiren.

Die **Therapie** vollzieht die Reposition leicht durch eine Extension an der Hand und Ueberführung derselben in Beugestellung mit gleichzeitiger Impulsion des Köpfchens. Die Retention besorgt eine dorsale Schiene für etwa 14 Tage. Mitunter zeigt sich grosse Neigung zu Recidiven der Luxation. Dann muss man für längere Zeit einen gut sitzenden Contentivverband am supinirten Arm anlegen.

2. Die volare Luxation.

Die volare Luxation entsteht entweder durch ein directes Trauma oder eher durch eine übermässige Supination. Häufiger findet sie sich zugleich mit der Radiusfractur.

Fig. 206.



Die **Symptome** sind Fehlen der normalen Prominenz des Ulnaköpfchens, dagegen Erscheinung desselben als

Vorsprung unter den Beugesehnen, die gleichzeitig radialwärts verdrängt sind, Stand der Hand in Supination oder Mittelstellung zwischen Pro- und Supination und Verminderung des Breitendurchmessers des Gelenkes. (Fig. 206.)

Bezüglich der **Prognose** gilt das über die vorige Luxation Gesagte.

Die **Therapie** vollführt eine Extension an der Hand, Pronationsbewegung und Coaptation des Köpfchens. Für das Einschnappen des letzteren hinter die Cartilago triangularis mag auch eine starke Abduction der Hand nützlich sein.

Bei complicirten Luxationen des Gelenkes, bei denen das Köpfchen der Ulna durch die zerrissene Haut hervorstand, hat man schon die Resection desselben gemacht.

Ich habe bei einer veralteten volaren Luxation, die eine grosse Schwäche des Vorderarmes zurückgelassen hatte, mit bestem Erfolg die Arthrotomie mit Naht der gerissenen Kapsel und Bänder ausgeführt.

Luxationen der Hand.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Handgelenk, Radio-Carpal-Gelenk, entsteht dadurch, dass die untere Gelenkgrube des Radius im Verein mit der Cartilago triangularis eine flache Pfanne bildet, welche als einen von dem Dorsum nach der Vola zu platt gedrückten überknorpelten Gelenkkopf die erste Reihe der Handwurzelknochen — os naviculare, lunatum und triquetrum — aufnimmt. Die Gelenklinie läuft in einem nach aufwärts convexen Bogen vom Proc. styloideus radii zu dem etwas höher liegenden Proc. styloideus ulnae. Die Gelenkkapsel ist ziemlich weit, entspringt von der Umrandung der Gelenkfläche des Radius und des Zwischenknorpels und setzt sich an der Peripherie der Carpalknochen an. Sie wird von einem sehr starken Bandapparate umgeben und zwar aussen von dem Lig. laterale externum, das von der Spitze des Proc. styloideus radii zum Os naviculare zieht, auf der Innenseite von dem stärkeren, vom Proc. styloideus ulnae zum Os triquetrum reichenden Lig.

laterale internum und an der Volar- und Dorsalseite durch das Lig. rhomboides, rectum und obliquum. Weiterhin wird das Gelenk dann noch durch die auf seiner Volar- und Dorsalseite vorüberziehenden Beuge- und Strecksehnen sehr geschützt. So erhält es eine bedeutende Festigkeit, welche ihm nebst ausgiebiger Beweglichkeit grosse Sicherheit und Kraft verleiht. Die Bewegungen, die im Handgelenk vor sich gehen können, sind die Dorsalflexion oder Streckung, Volarflexion oder Beugung, Abbiegung nach der Ulnarseite oder Adduction, Abbiegung nach der Radialseite oder Abduction und die Combination dieser Excursionen, Rotationsbewegungen.

Wegen der grossen Widerstandsfähigkeit des Gelenkes sind Luxationen desselben ausserordentlich selten. Wie schon erwähnt, hielt man sie früher für häufiger, indem man bis zu *Dupuytren*'s Zeiten die typische Radiusfractur für eine Handgelenksluxation ansah.

Nach den neuesten Zusammenstellungen von *Tillmanns* und *Hecht* existiren bisher in der Litteratur etwa 43 sichere Beobachtungen, die aber auch theilweise mit Fracturen des Proc. styloideus radii complicirt waren. Sie erfordern zu ihrem Zustandekommen eine sehr bedeutende Gewalt. Die Luxation kann auf das Dorsum oder die Vola erfolgen; dabei können die bedeckenden Weichtheile perforirt werden. Von den 43 obengenannten Fällen waren 26 dorsale, 17 volare Luxationen. 7 Fälle waren complicirte Luxationen.

1. Die dorsale Handgelenksluxation.

Die Verrenkungen der Hand auf die Rückseite des Vorderarmes betragen etwa $^2/_3$ der bisher bekannten Fälle.

Die Veranlassung war in der Regel eine forcirte Dorsalflexion, z. B. bei einem Sturz von bedeutender Höhe herab auf die vorgestreckte Hand. Die unvollständigen Luxationen entstehen in der Regel dadurch, dass die Gewalt den in Pronation fixirten Radius zu supiniren sucht. Es handelt sich also um sogenannte Torsionsluxationen.

Die Luxation ist nämlich entweder eine vollständige oder unvollständige, letztere in dem Sinne, dass gelegentlich nicht beide Vorderarmknochen, sondern nur der Radius allein aus seiner Verbindung mit den Handwurzelknochen gelöst wird.

Die **Symptome** dieser **unvollständigen** Luxation beschreiben wir nach einer Beobachtung von *Hecht*. Es hing in diesem Falle, in dem es sich um eine complicirte Luxation handelte, die


mit der Hohlfläche nach aussen gekehrte, also sehr stark pronirte, linke Hand schlaff an dem von der gesunden Hand gestützten, sich ebenfalls in voller Pronation befindlichen Vorderarm. Ungefähr 2 cm hinter der ersten Handwurzelreihe ragte aus einer etwas ulnarwärts von der Mitte befindlichen Wunde die Gelenkfläche des unteren Radiusendes hervor. Die äusserste Spitze des Proc. styl. radii war abgebrochen. An der normalen Stelle der Radiusepiphyse war eine Lücke vorhanden, in die man tief eindrücken konnte.

Es handelte sich also um eine incomplete, dorsale Handluxation oder, wie man auch sagen könnte, um eine isolirte Luxation des unteren Radiusendes nach vorn.

Die Reposition gelang leicht durch direkte Impulsion des Radiusendes bei gleichzeitiger Extension und Supination der Hand.

Die **Symptome** der **vollständigen** Handgelenksluxation sind denen der typischen Radiusfractur sehr ähnlich (Fig. 207 und 208). Man findet nämlich auch hier eine convexe Vorwölb-


Fig. 207.



ung über der Dorsalseite des Handgelenkes, die sich jedoch vielleicht nach oben hin etwas stärker abgrenzt als bei der Radiusfractur. Ebenso findet sich die Vorwölbung der Volarseite des Unterarmes, aber diese reicht bis zum Ballen des Daumens, also tiefer nach abwärts und setzt sich hier ebenfalls steiler ab als die durch die Fractur erzeugte. Bewegungen des in dieser Weise deformen Gelenkes sind unmöglich. Die Finger sind halbgebeugt und können nicht gestreckt werden. Die Palpation lässt durch die Haut hindurch die convexe Gelenkfläche des Carpus erkennen

und constatirt weiter, dass der Proc. styloideus radii unter dem Os naviculare steht, während das Capitulum ulnae etwa dem Os lunatum entspricht. Misst man die Entfernung der Spitze des Mittelfingers bis zum Olecranon, so erscheint dieselbe der gesunden Seite gegenüber verkürzt. Da-

Fig. 208.



gegen ist die Länge der Vorderarmknochen von ihren Proc. styloideis bis zum Capitulum radii und zum Olecranon gleich. Auch die Entfernung der beiden Proc. styloidei von einander ist normal, der Durchmesser des Handgelenkes dagegen vom Dorsum nach der Vola hin um das Doppelte vergrössert.

2. Die volare Handgelenksluxation.


Die volaren Handgelenksluxationen sind noch viel seltener als die dorsalen.

Die hauptsächlichste Veranlassung bildet ein Fall auf die stark volarflectirte Hand.

Die **Symptome** sind sehr in die Augen fallend (Fig. 209 und 210). Die Vorderarmknochen ragen an der Dorsalseite dicht unter der Haut hervor, und es ist besonders die Prominenz des Proc. styloideus radii so bedeutend, dass man deutlich seinen Contour erkennt. Von dieser Hervorwölbung fallen die Weichtheile steil gegen den Handrücken ab. In der so entstehenden Vertiefung verlaufen stark gespannt die Strecksehnen der Finger. Die durch den Carpus an der Volarseite gebildete Geschwulst ist nicht so


deutlich zu erkennen, da sie durch die zahlreichen Sehnen der Beuger verdeckt wird. Die Messungsresultate sind dieselben wie bei der Dorsalverrenkung.

Fig. 209.



Die **Prognose** der Handgelenksluxationen ist in uncomplicirten Fällen im Ganzen günstig, indem dabei die

Fig. 210.



Gebrauchsfähigkeit der Hand nicht sehr leidet. Auch die mit Weichtheilverletzungen einhergehenden Luxationen werden unter dem Schutze der Aseptik ihre Gefahr verlieren. Dagegen

können durch begleitende Fracturen und eine darauf nicht rücksichtnehmende Behandlung Ankylosen des Gelenkes entstehen. Nach geschehener Reposition ist keine Neigung zu Recidiven vorhanden.

Die **Therapie** der Handgelenksluxationen ist einfach. Die Reposition geschieht leicht durch Extension an der Hand, Contraextension am Arm und directe Impulsion des Carpus an seine richtige Stelle. Zur Retention wird die Hand für 8—10 Tage auf einer gepolsterten Schiene befestigt, sodann ihre Function durch Massage und zuerst vorsichtig ausgeführte gymnastische Uebungen wiederhergestellt.

Differentialdiagnose der Fractura radii loco classico und der Luxatio manus dorsalis.

A. Fractura radii loco classico.

1) Kommt sehr häufig vor.
2) Der Schmerz sitzt 1—2 cm über der Gelenklinie.
3) Der Vorsprung auf der dorsalen Seite fällt gegen die Ulna hin ab.
4) Der Vorsprung auf der volaren Seite reicht nicht bis zur Gelenklinie.
5) Die Achse der Hand geht durch den 4. Finger.
6) Das untere Ende der Ulna prominirt stark.
7) Die Bewegungen des Handgelenkes sind frei.
8) Die Entfernung des Proc. styloideus radii von dem Capitulum radii ist etwas verkürzt gegenüber der gesunden Seite.
9) Die Entfernung des höchsten Punktes des dorsalen Vorsprunges von der Spitze des Mittelfingers ist grösser als die Entfernung der Gelenklinie (oberster Rand des Carpus) von der Spitze des Mittelfingers der gesunden Seite.
10) Es lässt sich zumeist Crepitation und abnorme Beweglichkeit über dem Proc. styloideus radii nachweisen.
11) Die Deformität kehrt beim Nachlass der reponirenden Bewegungen wieder.

B. Luxatio manus dorsalis.

1) Kommt ausserordentlich selten vor.
2) Der Schmerz sitzt in der Gelenklinie.

3) Der Vorsprung auf der dorsalen Fläche liegt gleichmässig über Ulna und Radius und fällt steil ab gegen den distalen Unterarm.
4) Der Vorsprung auf der volaren Seite reicht bis zum Daumenballen und setzt sich hier steil ab.
5) Die Achse der Hand geht durch den Mittelfinger.
6) Das Köpfchen der Ulna ist nicht sichtbar.
7) Die Bewegungen des Handgelenkes sind aufgehoben.
8) Die Entfernung vom Proc. styloideus radii bis zum Capitulum radii ist beiderseits gleich.
9) Die Entfernung des höchsten Punktes des dorsalen Vorsprunges von der Spitze des Mittelfingers ist gleich gross wie auf der gesunden Seite der Abstand des obersten Randes des Carpus von der Spitze des Mittelfingers.
10) Crepitation und abnorme Beweglichkeit fehlen über dem Proc. styloideus radii.
11) Die Deformität lässt sich leicht beseitigen und kehrt nach Aufhören der Repositionsbewegungen nicht wieder.

Brüche der Handknochen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Man unterscheidet an dem Skelett der Hand 3 grössere Abschnitte: die Handwurzel oder Carpus, die Mittelhand oder Metacarpus und die Phalangen.

Die Handwurzel ist aus 8 kurzen, spongiösen, fest mit einander vereinigten, in 2 Reihen angeordneten Knochen zusammengesetzt. Die dorsale Fläche dieser Knochen ist convex gestaltet, während die palmare quer ausgehöhlt erscheint. Die Enden der beiden Reihen sind auf der Palmarseite gekennzeichnet, indem auf der Radial- und Ulnarseite die Eminentiae carpi, zwischen denen das Lig. volare proprium ausgespannt ist, hervorragen. Die dorsalen und palmaren Flächen der einzelnen Knochen sind rauh, die anderen dagegen geglättet. Die Handwurzel ist zur Zeit der Geburt noch vollständig knorpelig. Ihre Knochen haben keine Epiphysen, verknöchern vielmehr von einem einzelnen Kerne aus.

Die Mittelhandknochen bestehen aus einer Basis, einem Capitulum und einem Corpus. Der Metacarpus des Daumens ist der

kürzeste. Die anderen nehmen ulnarwärts stufenweise an Länge ab. Die des 2. bis 5. Fingers sind zu einem flachen Gewölbe vereinigt, dessen Concavität gegen die Hohlhand, dessen Convexität gegen den Handrücken sieht. Jeder einzelne Mittelhandknochen ist in entsprechender Weise leicht gekrümmt, verschmälert sich gleich unterhalb seines vierseitigen Basaltheiles, wird dann nach abwärts wieder breiter, um allmählich in sein einem Kugelsegment entsprechendes, volarwärts stärker vorspringendes Köpfchen überzugehen. Die den Nachbarn zugekehrten seitlichen Flächen sind leicht gewölbt, stossen auf der Volarseite in einer mittleren Kante zusammen und fassen die Knochenzwischenräume zwischen sich. Sie sind durch feste Bandmassen miteinander vereinigt. Die Verknöcherung geschieht von einem Hauptkerne und einer Epiphyse aus. Diese letztere liegt bei den vier Mittelhandknochen der Finger an dem Köpfchenende, bei dem des Daumens dagegen am Basalende.

Die Phalangen sind den Mittelhandknochen ähnlich gebaut, verknöchern aber von einer an ihrer Basis liegenden Epiphyse aus.

Sämmtliche Knorpelfugen der Hand erhalten sich etwa bis zum 16. Lebensjahre.

Die Fracturen der Hand betragen etwa 10% aller Knochenbrüche. Sie kommen entweder an der Handwurzel oder der Mittelhand oder den Phalangen vor.

1. Brüche der Handwurzelknochen.

Die Brüche der Handwurzelknochen sind wohl häufiger, als gewöhnlich angegeben wird, indem sie sehr oft verkannt und mit Contusionen verwechselt werden.

Infolge der gewölbeartigen Anordnung des Carpus setzen die Fracturen desselben eine bedeutende Gewalteinwirkung voraus und sind daher oft mit starker Quetschung oder Zerreissung der bedeckenden Weichtheile verbunden. Die Veranlassung ist entweder eine directe Gewalt, so ein heftiger Schlag, Ueberfahren eines Wagenrades, Quetschung zwischen Eisenbahnpuffern oder häufig auch ein Fall auf den Handrücken. *Delbecq* (1887) erzeugte die Fracturen an der Leiche durch forcirte Flexionen des Handgelenkes bei fixirtem Vorderarm. Nicht selten finden sich gleichzeitig Brüche und Verrenkungen anderer Theile des Armes, namentlich des unteren Radiusendes.

Die **Symptome** sind nicht sehr ausgesprochen, namentlich wenn die Weichtheile stark geschwollen sind. Die Patienten em-

pfinden Schmerz bei Bewegungen der Hand, und es entsteht eine genau der Handwurzelgegend entsprechende Schwellung. Wenn man sich nun überzeugt hat, dass die Vorderarmknochen intact sind, und man durch Betastung einen auf Druck ganz besonders schmerzhaften Punkt der Handwurzel entdeckt hat, so umfasst man mit den Fingern der einen Hand den Carpus auf der Ulnarseite, mit denen der andern auf der Radialseite und macht nun mit beiden entgegengesetzte Bewegungen nach der Dorsal- und Volarseite. Trotzdem eine solche Verschiebung der Fragmente an einander nur in geringer Ausdehnung möglich ist, fühlt man dabei doch zumeist Crepitation, da die getrennten spongiösen Knochenflächen in gegenseitiger Berührung bleiben. Eine Dislocation besteht sehr selten, höchstens kann einmal ein kleines Bruchstück nach dem Dorsum hin dislocirt und dann hier gefühlt werden.

Die **Prognose** ist insofern ungünstig, als zuweilen eine Steifigkeit der Handwurzel zurückbleibt. Wenn aber weiter keine Complicationen vorhanden waren, schadet das nicht viel, da die Beweglichkeit des Carpus an und für sich keine gar zu grosse ist.

Die **Therapie** besteht darin, dass man die Hand für 14 Tage auf eine Schiene aufbindet, in eine Mitella legt und dann nach Abnahme des Verbandes die Massage und Gymnastik erfolgen lässt. Bei complicirten Fracturen gilt neben dem Princip der Aseptik das, möglichst conservativ zu verfahren.

Eine isolirte Fractur des Os naviculare beschreibt *de Fortunet.* Ein Typhuskranker stürzte sich aus dem Fenster hinaus und erlitt dabei eine Verletzung am linken Handgelenk. An diesem fühlte man unterhalb des Proc. styloideus radii deutliche Crepitation, während der Radius selbst offenbar unverletzt war. Bei der Eröffnung des Gelenkes fand sich, dass das Os naviculare in zwei fast ganz gleich grosse Stücke gespalten war. Der Sprung ging von vorne nach hinten. Das äussere Fragment war nach hinten und aussen verschoben und sprang hier auch unter der Haut vor.

2. Brüche der Mittelhandknochen.

Die Fracturen der Metacarpalknochen kommen vorzugsweise bei Erwachsenen vor, sind aber im Ganzen selten und ebenfalls oft complicirt. Sie betreffen vorwiegend den 2. und 5. Metacarpus und in ausserordentlich typischer Weise den des Daumens.

Sie entstehen durch directe oder indirecte Gewalt. Die directen Brüche ereignen sich z. B. am 5. Metacarpus durch Auf-

schlagen mit der Ulnarseite der Hand auf einen kantigen Gegenstand. Durch indirecte Gewalt bricht am häufigsten der Metacarpus des Mittelfingers, und zwar entweder durch einen Fall auf die Spitzen der Finger, wodurch diese in Hyperextension gebracht werden, oder durch einen Fall auf die Köpfchen der Metacarpi der zur Faust geballten Hand. Auch hier trifft ja der Fall zunächst den am meisten prominirenden 3. Knöchel.

Die Bruchstelle findet sich gewöhnlich in der Mitte des Knochens; aber auch Querbrüche in der Nähe des Capitulum, die vielleicht als Epiphysentrennungen aufgefasst werden müssen, sind nicht selten. Dislocation ist entweder gar nicht oder nur in sehr geringer Weise vorhanden, so dass der verletzte Finger höchstens eine minimale Verkürzung im Vergleiche zu dem der gesunden Hand erlitten hat. Daneben kann dann noch eine winklige Knickung an der Bruchstelle vorhanden sein. Der Winkel schaut entweder nach dem Dorsum oder der Vola. Es hängt dies ab von der Art der Gewalteinwirkung. Wenn nämlich der Bruch durch Fall auf die Knöchel des Metacarpus die normale Wölbung desselben zu vergrössern sucht, so wird die winklige Knickung nach dem Dorsum hin erfolgen, wobei vielleicht nach *v. Bardeleben* die den Streckern überlegenen Beugemuskeln das vordere Bruchstück an seinem unteren Ende noch mehr gegen die Vola manus zu ziehen bestrebt sind. Umgekehrt wird bei einem Fall auf die Spitzen der hyperextendirten Finger ein nach dem Dorsum zu offener Winkel entstehen können.

Fig. 211.





Fig. 212.



Besonders typisch sind, wie gesagt, die Fracturen am Metacarpus des Daumens, denen *Bennett* besonders seine Aufmerksamkeit geschenkt hat. *Bennett* hat im Jahre 1886 9 einschlägige Fälle mitgetheilt. Es handelt sich immer um eine Schrägfractur, welche die volare Hälfte der proximalen Gelenkfläche des Daumenmetacarpus von dem übrigen Metacarpus trennt (Fig. 211). In Folge dessen rückt der Metacarpus immer etwas nach hinten, so dass man beim ersten Anblick eine Subluxation des Metacarpus nach dieser Richtung hin vermuthet (Fig. 212).

Misst man jedoch die Länge des Knochens auf seinem Dorsum, so zeigt sich sofort, dass keine Verkürzung vorhanden ist. Bei frischer Fractur lässt sich die Diagnose auch noch dadurch bestätigen, dass man Crepitation nachweist, indem man am Daumen extendirt, während man mit Zeigefinger und Daumen der anderen Hand die Basis des Metacarpus volar- und dorsalwärts umfasst.

Die **Symptome** der übrigen Metacarpalfracturen beziehen sich auf den örtlichen Schmerz, die Anschwellung, die Functionsstörung, den Nachweis von Crepitation und abnormer Beweglichkeit bei Betastung der Bruchstelle und Ausführung beugender, streckender und rotirender Bewegungen mit dem zugehörigen Finger und den Nachweis der Dislocation der Fragmente. Charakteristisch für den Bruch ist es, dass man diese, d. h. eine Winkelstellung der Bruchflächen, wo sie ursprünglich nicht vorhanden war, leicht künstlich erzeugen kann. Zu dem Zweck bestimmt man durch Beugung des Fingers genau die Lage des Gelenkes, setzt dann den Daumen etwas oberhalb desselben auf die Rückseite des Metacarpus und stellt nun den Finger in Hyperextension. Dabei sieht man dann eine Einknickung im Verlaufe des Metacarpus entstehen, während gleichzeitig die Fragmente auf der Beugeseite prominiren.

Bei Brüchen in der Nähe des Köpfchens könnte man an eine Luxation der 1. Phalanx denken. Vor einem solchen Irrthum wird aber die Oertlichkeit des eventuellen Vorsprunges, die Freiheit der Bewegungen im Gelenk und die Crepitation schützen.

Die **Prognose** ist im Ganzen eine günstige. Die Heilung erfolgt durch knöchernen Callus im Verlauf von 25—30 Tagen.

Die **Therapie** vollzieht zunächst die Reduction durch Zug am Finger und Gegenzug am Handgelenk mit gleichzeitiger Coaptation der Fragmente. Ist diese erreicht, so beugt man die Finger, während man gleichzeitig darauf achtet, dass sich die Bruchflächen nicht wieder verschieben, legt dann auf die Dorsalseite derselben ein gepolstertes Schienchen aus Holz, Pappe oder Kautschuk, in die Vola aber ein dickes Wattepolster, welches die gebeugten Finger umgreifen, fixirt nun die ganze Hand und den Vorderarm auf einer Schiene oder in einem Gypsverband und legt beide in eine Mitella. Der Verband muss öfters revidirt und für baldige Massage und Gymnastik der Finger gesorgt werden.

3. Brüche der Phalangen.

Die Fracturen der Phalangen entstehen in der Regel durch directe quetschende Gewalten, kommen aber gelegentlich auch durch forcirte Rotations- oder Seitenbewegungen zu Stande. Der Bruch kann an jeder Stelle des Knochens sitzen. Gar nicht selten durchsetzt er denselben seiner ganzen Länge nach.

Die **Symptome** sind unverkennbar, indem man neben den subjectiven Beschwerden des Patienten Crepitation und abnorme Beweglichkeit, selten dagegen Dislocation nachweisen kann

An den 3. Phalangen kommen zuweilen Rissfracturen vor, indem bei forcirter Beugung derselben die Strecksehnen mit einem Stück des Knochens, an welchem sie inseriren, abreissen. Um diese Fracturen zu erklären, haben *Segond*, *Busch* und neuerdings *Schöning* experimentelle Untersuchungen gemacht. Dem letzteren Autor gelang die Herstellung der Fractur namentlich bei älteren Leuten ausnahmslos dann, wenn eine Vorbedingung erfüllt war, wenn nämlich das erste Interphalangealgelenk oder am Daumen das Metacarpophalangealgelenk gestreckt war. Beugung der Endphalanx mit mässiger Kraft genügte dann, die Abreissung der knöchernen Insertionsstelle der Sehne herbeizuführen.

Die Erscheinungen bestehen in Flexion des Nagelgliedes, das activ nicht gestreckt werden kann, in geringer Geschwulst und Ecchymose der Gelenkgegend. Passiv kann das Glied gestreckt werden, geht aber, losgelassen, sofort wieder in die Flexionsstellung zurück.

Die **Prognose** der Fingerfracturen ist günstig. Sie heilen in der Regel innerhalb 3- 4 Wochen ohne jeden Nachtheil durch knöchernen Callus. Auch die erwähnten Rissfracturen lassen keinen bleibenden Nachtheil zurück, indem nach den Erfahrungen von *Busch* eine Verwachsung der Sehne mit der Kapsel des Phalangealgelenkes eintritt und dieselbe einen neuen Angriffspunkt erhält.

Fig. 213.



Die **Therapie** dieser Rissfracturen besteht darin, dass man den betreffenden Finger in Streckstellung bandagirt. Alle übrigen Phalangealbrüche werden aber in Beugestellung der

Finger verbunden und zwar in der Weise, dass man immer den Nachbarfinger als Schiene benutzt. Namentlich bei complicirten Fracturen muss die Beugestellung dringend innegehalten werden. Denn wenn es zu Bewegungsstörungen kommen sollte, wird ein mässig gekrümmter Finger immer weniger hindern, wie ein gerader steifer. Man besorgt also zunächst durch Zug und Gegenzug am Finger die Reposition, verbindet ihn dann durch Heftpflasterstreifen mit seinem Nachbar, beugt beide und hält sie in dieser Stellung zusammen durch Schienchen, die man aus Guttapercha, Pappe oder zusammengewickeltem Heftpflaster formt und mit schmalen Binden oder Heftpflasterstreifen befestigt (Fig. 213) Man kann auch wohl die beiden Finger einfach mit Gypsbrei bestreichen. In jedem Falle legt man die Hand in eine Mitella und fängt frühzeitig an, zu massiren und methodische Bewegungen zu üben.

Luxationen der Handknochen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Die Handwurzelknochen bilden miteinander das Intercarpalgelenk. Das Os capitatum und hamatum bilden sozusagen einen gemeinschaftlichen Gelenkkopf, welcher in eine durch das Os naviculare, lunatum und triquetrum gebildete Gelenkpfanne aufgenommen wird. Die einzelnen Knochen sind dabei selbst durch plane Gelenkflächen und starke Bänder mit einander verbunden und von der gemeinschaftlichen Handgelenkskapsel umschlossen. Sie bilden zusammen ein flaches, mit der Convexität gegen den Handrücken schauendes Gewölbe, in welchem das Os capitatum die Rolle des Schlusssteines spielt. Aeusserlich trifft man das Intercarpalgelenk unter der die beiden Griffelfortsätze verbindenden Linie. Neben den Sehnen des gemeinschaftlichen Fingerstreckers kann man ulnarwärts die Gelenkspalte zwischen Os triquetrum und Os hamatum, radialwärts die zwischen Os naviculare einerseits und Os capitatum und multangulum minus andererseits und noch weiter nach aussen die Gelenklinie zwischen Naviculare und Multangulum majus betasten. Die der Verbindung zwischen Os capitatum und Os lunatum entsprechende Stelle liegt in der Fortsetzung des dritten Mittelhandknochens etwa $^1/_2$ cm unterhalb

der Mitte zwischen beiden Griffelfortsätzen. Man kann diese Stelle am besten bei passiven Bewegungen der Hand, besonders bei passiver Beugung dem untersuchenden Finger entgegenführen.

Als zweiten hier in Betracht kommenden Gelenkcomplex haben wir die Carpo-Metacarpalgelenke zu erwähnen.

Die Verbindungen der 4 inneren Mittelhandknochen mit der Handwurzel sind Amphiarthrosen, haben plane Gelenkflächen, eine sehr straffe Bandbefestigung und daher nur geringe Beweglichkeit, die am 4. und 5. Finger immerhin noch grösser ist als am 2. und 3. Der Mittelhandknochen des Daumens steht ausser aller näheren Verbindung mit den übrigen, articulirt mit dem Os multangulum majus in einem freien Gelenk und kann daher nach allen Richtungen hin bewegt werden.

Die Köpfchen der Mittelhandknochen stellen mit den grubigen Gelenkflächen der ersten Phalangen die Metacarpophalangealgelenke dar. Die Köpfchen besitzen keine vollständige Kugeloberfläche, sondern gleichen mehr einer Rolle, welche nur auf der Palmarfläche so breit ist, wie die Grübchen der Grundphalangen. Der 2. bis 5. Finger können in dem Gelenk gebeugt und gestreckt werden, lassen aber ausserdem, sobald sie vollständig gestreckt sind, Seitenbewegungen zu. Es rührt dies daher, dass die Gelenke auf beiden Seiten von starken Bändern begrenzt werden. Sind aber die Finger gebeugt, so sind diese Seitenbänder straff gespannt und verhindern jede Seitenbewegung. Diese wird erst ermöglicht, wenn durch Streckung der Finger die Seitenbänder erschlafft sind.

Eine besondere Besprechung verdient das Metacarpophalangealgelenk des Daumens. Dem niederen, breiten, fast dem Abschnitte einer Walze vergleichbaren Gelenkkopfe entspricht hier eine flache, wesentlich quer ovale Gelenkgrube. Die Walze verjüngt sich gegen die Palmarseite, so dass sie auf der Dorsalseite breiter ist als auf dieser. Auf der Volarseite finden sich 2 Condyli, die eine Vertiefung für die lange Beugesehne einfassen. Zwei ähnliche Höckerchen befinden sich zu beiden Seiten der 1. Phalanx, ebenfalls eine Rinne für die lange Beugesehne bildend. An der Volarfläche des Gelenkes liegen, der Basis phalangis in der Regel näher als dem Capitulum metacarpi, 2 Sesambeinchen, die durch ein Band, das Ligamentum intersesamoidale zusammengehalten werden und an der Phalanx vermittelst der Lig. phalango-sesamoidea anhaften. Das erstere Band liegt in innigem Zusammenhange mit den beiden Seitenbändern, die hier so stark entwickelt sind, dass in dem Gelenk nur Beugung und Streckung,

aber durchaus keine Seitenbewegung möglich ist. Die Kapsel ist auf der Dorsal- und Palmarseite dünn und schlaff, wird aber dort, wo sie sich an die Grundphalanx anheftet, durch derbe, quere, von den Seitenbändern ausgehende Fasern verdichtet und verdickt. Diese bilden hier eine Rolle für die Sehnenscheiden der Flexoren und werden beim Versuch einer Dorsalflexion heraufgezogen, infolge dessen sich dann die Kapsel an der unteren Umrandung des Köpfchens stark spannt.

Die Interphalangealgelenke werden durch eine Rolle der proximalen Phalanx gebildet, in welcher die mit 2 Grübchen versehene Endfläche der nachfolgenden Phalanx gleitet. Sehr starke Seitenbänder gestatten den Gelenken nur die Beuge- und Streckbewegung. Stärkere Dorsalflexion wird durch den Bandapparat gehemmt.

1. Luxationen im Intercarpalgelenke.

Bei dem festen Gefüge, den dieser Gelenkcomplex bildet, sind Luxationen desselben sehr grosse Seltenheiten.

Abgesehen von complicirten Schuss- und Maschinenverletzungen existiren bisher nur wenig sichere Beobachtungen *(Maisoneuve, Desprès, Richmond* und *Claudot),* in welchen die **Verbindung der 1. und 2. Handwurzelreihe gegen einander** luxirt war. Dabei handelte es sich um eine vollständige Dislocation der zweiten Handwurzelreihe auf das Dorsum der ersten, in den übrigen Fällen um unvollständige Verrenkungen derselben nach der Volarseite. Die Veranlassung war ein Fall auf die Hand gewesen.

Die **Symptome** der **dorsalen** Luxation glichen denen der typischen Radiusfractur, nur dass die dorsale Schwellung distal von der die Griffelfortsätze verbindenden Linie lag.

Bei der **volaren** Luxation war eine Deformität umgekehrt wie bei dem typischen Radiusbruch vorhanden und stand die Hand in geringer Abduction. Bei Beugung und Streckung im Handgelenk entstand ein ähnliches schnappendes Geräusch, wie bei Einrenkung einer Luxation.

Die **Reposition** geschah bei der dorsalen Luxation leicht durch Extension an der Hand und Impulsion der Knochen an ihre richtige Stelle, bei der volaren durch starke Beugung der Hand ebenfalls verbunden mit dem Zurechtdrücken des Gelenkes.


Vor kurzer Zeit wurde von *Schmidt* ein interessanter Fall von Luxation der distalen Handwurzelreihe nach

dem Handrücken beschrieben, den wir hier als Beispiel der intercarpalen Verrenkungen anführen wollen.

Patient, ein kräftiger, gesunder Mann, war beim Sturz von einer Treppe auf den Rücken und Ulnarrand seiner rechten Hand aufgefallen; dabei war bei feststehender proximaler Handwurzelreihe die distale Reihe gewaltsam volarwärts flectirt und die Hand etwas um ihre Längsachse gedreht worden.

Die Untersuchung ergab zunächst eine geringe Ulnarabduction der ganzen Hand. Der rechte Vorderarm ist, vom Capitulum radii bis zur Spitze des Mittelfingers gemessen, reichlich um 1 cm kürzer als der linke; auf dem Handrücken befindet sich eine etwa hühnereigrosse, querovale Geschwulst von ziemlich

Fig. 214 a und b.



fester Consistenz. Dieselbe nimmt gegen die Finger hin allmählich ohne scharfe Grenze ab, wird aber etwa 1,5 cm unter der Höhe des Capitulum ulnae von einem über den ganzen Handrücken sich hinziehenden, etwa in der Mittellinie des Handgelenkes den Höhepunkt erreichenden Rande umschlossen, der gegen die Finger hin concav gerichtet ist und nach oben steil abfällt. Die active Dorsalflexion der Hand ist vollständig, die übrigen Bewegungen

der Hand theilweise aufgehoben. Etwa $1^1/_2$ Monate nach der Verletzung tritt eine Abductionsstellung der Hand besonders noch am Zeige- und Mittelfinger hervor, während die oben beschriebene Geschwulst beträchtlich zurückgegangen ist und jetzt von scharfen, eckigen Contouren begrenzt wird (Fig. 214 a und b). Die Betastung ergiebt jetzt deutlich eine dorsale Dislocation des Os capitatum, Os hamatum und Os multangulum minus. Die Vertiefungen zwischen den einzelnen Metacarpalknochen markirten sich als seichte Längsfurchen.

Eine Reposition wurde nicht ausgeführt; trotzdem aber stellte sich die Function der Hand in annähernd normalen Grenzen wieder her.

Etwas häufiger als die eben beschriebenen Luxationen sind die **Verrenkungen einzelner Carpalknochen.** *Tillmanns* hat 15 derartige Fälle gesammelt, die das Os naviculare, capitatum, multangulum majus und lunatum, selbst auch das pisiforme betrafen.

Diese Luxationen waren vollständige und unvollständige und häufiger nach dem Dorsum als nach der Vola erfolgt. Die Veranlassung war eine forcirte Volar- oder Dorsalflexion der Hand.

Eine besondere Prädisposition für die isolirte Luxation besitzt das Os capitatum, indem es als Schlussstein des carpalen Gewölbes, bei abnormer, gewaltsamer Spannung dieses letzteren auf die Dorsalfläche desselben herausgedrückt wird.

Die **Symptome** sind bei nicht zu bedeutender Schwellung auffällig genug. Der ausgewichene Knochen bildet auf dem Dorsum oder der Vola eine harte, rundliche Geschwulst, die sich im ersten Fall bei Beugung, im letzteren bei Streckung der Hand vergrössert und um so fühlbarer und auffallender wird, je beträchtlicher die Verrenkung und je magerer die Hand ist.

Die **Reposition** geschieht durch Extension an der Hand und directe Impulsion des prominirenden Knochens, während man die Hand gleichzeitig dorsal oder volar flectirt. Gelingt die Reposition nicht, so hat man den luxirten Knochen auch schon mit Erfolg exstirpirt.

Zur Nachbehandlung würde man die Hand für etwa 14 Tage fixiren und dann durch Massage und Gymnastik die Function derselben wieder herstellen.

2. Luxationen der Carpo-metacarpalgelenke.

Luxationen im Carpo-Metacarpalgelenk des 2.—5. Fingers sind ungemein selten. Nur einmal hat man alle vier Metacarpen vollständig nach dem Dorsum und ein anderes Mal nach der Vola luxirt gefunden. Nur der letztere Fall kam frisch zur Beobachtung (*Tillaux*). Er betraf einen 20 jährigen Patienten, der auf den Rücken der stark gebeugten Hand aufgefallen war. Die Hand stand in Volarflexion und konnte nicht gestreckt werden. Knapp vor der zweiten Carpusreihe war eine deutlich sicht- und fühlbare Depression vorhanden. Die Reduction geschah durch leichte Extension und eine solche Hebelbewegung mit der Hand, dass die Basis der Metacarpen gegen das Dorsum gedrängt wurde. Von isolirten Luxationen hat man volare des Metacarpus indicis, dorsale des 3. und 4. Metacarpus beobachtet. Eine dorsale Luxation des 1. und 2. Metacarpus, jedoch complicirt mit Fractur des dritten, ist ebenfalls beschrieben worden. Die Ursache war in den meisten dieser Fälle das Zerspringen eines Gewehrlaufes.

Etwas häufiger sind Luxationen in dem Carpo-Metacarpalgelenk des Daumens. *Carette* hat im Jahre 1894 in seiner These 27 solcher Beobachtungen aus der Litteratur zusammengestellt. Man hat hier 3 Luxationsformen beobachtet, indem man den Metacarpus auf das Dorsum oder die Vola des Os multangulum majus verrenkt oder auch radialwärts von demselben verschoben fand.

Bei der **dorsalen Luxation**, die durch Fall auf die Rückenfläche des flectirten Daumens oder durch einen directen von der Vola her geführten Stoss entstanden war, ragte der Metacarpus entweder nur leicht nach dem Dorsum hervor, oder er prominirte fast über 1 cm, ja war sogar auf dem Multangulum majus so weit nach dem Handgelenk hingerutscht, dass er hier die Sehnen in der Tabatière emporhob. *Roser* räth, bei unsicherer Diagnose eine starke Flexion zu machen, wodurch man die Gelenkfläche des Metacarpus dem palpirenden Finger entgegenführt.

Die **Reposition** geschieht durch Extension und directe Impulsion.

Die **volare Luxation** ist entschieden seltener als die eben beschriebene. Der Metacarpus pollicis tritt dabei auf die Oberfläche des Os multangulum majus neben den Metacarpus indicis und macht hier in der Palma manus einen Vorsprung.

Der Daumen erscheint nach dem Dorsum umgelegt, seine Function aufgehoben und die Flexoren stark gespannt.

Die **Reposition** geschieht durch Neigung des Daumens gegen die Hohlhand und gleichzeitige Extension desselben.

Die **radiale Luxation** wurde 2 mal als incomplete Verrenkung von *Albert* beobachtet.

Die Verletzung entstand während einer Kraftprobe beim Ringen.

Die Basis des Metacarpus prominirte nach der Radialseite. Seine Längsachse war schief von unten ulnarwärts nach oben radialwärts gerichtet, wodurch auch an der Volarseite ein leichter Vorsprung entstand.

Die **Reposition** geschah leicht durch Zug und Impulsion. Die Festigkeit des in einem Wasserglasverband fixirten Gelenkes wurde jedoch erst nach sechs Wochen wieder normal.

3. Luxationen der Metacarpo-phalangealgelenke.

Luxationen in den Metacarpo-phalangealgelenken sind relativ selten am 2.—5. Finger, häufiger dagegen am Daumen, indem sie bei diesem 4,8 % aller Verrenkungen ausmachen. Es rührt dieser Unterschied in der Frequenz her von der freien Stellung, welche der Daumen den andern Fingern gegenüber einnimmt und die ihn den luxirenden Gewalten mehr aussetzt.

Wir betrachten zunächst diese Daumenluxationen, da sie in vieler Beziehung als Paradigma für die betreffenden Luxationen der übrigen Finger gelten können.

A. Luxationen des Daumens.

Das Metacarpo-phalangealgelenk des Daumens erlaubt, wie schon erwähnt, Beugung und Streckung. Bei stärkerer Volarflexion wird die Bewegung dadurch gehemmt, dass der Daumen auf seinem Ballen aufstösst. Luxationen durch Ueberbeugung sind daher sehr selten. Sie müssen naturgemäss nach der Vola hin erfolgen. Anders steht es mit der Hyperextension. Diese besitzt keine Contacthemmung, bietet daher luxirenden Gewalten gegenüber einen freien Angriffspunkt. In der That sind denn auch die dorsalen Luxationen ungleich viel häufiger als die volaren.

Noch seltener als die volaren Luxationen kommen solche nach der Seite und zwar nur als radiale Verrenkungen vor, Verletzungen, die wie die volaren Luxationen eine combinirte Gewalteinwirkung voraussetzen. Wir hätten also zu besprechen:

a) die dorsalen
b) die volaren } Daumenluxationen.
c) die seitlichen

Spricht man gemeinhin von Daumenluxationen, so versteht man darunter stets

a) die dorsalen Daumenluxationen.

Wenn man die Extension im Metacarpophalangealgelenk des Daumens übertreibt, so findet man einen Widerstand, sobald sich die Grundphalanx des Daumens der dorsalen Grenze seines zugehörigen Metacarpusköpfchens nähert, indem einmal dieses breiter ist als die Gelenkfläche der Phalanx, dann aber auch deshalb, weil bei einer solchen extremen Dorsalflexion der vorher beschriebene kräftige Bandapparat an der Beugeseite des Gelenkes stark angespannt wird. Wirkt jetzt die dorsalflectirende Gewalt noch weiter, so findet die Grundphalanx an dem bezeichneten Punkt des Metacarpus ein Hypomochlion, die Gelenkflächen werden von einander abgehebelt, reissen die Kapsel an der unteren volaren Umrandung des Köpfchens quer ab und kommen durch dieselbe zum Vorschein. Im Momente des Einrisses steht die Grundphalanx also senkrecht auf dem Metacarpus. Meist folgt jetzt der hyperextendirenden aber eine Flexionsbewegung, welche die Phalanx, deren Basis auf dem Dorsum des Metacarpus aufruht, diesem letzteren wieder mehr oder weniger parallel stellt.

Die Gewalten, welche in dieser Weise die Luxation zu Stande bringen, sind in der Regel ein Fall auf die Vorderfläche des Daumens oder ein heftiger Zug an demselben nach hinten, z. B. beim Ringen, oder ein Stoss gegen ihn beim Kampf mit Schlüsseln, während der Daumen zum festeren Halten eines solchen in den Ring des Schlüsselgriffes gesteckt ist.

Untersuchen wir die pathologisch-anatomischen Charaktere einer frischen Daumenluxation, so interessirt uns wesentlich das Verhalten der Gelenkflächen zu einander, der Zustand des volaren Sesamapparates, der Kapsel und der das Gelenk umgebenden Sehnen und Muskeln.

Was zunächst die Gelenkflächen anbetrifft, so kann die der Phalanx das Metacarpusköpfchen vollständig verlassen haben oder noch theilweise auf dessen dorsalem Rande aufstehen. Im ersten Fall würden wir eine vollständige, im letzteren eine unvollständige Luxation vor uns haben. Nun unterscheidet man allerdings hier am Daumengelenk vollständige und unvollständige Luxationen, macht aber ihre Unterscheidung nicht allein von dem mehr weniger bestehenden Contact der Gelenkflächen abhängig, sondern, nach den grundlegenden Untersuchungen *Faraboeuf*'s vor allem auch von dem Verhalten der Sesambeinchen.

Man spricht nämlich von einer incompleten Luxation dann, wenn die Sesambeinchen mit dem sich zwischen ihnen ausspannenden Bandapparat (Lig. intersesamoideum) auf den oberen Rand der metacarpalen Gelenkfläche heraufgerutscht sind, in ähnlicher Weise, wie man eine Brille von der Nasenwurzel auf die Stirne schiebt. Die Grundphalanx steht dabei mit der volaren Hälfte ihrer Gelenkfläche ebenfalls auf dem dorsalen Rand des Metacarpusköpfchens und wird durch die quer über das Köpfchen gespannte Schlinge des Sesamapparates am Zurücktreten in die Beugestellung verhindert.

Die Seitenbänder können bei dieser Luxationsform intact sein. Es zerreissen neben der Kapsel höchstens noch die Lig. metacarposesamoidea. Die Fasern des M. abductor brevis und des Adductor ziehen jetzt dorsalwärts von der Drehachse des Gelenkes und unterstützen wohl die Fixation der Phalanx in ihrer falschen Stellung.

Die unvollständige Luxation kann von einzelnen Individuen, besonders von solchen mit schlaffem Bandapparat willkürlich erzeugt und reponirt werden.

Bei der completen Luxation ist die Gelenkfläche der Phalanx mit dem unzertrennlich an sie befestigten Lig. intersesamoideum auf das Dorsum des Metacarpus hinaufgestiegen, und hat sich das Band um den Nacken des Metacarpus herumgeschlungen.


Es reisst dabei in der Regel nur das Lig. laterale externum von seinem Metacarpusansatz ab, während das internum erhalten oder nur in seinen tiefen Fasern, zuweilen mit einem Stück Periost vom Knochen abgelöst ist. Die Folge davon ist die, dass auch nur das äussere Sesambein auf das Dorsum metacarpi hinaufzusteigen vermag, während das innere an der innern obern Seite des Gelenkes liegen bleibt.

Nur selten ist umgekehrt das innere Sesambein aufwärts dislocirt und zwar dann, wenn gelegentlich einmal das innere Seitenband stärker zerrissen war.

Der Kopf des Metacarpus ist bei der vollständigen Luxation zwischen der äusseren Portion des Flexor brevis und dem Abductor brevis einerseits und der inneren Portion des Flexor brevis und dem Adductor andererseits hindurchgetreten und steht dicht unter der Haut der Vola.

Diese Muskeln erfahren dabei theils Zerrungen, theils Verschiebungen. So wird der Adductor, der sich am innern Sesambein inserirt, nach innen verschoben, während der Flexor brevis, der sich am äusseren Sesambein ansetzt, in seinen vorderen inneren Fasern zerreisst, in seinen äusseren Fasern dagegen nach aussen luxirt. Der Abductor brevis bleibt in der Regel erhalten; die Sehne des Flexor pollicis longus wird dagegen dislocirt. Indem sie nämlich schon normal ulnarwärts von der Achse des Metacarpus verläuft, rutscht sie jetzt, von dem ja meistens intact gebliebenen Lig. laterale internum mitgezogen, über den inneren Rand des Metacarpusköpfchens nach innen. Vergegenwärtigen wir uns also noch einmal die Lage dieses selbst, so wird sein Hals nach innen umschlungen von der Sehne des langen Beugers und dem inneren Theil des Flexor brevis, während auf seiner Aussenseite der äussere Theil des Flexor brevis und auf seinem Rücken das Lig. intersesamoideum und das äussere Sesambein aufliegt (Fig. 215).

Fig. 215.



Die **Symptome** der dorsalen Daumenluxationen sind äusserst charakteristisch. Betrachten wir zunächst die der **unvollständigen** Luxation (Fig. 216), so fällt sofort die a b n o r m e S t e l l u n g des D a u m e n s auf. Derselbe bildet mit seinem Metacarpus eine b a j o n e t t f ö r m i g e K n i c k u n g, indem die Grundphalanx in einem stumpfen Winkel dorsal flectirt steht, während die zweite Phalanx zur ersten halbgebeugt ist. Die B e w e -

gungen der ersten Phalanx sind fast aufgehoben, weil die intacten Seitenbänder die verrenkten Knochen gegen einander pressen. Die Sehne des Extensor verläuft straff gespannt nach der ulnaren Seite des Gelenkes hin, während radialwärts von ihr eine tiefe Grube entsteht, in der man gelegentlich den dorsalen Rand der Grundphalanx fühlen kann. Auf der Volarseite ragt das Köpfchen des Metacarpus dicht unter der Haut hervor. Da Phalanx und Metacarpus nicht gegen einander bewegt werden können, so hält der Anfänger diesen Vorsprung in der Hohlhand gewöhnlich für die Basis der Grundphalanx, indem der Vorsprung ja in der That in der Verlängerung der Achse der Grundphalanx liegt. Ein solcher Irrthum wird dann leicht durch die Palpation aufgeklärt, indem dieselbe zeigt, dass der Vorsprung eine runde Wölbung besitzt, während dagegen die Phalanxbasis concav ausgehöhlt ist.

Fig. 216.





Fig. 217.



Die **Symptome** der vollständigen Luxation (Fig. 217) sind fast noch ausgesprochener, werden aber zuweilen durch eine starke Schwellung und blutige Suffusion des Gelenkes etwas verdeckt. Die bajonettförmige Knickung des Daumens ist jetzt zu einer vollständigen Z-Stellung desselben geworden, indem die Achse der ersten Phalanx senkrecht auf der des Metacarpus steht, während die zweite Phalanx wiederum gebeugt ist. Nur in Ausnahmefällen ist die

2. Daumenphalanx nicht gebeugt, sondern gestreckt, dann nämlich wenn die Sehne des Flexor pollicis longus nach innen vom Metacarpusköpfchen abgeglitten ist. Im Gegensatz zu der „Z-Stellung" bezeichnet man dann wohl die Stellung des Daumens als „Bajonettstellung". Weiterhin finden wir auch hier wiederum den Vorsprung in der Vola, während der Daumen öfter, entsprechend dem Zug des inneren Bandes, gleichzeitig eine Dislocation nach dem Zeigefinger eingegangen ist, so dass er dann also dorso-ulnarwärts steht. Der Metacarpus des Daumens und dieser daher mit ihm steht abducirt und etwas opponirt, so dass der ganze Thenar an Breite ab-, an Dicke aber zunimmt. Dem entsprechend ist auch die Grenzfalte zwischen Thenar und Hohlhand viel tiefer als normal. Der Daumen ist entweder unbeweglich fixirt, namentlich dann, wenn er die Z-Stellung inne hat — *Rose* nennt diese Form die steife Form, oder aber er ist, namentlich, wenn die Seitenbänder zerrissen sind, ziemlich ausgiebig beweglich — die „wacklige" Form nach *Rose*. Man kann ihn dann von einer Seite zur andern, von vorn nach hinten schieben, ihn auch um seine Längsachse rotiren und kann ihn schliesslich auf dem Dorsum des Metacarpus auch wohl so gegen die Beugestellung hin umlegen, dass seine Achse parallel zur Achse des Metacarpus zu liegen kommt. Der Daumen erscheint dann vom Os multangulum majus aus gerechnet selbst bis zu 1,5 cm verkürzt. Lässt man dann die Phalanx wieder los, so federt sie wieder in ihre aufgerichtete, hyperextendirte Stellung zurück.

Fig. 218.



Bei solchen Versuchen muss man sehr vorsichtig sein. Es kann einem sonst passiren, dass man aus der completen Luxation die von *Faraboeuf* sogenannte **complexe** hervorbringt (Fig. 218). Diese ist nach dem genannten Autor dadurch charakterisirt, dass sich das äussere Sesambein zwischen der Phalanx und dem Metacarpus einklemmt und zugleich umdreht. Sie entsteht dadurch, dass sich bei der ebengenannten

Manipulation — Extension und Volarwärtsdrücken der Phalanx — das Sesambein zunächst auf die hohe Kante stellt, dann aber bei fortdauerndem Zug umgedreht, gleichsam umgewälzt wird, so dass es nun, während es sich zwischen die beiden Knochen einschiebt, seine überknorpelte Fläche dorsalwärts stehen hat.

Ist die complexe Luxation eingetreten, so steht jetzt die Phalanx parallel mit dem Metacarpus. Die früher vorhandene Beugung des Interphalangealgelenkes ist verschwunden, der Durchmesser des Gelenkes von der Beuge- und Streckseite auffallend vergrössert und die Gelenkfläche der Phalanx vom Dorsum her deutlich abzupalpiren. Ist eine stärkere Schwellung vorhanden, so kann man sich diese Palpation durch eine stärkere Beugung des Daumens erleichtern, indem dann die Phalanxbasis auf dem Dorsum des Metacarpus noch mehr hervorspringt.

Die **Prognose** der dorsalen Daumenluxation, die nicht sofort reponirt wird, ist durchaus nicht sehr günstig zu stellen, da die Luxation bald veraltet und der Gebrauch des Gliedes dann sehr leidet. Der Daumen kann zwar im Laufe der Zeit eine mehr und mehr der normalen sich nähernde Lage einnehmen, es kann sich auch wohl eine neue Gelenkhöhle bilden, aber es kehrt doch mit der Beweglichkeit die alte Kraft nicht wieder zurück.

Selbst reponirte Fälle behalten oft eine gewisse Schwäche mit einer Disposition zum Wiedereintritt der Luxation.

Sehen wir nun ab von gewaltsamen Repositionsversuchen, bei denen man den ganzen Daumen ausriss oder auch wohl eine Gangrän desselben erzeugte, so gelingt doch die Einrichtung der Luxation selbst bei rationeller Reposition nicht immer. Es können sich derselben vielmehr von aussen unüberwindliche, nur dem Messer zugängliche, in den pathologischen Veränderungen des Gelenkapparates begründete Hindernisse entgegenstellen.

Derartige **Repositionshindernisse** hat man nach und nach eine ganze Reihe gefunden, die sich auch wohl mit einander combiniren können.

Fangen wir mit dem Knochen selbst an, so ist, wenn auch selten, zunächst die keilartige Form des Metacarpusköpfchens zu beschuldigen *(Hey)*, indem der breite Rücken desselben nicht wieder durch die relativ zu engen und kurzen Weichtheile zurücktreten kann. Wir wissen ja, dass das Lig. intersesamoideum den Hals des Metacarpus umschlingt, während von beiden Seiten des-

selben die Seitenbänder herabziehen. Sind diese nun, was ja gelegentlich vorkommt, erhalten, so wird der Metacarpuskopf von einem förmlichen Bänderring umfasst, der sich sehr schwierig so weit öffnen lässt, dass der durch ihn hindurch gesteckte Kopf zurückgleitet, weil ein Theil dieses Ringes — das zwischen den Sesambeinen ausgespannte Band — unausdehnbar ist. Die Spannung der Seitenbänder selbst, auf welche *Dupuytren* das Hauptgewicht legte, spielt wohl kaum eine Rolle, weil das radiale ja meist zerrissen ist. Ist es aber erhalten, so hängt vom Grade des Erhaltenseins der Bänder sicher viel mehr der Grad der Verrenkung als die Schwierigkeit der Reposition ab. Auch die *Vidal*'sche Ansicht, dass die kurzen in der Nähe des Gelenkes inserirenden Muskeln den durchgetretenen Kopf wie in einem Knopfloch fest umklammern und ihn nicht wieder herauslassen sollten, trifft wohl nur ganz ausnahmsweise zu, weil die Muskeln öfters ja selbst zerreissen und ausserdem die Repositionsschwierigkeit auch in der Narcose und an der Leiche bestehen bleibt. In der Regel beruht das Repositionshinderniss auf einer Interposition des Sesambeines oder von Theilen der Kapsel zwischen Phalanx und Metacarpus oder auf einem abnormen Verlauf der Sehne des langen Beugers.

Die Interposition des Sesambeines wurde zuerst von *Lücke*, dann von *Faraboeuf* als ein wesentlicher Behinderungsgrund der Reposition erkannt, und zwar fand sie *Lücke* bei der Operation eines einschlägigen Falles, *Faraboeuf* bei zahlreichen Leichenversuchen.

Dieses Hinderniss tritt jedoch in seiner Häufigkeit zurück gegen die besonders von *Roser* gelehrte Interposition der Kapsel. Wir haben Eingangs schon erwähnt, dass diese bei der gewaltsamen Abhebelung der Gelenkflächen in der Regel an der volaren Umrandung des Metacarpusköpfchens quer abreisst. Sie bleibt dann an der Phalanx in Gestalt eines grossen Lappens hängen, der an seinem freien Rand zu beiden Seiten die Sesambeinchen trägt. Im Moment der Luxation kann es nun geschehen, dass sich dieser Theil der Kapsel, dem äusseren Luftdruck folgend, nach der Dorsalseite hin umklappt und sich zwischen Metacarpus und Phalanx hineinschiebt. Die Sesambeinchen machen dann natürlich die Dislocation mit, und so wird neben der Kapsel auch noch das Lig. intersesamoideum eingeklemmt.

Neben der Interposition des Sesambeines und der Kapsel constatirte man durch Operation irreponibler Luxationen als häufiges Hinderniss der Reposition weiterhin einen abnormen Verlauf der Sehne des Flexor pollicis longus. Die Sehne gleitet nämlich bei der Entstehung der Luxation ulnarwärts vom Metacarpusköpfchen ab, indem sie bei intactem innerem Seitenband fest an die Phalanx angeheftet ist, derselben also in ihrer abnormen Bewegung folgen muss, und geräth dann auf die Dorsalseite des Metacarpusköpfchens. (*Lisfranc, Péan, v. Esmarch, v. Bardeleben, Lauenstein, v. Bergmann*).

Wir erwähnten schon vorher, dass die Fälle, in denen dies Abgleiten der langen Beugesehne nach innen hin stattgefunden hat, sich dadurch auszeichnen, dass im klinischen Bilde die 2te Phalanx des Daumens nicht gebeugt, sondern gestreckt steht. Es ist dann auch das Metacarpusköpfchen in der Vola sehr deutlich zu fühlen. Schliesslich wollen wir noch anführen, dass *König* in einem Fall, der von ihm durch Operation geheilt wurde, beobachtete, dass der äussere Abschnitt der Phalangealgelenkfläche abgerissen und auf dem Dorsum des Metacarpus zwischen diesem und der intakten Gelenkhälfte der Phalanx interponirt war.


Die **Therapie** soll sich aller dieser Repositionshindernisse bewusst sein und die Reposition nur mit Berücksichtigung der pathologischen Verhältnisse geschehen.

Die kräftige Extension an dem verrenkten Gliede oder die forcirte Beugung desselben, Methoden, die man früher anwandte, sind daher nicht zu empfehlen, zumal da man durch sie, wie vorher erörtert, die complete Luxation in die schlimmere complexe verwandeln kann. Es concurriren vielmehr wesentlich 2 andere Verfahren, nämlich die directe Impulsion der Phalanx (*Faraboeuf*) und die Hyperextension derselben mit nachfolgender Flexion (rationelle Methode, *Roser*).

Die directe Impulsion soll den um den Hals des Metacarpus herumgeschlungenen, eventuell interponirten Sesamapparat durch die Phalanx selbst wieder an seine richtige Lage bringen. Man führt sie zweckmässig in folgender Weise aus. Die kranke Hand wird in Mittelstellung zwischen Pro- und Supination auf eine Tischkante gelegt, so dass der luxirte Daumen nach oben steht, der Kleinfingerthenar aber auf der Tischkante aufruht. Nun legt der Operateur, indem er dem Kranken seinen Rücken zuwendet, beide Daumenspitzen gegen die Dorsalfläche der

mehr weniger senkrecht zum Metacarpus stehenden Phalanxbasis, umfasst mit den Spitzen beider Zeigefinger das Capitulum metacarpi, mit den anderen Fingern aber die Hand des Patienten. Jetzt drückt er mit den Daumenspitzen die Basis der Daumenphalanx nach vorn und lässt sie über die Gelenkfläche des Köpfchens volarwärts heruntergleiten, wobei gleichzeitig die ansa des Sesamapparates vorgeschoben wird. Diese rutscht dann, sobald sie am Rande der gewölbten Metacarpalgelenkfläche angekommen ist, bei weiterem Druck in ihre frühere Lage zurück, worauf das Einschnappen der Gelenkflächen von selbst erfolgt und die Reposition gelungen ist. Man kann sich die Reposition erleichtern, wenn man während der

Fig. 219.



Impulsion noch eine Extension am Daumen ausführen lässt. Diese Extension geschieht dann durch einen Gehülfen entweder mittelst seiner Finger, oder da der Daumen nur eine kurze Handhabe bietet, mittelst besonderer Schlingen oder Zangen, wie solche von *Luer*, *Matthieu* und *Collin* angegeben sind. Die obenstehende Figur zeigt die Anwendung der *Collin*'schen Zange neben der gleichzeitigen Impulsion (Fig. 219).

Die zweite Methode — die Hyperextension mit nachfolgender Flexion — sucht die luxirte Phalanx auf demselben Wege zurückzuführen, auf welchem die Luxation entstand. Man fasst den Daumen mit den Fingern oder einer der genannten Zangen, hyperextendirt ihn stark, d. h. legt ihn gegen seinen Metacarpus möglichst weit dorsalwärts zurück, um die eventuell eingeklemmte Kapsel frei zu machen, schiebt dann die Basis der Phalanx derart schleifend nach vorn, dass der interponirte Kapseltheil vor ihr her an seine normale Stelle gleitet, und geht dann,

sobald man am dorsalen Rand des Metacarpusköpfchens angekommen ist, langsam in die Beugestellung über. Das Einschnappen der Gelenkflächen zeigt wieder die gelungene Reposition an.

Wenn, wie dies ja gelegentlich der Fall ist, der Daumen nicht nur dorsal flectirt, sondern gleichzeitig ulnarwärts abgewichen ist, so empfiehlt es sich, ehe man die Hyperextension vornimmt, durch Rotation in entgegengesetzter Richtung, vielleicht auch durch Bewegungen im Sinne der Abduction und Adduction, dem Daumen erst die senkrechte Stellung zum Metacarpus zu geben. Die gleichen Manipulationen würden auch die eingeklemmte Sehne des langen Beugers befreien können.

Hat man es mit einer complexen Luxation zu thun, so muss diese erst wieder in eine complete zurückverwandelt werden. Es geschieht dies in der Weise, dass man in der Richtung der parallel zum Metacarpus stehenden Phalanx kräftig extendirt, bis man die Verkürzung ausgeglichen hat, dann aber immer ziehend die Phalanx so stark dorsal flectirt, dass sich das Sesambeinchen wieder umdrehen kann. Die so entstandene complete Luxation wird dann in der angegebenen Weise behandelt.

Durch die eine oder andere der beschriebenen Methoden gelingt es, etwa $^2/_3$ der Daumenluxationen zu reponiren; bei $^1/_3$ derselben kommt man aber nicht zum Ziel. Es ist dann eines der oben genannten Repositionshindernisse vorhanden, die nur auf blutigem Wege beseitigt werden können.

In früheren Zeiten ging man mit dem Tenotom ein und durchnitt subcutan die vorspringenden oder besonders stark gespannten Sehnen und Bänder. Man gelangte dabei jedoch oft nicht zum Ziel, da man ja die interponirte Kapsel oder die interponirten Sesambeine nicht erreichte. Heutzutage wird man unter dem Schutze der Aseptik das Gelenk durch einen Schnitt auf der radialen Seite der Strecksehne oder auf der volaren Seite über dem Metacarpusköpfchen eröffnen, die Wunde auseinanderhalten lassen und sich mit dem Auge über die vorliegenden Verhältnisse orientiren. Ein kleiner Schnitt in die seitlichen Gelenkbandfasern wird dann genügen, um die beiden Knochen von einander abziehen, die Repositionshindernisse beseitigen und die Reposition vollführen zu können. Die luxirte Sehne des Flexor pollicis longus holt man am besten mit einem Schielhaken von der Dorsalfläche des Metacarpuskopfes über seine innere Fläche herab.

Die Arthrotomie ist auch in veralteten Fällen zu versuchen. Kommt man aber mit derselben nicht zum Ziel, so hat

man schon öfter mit Erfolg die Resection des Metacarpusköpfchens ausgeführt.

Will man auf die vollständige Reposition verzichten, so hat *Hueter* ganz leidliche functionelle Resultate dadurch erzielt, dass er in solchen Fällen, wo mit annähernder Sicherheit eine Kapselinterposition angenommen werden konnte, die Knochen in fast normale Stellung brachte und sie in dieser, um ein Wiedereintreten der Dislocation bei Aufhören des corrigirenden Zuges zu verhüten, in einem Gypsverband fixirte. Hatte ein solcher Verband 14 Tage gelegen, so war dann die Neigung zum Wiedereintritt der Verrenkung, wahrscheinlich wohl durch eine Druckatrophie der interponirten Theile, verschwunden, und es konnte mit activen und passiven Bewegungen begonnen werden.

Zur Nachbehandlung des reponirten Daumens muss derselbe in leichter Beugestellung mittelst einer Pappschiene und einer Spica pollicis aus gestärkten Binden für 14 Tage festgestellt werden. Nach Ablauf dieser Zeit ist dann durch Gymnastik und Massage für eine Wiederherstellung seiner alten Kraft und Beweglichkeit zu sorgen.

b) Die volaren Daumenluxationen.


Die volaren Daumenluxationen sind ausserordentlich selten. Dies rührt wohl daher, dass eine Ueberbeugung des Metacarpo - Phalangealgelenkes nicht stattfinden kann, weil sich bei einer solchen die Spitze des Daumens in seinen Thenar einbohren müsste. Es gehören vielmehr sehr starke combinirte Gewalten zur Erzeugung der Luxation, indem neben der Beugung der Grundphalanx gleichzeitig noch rotirende, ab- oder adducirende Kräfte auf sie einwirken müssen.

Gemäss dieser Wirkungsweise der Kräfte fand man die Luxation auch nie rein volar, es stand vielmehr die Phalanx stets auch gleichzeitig ulnar- oder radialwärts rotirt. Diese Rotation muss dann noch durch die Configuration der Gelenkflächen unterstützt werden. Da nämlich die volare Fläche des Capitulum metacarpi sphärisch convex, die Dorsalfläche der Phalanxbasis aber nach beiden Seiten hin stark abschüssig convex ist, so kann sich die Gelenkfläche der letzteren nicht mitten auf der runden Fläche des Capitulum halten, sondern muss sich nach einer Seite drehen *(Meschede)*. Nach welcher Seite sich der Daumen dabei dreht, hängt wohl von der Dislocation der langen Streck-

sehne ab. Diese rutscht nämlich entweder radial- oder ulnarwärts vom Metacarpus ab und muss dann in Folge ihrer Spannung den Daumen im Sinne ihrer Verlagerung mit sich ziehen. Die Sehne soll sich sogar zwischen die beiden Knochen interponiren können. Stets ist die Kapsel ausgiebig zerrissen, und ebenso sind stets beide Seitenbänder zersprengt.

Die **Symptome** sind bei nicht zu starker Schwellung nicht zu missdeuten (Fig. 220). Das Metacarpusköpfchen ragt auf dem Handrücken vor und ist dort von der Strecksehne bedeckt, wenn dieselbe in der Medianlinie verblieben ist. Die Basis der ersten Phalanx prominirt dagegen in der Vola und kann dabei ziemlich weit nach dem Handgelenk zu verschoben sein. Ist die Strecksehne radialwärts herabgerutscht, so steht die Phalanx nach dieser Seite abducirt, die Oberfläche des Daumens aber supinirt, ist sie ulnarwärts dislocirt, so hat umgekehrt die Phalanx eine Adductionsstellung bei gleichzeitiger Rotation ihrer Vola im Sinne der Pronation.

Fig. 220.



Die **Reposition** geschieht durch Rotation im entgegengesetzten Sinne des Daumenstandes, um die Strecksehne wieder median zu bekommen, Extension zur Ausgleichung der Verkürzung, Hyperextension zur Adaption der Gelenkflächen und directe Impulsion derselben, sobald sie sich mit ihren Rändern wieder berühren.

Da wegen der ausgedehnten Zerstörung des Gelenkbandapparates Neigung zu Recidiven der Luxation besteht, muss die Retention und Nachbehandlung sorgfältig geschehen in gleicher Weise wie bei der dorsalen Luxation.


c) Die seitlichen Daumenluxationen.

Die Kenntniss der seitlichen Daumenluxationen verdanken wir einer Beobachtung *Bessel Hagen*'s. Da diese die einzige bisher bekannte ist, lassen wir dieselbe zunächst hier folgen.

Ein 28jähriger kräftiger Mann war im Streit mit seinem Gegner, als er diesen bei der Kehle gepackt und gewaltsam von sich abzudrängen versucht hatte, mit seiner krampfhaft zusammengekrallten linken Hand nach oben gegen den Unterkiefer seines Feindes ausgeglitten, so dass der Unterkiefer wie ein Keil zwischen den Daumen und die übrigen 4 Finger eingetrieben wurde. Sofort fühlte der Patient einen heftigen Schmerz an seinem Daumen, so dass er unfähig war, die Hand noch weiter zu gebrauchen.

12 Stunden später untersuchte ihn *Bessel Hagen* und fand dabei das in Fig. 221 wiedergegebene Bild. Neben einer stärkeren Schwellung und schwachen Sugillation an der radialen

Fig. 221.



Hälfte der Hand zeigte es sich, dass der Einschnitt zwischen Daumen und Zeigefinger an Tiefe eingebüsst hatte, während die Interdigitalcommissur abnorm weit vorgetrieben, der Daumen aber um nahezu $1^1/_2$ cm verkürzt erschien. Der Daumen stand leicht opponirt bei geringer Beugung im Interphalangealgelenk. Die Längsachse der ersten Daumenphalanx (dc) war seitlich abgewichen, derart, dass sie mit dem Schaft des Metacarpus (ab) einen stumpfen, nach der radialen Seite zu geöffneten Winkel bildete. Dabei traf sie, centralwärts verfolgt, nicht auf die Gegend des Metacarpo-Phalangealgelenkes, sondern verlief seitlich und zwar radialwärts bis etwa zur Mitte des Metacarpus. Schliesslich war die Grundphalanx noch um ihre Längsachse rotirt und die Haut an der Grenze des Thenar in tiefe Falten (e) eingeschnitten. Die Palpation liess deutlich das Köpfchen des Metacarpus und die Basis der ersten Daumenphalanx abtasten. Bewegungen liessen sich passiv nur als abnorme Ab- und Adductionsbewegungen unter heftigen Schmerzen ausführen.

Nach diesen klinischen Erscheinungen war es klar, dass es sich um eine complete, rein seitliche, radiale Luxation des Daumens handelte.


Die Reposition gelang in der Narcose leicht durch einen kräftigen Zug am Daumen in der Richtung der Abduction und einen directen Druck auf die abgewichene Phalanxbasis nach der Ulnarseite hin. Die Gelenkenden sprangen mit deutlichem Schnappen in ihre frühere Stellung ein.

Die Function und Festigkeit des Gelenkes stellte sich im Laufe der Zeit wieder vollständig her.

Die Art der Gewalteinwirkung in diesem Fall ist nach *Bessel Hagen* derart gewesen, dass, während durch Contraction des Musculus opponens der erste Metacarpalknochen fixirt und das Metacarpophalangealgelenk gestreckt war, eine combinirte Kraft die Gelenkflächen dieses letzteren Gelenkes im Sinne der Abduction von einander abhebelte und gleichzeitig ebenfalls im Sinne der Abduction einen directen Druck auf das proximale Gelenkende der Daumenphalanx ausübte.

Was die pathologisch-anatomischen Verhältnisse des Falles betrifft, so ist nach *Bessel Hagen*'s kritischen und ex-

Fig. 222.



perimentellen Untersuchungen sicher anzunehmen, dass beide Seitenbänder des Gelenkes gerissen waren und dass daneben sowohl von dem dorsalen, wie dem volaren Theile der Gelenkkapsel einzelne Faserzüge der übermässigen Dehnung nachgegeben hatten. Wahrscheinlich hatte der Riss von dem ulnaren

Seitenband ausgehend in querer Richtung die dorsalen und volaren Theile der Kapsel durchsetzt, ohne jedoch ganz bis zur Radialseite vorzudringen. Der Kapselriss lag dabei an der Volarseite wie bei der dorsalen Daumenluxation, an ihrem Ansatz am Metacarpus. Die Muskeln waren einfach dislocirt, wie sich aus der Betrachtung der Fig. 222 leicht ergiebt.

Die **Reposition** müsste bei misslingender einfacher Extension und Impulsion des Daumens darin bestehen, dass man durch eine Hyperabduction zunächst die Erschlaffung der angespannten Kapselstränge zu bewerkstelligen hätte, diesem ersten Acte dann die Extension bei fixirter Hand und dieser endlich die Coaptation durch directen Druck auf die Phalanxbasis folgen liesse.

B. Luxationen der übrigen 4 Finger im Metacarpophalangealgelenk.

Die Luxationen der Grundphalangen des 2.—5. Fingers sind wohl etwas häufiger, als man sie zu Gesicht bekommt, da sie wohl des Oefteren von dem Verletzten selbst reponirt werden. *Zöge v. Manteuffel* fand 1889 in der Litteratur 10 Fälle beschrieben. Relativ am meisten wird der Zeige- und der kleine Finger betroffen.

Sie erfolgen wie die Daumenluxationen in der Mehrzahl der Fälle **auf das Dorsum** des Metacarpus und zwar durch Gewalten, die hyperextendirend und zugleich rotirend auf den betreffenden Finger einwirken.


Die Kapsel reisst auch hier an ihrem Ansatz am Metacarpus ab und kann sich ebenfalls sammt einem Sesambein zwischen Phalanx und Metacarpus interponiren (*Willemer*, *Klemm*). Zuweilen steht der luxirte Finger nicht gerade median, sondern zeigt ausserdem noch eine ulnare oder radiale Abweichung. In der Mehrzahl der Fälle sind die Luxationen complicirte. Sie sind auch hier wieder entweder vollkommen oder unvollkommen.

Die **Symptome** der **vollständigen** Luxation sind Verkürzung des Fingers, der in Flexions- oder Extensions- oder Hyperextensionsstellung steht und dabei radial oder ulnar abgewichen sein kann. Vorspringen der Phalanxbasis auf dem Dorsum des Metacarpus, Vorspringen des Metacarpusköpfchens in der Hohlhand (Fig. 223). Bei Luxationen des Zeigefingers ist die den Daumenballen um-

kreisende Hautfalte tief eingezogen. Die Bewegung des Fingers ist meist ganz aufgehoben.

Bei der **unvollständigen** Luxation ist der Finger nicht verkürzt. Es findet sich aber der dorsale und volare Vorsprung, während sich der Finger in Extensionsstellung und zugleich in einer höheren Ebene als der Metacarpus befindet.

Fig. 223.



Die **Reposition** geschieht in der Regel leicht durch Ueberstreckung des Fingers, Vorschiebung der Phalanx gegen das Metacarpusköpfchen und Beugung derselben, sobald sie an die Gelenkfläche des letztern angekommen ist.

Interposition der Kapsel, eines Sesambeinchens, Spannnng der langen Beugesehne kann die Reposition hindern, so dass sie wie bei der dorsalen Daumenluxation erst nach Arthrotomie des Gelenkes möglich wird. *Zöge von Manteuffel* empfiehlt, dieselbe von der Volarseite aus vorzunehmen, da man vom Dorsum aus das Gelenk nicht genügend freilegen kann. *Klemm* hat dagegen bei einer 4 Wochen bestehenden Luxation des Zeigefingers das unüberwindliche Repositionshinderniss, das in der Interposition eines grösseren Theiles der Gelenkkapsel bestand, von einem dorsoradialen Schnitt aus freigelegt und bequem entfernt. *Klemm* musste ausserdem die beiden Gelenkenden aus derben Bindegewebsschwarten herauspräpariren und erreichte trotzdem ein recht befriedigendes Resultat.

Die **volaren** Luxationen sind ganz ausserordentlich selten. Sie lassen sich auch durch die höchsten Grade der Beugung nicht künstlich erzielen, und nahm man daher früher als wahrscheinlich an, dass sie durch directe schwere Gewalten, welche die Phalanx durch die volare Kapsel hindurchtreiben, erzeugt würden. *Bardeleben* beschreibt einen Fall, wo durch eine Maschinenverletzung alle

Finger mit Ausnahme des Daumens volarwärts verrenkt waren. Sonst waren nur 4 Fälle: zwei am Zeigefinger, einer am Ring- und Kleinfinger und einer am Mittelfinger bekannt.

Im Jahre 1887 beobachtete nun *Nannotti* 2 weitere einschlägige Fälle, eine volare Luxation des Zeigefingers und eine solche des Mittelfingers, die ihn zu experimentellen Studien veranlassten. Durch stumpfwinklige Hyperextension des Fingers erzeugte er einen Einriss der volaren Kapselwand und schob dann die Basis der Phalanx volarwärts über das Metacarpusköpfchen, während er gleichzeitig den ganzen Finger in centripetaler Richtung weiter drückte. Dabei fand er, dass 3 mal die Basis der Phalanx abbrach und nach Eröffnung des luxirten Gelenkes dieselbe luxirt und das periphere Stück der Phalanx in den basalen Theil eingekeilt war. In diesen Fällen, in denen das Crepitationsgeräusch ein etwas verschiedenes war von den reinen Luxationsfällen, war nur vorn die Kapsel eingerissen, während bei den übrigen auch eines oder beide Seitenbänder nachgegeben hatten. Dementsprechend standen die Finger bei der reinen Luxation ohne Fractur etwas in Rotationsstellung, mit dem Nagel nach ein- oder auswärts gerichtet. Nach erfolgter Luxation tritt die gespannte Lumbrical- und Interossealmuskulatur in Wirkung und befördert die Verschiebung der Phalanx in centripetaler Richtung. Die Entstehung der Luxation auf directem Wege durch Druck auf die flectirte Phalanx hält *Nannotti* aus anatomischen Gründen für unmöglich; die Gewalt müsste dann an dem hervortretenden Metacarpalkopf einen Widerstand finden und eher den Metacarpus fracturiren.

1894 beschrieb *Ullmann* eine volare Luxation des kleinen Fingers, 1895 *Waldau* eine volare Luxation des rechten Zeigefingers, die ohne stärkere directe Gewalt zu Stande gekommen war. Der luxirte Finger stand flectirt und liess sich leicht reponiren.

Die **Symptome** sind denen der volaren Daumenluxation analog. Der Finger steht leicht flectirt, ist verkürzt, zuweilen gleichzeitig radial- oder ulnarwärts abgewichen, während das Metacarpusköpfchen auf dem Dorsum, die Phalanxbasis in der Vola prominirt.

Die **Reposition** geschieht durch Hyperextension (Dorsalflexion), bis sich die Gelenkflächen wieder berühren und direct impulsirt werden können, während man den eigenen Daumen von der Volarseite gegen das Gelenk drückt und als Schluss-

bewegung eine Beugung des luxirten Fingers ausführt *(Lombard)*.

Der Ausgang ist bei reponirten Fällen die Heilung. Bei irreponiblen veralteten Luxationen wurde eine Nearthrosenbildung mit fast vollständiger Wiederherstellung der Function beobachtet.

4. Luxationen des Interphalangealgelenkes.

Luxationen der II. und III. Phalanx können durch Hyperextension nach dem Dorsum, durch Hyperflexion nach der Vola und durch rotirende und zugleich ab- oder adducirende und die Seitenbänder zerreissende Gewalten nach der Radial- oder Ulnarseite erfolgen. Dementsprechend steht die Basis der luxirten Phalanx entweder auf dem Dorsum (Fig. 224)

Fig. 224.





Fig. 225.



oder auf der Vola der vorhergehenden Phalanx (Fig. 225) und erzeugt hier einen Vorsprung oder prominirt auf der radialen oder ulnaren Seite. Da das Gelenk der Inspektion und Palpation so leicht zugänglich ist, ist die **Diagnose** in der Regel auf den ersten Anblick zu stellen. Verschieden ist die Haltung der luxirten Phalanx. In der Regel steht dieselbe mehr weniger gebeugt, doch wird auch zuweilen vollständige Streckstellung beobachtet, wie bei der untenstehend abgezeichneten und von *P. Güterbock* beschriebenen Luxation der 2. Daumenphalanx (Fig. 226).

Eigenthümlich ist das Aussehen der combinirten Interphalangealluxationen, d. h. der Luxationen, bei denen die Phalanx gleichzeitig volarwärts und nach innen oder dorsalwärts und nach aussen verrenkt ist. Als Beispiel der letzteren Art geben wir wiederum eine Beobachtung *Güterbock*'s wieder (Fig. 227).

Bei unvollständiger Luxation könnte die Diagnose im ersten Augenblick zweifelhaft erscheinen, da bei dieser die Deformität nicht so charakteristisch ist. Hier hilft dann die gehinderte Beugung des betreffenden Gelenkes zur richtigen Erkenntniss der Verletzung.

Fig. 226.





Fig. 227.



Die **Reposition** gelingt in der Regel spielend leicht durch Extension und directe Impulsion. Nur wenn die Beugesehne sich zwischen die Knochen eingeklemmt hat, kommt man so nicht zum Ziel, muss sie vielmehr zunächst durch geeignete Rotationsbewegungen frei zu machen suchen.


Zeigte sich die Luxation als irreponibel, so hat man auch hier die Arthrotomie und sogar Resection des Gelenkes gemacht. Wir würden die erste empfehlen, während die letztere vielleicht bei complicirten Luxationen in Frage kommt.

Brüche des Beckens.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Becken als Ganzes besteht aus zwei Hälften, den sogenannten Hüftbeinen, zwischen denen hinten wie ein Keil das Kreuzbein eingeschoben ist. Jede einzelne dieser Hälften wird aus 3 Knochen zusammengesetzt, nämlich dem Darmbein, Os ilei, dem Sitzbein, Os ischii, und dem Schambein, Os pubis. Diese 3 Knochen stossen in der Hüftgelenkspfanne zusammen. Man erkennt das am besten bei jugendlichen Individuen, bei denen sie durch Knorpelfugen getrennt sind. Diese Knorpelfugen bilden etwa die Form eines **Y**, das nach der Schoossfuge hinschaut (Fig. 228). Das Sitzbein und Schambein bestehen selbst wieder aus je 2 Schenkeln, welche das Foramen obturatorium umschliessen und an der vorderen inneren Umrandung desselben, ebenfalls bis zum vollendeten Wachsthum durch eine Knorpelscheibe vereinigt sind. Ausserdem besitzt das Hüftbein noch 2 andere Epiphysenlinien, nämlich eine am Darmbeinkamme und eine am Tuber ischii. Die Stelle, wo Darmbein und Schambein verknöchern, wird am ausgewachsenen Skelett durch das sogenannte Tuberculum ileo-pubicum markirt. Von dem vorderen spitzen Ende der überknorpelten Pfanne, der Incisura acetabuli, zieht über die ganze Fläche des horizontalen Schambeinastes eine Kante, Pecten pubis, welche kurz vor der Synchondrose beider Schambeine in einem Vorsprung, dem Tuberculum ileo-pectineum, endigt.

Fig. 228.



Eine dritte Hervorragung am Schambein findet sich schliesslich noch am oberen Rande der Symphyse. Sie wird als Tuberculum pubicum bezeichnet und dient dem Musc. rectus zum Ansatze. An der inneren Fläche wird das Hüftbein in eine obere und untere Hälfte getheilt durch eine Kante, welche sich von der Articulatio sacro-iliaca bis zur Synchondrosis ossium pubis erstreckt und den Namen Crista ileo-pectinea (Linea innominata, arcuata interna) führt. Die aufsteigenden Sitz- und absteigenden

Schambeinäste umschliessen ein mit einer Spitze an den unteren Rand der Schoossfuge anstossendes Dreieck, Angulus oder Arcus pubis, zwischen dessen oberen Schenkeln sich das Diaphragma uro-genitale mit der Durchtrittsöffnung der Pars membranacea urethrae ausspannt. Das Hüftbein besitzt nach hinten zwei Ausschnitte, die Incisurae ischiadicae major und minor. Dieselben werden durch die Lig. spinoso-sacra und tuberoso-sacra zu einer Art von Fensterpaaren ergänzt. Durch das obere derselben, das Foramen ischiadicum majus tritt der Musc. pyriformis hindurch, während oberhalb dieses die Art. glutaea super. und der gleichnamige Nerv, unterhalb desselben aber die Art. glutaea infer., der Nerv. glutaeus infer. und der Nerv. ischiadicus zum Vorschein kommen. Durch das untere, das Foramen ischiadicum minus zieht der Musc. obturator. intern. zum Femur.

Die beiden Schambeine und damit die beiden Hälften des Beckens stossen in der vorderen Median-Linie in der sogenannten Symphyse oder Schoossfuge zusammen. Diese Symphyse stellt selten ein wirkliches Vollgelenk, in der Regel nur ein Halbgelenk dar, indem wie bei dem Verband der Wirbelkörper unter einander, so auch hier zwischen die Berührungsflächen der beiden Schambeine eine Bandscheibe eingeschaltet ist. Diese Bandscheibe ist an und für sich schon sehr derb, wird aber noch mehr verstärkt durch Bänder, welche sich besonders vor und unter der Verbindung finden und mit dem Periost der Schambeine verschmelzen. Sie ist selbst in eine Art Gelenkhöhle der Schambeine, die sogar mit hyalinem Knorpel ausgekleidet ist, eingelassen. Ein horizontaler Durchschnitt durch die Symphyse zeigt, dass die Fasermasse keilförmig gestaltet und mit der Kante nach dem Beckenraum, mit der Basis nach vorn gerichtet ist.

Während wir hier also nur eine Synchondrose vor uns haben, wird die Verbindung der Darmbeine mit dem Kreuzbeine jederseits durch ein wahres Gelenk, Articulatio sacro-iliaca vermittelt. Die Gelenkflächen, die im ganzen eine ohrförmige Gestalt haben, entsprechen sich in ihrer Grösse vollkommen und liegen dicht an einander, so dass nur ein verhältnissmässig schmaler Spalt zwischen ihnen bestehen bleibt. Wir finden aber trotzdem alle Bestandtheile eines wahren Gelenkes: den hyalinen Knorpelüberzug der Contactflächen, eine den Verschluss der Gelenkhöhle besorgende fibröse Kapsel und eine gefässhaltige, mit kleinen Zotten versehene Synovialhaut. Die Menge der Synovia ist äusserst gering, nimmt

jedoch im höheren Alter gewöhnlich zu, womit dann die Festigkeit des Gelenkes etwas abnimmt. Während die Articulation auf ihrer vorderen Seite nur verhältnissmässig schwache, querverlaufende Verstärkungsbänder besitzt, sind dieselben hinten in einem aus mannigfaltig verfilzten und äusserst kräftigen Fasermassen bestehenden Haltapparat, Apparatus ligamentosus ileosacralis vorhanden, der sich zwischen den falschen Gelenkfortsätzen des Kreuzbeines und den vorspringenden Rändern des Darmbeines ausspannt. Als weiteres Hilfsband kann auch das Lig. ileolumbale gelten, das vom Querfortsatze des 5. Lendenwirbels zum hinteren Rande des Darmbeines zieht.

Würde man die beiderseitigen Gelenkflächen des Kreuzbeines verlängern, so würden sie sich in einem spitzen Winkel schneiden. Es erscheint demgemäss das Kreuzbein wie ein Keil, der von vorn her zwischen die beiden Darmbeine hineingetrieben ist. Gleichzeitig steckt es zwischen diesen aber als ein von oben nach unten hin eingetriebener Keil, indem es oben breiter ist als unten. Die fünf Wirbel, aus denen es entsteht, sind erst nach dem 20. Jahr knöchern verwachsen. Dann erst besitzt der Kreuzbeinkeil eine bedeutende Festigkeit. Als Pars pelvina desselben bezeichnet man seine 3 oberen Wirbel, die mit dem Darmbein in Verbindung stehen. Sein anderer Theil, an den sich vermittelst einer Faserknorpelscheibe, theils mit, theils ohne spaltförmige Höhle, das Steissbein ansetzt, heisst Pars perinealis.

Was die Architektur des Hüftbeins betrifft, so besitzt dasselbe an den meisten Stellen nur eine mässig starke compacte Rinde. Am kräftigsten ist dieselbe in der Umgebung der Pfanne sowie oberhalb derselben. In den hinteren Abschnitten des Darmbeines wird dasselbe so dünn, dass es zuweilen sogar durchscheint. Diese Partieen werden aber von starken darüberliegenden Muskeln geschützt.

Wir müssen uns nun noch das Becken in toto betrachten. Da fällt uns sofort in die Augen, dass die Grundform desselben einen Ring darstellt, von welchem nach oben die Schaufeln der Darmbeine, nach unten die Theile des Sitz- und Schambeines abgehen, welche unterhalb einer vom unteren Rand der Symphyse nach dem unteren Rand der Pfanne gezogenen Linie liegen. Dieser Grundring des Beckens, schlechtweg auch der Beckenring (Rose) genannt, ist für uns von der grössten Wichtigkeit, einmal, weil er die Wirbelsäule und somit den Stamm trägt, dann weil an ihm die Gelenkpfannen angebracht sind und er somit auch die

Stütze für die unteren Extremitäten abgiebt, besonders aber deshalb, weil er in der Form eines Gewölbebogens gebaut, äusseren Gewalten einen grossen Widerstand entgegenzusetzen vermag. Seine schwächste Stelle liegt zwischen der Symphyse und dem Tuberculum ileo-pubicum.

Den oberhalb der Crista ileo-pectinea liegenden Theil des Beckens nennt man das grosse Becken, den darunterliegenden das kleine Becken. Letzteres enthält neben einzelnen Darmschlingen den Urogenital-Apparat und das Rectum.

Das Becken, namentlich jugendlicher, aber auch älterer Personen besitzt eine ziemlich grosse Elasticität. So erwähnt *Hyrtl* einen Fall, in welchem das Becken eines 6jährigen Mädchens von einem schweren Lastwagen derart überfahren wurde, dass der halbe Darmkanal durch das zerrissene Perineum durchtrat, und doch waren die Knochen vollständig intact.

Frequenz, Aetiologie und pathologische Anatomie der Beckenbrüche.

Infolge der ihm innewohnenden, durch seine Construktion bedingten grossen Festigkeit gehören Brüche des Beckens zu den am wenigsten vorkommenden. Ihre Frequenz beträgt etwa 1 % aller Fracturen. Das männliche Geschlecht findet sich überwiegend häufig betroffen. Das Kindes- und Greisenalter bleibt ziemlich verschont. Die Mehrzahl aller Beobachtungen fällt in das 10. bis 50. Lebensjahr. Von den einzelnen Knochen bricht am häufigsten das Schambein, dann folgen das Darmbein, das Sitzbein und schliesslich die Pfanne und das Kreuzbein.

Im Ganzen vermögen nur sehr kräftige Gewalten die Continuität der Beckenknochen zu überwinden. Dieselben wirken entweder direct, indem sie den einen oder anderen Durchmesser des Beckenringes zu verkleinern streben, oder indirect, indem sie von irgend einem Körpertheile aus auf das Becken übertragen werden. Schliesslich können einzelne seltene Formen auch durch reine Muskelwirkung zu Stande kommen. Gar nicht so selten finden sich hier auch Fracturen durch Contre-coup, indem die Fractur fern von dem directen Angriffspunkte der Gewalt entsteht. Die Gelegenheitsursachen selbst werden durch starke Kräfte dargestellt. Ausser den Schussfracturen findet man als Veranlassung das Ueberfahren eines schwer beladenen Wagens über das Becken, das Verschüttetwerden durch Mauereinsturz oder in

Sandgruben, einen Fall von bedeutender Höhe herab auf die Füsse oder das Gesäss, die Einklemmung zwischen den Puffern von Eisenbahnwaggons, einen heftigen Schlag oder einen schnell wirkenden Stoss angegeben.

Von wirklichen Rissfracturen durch Muskelcontraction kennen wir nur wenig sichere Fälle. So beschreibt *Maydl* einen Rissbruch des horizontalen Schambeinastes, *Linhart* einen solchen der Spina ilei ant. inf. durch Zug des Lig. Bertini. Die Vermuthung *Riedinger*'s, dass gelegentlich Fracturen der Crista ilei durch Zug der Glutaei entstehen sollen, ist bisher nicht bewiesen worden.

An die Aetiologie der Beckenbrüche fügen wir unmittelbar an die **pathologisch-anatomischen Charaktere** derselben, da sich diese mit grosser Sicherheit aus der Art der Gewalteinwirkung und der Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Abschnitte des Beckens, namentlich des Beckenringes, erschliessen lassen. Experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese verdanken wir namentlich *Kusmin* und *Arcilza*.

Wir beginnen mit den **Beckenringfracturen** und nehmen zuerst den Fall der sagittalen Gewalteinwirkung.

Denken wir uns, es geht das Rad eines schwer beladenen Wagens quer über die Symphyse hinweg, so wird diese dem Kreuzbein genähert, der sagittale Durchmesser des Beckens also verkleinert werden. Ist nun die Last des Wagens so bedeutend, dass sie die Elasticität des Beckenringes zu überwinden vermag, so wird das ganze Gebiet der Schoossfuge herausgebrochen und in den Beckenraum hineingetrieben werden. Es ist wohl selbstverständlich, dass der Bruch dort eintritt, wo der Beckenring das Minimum der Widerstandsfähigkeit besitzt. Dieses findet sich aber da, wo die vordere Umgrenzung des Ringes am dünnsten ist, ferner da, wo dickere Partieen des Scham- und Sitzbeines in einander übergehen, und schliesslich da, wo diese in den Jugendjahren durch Knorpelfugen verbunden waren. (Kusmin).

Die Bruchlinien, welche das fracturirte Schoossfugengebiet umgrenzen, liegen oft symmetrisch auf beiden Seiten und sind dabei nicht selten rauh, gezackt oder gar gesplittert. Im Ganzen haben sie einen typischen Verlauf und zwar in folgender Weise:

Den Ramus horizontalis ossis pubis durchsetzen sie entweder am Tuberculum pubicum, dicht an der Symphyse,

von hier schräg gegen das Foramen ovale hinziehend (Fig. 229) oder am Tuberculum ileopubicum. Hier entweder ebenfalls schräg nach abwärts und innen nach dem Foramen ovale hingerichtet (Fig. 231) oder in der Weise verlaufend, dass der Schambeinast vollständig aus seiner Verbindung mit dem Darm- und Sitzbein herausgelöst wird (Fig. 230), wobei auch noch ein Bruch durch die Pfanne hindurch in die Incisura ischiadica major eindringen kann (Fig. 232).

Fig. 229.





Fig. 230.



Am Ramus ascendens ossis ischii sind besonders zwei Stellen disponirt. Einmal die Partie, an der das starke Tuber ischii in den aufsteigenden Ast übergeht (Fig. 229) und zweitens die Vereinigungsstelle dieses mit dem Ramus descendens des Schambeines (Fig. 230).

Bei dem eben angenommenen Modus der Gewalteinwirkung haben wir so eine Verletzung an dem Ort ihres Auftreffens selbst entstehen sehen. Es kommt nun aber gar nicht so sehr selten vor, dass bei stärkerer, expansiv wirkender Kraft, wie z. B. bei der Einklemmung des sagittalen Durchmessers zwischen den Puffern zweier Waggons auch der hintere Angriffspunkt, das Kreuzbein, leidet. Dasselbe erfährt dabei entweder nur eine Zerrung der Bänder im vorderen Theile seiner Gelenkverbindung mit dem Darmbeine oder eine Zerreissung derselben, so dass eine vollständige Diastase der Articulatio sacroiliaca entsteht und das Kreuzbein selbst nach vorn und oben dislocirt wird (Fig. 230). Halten aber die vorderen Bänder Stand,

so können sie einen Theil der Kreuzbeinflügel (Fig. 231) entlang den Foramina sacralia ausreissen, während gleichzeitig die Lig. spinoso- und tuberoso-sacra dasselbe am perinealen Rand des Kreuzbeins thun. Der Mechanismus einer solchen Verletzung liegt klar auf der Hand. Indem die Gewalt den Beckenring abzuplatten trachtete, hatte sie das Bestreben, die Darmbeine nach aussen umzulegen. Infolge ihrer grösseren Stärke hielten diese aber zunächst fest. Es musste erst der vordere schwächere Beckenring nachgegeben haben, dann konnten sie so auseinander weichen, dass die Anspannung oder Zerreissung der genannten Bänder stattzufinden vermochte.

Fig 231.





Fig. 232.



Dass diese Erklärung die richtige ist, zeigen solche Fälle, bei denen die Gewalt vorzugsweise auf die Spinae ilei anter. sup. wirkte, indem dabei neben einer Fractur dieser selbst der eben geschilderte Fracturtypus in vollstem Masse zur Geltung kommt.

Nicht minder charakteristisch wie bei dem eben geschilderten sagittalen Druck gestalten sich die Verhältnisse bei Compression des Beckenringes in seinem frontalen oder diagonalen Durchmesser. Eine solche kann eintreten, wenn das Becken von beiden Darmbeinen her oder von den beiden Trochanteren aus zusammengedrückt wird.

Nehmen wir zuerst den Fall, dass die Verletzung rein im queren Durchmesser des Beckens erfolgt, so sucht die Kraft die beiden Pfannen einander zu nähern. Dies wird dadurch ver-

hindert, dass sich das Schoossgebiet und das Kreuzbein-Darmbeingebiet vermöge der ihnen innewohnenden Spannung der Verkleinerung des Durchmessers entgegensetzen. Bei weiterer Wirkung der Gewalt werden diese Hindernisse beseitigt, im vorderen Beckenring dadurch, dass das Schoossfugengebiet an denselben Stellen einbricht, welche wir auch bei der sagittalen Bruchwirkung als am wenigsten widerstandsfähig kennen gelernt haben (Fig. 233); im hinteren Beckenring aber dadurch, dass die beiden Darmbeine in das Kreuzbein von beiden Seiten her hineingeschoben werden und dasselbe in seinem pelvinen Theil zertrümmern (Fig. 233). Sind auf diese Weise die Hindernisse beseitigt, welche sich der Vergrösserung des sagittalen Durchmessers entgegenstellen, ist aber die brechende Kraft damit noch nicht erschöpft, so wird sie nun fortwirkend die Darmbeine um eine ideale, durch die Articulatio sacro-iliaca gelegt gedachte Achse einwärts zu rotiren streben, bis auch diese secundäre Bewegung wieder durch die Anspannung des beiderseitigen Apparatus ligamentosus sacro-iliacus gehemmt wird. Dieser starke Bandapparat kann nun Stand halten, oder er wird ebenfalls zerrissen, womit eine Diastase der Articulationes sacro-iliacae entsteht (Fig. 235), oder er erzeugt, indem er widerstandsfähiger ist als der Knochen, einen

Fig. 233.






Fig. 234.





Rissbruch der hintern Darmbeinschaufel, wobei dann die Bruchlinie von der hintern obern Crista derselben bis zum Foramen ischiadicum majus verläuft. So entsteht der von *Malgaigne* sogenannte doppelte verticale Bruch, indem die Bruchlinie einmal kurz gesagt das Foramen ovale halbirt und zweitens in gleicher Richtung das Darmbein durchdringt (Fig. 234). Es ist wohl auf der Hand liegend, dass bei einem derartigen Mechanismus auch an der Angriffsstelle der Gewalt Fracturen entstehen können, so am vorderen Theil der Darmbeinschaufel (Taf. XX), und dass die Fragmente die Neigung haben, nach aussen zu gelangen. So können sich namentlich die spitzigen Zacken der Schambeinbruchflächen in den darüber liegenden Musc. ileo-psoas einbohren (s. Taf. XX). Ebenso ist es begreiflich, dass bei Entstehung eines derartigen Bruches durch Fall von bedeutender Höhe herab das ganze herausgebrochene Stück des Hüftbeines gelegentlich nach hinten und oben zu stehen kommen kann (Fig. 234).

Fig. 235.





Fig. 236.



Der eben geschilderte Mechanismus der rein queren Compression wird aber jedenfalls nicht sehr häufig stattfinden. In der Regel werden wohl die Patienten der Gewalt auszuweichen streben. Sie versuchen unwillkürlich eine Drehung ihres Beckens, um z. B. aus den Puffern zweier Eisenbahnwagen herauszukommen, und werden dann von diesen in dem diagonalen Durchmesser ihres Beckens erfasst.

Dann kann wieder die Schoossfuge an den typischen Stellen und ebenso das Kreuzbein brechen. Häufiger aber haben wir in solchem Fall den Zustand, dass auf der Seite der Kraft das Hüftbein unverletzt ist und höchstens eine Diastase oder kleine Rissfractur an der Articulatio sacro-iliaca zeigt, während die Seite des Gegendruckes die doppelte Verticalfractur und noch ausserdem Splitterungen des Darmbeins aufweist (Fig. 235). Die letztere ganze Seite wird ja bei der postulirten Gewalteinwirkung gleichsam nach innen umgelegt und findet sich demgemäss auch meist nach hinten und innen gegen die intacten Beckentheile dislocirt.

Fig. 237.





Fig. 238.



Es erübrigt uns nur noch die Betrachtung der Fracturen, die bei Fall auf das Gesäss, also durch Einwirkung der Gewalt auf die Tubera ischii auftreten können. Es kann hier wohl auch die Kraft auf das Kreuzbein übertragen werden, so dass an demselben eine Zerrung der Bänder, eine Diastase seiner Gelenke oder wohl auch eine Abreissung kleinerer Knochenstücke stattfindet. Der eigentliche Typus dieser Fracturen ist jedoch der, dass ein unversehrter Knochenring, der vom Scham- und Sitzbein um das Foramen ovale gebildet wird, herausbricht (Fig. 236). Seltener sitzt der Bruch an den sonst so typischen Stellen des vorderen Beckenringes.

Den eben beschriebenen multiplen Brüchen des Beckenringes gegenüber sind die isolirten Fracturen der einzelnen Beckenknochen von geringer Bedeutung.

Am wichtigsten sind noch die Brüche der Pfanne. Diese kann nämlich gelegentlich in ihre 3 Bestandtheile zerlegt werden, so dass also die Trennungslinien entsprechend den früheren Knorpelfugen verlaufen (Fig. 237). Sehr selten kommt es vor, dass bei einer heftigen, vom Trochanter her wirkenden Gewalt der Femurkopf die Pfanne sprengt, so dass er durch dieselbe hindurchtretend im kleinen Becken zum Vorschein kommt (Luxatio femoris centralis)

(Fig. 238). Brüche des Pfannenrandes finden sich öfter als Begleiter der Hüftgelenksluxationen.

Isolirte Fracturen der Tubera ischii kommen gelegentlich vor. Das abgebrochene Fragment kann dann nach vollständiger Zerreissung des Periostes und der sehnigen Ausbreitung der Muskelansätze durch die Beuger des Unterschenkels nach abwärts gezogen werden.

An den Darmbeinschaufeln finden wir gelegentlich durch Projectile erzeugte Lochbrüche in gleicher Weise wie bei den Schädelknochen. Sie können aber für sich auch entweder in der Linea arcuata interna abbrechen, oder der Bruch kann grössere oder kleinere Stücke betreffen, gelegentlich auch wohl die ganze Crista, besonders so lange sie noch eine Epiphyse besitzt, oder nur die Spina anterior superior abtrennen. Die Fragmente der Crista werden durch die Glutäen nach aussen umgelegt oder folgen dem Zuge des Obliquus und Transversus abdominis nach oben. Die abgebrochene Spina ant. sup. kann durch den Sartorius und Tensor fasciae latae nach unten und vorn gezogen werden. Das Kreuzbein kann durch Fall auf das hintere Stammende isolirt brechen. Die Fractur verläuft dann in der Regel in querer Richtung, wie es scheint, mit besonderer Vorliebe in der Höhe der 3. Sacrallöcher. Das untere Fragment wird durch die Gewalt nach innen getrieben und kann eine Compression des Rectum verursachen.

Das Steissbein bricht infolge seiner grossen Beweglichkeit sehr selten. Nur im hohen Alter, wenn die einzelnen Stücke unter einander und das Steissbein selbst mit dem Kreuzbein knöchern vereinigt sind, kann ein directer Schlag, z. B. mit dem Hufe eines Pferdes, oder ein Fall auf die Hinterbacken den Knochen der Quere nach brechen.

Betrachten wir nun noch die **Complicationen der Beckenfracturen**, so ereignen sich Zerreissungen der bedeckenden Weichtheile wohl deshalb nur selten, weil die verletzende Gewalt meist mit breiter Oberfläche auftrifft. Durchstechungen der Haut durch spitze Fragmente von innen nach aussen kommen allerdings hie und da vor, so besonders in der Leistenbeuge bei Brüchen des Schambeins. Sehr viel häufiger, ja man kann sagen wohl stets sind dagegen Quetschungen und blutige Suffusionen der bedeckenden Haut und Muskulatur vorhanden. Verletzungen der Art. und Ven. iliaca, besonders

Thrombosen oder Phlebitis in letzterer, Quetschungen und Zerrungen des Ischiadicus, des Cruralis, sowie der Sacralnerven kommen nur vereinzelt vor. Von besonderer Wichtigkeit sind die Läsionen der Beckenorgane. Hier haben wir als den häufigsten Befund zu erwähnen Insulte der Urethra. Dieselbe wird bei allen Brüchen in der Symphysengegend, bei denen die Fragmente nach innen oder nach unten und vorn dislocirt sind, besonders in ihrer Pars membranacea und bulbosa gequetscht oder ganz von der Prostata abgerissen. Spitze Fragmente können sie durchbohren, stumpfe sie verlegen oder abknicken. Die Blase selbst kann ebenso und zwar extra- oder intraperitoneal gequetscht und zerrissen werden. Zackige Bruchflächen können sie anspiessen, Splitter sie perforiren und zu Kernen von Blasensteinen werden. Wie die Urethra, kann auch die Vagina gelegentlich von den Fragmenten durchbohrt oder zerrissen sein. Ebenso wurden auch schon Zerreissungen der Därme, besonders des Mastdarmes beobachtet und reichliche intra- und retroperitoneale Blutergüsse bei den Sectionen gefunden. Schliesslich sind gleichzeitige Fracturen anderer Knochen oder Verletzungen innerer Organe nichts Seltenes bei Beckenbrüchen.

Symptome der Beckenbrüche.

Den schweren einwirkenden Gewalten entsprechend zeigen die Patienten mit Beckenfracturen oft das Bild des Shocs, selbst wenn keine inneren Organe verletzt sind. Sie liegen da blass, reactionslos, mit kleinem Puls und kalten Extremitäten. Merkwürdig contrastiren dagegen Bewegungen, welche sie mit der einen oder anderen der unteren Extremitäten ausführen. Dieselben werden nämlich ruckweise im Hüftgelenk gebeugt und dann wieder gestreckt. Es sind das Schmerzcontracturen, die ausgelöst werden, sobald der Musc. ileopsoas durch spitze, in ihn eingedrungene Fragmente oder durch eine Quetschung und Sugillation, wie man eine solche bei der Section öfters auch nachweisen kann, dauernd gereizt wird. Sind die Kranken wieder vollständig bei Sinnen, so klagen sie über heftige Schmerzen, die sie meist auf bestimmte circumscripte Stellen localisiren, Schmerzen, die bei Brüchen des vorderen Beckenringes in den Oberschenkel bis ans Knie (Nervus obturatorius), bei solchen des Kreuzbeins in den Rücken oder das Gesäss und bei Steissbeinfracturen in den After ausstrahlen und die Patienten meist veranlassen, jede willkürliche Bewegung zu vermeiden. Fordert man sie

auf, den betreffenden Schenkel zu beugen, so unterlassen sie dies oder bringen es nur unter den grössten Beschwerden zu Stande. Wenn sie im Moment der Verletzung gestürzt waren, vermögen sie sich in der Regel nicht zu erheben und bei Pfannenbrüchen keinen Schritt zu gehen, indem ja die Extremität jetzt ihre Stütze verloren hat. Neben diesen Functionsstörungen der Extremität sieht man dann bei genauer Betrachtung häufig noch eine abnorme Stellung derselben, indem sie namentlich bei Brüchen der Pfanne und bei den *Malgaigne*'schen doppelten Vertikalfracturen öfter nach aussen rotirt steht, weil bei ihnen ja die ganze Beckenhälfte diese abnorme Lage eingenommen hat. Daneben ist sie nicht selten und zwar unter den gleichen Bedingungen etwas verkürzt, meist jedoch nicht mehr als $1-1^1/_2$ cm. Selten sind Lähmungen der Beine. Sie wurden bei Kreuzbeinfracturen beobachtet. Ueber der Bruchstelle selbst sind die Weichtheile stark geschwollen und blutig verfärbt. Besonders in der Umgebung des Sitz- und Schambeines, ebenso am Scrotum und Perineum finden sich oft ausgedehnte Ecchymosen. Diese sind von besonderer Wichtigkeit, wenn sie nach einigen Tagen oberhalb des Lig. Pouparti auftreten, indem sie dann den Beckenbruch, insbesondere den Pfannenbruch von der intracapsulären Schenkelhalsfractur unterscheiden, deren Bluterguss stets unterhalb dieses Bandes zum Vorschein kommt. Lassen die genannten Erscheinungen eine Fractur vermuthen, so geht man jetzt über zur Palpation. Zunächst umgreift man von beiden Seiten her die Darmbeinschaufeln und drückt sie vorsichtig einander entgegen, dann legt man eine Hand unter das Kreuz und übt mit der andern einen leisen Druck aus auf die Symphyse und wird in beiden Fällen finden, dass der Schmerz des Patienten bedeutend gesteigert und immer wieder an dieselben Stellen verlegt wird. Diese tastet man dann, während man die Beine des Patienten sanft im Hüft- und Kniegelenk beugen lässt, mit Vermeidung jedes stärkeren Druckes ab und wird dann in der Contour der Knochen entweder nur kleine Niveaudifferenzen oder den höheren Stand einer Spina anterior superior nachweisen oder bei stärkerer Dislocation selbst die Bruchflächen fühlen, ja abnorme Beweglichkeit und selbst Crepitation erzeugen können. Selbstverständlich darf man nicht den Nachweis dieser Kardinalsymptome der Fractur durch rohe Manipulationen erzwingen wollen, da zuerst grobe Läsionen durch die Untersuchung selbst gesetzt werden können.

Stets empfiehlt es sich, der äusseren Untersuchung die innere durch den Mastdarm, eventuell die Scheide, folgen zu lassen, oder beide zu combiniren. Man fühlt dann nicht nur abnorme Beweglichkeit und Crepitation am Steiss- und Kreuzbein, sondern auch ganz genau das Verhalten des vorderen Beckenringes und der Pfanne.

Die Deformität bei den Brüchen der einzelnen Beckenbestandtheile wird sich nach dem bei der pathologischen Anatomie Gesagten leicht ergeben.

Abgebrochene Stücke der Crista ilei wird man entweder nur nach aussen umgelegt oder zwischen den Bauchmuskeln in die Höhe gezogen finden, während das abgebrochene Tuber ischii im Falle einer vollständigen Loslösung nach abwärts dislocirt liegen wird. Bei Brüchen des Kreuzbeines wird man das untere Fragment nach innen gewichen finden und die entstehende winklige Knickung entweder schon von aussen oder mit dem im Mastdarm eingeführten Finger erkennen. Bei Brüchen der Pfanne mit Perforation des Kopfes in die Beckenhöhle wird der normale Vorsprung des Trochanter fehlen, die Wölbung des Kopfes dagegen vom Mastdarm aus zu fühlen sein.

Die Symptome, deren wir bisher gedachten, waren durch die Fractur selbst bedingt. Sie werden vielfach ergänzt von den Erscheinungen der Complicationen. In erster Linie sind hier zu nennen die Verletzungen der Harnröhre und Blase. Bei keinem Beckenbruch darf man versäumen, diese Theile genau zu untersuchen. Percutirt man die Blase, so wird oft eine Retentio urinae constatiren können. Diese ist dann die Folge einer Blasenlähmung, welche selbst wieder entweder nur auf einer Erschütterung der Blasennerven oder auf einer mangelnden Action der Bauchpresse beruht. Diese letztere aber erklärt sich dadurch, dass die Insertionspunkte der Bauchmuskeln theilweise abgebrochen oder deren Fasern gequetscht oder blutig infiltrirt sind. In einem solchen Falle sammelt sich der Urin in der Blase an, dehnt diese ad maximum aus, bis es zur Ischuria paradoxa kommt, wenn man nicht den Katheter einführt. Dieser entleert dann nicht selten einen blutigen Urin. Bei erhaltener Detrusor-Wirkung wird ein solcher wohl auch spontan entleert. Kommt reines, unvermischtes Blut aus der Urethra zum Vorschein, so ist diese selbst verletzt. Führt man dann nicht sofort einen Katheter ein, so entwickelt sich bald eine Urininfiltra-

tion, die anfangs Anhaltspunkte für den Sitz der Verletzung geben kann. Durchtränkung des Scrotalgewebes deutet auf Ruptur der Pars bulbosa, Infiltration oberhalb der Symphyse und in den beiden Leistengegenden, beginnende Dämpfung in der Unterbauchgegend auf Verletzung der hinter der Fascia pelvis liegenden Pars nuda oder einen Riss in der Blasenwand. Intraperitoneale Blasenrupturen mit Austritt von Blut und Urin in die Bauchhöhle gehen einher mit frühzeitigen Collapserscheinungen, Schmerzhaftigkeit der Unterbauchgegend und rasch zunehmender Dämpfung. Der eingeführte Katheter kann dabei trotzdem ziemlich viel blutige Flüssigkeit entleeren, indem er in die Bauchhöhle eindringt.

Diesen Erscheinungen des Harnapparates gegenüber treten die Rectalsymptome entschieden zurück, die als Kothverhaltung oder als Austritt von Fäcalmassen in die Bauchhöhle auftreten.

Sollen wir noch ein Wort hinzufügen über die **Diagnose** der Beckenbrüche, so halten wir es für das Wichtigste, stets den geschilderten Gang der Untersuchung einzuschlagen. Man wird dann nicht nur die Brüche der Fortsätze leicht erkennen, sondern sich vor allem auch über die Verletzungen des Beckenringes klar werden und die Läsionen der Beckenorgane nicht übersehen. Es kommen allerdings Fälle vor, in denen bei der Section schwere, ja sogar geheilte Beckenfracturen gefunden werden, während zu Lebzeiten keine Anzeichen einer solchen vorhanden waren.

Das sind in der Regel Brüche, die gleichzeitig mit anderen Verletzungen einhergingen. Zuweilen aber fehlen solche und dann kann die Diagnose oft nur aus den Bewegungsstörungen der untern Extremitäten erschlossen werden. Wir führen diesbezüglich am besten *Billroth*'s Erfahrungen an, der sich folgendermassen ausdrückt: „Wenn nach einer erheblichen Verletzung der Beckengegend, bei Ausschluss von Wirbel-, Ober-, Unterschenkelfracturen und -Luxationen, die Patienten nicht oder nur mit grossen Schmerzen stehen und gehen können, wenn sich diese Erscheinungen erst nach wochenlanger Ruhe verlieren, dann kann man mit Sicherheit annehmen, dass eine Verletzung des Beckens vorhanden war.“

Prognose der Beckenbrüche.

Bezüglich ihrer Prognose haben die Beckenbrüche Aehnlichkeit mit den Fracturen des Schädels und der Wirbelsäule, indem die

Schwere der Verletzung nicht sowohl vom Knochenbruch an sich als von der gleichzeitigen Läsion der von den Knochen umschlossenen inneren Organe abhängt.

Selbst schwere, multiple Beckenringfracturen können nämlich, falls keine weiteren schwereren Complicationen bestehen, durch knöchernen Callus heilen, der dann im Verlauf von 2—3 Monaten den Beckenring wieder vollständig consolidirt. Nach einer neueren Zusammenstellung von *Drechsler* heilten von 106 Beckenfracturen 71 = 68.54%. Es bleibt allerdings meist eine Dislocation bestehen. Die deforme Heilung bringt aber keine wesentlichen Functionsstörungen mit sich, indem geringe Verkürzungen einer Extremität leicht ausgeglichen werden und die anfangs noch bestehenden Schmerzen und Unsicherheit des Ganges wieder verschwinden. Nur bei Frauen kann bei Heilung mit stärkerer Dislocation eine Raumbeengung des Beckens zurückbleiben, die dann zu schweren Störungen bei der Geburt Veranlassung zu geben vermag.

Complicirte, namentlich Schussfracturen, die nicht aseptisch gehalten werden, können zunächst langwierige Eiterungen des Beckenzellgewebes und der Hüftgelenke veranlassen und dann durch Sepsis oder Pyämie letal endigen. Viel seltener heilen sie schliesslich nach Ausstossung ausgedehnter Sequester.

Sehr bedroht wird das Leben der Kranken auch durch die Läsionen des Harnapparates. Nehmen wir zunächst den Fall einer Harnröhrenzerreissung, die nicht durch sofortige Einführung des Katheters unschädlich gemacht wurde, so entwickelt sich bald eine Urininfiltration. Auch diese kann anfangs noch durch zweckmässige Behandlung, d. h. möglichst frühzeitige Incisionen und Sorge für den Abfluss des Urins nach aussen in engen Grenzen gehalten werden. Kommt aber ärztliche Hilfe zu spät, so kann sie die bedenklichsten Störungen am Penis, Damm und Scrotum erzeugen oder tiefgehende retroperitoneale Abscesse veranlassen, so dass es schliesslich wieder zur Pyämie kommt oder der Eiter in die Bauchhöhle durchbricht und der Kranke einer septischen Peritonitis erliegt. Das gleiche kann ihm geschehen bei intraperitonealen Blasenrupturen, obwohl sich die Bauchfellentzündung nicht sofort an die Verletzung anzuschliessen braucht. Tödtlich enden wohl auch in der Regel die Zerreissungen der Därme durch Austritt von Koth ins Peritoneum und die Zerreissungen der grossen Gefässe durch Verblutung. Es kommen aber gelegentlich die schwer-

sten Fälle mit dem Leben davon. Die aseptische Wundbehandlungsmethode, die uns das Bauchfell zu eröffnen und die zerrissene Blase zu nähen erlaubt, hat auch hier schon sehr segensreich gewirkt.

Erliegen nun die Patienten nicht der Verletzung, so behalten sie doch oft lästige Störungen zurück.

Die Urethra kann durch unförmliche Callusmassen verlegt werden, narbige Stricturen können sich in ihr entwickeln oder langwierige Urinfisteln entstehen. Die Urininfiltration kann zu Gangrän des Dammes und des Scrotum geführt und so Defecte erzeugt haben, die theilweise bis auf die Harnwege reichen und wegen des callösen Narbengewebes nicht zur Heilung gelangen. Es dauert dann oft noch Monate und Jahre, bis man durch plastische Operationen einen einigermassen erträglichen Zustand herstellen kann. Schliesslich entsteht bei der nothwendig lange dauernden Ruhelage nicht so selten auch Decubitus, der, vernachlässigt, ebenso schädlich wirken kann wie bei den Wirbelfracturen.

Therapie der Beckenbrüche.

Uncomplicirte Brüche der Beckenfortsätze verlangen zunächst die Reposition der Fragmente. Dieselbe geschieht in der Weise, dass man sie von aussen her umgreift und in ihre richtige Lage bringt, während man nöthigenfalls mit dem in den Mastdarm oder in die Scheide eingeführten Finger die reponirenden Bewegungen unterstützt. Zur Retention kann man nichts weiter thun, als die Bettruhe verordnen, indem man die Patienten mit im Hüft- und Kniegelenk gebeugten Beinen die Rückenlage einnehmen lässt. Brüche der Pfanne oder die *Malgaigne*'schen doppelten Verticalfracturen würden die Anlegung eines Extensionsverbandes am Oberschenkel erfordern eventuell mit Querextension des nach aussen umgeworfenen oberen Randes der Darmbeinschaufel nach innen.

Bei den multiplen Beckenringfracturen gilt bezüglich des Transportes, der Entkleidung der Patienten, ihrer Lagerung, der Verhütung des Decubitus dasselbe wie bei den Wirbelbrüchen. Auch hier versucht man die Reposition und Retention in der angegebenen Weise. Wir können im Ganzen ausser ruhiger Lagerung nicht viel thun, um den Bruch selbst zu beeinflussen. In welcher Lagerung der Patient dabei liegen soll, hängt in erster Linie von den Empfindungen des Patienten selbt ab; man legt ihn im Allge-

meinen so hin, wie er sich am wohlsten fühlt. Unsere ganze Sorge müssen wir dagegen den Harnsymptomen zuwenden. Handelt es sich nur um eine functionelle Blasenlähmung, so genügt das öftere Einführen des Katheters, um den Harn zu entleeren. Liegt aber eine intra- oder extraperitoneale Ruptur derselben vor, so würde die aseptische Laporatomie, verbunden mit der Naht der Blase oder Drainage derselben und der Bauchhöhle, indicirt sein.

Bei Verletzungen der Harnröhre muss zur Verhütung der Urininflltration sofort ein Verweilkatheter eingelegt werden. Der Katheterismus ist aber bei vollständiger Zerreissung der Urethra oft sehr schwer. Kommt man auch in der Narcose nicht zum Ziel, oder sind schon die Zeichen der Urininfiltration vorhanden, so muss man sofort vom Damme aus auf die Harnröhre einschneiden (Urethrotomia externa), das hintere Ende derselben aufsuchen und dann durch dieses den Katheter in die Blase einführen. Zum Auffinden dieses hinteren Urethralendes ist es dabei zuweilen noch nothwendig, den Katheterismus posterior auszuführen. Ist die Harninfiltration bereits eingetreten, so muss man die infiltrirten Theile gehörig incidiren, drainiren und so den gangränösen Zerfall möglichst zu beschränken suchen.

Selbstverständlich erfordern complicirte Beckenbrüche strengste Antisepsis, Entfernung loser Splitter, Unterbindung blutender Gefässe, die zurückbleibenden Störungen aber, wie Harnfisteln, Stricturen u. s. w., eine ihnen angemessene nachträgliche Behandlung.

Luxationen der Beckenknochen.

Luxationen der Beckenknochen nennt man die Verschiebung derselben in einer der drei Knorpelfugen, während man ein blosses Klaffen dieser als Diastase bezeichnet. Man unterscheidet im Allgemeinen sechs Formen dieser Verletzungen, die wir kurz betrachten wollen.

1. **Luxation der Symphysis ossium pubis.** Die Veranlassung zur Sprengung der Schambeinfuge ist entweder eine äussere Gewalt, welche die Symphyse direct nach hinten treibt, oder ein grosser Kindskopf, der von starken Wehen getrieben oder mit der

Zange kräftig angezogen, bei engem Becken den Ring desselben wie ein Keil auseinandertreibt oder schliesslich eine passive Dehnung der starken sich am Schambein inserirenden Adductoren. Diese letzteren erzeugten die Luxation z. B. öfters dann, wenn Patienten beim Ausgleiten grosse Anstrengungen machten, um nicht mit gespreizten Beinen zu fallen, oder wenn Reiter, trotz kräftigen Schenkelschlusses von dem sich bäumenden Pferd in die Höhe geschleudert wurden und dann mit voller Wucht wieder auf den Sattel zurückfielen.

Die Trennung sitzt entweder in der Knorpelscheibe selbst oder häufiger an der Grenze des Knorpels und Knochens und zwar so, dass der ganze Knorpel an einem der beiden Schambeine haften bleibt.

Was die **Symptome** betrifft, so vernehmen die Patienten in der Regel das Krachen der Symphyse. Es hesteht an derselben Schmerzhaftigkeit, Unfähigkeit zu gehen. Das charakteristische Zeichen ist das Klaffen der Symphyse, das sich bis zur Breite von mehreren Fingern durch die Haut hindurchfühlen lässt. Ausserdem besteht natürlich abnorme Beweglichkeit, aber keine Crepitation. Selten fehlen Störungen von Seiten der Harnorgane, da Läsionen der Blase und Harnröhre meistens vorhanden sind.

2. **Luxationen der Symphysis sacro-iliaca** kommen zuweilen, wie wir das schon gesehen haben, vor in Begleitung von Beckenringfracturen, sehr selten jedoch isolirt. In dieser Weise wurden sie einigemale beobachtet bei schweren Geburten und durch directe äussere, den hinteren Abschnitt des Darmbeines betreffende Gewalten.

Symptome. Die Verschiebung findet gewöhnlich nach vorn statt oder bleibt wenigstens hier länger erkennbar, während die nach hinten erfolgenden Dislocationen sich sofort wieder von selbst einrichten. Zuweilen bildet auch wohl die ganze betreffende Hüfte einen merklichen Vorsprung nach vorn und aussen, so dass dann besonders die vorgeschobene Spina anter. super. ins Auge fällt.

3. Die **Luxationen des Darmbeines,** d. h. die Lösung einer Beckenhälfte aus ihren Fugen, ist das Gegenstück zur *Malgaigne*'schen Verticalfractur.

Wie diese kommt sie zu Stande durch Sturz aus der Höhe auf einen Fuss oder eine Beckenseite oder Auffallen einer schweren

Last auf diese. In der Regel sind die betreffenden Knochen gleichzeitig auch gebrochen.

Die **Symptome** lassen sich ableiten von dem Höherstehen der ganzen Beckenhälfte, indem sowohl die Crista und deren Spinae, als auch die Schoossfuge die der anderen Seite überragen. Dabei sind diese Punkte stets auch leicht nach vorn oder hinten verschoben und nach aussen umgelegt. Das entsprechende Bein ist verkürzt und nach aussen rotirt. Zusammendrücken der Darmbeinschaufeln wird äusserst schmerzhaft empfunden und lässt die ganze abnorme Beweglichkeit des Hüftbeines erkennen. Die Deformität wird durch Extension am Bein leicht ausgeglichen.

Die Differentialdiagnose von der seitlichen Beckenringfractur wird dadurch gestellt, dass sich der Schmerz genau auf die Knorpelfugen localisiren lässt und Crepitation dortselbst fehlt.

Wir führen als Beispiel eine Beobachtung von *Hallowell* an. Eine sehr fette, schwangere Frau stützte sich auf einen starken Schirmstock. Dieser brach. Bei der Anstrengung, sich vor dem Fallen zu bewahren, fühlte Patientin im Becken etwas nachgeben und hörte ein Krachen in der Symphyse. Dann fiel sie mit grossem Schmerz zu Boden. Der bald darauf aufgenommene Befund war folgender. Das rechte Bein war ganz kraftlos und war um 2 cm verkürzt. Starker Schmerz, besonders im Verlaufe des Nervus ischiadicus. Ferner bestand heftiger Schmerz und Druckempfindlichkeit in der Gegend der Symphyse und in der Synchondrosis sacroiliaca beider Seiten, besonders der rechten, wo eine ausgesprochene Depression nach der Seite des os ilei hin zu fühlen war. Wegen des starken Fettpolsters war von der Symphyse nichts durchzufühlen; von der Scheide aus fühlte man dagegen die rechte Beckenhälfte gegen die linke um 2 cm nach vorn und oben vorspringen. Die Spina ant. sup. stand ebenso rechts 2 cm höher als links.

Die Reposition geschah durch directe Impulsion unter hörbarem Krachen. Die Heilung trat ohne alle Behinderung für das Gehen ein.

4. **Luxationen des Kreuzbeines** können entstehen durch sagittale Compression des Beckenringes, sowie durch einen directen Stoss gegen dasselbe von hinten her. Gewöhnlich sind gleichzeitig Fracturen vorhanden. Die Deformität ergiebt sich aus Fig. 236,

in der man das Kreuzbein nach vorn und oben dislocirt findet. Die Verletzung war in den bekannten Fällen stets tödtlich.

5. **Luxationen des Steissbeines** sollen nach vorn und hinten vorkommen, werden sich aber kaum von den Fracturen dieses Knochens unterscheiden lassen.

6. Die **Luxationen aller drei Beckensymphysen auf einmal** sind mehrmals beschrieben worden; die Verletzten erlagen aber alle nach kurzer Zeit den Verletzungen der Beckenorgane.

Die **Prognose** hängt in gleicher Weise von dem Verhalten der Beckenorgane ab, wie bei den Fracturen. Ebenso wird sich, wie bei diesen die

Therapie gestalten. Ruhige Rückenlage bei gebeugtem Knie und Hüftgelenk (Planum inclinatum duplex), eventuell permanente Extension am Oberschenkel werden die durch directen Druck reponirten Knochen in ihrer Lage erhalten. Statt der früher gebräuchlichen Beckengurte würde man das Klaffen der Symphyse am zweckmässigsten wohl mit Heftpflasterstreifen beherrschen können. Besondere Sorgfalt verdienen natürlich wiederum etwaige Läsionen des Harnapparates.

Luxationen des Hüftgelenkes.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

An der Bildung des Hüftgelenkes betheiligen sich die Pfanne des Hüftbeines und der Kopf des Oberschenkels.


Die, wie schon früher erwähnt, von dem Darm-, Sitz- und Schambein gemeinschaftlich gebildete Pfanne, Acetabulum, stellt eine halbkugelige Hohlfläche dar, welche zur Aufnahme des Oberschenkelkopfes erst dadurch völlig geeignet wird, dass sich um ihren freien Rand ein dicker, scharf endigender, faserknorpeliger Ring, Labrum glenoideum, legt, welcher ihre Tiefe vermehrt und eine an ihrer Innenseite befindliche Lücke, Incisura acetabuli, überbrückt. Nur der diesem Knorpelring zugewendete Rand der Pfanne ist vom Knorpel überzogen. Ihr Grund ist nur mit Synovialhaut bekleidet und enthält ausserdem etwas lockeres Fettgewebe.

Der Gelenkkopf des Oberschenkels besitzt annähernd die Gestalt einer Halbkugel. Wir sagen „annähernd“, weil die Kugel-

gestalt etwas abgeflacht ist. Dementsprechend sind auch Pfanne und Gelenkkopf nicht ganz vollständig congruent, so dass sich die gegenseitigen Flächen nicht in allen Stellungen der Extremität berühren. Etwas unterhalb des Scheitels befestigt sich in einer kleinen Grube des Kopfes das Lig. teres, welches mit einem Theil seiner Bindegewebsfasern unmittelbar in den hyalinen Knorpelüberzug der Gelenkfläche übergeht. Die Verbindung des Gelenkkopfes mit der Diaphyse des Femur vermittelt der Schenkelhals. Die Grenze dieser beiden letzteren kennzeichnet die Linie, welche zwischen Trochanter major und minor hinzieht (Linea intertrochanterica).

Die Kapsel des Hüftgelenkes verhält sich ihrer Weite nach umgekehrt wie jene des Schultergelenkes. Während wir nämlich dort gesehen haben, dass letztere an ihrer Schulterblattinsertion enger ist, als an der Befestigungsstelle am Oberarm, ist die Hüftgelenkskapsel am Schenkel enger als an der Pfanne und stellt so einen Kegel dar, dessen Spitze nach unten, dessen Basis nach oben gerichtet ist. Sie entspringt an dem ganzen Umfange der Pfanne, setzt sich dagegen nicht um die ganze Peripherie des Schenkelhalses herum fest. Sie haftet vielmehr nur an den vorderen und seitlichen Abschnitten desselben, besonders an der Linea intertrochanterica an. Ihre hintere Wand hat keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Knochen. Sie endigt vielmehr mit einem scharf gezeichneten freien Rand und lässt nur die sie innen auskleidende Synovialis auf den Schenkelhals übergehen.

Fig. 239.



Die Wandungen der Kapsel sind ungleich fest und dick. Die schwächsten Partieen finden sich an ihrer hinteren unteren Umrandung, da, wo sich die Synovialmembran auf den Schenkelhals hinüberschlägt. Auf der vorderen Seite erhält sie dagegen bedeutende Verstärkungsbänder. Das wichtigste derselben ist das Lig. Bertini oder auch das Lig. ileo-femorale genannt (Fig. 239). Dasselbe entspringt von der Spina anter. infer. des Darmbeines in der Breite von $1^1/_2$ cm und setzt sich, eine Breite von $7^1/_2$ cm erlangend, in zwei divergirenden Schenkeln an der Linea intertrochanterica anter. an. Es erhält auf diese

Weise die Form eines umgekehrten Y und wird daher nach *Bigelow*, der seinen bedeutenden Einfluss auf Form und Einrichtung der Hüftgelenksluxationen besonders kennen gelehrt hat, auch Y-Band genannt. Der gemeinsame Schenkel des Y ist oft sehr kurz, da die Divergenz des äusseren und inneren Theiles schon nahe am Ansatze beginnt. Diese beiden letzteren gehen ohne scharfe Grenze in die übrige Kapsel über, jedoch nicht mit der ganzen Summe ihrer Fasern. Von beiden Seiten her lösen sich nämlich Bündel ab, welche den Hals umgreifen und sich mit den entgegenkommenden hinter diesem vereinigen. So entsteht eine Bandschlinge, die Zona orbicularis, welche den Schenkelhals in ähnlicher Weise umgreift, wie das Lig. anulare das Köpfchen des Radius. Das Y-Band ist ausserordentlich stark und widerstandsfähig. Seine Dicke übertrifft die des Lig. patellare und der Achillessehne. Bei einem starken Manne musste man dasselbe mit 700 Pfund belasten, bis es zerriss.

Weniger entwickelt sind zwei andere Verstärkungsbänder der Kapsel, die Ligamenta pubo- und ischio-femorale, von denen das erstere vom Tuberculum ileo-pectineum zum Trochanter minor, das andere vom Tuber ischii zur hinteren Kapselwand zieht.

Das bereits erwähnte Lig. teres entspringt von der Incisura acetabuli und führt dem Schenkelkopf seine Ernährungsgefässe zu.

Dass die Schwere der unteren Extremität nicht den Contact des Kopfes mit seiner Pfanne aufhebt, wird nach Untersuchungen der Gebrüder *Weber* an der Leiche bewirkt durch den äusseren Luftdruck. Beim Lebenden kommen neben diesem sicher jedoch noch in Betracht der ventilartige Schluss des Labrum cartilagineum, die Cohäsion der Synovia und die Wirkung der das Hüftgelenk deckenden Muskeln.

Von diesen letzteren lagern an der Innenseite des Gelenkes die Adductoren, der Pectineus und Gracilis, vorn der Ileo-psoas, Sartorius, Rectus femoris und Tensor fasciae latae, aussen die Glutaei, der Pyriformis, Obturator internus mit den Gemellis, der Quadratus femoris und der Obturator externus, hinten der Biceps, Semitendinosus und Semimembranosus.

Diese starken und kräftigen Weichtheile bilden gleichsam einen Wall, welcher besonders bei noch reichlich entwickeltem Fettpolster das Gelenk der äusseren Palpation äusserst unzugänglich macht.

Nichts desto weniger lässt sich die Lage desselben doch annähernd sicher von aussen bestimmen.

Bei Kindern trifft nämlich eine Ebene, welche man horizontal durch die Spitze des Trochanter major legt, etwa den höchsten Punkt des Schenkelkopfes. Bei Erwachsenen aber, bei denen dieser Trochanter etwas tiefer steht, fällt die gleiche Ebene etwa in den Mittelpunkt des Kopfes. Die Spitze des Trochanter major selbst liegt aber bei mässiger Beugung des Schenkels in einer Linie, welche von der Spina ilei anter. super. hinten herum zum Tuber ischii gezogen wird. (*Roser-Nélaton*'sche Linie). Kann man wegen starker Schwellung die Vorragung des Trochanter nicht erkennen, so vermag man dann die Lage des Gelenkes dadurch sicher zu bestimmen, dass man die Distanz zwischen Spina ilei anter. super. und Symphyse halbirt und von diesem Halbirungspunkte aus ein Perpendikel nach unten zieht. Dieses theilt dann das Gelenk ungefähr in zwei gleiche Hälften (*König*).

Das Hüftgelenk ist wie das Schultergelenk eine freie Arthrodie. Bewegungen in demselben sind also um alle nur denkbaren durch den Mittelpunkt des Kopfes gelegten Achsen möglich. Man scheidet jedoch auch hier die Bewegungen als solche um drei Achsen, weil sich aus diesen Grundtypen alle übrigen combiniren lassen. Diese Bewegungen sind: 1) solche um eine frontale, quer durch beide Schenkelköpfe ziehende Achse, Beugung und Streckung, 2) solche um eine sagittale senkrecht zu der vorigen verlaufende Achse, Abduction und Adduction und 3) solche um eine verticale, mit der des Femur zusammenfallende Achse, Rotation nach aussen und nach innen. Am ausgiebigsten gehen unter normalen Verhältnissen Ab- und Adduction, weniger Beugung und Streckung und am geringsten die Rotationsbewegungen vor sich.

Jede dieser Bewegungen besitzt ihre physiologische Hemmung. Die Grenze der Flexion entsteht in der Regel durch Berührung der Schenkelweichtheile mit denen des Bauches. Nur bei sehr abgemagerten Individuen und starkem Zurückbeugen der Wirbelsäule könnte es zu einem Anstossen des Schenkelhalses an den oberen Rand der Pfanne kommen. Die Extension wird gehemmt durch das Lig. ileo-femorale, welches sich gebieterisch jeder stärkeren Entfernung seines Ansatzes vom Darmbein entgegensetzt. Das Lig. ileo-femorale hemmt auch übermässige Bewegungen um die beiden anderen Achsen, indem sein äusserer Schenkel die Adduction und Auswärtsrollung, sein

innerer in Verbindung mit dem Lig. pubo-femorale die **Abduction** und **Einwärtsrollung** behindert. Beide Schenkel wirken dabei um so früher und intensiver hemmend, je mehr sie zugleich durch Extension gespannt sind. Ab- und Adduction, sowie die Rotation werden also bei gebeugtem Schenkel ausgiebiger von Statten gehen können. Schliesslich hängt die Bewegungsmöglichkeit noch von der Dehnbarkeit und der wechselseitigen Beziehung der Muskeln ab. Das beweisen die Kautschukmenschen, welche ihre Antagonisten auszuschalten vermögen.

Frequenz, Aetiologie und Eintheilung der Hüftgelenksluxationen.

Die Tiefe der Pfanne, die Festigkeit der Kapsel, die Widerstandsfähigkeit der mächtigen Muskeln sowie des Schenkelhalses, die seltene Inanspruchnahme der Bewegungshemmungen bedingen eine grosse Seltenheit der Hüftgelenksluxationen, indem sie mit nur 2 % (*Krönlein*) nach denen des Schulter- und Ellenbogengelenkes in der Häufigkeits-Skala erst in der dritten Reihe rangiren. Ueberwiegend häufig werden kräftige Männer zwischen dem 20. und 50. Lebensjahre betroffen; doch sind Kinder, Frauen und Greise keineswegs ausgeschlossen. Die linke Seite scheint etwas häufiger betroffen zu werden als die rechte. Nach *Kneer* trafen von 132 frischen Luxationen 71 die linke, 59 die rechte Seite; 2 waren Doppelluxationen. Solche Doppelluxationen sind bisher überhaupt im Ganzen nur 27 mal beobachtet worden. (*Niehans*, *Kneer*).

Der Gelenkkopf ist durch seine vertiefte Lage directen Gewalteinwirkungen nicht zugänglich. Die Luxationen entstehen also auf **indirectem** Wege. Selten wirkt in dieser Weise ein einfacher Stoss gegen den Trochanter, ein Fall auf das gebeugte Knie oder auf die Füsse. Die Ursache ist vielmehr in der Regel **eine gewaltsame und plötzliche Uebertreibung einer sonst physiologischen Bewegung**, indem entweder der Oberschenkel gegen das Becken oder dieses gegen den Oberschenkel hingeführt wird, wie dies bei einem Sturz aus grosser Höhe, beim Ueberfahrenwerden von schweren Fuhrwerken, beim Auffallen schwerer Lasten auf das Hüftgelenk, beim Verschüttetwerden durch auffallende Erd- oder Steinmassen u. s. w. statthaben kann. Dabei muss stets die Hemmung der Bewegung erreicht werden und der Kopf mit seinem grössten Umfange den Pfannenrand überragen. In diesem Moment gewinnt der Schenkelhals an den Hemmungsbändern und dem überknorpelten Pfannenrand ein Hypomochlion.

Dadurch wird aber der Femur zu einem zweiarmigen Hebel, dessen Lastarm der Gelenkkopf, dessen Kraftarm das Bein in seiner ganzen Länge darstellt. Während sich nun der Krafthebel nach der einen Seite bewegt, drängt der Lasthebel, d. h. der Gelenkkopf in entgegengesetzter Richtung gegen die Kapsel, sprengt diese und tritt über den Pfannenrand heraus. Der Kopf wird also aus der Pfanne herausgehebelt. Nur sehr selten berührt er dabei mit einem Theil noch die Pfanne, so dass die Luxation eine unvollständige wäre. Solche werden überhaupt bezweifelt. Hat er aber die Pfanne ganz verlassen, so behält er ebenfalls selten seine primäre Stellung dicht neben der Pfanne bei, nimmt vielmehr, der forttreibenden Gewalt sowie der Schwere des Gliedes folgend, fast stets eine secundäre Stellung ein und wird dann in dieser durch die unverletzten Kapseltheile, vor allem durch das Lig. ileo-femorale fixirt. Dieses giebt vermöge seiner Spannung dem luxirten Gliede in der Regel eine so typische Stellung, dass man nach *Bigelow* alle Luxationen, bei denen es erhalten ist, als regelmässige bezeichnet, diesen aber die unregelmässigen entgegensetzt, bei denen äusserst schwere Gewalten z. B. Maschinenverletzungen auch dieses stärkste Band des Körpers zerstört haben. Der Kopf kann nun die Pfanne hinten, vorn, oben oder unten verlassen, und man unterscheidet dann nach dem Standorte des Kopfes folgende Formen der Verrenkung.

1. Luxationen nach hinten (Luxationes posticae s. retrocotyloideae).

a) Luxatio iliaca,
b) Luxatio ischiadica.

2. Luxationen nach vorn (Luxationes anticae s. praecotyloideae.

a) Luxatio suprapubica: Luxatio pubica,
Luxatio ileopectinea.
b) Luxatio infrapubica: Luxatio obturatoria,
Luxatio perinealis.

3. Luxationen nach oben (Luxationes supracotyloideae).

4. Luxationen nach unten (Luxationes infracotyloideae).

Unstreitig die häufigsten von allen diesen Luxationen sind die nach hinten. Folgen wir der Statistik, welche *Kneer* durch

Vereinigung der Zusammenstellungen von *Cooper*, *Malgaigne*, *Weber*, *Hamilton*, *Billroth* und *Bruns* erhielt, so waren von 210 Luxationen 160 nach hinten (= 76,02%) und 49 nach vorne (= 43,4%) erfolgt.

Von den Luxationen nach hinten ist wiederum die Luxatio iliaca häufiger als die ischiadica; es treffen nämlich auf 133 solcher Luxationen 96 auf die erstere, 37 auf die letztere Form.

Von den beiden Unterarten der Luxationen nach vorn kommt die Luxatio suprapubica fast gleich häufig vor wie die infrapubica. Unter 39 von *Kneer* zusammengestellten Fällen von Luxation nach vorn waren 19 suprapubicae, 20 infrapubicae.

Wir werden nun zunächst die oben genannten Luxationsformen einzeln besprechen und dann die seltenen Fälle verfolgen, in denen sie combinirt, als sog. Doppelluxationen vorkommen.

1. Luxationen nach hinten — Luxationes posticae s. retrocotyloideae.

Die Luxationen nach hinten unterscheidet man als solche auf das Darmbein (L. iliaca) und solche auf das Sitzbein (L. ischiadica). Der Unterschied im Stande des Kopfes bei diesen beiden Formen ist nicht gross, aber practisch wichtig. Immerhin lassen sich beide Arten ohne Nachtheil zusammen abhandeln.

Die Luxationen nach hinten entstehen im Allgemeinen durch Gewalten, welche die untere Extremität in Flexions-, Adductions- und Innenrotationsstellung drängen. Ob dabei der Kopf die höhere Lage auf dem Darmbein einnimmt oder die tiefere auf dem Sitzbein, das hängt ab von dem Grade der stattgehabten Flexion und Innenrotation. Man kann sich dies am besten vergegenwärtigen, wenn man die luxirenden Gewalten selbst zu Hilfe nimmt.

Diese wirken entweder so, dass das Bein die abnorme Bewegung macht, während das Becken fixirt ist, oder sie rotiren das Becken bei fixirtem Bein.

Nehmen wir den ersteren Fall an, so haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Einmal ist das Bein adducirt und nach innen rotirt, jedoch nur mässig flectirt. Der Patient fällt z. B. von einer bedeutenden Höhe herab und gleitet beim Auftreffen auf den Boden mit dem Fusse nach innen oder stürzt mit einwärts rotirten Beinen auf die Seite. Dann wird sich die Kraft bis auf den

Schenkelkopf fortpflanzen. Dieser wird aber dadurch gegen den hinteren oberen oder seitlichen Theil der Gelenkkapsel angedrängt werden und dieselbe bei genügender Gewalteinwirkung hier, d. h. also hinten und oben oder bei etwas stärkerer Flexion auch mehr in den hinteren seitlichen Partieen zerreissen und, durch sie hindurchtretend, direct auf das Darmbein gelangen (L. iliaca directa). Jedenfalls liegt der Kapselriss oberhalb der Sehnen der Mm. obturatorii, doch können diese mit der unter ihnen liegenden Kapsel gelegentlich auch zerrissen sein. Der verrenkte Kopf steht dann entweder zwischen Obturator internus und Pyriformis, dessen fleischiger Bauch gequetscht oder durchrissen ist, oder er gleitet unter dem Pyriformis durch, so dass nun dessen Sehne um den Schenkelhals herumzieht, während der Kopf auf dem zerrissenen oder von seiner Insertion am Schenkel abgelösten Glutaeus minimus aufruht und selbst von dem Rande des Glutaeus medius und dem Glutaeus maximus bedeckt ist

Fig. 240.





Fig. 241.



(Fig. 240). Das Lig. ileo-femorale ist vorzüglich in seinem äussern Schenkel gespannt, die vordere Kapsel intact, ebenso die untere (Fig. 241).

Der eben supponirte Mechanismus kommt nun im Ganzen selten vor. In der Regel findet vielmehr beim Zustandekommen der hinteren Luxationen eine stärkere Beugung, ja sogar eine Ueberbeuguug und eine stärkere Rotation nach innen statt, wobei dann so recht die Hebelwirkung zur Geltung kommt. Selten genügt schon ein blosses Ausgleiten auf ebenem Boden zur Entstehung solcher Verrenkungen, meistens ist eine starke Gewalt nothwendig. Dieselbe wirkt am allerhäufigsten als schwere Last, welche, wie herabstürzende Erdmassen bei Verschüttungen, dem Becken die rotirende Bewegung mittheilen, indem sie dasselbe an der der Luxation entgegengesetzten Seite treffen und es vornüber und nach der luxirten Seite hin wälzen. In ähnlicher Weise entstehen die Luxationen wohl auch bei Eisenbahnunfällen, bei denen die Reisenden aus dem Wagen herausgeschleudert werden und mit dem betreffenden Beine hängen bleiben. Hierbei ist dann in der Schwere des nach vorne herausfallenden und rotirenden Körpers die Ursache der Verletzung zu suchen.


Der Mechanismus ist in allen diesen Fällen eine Hebelwirkung. Durch die starke Beugung, Adduction und Innenrotation wird der Kopf den hinteren unteren Kapselpartieen gegenübergestellt, die ganze Extremität aber zu einem zweiarmigen Hebel, der sein Hypomochlion dadurch findet, dass sich der Schenkelhals auf dem vorderen oberen Pfannenrande aufstemmt. Je mehr nun die Gewalt den langen Hebelarm d. h. das Bein in der gedachten Stellung weiter zu treiben sucht, um so mehr muss der kurze Hebelarm der Last, d. h. der Gelenkkopf hinten und unten gegen die Kapsel andrängen, bis diese schliesslich nachgiebt. Der Kapselriss liegt jetzt also an der hinteren unteren Umrandung der Pfanne. Ist nun der Kopf ausgetreten, so bleibt er nicht hinten und unten an der Pfanne stehen, sondern nimmt dadurch, dass das Bein durch die Schwere oder den Willen des Patienten, besonders aber durch die fortwirkende Gewalt in stark einwärts rotirter Stellung herabfällt, eine secundäre Lage ein, indem er nach hinten und oben neben der Pfanne in die Höhe rückt.

Er kommt hier zunächst auf die untere hintere Sitzbeinfläche zwischen den Rand des Acetabulum und den der Incisura ischiadica minor zu liegen, schiebt dann die Sehne des Obturator internus und der Gemelli vor sich her, bis diese über seine Wölbung herübergleiten, so dass nun, während die Gemelli in der Regel zerreissen, die Sehne des Obturator internus zwischen Kopf und

Gelenkpfanne eingeklemmt wird, der Kopf aber zwischen Incisura ischiadica major und minor stehen bleibt oder sich in den untern Theil der letzteren einstellt. Er schaut dann zwischen dem ihn nach oben deckenden Musc. pyriformis und dem meistens auch etwas eingerissenen Quadratus femoris wie aus einem Fenster heraus. Das ist die Lage des Kopfes bei der Luxatio ischiadica, die *Bigelow* wegen des eben beschriebenen Verhältnisses zur Sehne des Obturator internus auch „Luxation unter die Sehne“ genannt hat (Fig. 242).

Die Sehne des Obturator internus hindert den Kopf, noch höher emporzusteigen. Dies kann nur geschehen, wenn die Sehne zerreisst. Dies scheint allerdings ziemlich oft vorzukommen; wie wir oben bei der Statistik gezeigt haben, trifft man den Kopf häufiger höher auf dem Darmbein, wobei er jedoch fast nie eine Linie überschreitet, welche man sich von der Spina anterior inferior nach der obersten Grenze der Incisura ischiadica major gezogen denkt. Das besonders in seinem innern Schenkel stark gespannte Y-Band und die unversehrt gebliebene hintere Kapselwand verhindern ein höheres Aufsteigen. So ist die Luxatio iliaca gleichsam auf indirectem, secundärem Wege entstanden, der Kopf aber hat dann dieselbe Stellung zu den umgebenden Muskeln, wie wir sie vorher bei der directen Luxation kennen gelernt haben, nur sind auch, wie jetzt gesagt, die Auswärtsroller zerrissen. Will man im Namen dieser Luxation zugleich ihre Entstehung mit angeben, so bezeichnet man sie auch wohl als Luxatio ileo-ischiadica.

Fig. 242.




Wir haben bisher nur die Lage des Kopfes zu seiner Umgebung berücksichtigt und müssen nun zur Ergänzung der **pathologisch-anatomischen Charaktere** noch einige praktisch wichtige Details nachholen.

Beginnen wir mit der Pfanne selbst, so sind gar nicht selten an den Austrittsstellen des Kopfes Fracturen ihres Randes beobachtet worden, oder man fand auch wohl den Limbus cartilagineus von seiner knöchernen Unterlage abgelöst. Auch kommen hie und da sternförmige Fracturen des Pfannenbodens selbst zur Beobachtung.

Die Kapsel ist an den betreffenden Stellen entweder quer (Fig. 243) oder in Form eines Dreieckes von der Pfanne abgerissen, oder häufiger der Länge nach, also von der Pfanne nach dem Trochanter hin gespalten. Sehr selten befindet sich der Kapselriss an der Insertion des Schenkelhalses. Zuweilen ist die Kapsel in ihrer ganzen hinteren Ausdehnung von der Pfanne losgelöst. Ist sie in ihren lateralen Partieen erhalten, so stehen diese vor dem Kopf und verlaufen dann gespannt von dem hinteren Rand der Pfanne nach dem Schenkelhals.

Fig. 243.



Niemals aber ist bei diesen regelmässigen Luxationen das Y-Band verletzt. Dadurch erklärt sich seine grosse Bedeutung für diese Luxationen, indem es ganz allein im Stande ist, den Kopf in seiner falschen Stellung zu fixiren. Bei der Luxatio ischiadica ist vorzüglich sein innerer, bei der Luxatio iliaca vorzugsweise sein äusserer Schenkel gespannt.

Das Lig. teres ist meistens zerstört, kann aber auch aus dem Grübchen am Schenkelkopf abgelöst sein oder selbst ein Stückchen seines Schenkelkopfansatzes abgerissen haben. So beschrieb *Braun* vor kurzem ein Präparat, in welchem die Bruchlinie durch den Schenkelkopf von oben nach unten verlief, während das abgerissene Stück des Kopfes noch mit dem Lig. teres zusammenhing.

Der Nervus ischiadicus kann von dem Schenkelhals in die Höhe gehoben und stark gedehnt und gequetscht, die Glutäalgefässe ebenfalls comprimirt oder zerrissen werden (Fig. 242).

Von den von vorn her an den Oberschenkel sich ansetzenden Muskeln werden besonders der Ileopsoas, Pectineus und die Adductoren stark gespannt.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass neben schwereren Verletzungen, wie Wirbel- und Beckenfracturen, sowie Verletzungen der Baucheingeweide gelegentlich auch Fracturen des Schenkelhalses und des Schenkelschaftes die Luxationen compliciren und sogar doppelseitige Oberschenkelluxationen vorkommen können. Diesen letzteren werden wir später noch eine ausführlichere Besprechung widmen. Was die complicirenden Fracturen des Oberschenkels betrifft, so hat *Kammerer* 1889 bei einer sorgfältigen Litteraturumschau 19 einschlägige Beobachtungen für alle Formen der Hüftluxationen zusammen gefunden. In diesen 19 Fällen war 13 mal der Schenkelschaft, 6 mal der Schenkelhals gebrochen, 12 mal hatte sich dabei der Oberschenkelbruch bei Luxation des Femur nach hinten, 2 mal bei Luxation nach unten und vorn, 5 mal bei Luxation nach vorn und oben ereignet.

Symptome der Luxationen nach hinten.

Wer sich nach dem Gesagten oder mit Zuhilfenahme eines skelettirten Beckens die Lage des Kopfes bei der Luxatio iliaca und ischiadica vergegenwärtigt und sich daran erinnert, dass bei der Luxatio iliaca der Kopf nie auf die eigentliche Darmbeinschaufel heraufrückt, dem wird es sofort begreiflich sein, dass die beiden Formen keine grossen Differenzen des klinischen Bildes zeigen werden.

In beiden Fällen steht das luxirte Bein flectirt, adducirt und nach innen rotirt und ist dabei verkürzt. Nur Unterschiede im Grade dieser falschen Stellungen kennzeichnen die eine oder andere Form.

Bei der **Luxatio iliaca** (Taf. XXI) stützt sich, wenn der Kranke aufrecht steht, das luxirte Bein mit dem Rande des einwärts gedrehten Fusses auf die Zehen des anderen. Die Beugung im Hüftgelenk, die stets vorhanden ist, wird dabei durch Senkung der betreffenden Beckenseite und Lordose der Lendenwirbelsäule vollkommen compensirt, so dass der Fuss den Erdboden mit der Sohle berührt. Lässt man den Patienten die Rückenlage einnehmen, so tritt die Beugung stärker zu Tage. Es kreuzt nun der kranke Fuss den gesunden am Metatarsus.





Bei der **Luxatio ischiadica** ist die Beugung und Innenrotation des Schenkels stärker ausgeprägt als bei der iliaca. Im Stehen rückt der kranke Fuss vor den gesunden, und es vermag der Patient kaum mit der Fussspitze den Erdboden zu berühren. Im Liegen kreuzt das gebeugte Knie den anderen Oberschenkel und ruht mit seiner Innenseite auf der Vorderfläche des letzteren gleich oberhalb der Patella auf. Das Knie ist dabei leicht gebeugt, und zwar um so stärker, je tiefer der Kopf steht.

Zu dieser charakteristischen Stellung der Extremität kommt als weiteres augenfälliges Symptom hinzu die Verkürzung derselben. Dieselbe ist eine scheinbare und ein wahre. Scheinbar dadurch, dass der Patient die Adduction durch Hebung der kranken Beckenseite zu corrigiren sucht, faktisch aber wegen des jetzt höheren Standes des Kopfes am Becken, dadurch nachweisbar, dass die Spitze des Trochanter major nicht, wie normal, in der *Roser-Nélaton*'schen Linie steht, sondern diese Linie nach hinten und oben um 2—5 cm überragt. Die Verbindungslinien der Spina ilei anterior superior, des Trochanter major und des Tuber ischii umschliessen nun ein mit der Spitze nach hinten und oben gerichtetes Dreieck, die Messung von der Spina anterior superior zum Malleolus internus aber ergiebt eine Längendifferenz zu Ungunsten der kranken Seite. Selbstverständlich ist die Verkürzung stärker bei der Luxatio iliaca als bei der ischiadica.

Ebenso auffallend wie die genannten Erscheinungen ist die Deformität der Hüftgegend. Dieselbe erscheint, da der nach innen und vorn gedrehte Trochanter major die Fascia lata spannt und nach aussen drängt, verbreitert. Bei mässig genährten Individuen erscheint das Gesäss voller und die Gesässfalte nach oben gerückt. In der Tiefe der Gesässmuskulatur vermag man den Kopf als harten kugeligen Körper zu fühlen, muss aber dazu bei Kranken mit reichlicher Fettentwicklung oft die Ausführung von Rotationsbewegungen mit dem Beine zu Hilfe nehmen, um sich zu überzeugen, dass die in der Tiefe fühlbare Geschwulst die vorgenommenen Bewegungen wirklich mitmacht. In der Leistengegend fehlt der normal vorhandene feste Widerstand in der Tiefe. Nur selten werden durch starke subcutane Blutergüsse die Contouren der Hüfte ganz verwischt.

Das Bein ist in seiner falschen Stellung fast vollständig fixirt, wie wir schon wissen, durch die Wirkung des Y-Bandes und der erhaltenen Kapseltheile. Active Bewegungen sind kaum ausführbar, passive im Sinne der Abduction und Aussenrotation vollständig unmöglich, in geringem Grade dagegen ausführbar im Sinne der Beugung und Adduction. Streckung und Adduction sind dagegen wieder nicht möglich. Bei allen stärkeren Bewegungsversuchen setzt sich diesen ein elastischer, federnder Widerstand entgegen.

In Folge der schweren Gewalteinwirkung und Erschütterung des Beckens findet man besonders im jugendlichen Alter nicht so selten eine vorübergehende Retentio urinae.

Neben diesen objectiven Symptomen treten die subjectiven ziemlich zurück. Der Kranke hat heftige Schmerzen und bei Compression des Ischiadicus ein bis in den Fuss ausstrahlendes Gefühl von Ameisenkriechen und Brennen, oder auch heftige Ischialgie.

Wir wollen nicht zu erwähnen unterlassen, dass in ganz ausserordentlich seltenen Fällen auch das Y-Band zerreissen und somit eine unregelmässige Luxation entstehen kann, bei der nunmehr das Glied seiner Schwere folgend eine nach aussen rotirte Lage annimmt.

Nach dem Gesagten ist die **Diagnose** der hinteren Luxationen leicht zu stellen. Verwechslungen können kaum vorkommen, obwohl bei starker Schwellung der Hüfte einfache Contusionen des Gelenkes, sowie die seltenen mit Innenrotation des Beines einhergehenden Formen der Schenkelhalsbrüche ähnliche Erscheinungen zeigen können. Die Unterscheidungsmerkmale werden wir später kennen lernen. In allen zweifelhaften Fällen wird die Untersuchung in der Narcose die richtige Erkenntniss fördern helfen. Ob die vorliegende Verletzung in einer Luxatio iliaca oder ischiadica besteht, das wird die Stellungsanomalie der Extremität entscheiden, indem ja Beugung, Adduction und Einwärtsrollung bei der ischiadica stärker sind als bei der iliaca.

Was die Complicationen anbetrifft, so wird man einen Bruch des Pfannenrandes diagnosticiren können, wenn sich die Luxation relativ sehr leicht einrichten lässt, wenn bei der Reduction Crepitation fühlbar ist und wenn die reponirte Luxation grosse Neigung zu Recidiven zeigt.

Bei gleichzeitiger Fractur des Schenkelhalses wird man das Bein verkürzt, nach aussen rotirt, den

Schenkelkopf aber unter der Glutäalmuskulatur finden — das sind aber äusserst seltene Fälle.

Prognose der Luxationen nach hinten.

Die Prognose frischer, rationell behandelter, d. h. zweckmässig eingerichteter Luxationen ist im Ganzen eine günstige, indem in der Regel keine Störungen zurückbleiben, habituelle Luxationen aber ausserordentlich selten sind und nur bei gleichzeitigem Bruch des Pfannenrandes vorkommen.

Die Luxationen veralten jedoch sehr bald, und wenn es auch einzelne Fälle giebt, in denen die Reposition noch nach Jahren gelungen sein soll, so ist im Allgemeinen die Verrenkung schon nach wenigen Wochen nicht mehr vollständig zu heilen. Es bildet sich dann der Kopf an der falschen Stelle meist ein neues Gelenk und zwar öfters eine Nearthrose der vollkommensten Art. Trotzdem aber bildet die Verkürzung und Einwärtsrollung des Beines ein grosses Hinderniss beim Gehen, so dass die Kranken sich stets der Krücken bedienen müssen. Nur ausnahmsweise wird mit der Zeit in Folge der ständigen Belastung des Beines die Einwärtsrollung geringer. Aber auch dann vermögen sich die Patienten nur unter stärkerem Hinken und unter baldiger Ermüdung fortzubewegen. Das kranke Bein wird dabei stets auch mehr oder weniger hochgradig atrophisch, und ausserdem kommt es zuweilen vor, dass neuralgische Schmerzen durch Druck des luxirten Kopfes auf den Nervus ischiadicus den Patienten dauernd belästigen. Die alte Pfanne füllt sich mit Bindegewebe aus und obliterirt mit der Zeit vollständig. Wir führen nur einige diesbezügliche Litteraturangaben an. v. *Volkmann* fand bei einer 2 Monate alten Luxation einen Muskelstreifen über die alte Pfanne ausgespannt, deren obere Schichten fibrös indurirt waren. *Mac Cormac* fand die alte Pfanne ganz von Bindegewebe angefüllt. *Quenu* fand an der falschen Stelle des Kopfes eine neue Pfanne und Kapsel von knorpelig bindegewebiger Consistenz, *Nicoladoni* eine neue starke, derbe Kapsel und eine mit faserknorpelartiger Masse überzogene neue Pfanne, *Niehaus* eine fast ganz verknöcherte neue Kapsel. Interessant ist der von *Rudolf Volkmann* erhobene experimentell begründete Befund einer vollständigen Neubildung des Lig. teres. Der Schenkelkopf verliert seine normale Gestalt. Er schleift sich dort ab, wo er mit der neuen Pfanne articulirt, und büsst an den anderen Stellen seinen Knorpelüberzug ein.

Solche üble Folgen, wie man sie als acute Vereiterungen und Verjauchungen der Gelenke nach gewaltsamen und rohen Repositionsversuchen in früheren Jahren vorkommen sah, sind heutzutage wohl kaum mehr zu befürchten.

Die Kenntniss der Aetiologie und der Anatomie der besprochenen Luxationen ist heutzutage soweit vorgeschritten, dass wir die Einrichtung derselben nicht mehr wie unsere Vorfahren zu fürchten haben. Geht man sachgemäss vor, so wird die Reposition in der Regel ohne Schwierigkeiten gelingen. Es giebt nun aber eine, glücklicher Weise sehr geringe Anzahl von Fällen, in denen selbst das rationellste Verfahren im Stiche lässt. Das sind die Verletzungen, in welchen ein **unüberwindliches Repositionshinderniss** vorliegt.

Als solche hat man bisher kennen gelernt: zunächst Knochenstücke, welche sich in die Pfanne einlagern. So kann das Lig. teres ein Stück vom Kopf losgerissen haben und mit diesem in der Pfanne liegen, oder es kann ein Segment des Pfannenrandes abgebrochen sein und sich jedesmal vor dem Femur-Kopfe in die Pfanne hineinschieben, wenn man den ersteren einzurenken versucht, oder es kann ein Stück des Trochanter, das mit der Kapsel abgerissen und an dieser hängen geblieben war, sich zwischen Kopf und Pfanne einklemmen. In gleicher Weise kann auch gelegentlich ein Stück des Limbus cartilagineus von seinem knöchernen Ansatz losgelöst und zwischen Kopf und Pfanne interponirt werden.

Weiterhin kommen die Muskeln in Betracht. Man hat auch hier wieder eine knopflochartige Umschliessung des Kopfes durch die kleinen Auswärtsroller beschuldigt. Eine solche kann wohl statthaben, wie die Sectionen zeigten, allein es ist kaum anzunehmen, dass rationelles Vorgehen dies Hinderniss nicht beseitigen sollte.

Dies kann man nicht sagen von den zuweilen durch den Kapselriss gesetzten Momenten. Es kommen hier zweierlei Verhältnisse in Betracht. Einmal kann derselbe, wie das *Gellé* unzweifelhaft nachgewiesen hat, zu eng sein, so dass der Kopf die Kapsel jedesmal vor sich herstülpt. Zweitens aber kann ein abgerissener Lappen der Kapsel sich in die Pfanne hineinlegen und so eine absolute Irreponibilität bewirken.

Solche Fälle bedürfen dann einer besonderen Behandlung.

Therapie der Luxationen nach hinten.

Die Reposition der Hüftgelenksluxationen wird, da sie eine schmerzhafte Operation ist und da mächtige Muskelmassen zu entspannen sind, am besten in der Narcose vollzogen. Nothwendig ist dann weiter eine genügende Fixation des Beckens. Man kann diese auf zweierlei Weise erreichen. Entweder lässt man das Becken des auf dem Rücken liegenden Patienten durch die auf beide Spinae ilei ant. sup. gelegten Hände eines Assistenten fest gegen die Unterlage drücken, die unnachgiebig sein muss, oder man bedient sich noch zweckmässiger des *Gersuny*'schen Verfahrens. Dieses besteht darin, dass man durch einen Assistenten das gesunde Bein des Patienten ad maximum im Hüft- und Kniegelenk beugen und derart fixiren lässt, dass das Knie fest gegen die Brust gedrückt wird. Der Operateur selbst fasst nun das im Kniegelenk gebeugte luxirte Bein derart, dass seine eine Hand auf das Knie, die andere an die Knöchel zu liegen kommt (Fig. 244). Die Reposition selbst geschieht nun ohne jede rohe Gewalt und zwar durch Methoden, welche durch das Studium der Aetiologie und der pathologisch-anatomischen Charaktere gewonnen wurden und als anatomisch-physiologische Verfahren bezeichnet werden können.


Es sind nur zwei Methoden, welche auf diesen Namen Anspruch machen können. Wir führen daher auch nur diese beiden hier an. Es sind 1. die Methode der Manipulation, die von *Roser, Busch, Bigelow* und *Kocher* angegeben wurde, und die wir nach *Kocher* anführen, und 2. die auch von anderen Autoren angewendete, aber ganz besonders von *Middeldorpf* empfohlene Hebelmethode, sogenannte „Methodus mochlica".

1. Die **Kocher'sche Methode der Manipulation** besteht darin, dass man das luxirte Bein zunächst noch stärker einwärts rotirt, als es schon steht, dann bis zum rechten Winkel flectirt, an dem flectirten Bein einen directen Zug nach oben in der Richtung des gebeugten Schenkels ausführt, es nun nach auswärts rotirt und schliesslich streckt.

Sehen wir zu, wozu die einzelnen Bewegungen nützen sollen, so wird durch die zuerst ausgeführte Einwärtsrotation eine Erschlaffung der Kapsel und des Y-Bandes herbeigeführt und der Kopf von der Hinterfläche des Beckens abgehebelt, also mobil gemacht. Die nachfolgende Flexion bis zum rechten Winkel

bewirkt ein Herabgleiten des Kopfes hinter den unversehrten Kapseltheilen nach unten, so dass er nunmehr dem Kapselriss, wieder gegenübersteht. Sie wird ohne jede Gewaltanwendung gemacht, die bestehende einwärts rotirte und adducirte Stellung des Beines also dabei beibehalten. Vor gewaltsamer Flexion muss man sich hüten, denn sonst kann es passiren, dass der Kopf um die untere Umrandung der Pfanne nach vorn gleitet und nun eine Luxation nach vorn und zwar auf das Foramen obturatorium entsteht. Bei der folgenden Bewegung, d. h. dem Zug nach oben,

Fig. 244.



soll das Y-Band, die Kapsel und namentlich der hintere Umfang derselben wieder angespannt und der Kopf auf die Höhe des Pfannenrandes emporgehoben werden, während ihn die Aussenrotation um den durch Spannung des Y-Bandes fixirten Trochanter nach innen in die Pfanne hineindreht und die schliessliche Streckung ihn parallel neben das andere Bein hinlegt.


2. Die **Middeldorpf'sche „Methodus mochlica"** reponirt den Kopf durch starke Flexion, Abduction und Auswärtsrollung der Extremität (Fig. 245).

Die starke Flexion hebelt den Kopf wieder vom Becken ab und stellt ihn dem Kapselriss gegenüber, die Abduction spannt den äusseren Schenkel des Lig. ileo-femorale, gestattet dadurch dem Schenkelhals oder dem Trochanter, sich am Rande der Pfanne anzustemmen und so ein Hypomochlion zu bilden, um welches nun die jetzt folgende Aussenrotation den Kopf in

die Pfanne hineinhebelt. Schliesslich werden auch wieder durch Streckung der Extremität beide Beine parallel gelegt.

Das Einschnappen des Gelenkkopfes verräth sich bei beiden Methoden durch das charakteristische Geräusch und dadurch, dass das Glied wieder nach allen Richtungen hin bewegt werden kann.

Fig. 245.



Der Anfänger muss sorgfältig darauf achten, dass er nicht eine Luxatio obturatoria erzeugt, sondern wirklich die Reposition besorgt hat.

Beide Methoden sind gleich gut und practisch. Die letztere empfiehlt sich namentlich auch für nicht ganz frische Verletzungen. Man muss dann aber ja recht vorsichtig zu Werke gehen, da man sonst bei der Abduction und Aussenrotation, besonders bei älteren Leuten, den Schenkelhals brechen kann. Das ist schon den besten Chirurgen passirt. Man kann dies nur dadurch vermeiden, dass man alle Bewegungen langsam und stetig, aber ja nicht ruckweise vornimmt.

Gelingt die Reposition auf keine Weise und muss man annehmen, dass eines der vorhergenannten, von aussen unüberwindlichen Repositionshindernisse vorliegt, so muss man auf die Einrichtung verzichten, wenn man nicht unter aseptischen Cautelen

die Arthrotomie und Entfernung der Hindernisse mit dem Messer vornehmen will, wie das *v. Volkmann* bereits mit Erfolg gethan hat.

In Fällen von Complication der frischen Luxation mit Schenkelhalsbruch oder Diaphysenfractur des Femur wird die Reposition versucht werden müssen, eventuell nach aseptischer Blosslegung des Hüftgelenkes. Zeigt sich dabei bei Brüchen des Schenkelhalses, dass eine Reposition des Kopfes unmöglich ist, so kann der geübte Aseptiker die primäre Resection ausführen, die Oberschenkeldiaphyse der Pfanne gegenüberstellen und in Abductionsstellung der Extremität einen Heftpflastergewichtsextensionsverband anlegen. Der weniger Geübte aber wird von vorneherein die Fractur in möglichst günstiger Stellung zu heilen und dann eine ausgiebige Nearthrose zu erzielen versuchen.

Bei veralteten Luxationen kann man, nachdem durch einleitende Rotationsbewegungen die Adhäsionen möglichst gesprengt sind, die Reposition durch die Hebelmethode versuchen. Gelangt man nicht zum Ziel, so kann man mehrere Wege beschreiten. Am rationellsten ist es nach ausgiebigster offener Durchschneidung aller verkürzten Weichtheile, nach gründlicher Entfernung aller sich interponirenden Bandmassen, nach Freilegung und Ausräumung der alten Pfanne die blutige Reposition des Schenkelkopfes zu versuchen. Dieselbe wird vorzugsweise bei jüngeren Individuen gelingen *(Vecelli, Küster, Harris)*, wird dagegen wohl meist im Stiche lassen bei älteren Patienten und starker Deformirung des Schenkelkopfes.

Ein anderer Weg ist der, dass man zunächst eine möglichst günstige Nearthrose zu erzielen sucht, um dann die Osteotomia subtrochanterica zu machen und dem Bein die richtige Stellung zu geben. Als Methode der Osteotomie würde sich die schiefe Osteotomie *(Hoffa)* am meisten empfehlen, weil man bei Zuhülfenahme dieser Methode nicht nur die falsche Stellung des Beines ausgleichen, sondern gleichzeitig auch die Verkürzung um ein gutes Theil beseitigen kann.

Für hartnäckigere Fälle bleibt dann die Resection des Femurkopfes ein letztes Hülfsmittel. Diese ist bisher nach *Kirn, Bloch* und *Ostermayer* schon 18 mal ausgeführt worden, mit 13 Heilungen und theilweise ausgezeichneten functionellen Resultaten.

Sollte einem das Unglück passiren, bei Repositionsversuchen alter Luxationen den Schenkelhals zu brechen, so würde man be

extracapsulärer Fractur einen Extensionsverband anlegen müssen, um wieder eine Heilung in guter Stellung zu erzielen. Bei intracapsulärer Fractur aber, bei der, wie die Erfahrung gelehrt hat, der Kopf wegen seiner schlechten Ernährung leicht necrotisch wird, würde die Resection des Kopfes indicirt sein.

Die Nachbehandlung der reponirten Luxation besteht zunächst darin, dass man auf die Hüfte eine Eisblase auflegt, den Patienten ruhig zu Bette legt und das Gelenk dann für einige Zeit feststellt. Bei nicht complicirten Luxationen genügt eine Ruhigstellung für zwei bis drei Wochen. Sobald aber ein Bruch des Pfannenrandes vorhanden ist, muss die Fixation bis auf sechs Wochen ausgedehnt werden, da sonst zu leicht Recidive der Luxation entstehen. Hat der Patient seine ersten Gehversuche gemacht, so muss nun die Massage der Muskulatur, die Anwendung der Electricität und eine vorsichtige Gymnastik folgen.

2. Luxationen nach vorne, Luxationes anticae s. praecotyloideae.

Während die Luxationen nach hinten durch Gewalten entstehen, welche das Bein flectiren, adduciren und nach innen rotiren, werden die Verrenkungen nach vorne durch solche erzeugt, die das flectirte oder gestreckte Bein abduciren und nach aussen rotiren.


Auch hier kann entweder das Becken oder das Bein die abnorme Bewegung ausführen. Der Kopf tritt dabei aus einem Kapselriss heraus, der entweder in der vorderen oberen oder vorderen unteren Umrandung der Pfanne liegt. Im ersteren Falle erfolgt die Luxation nach vorne oben auf das Schambein (L. suprapubica), im anderen nach vorne unten unter das Schambein (L. infrapubica).

a) Luxationes suprapubicae.

Die Veranlassung zu den Verrenkungen auf das Schambein kann eine Gewalt sein, welche den Oberschenkel von hinten her trifft und den Kopf direct vorn aus der Kapsel treibt. Dies kommt jedoch nur sehr selten vor. In der Regel handelt es sich um eine gewaltsame Rückwärtsbeugung des Rumpfes, während die Patienten mit abducirten und auswärtsrotirten Beinen dastehen. So ereignen sie sich z. B. bei Kindern, welche beim Schaukeln ihrer Gespielen selbst derart von der

Schaukel gestossen werden, dass ihr Oberkörper hintenüber fällt. In ähnlicher Weise werden Erwachsene betroffen, indem ihnen eine schwere Last, bei Verschüttungen z. B. die herabstürzenden Erd- oder Steinmassen, auf die Brust fällt und dieselbe nach rückwärts treibt. Anderemale wird die Luxation dadurch erzeugt, dass die Patienten in den Speichen von Rädern hängen bleiben, der Wagen aber weiter fährt, oder dadurch, dass der Körper beim Ringen hintenübergelegt wird, oder [die Leute beim Gehen oder Laufen mit dem Fuss in einer Spalte oder Unebenheit des Bodens hängen bleiben, in demselben Moment aber ihren Körper rückwärts beugen, um sich vor dem Falle zu schützen.

Fig. 246.




In allen diesen Fällen handelt es sich wieder um eine Hebelwirkung. Der Schenkelhals stemmt sich auf den zum Hypomochlion werdenden hinteren unteren Rand der Pfanne. Der Kopf als Hebelarm der Last wird gegen die vordere obere Kapselwand gedrängt und reisst sie hier, wo sie schon an und für sich schwach gewebt ist, vor und nach innen von dem Lig. ileo-femorale entzwei.

Der ausgetretene Kopf gelangt auf das Schambein und kann nun auf demselben verschiedene Stellungen einnehmen. Am häufigsten bleibt er auf dem Tuberculum ileo-pectineum, also nach innen von der Spina anterior inferior stehen an der Stelle, an der sich das Darmbein mit dem horizontalen Aste des Schambeines verbindet (L. ileopectinea). Wenn er ein klein wenig nach aussen, ziemlich dicht unter dieser Spina angetroffen wird, so spricht man wohl auch von einer L. subspinosa. Machte er mehr in der Mitte des Schambeines oder noch mehr nach innen am Tuberculum pubicum Halt, so liegt die Luxatio pubica vor.


Was nun die **pathologisch-anatomischen Charaktere** dieser Luxationen betrifft (Fig. 246), so wird der auf dem Schambein liegende Kopf auf seine Unterlage fest aufgedrückt durch den über seine Wölbung oder häufiger über seinen Hals gespannt verlaufenden M. ileopsoas und die ebenfalls gespannte Fascia lata. Der Kopf selbst drückt etwa gegen die Gegend der Leiste, an der die Spermaticalgefässe in den inneren Leistenring eintreten. Der Trochanter major steht in der Hüftpfanne. *Lauenstein* machte die Section eines Falles, in dem der Trochanter major durch Muskelzug abgerissen war. In diesem Falle hatte der Schenkelhals eine Stütze an dem oberen Pfannenrande gefunden. Die Kapsel reisst entweder dicht am Schenkelhals, wobei dann der am Pfannenrande hängenbleibende Theil sich lappenförmig in die Pfanne hineinschlägt, oder sie ist in der Hälfte ihres vorderen Umfanges in der Nähe der Pfanneninsertion abgerissen, so dass der Schenkelhals zwischen dem Kapselrande und dem Limbus cartilagineus wie in einem Knopfloch festgehalten wird. Das Y-Band ist erhalten, der innere Schenkel weniger gespannt als der äussere, dessen Ansatz mit dem Trochanter major nach hinten gegen die Pfanne weicht (Fig. 247). Der N. cruralis verläuft über dem Schenkelhals. Die Femoralgefässe sind nach innen gegen die Symphyse verschoben. Die dem Kopf zunächst liegende Arterie kann dabei zwischen Kopf und Os pubis eine Compression erfahren. Nur selten verlaufen die grossen Gefässe über die Wölbung des Kopfes selbst. Sie sind dann natürlich hochgradig gedehnt. Von den umgebenden Muskeln ist der Pectineus gewöhnlich seitlich zerrissen oder gegen die Symphyse hingebogen, die drei Glutaei erschlafft, ihre Insertionen mit dem Trochanter nach innen gezogen.

Fig. 247.



Die Auswärtsroller sind sammt der hinteren Kapsel ebenfalls nach innen dislocirt, werden von dem Trochanter in die Pfanne hineingedrückt und sind dabei aufs Aeusserste gedehnt oder auch wohl, mit Ausnahme des Obturator externus, zerrissen.

Die **Symptome** dieser Luxationen sind prägnant (Tafel XXII). Das Bein steht im Allgemeinen gestreckt, abducirt und nach aussen rotirt. Die Abduction ist am geringsten ausgesprochen bei der Luxatio ileo-pectinea. Hier steht das Bein fast parallel dem anderen. Je mehr der Kopf sich der Mittellinie nähert, um so ausgesprochener wird die Abductionsstellung, und um so mehr muss sich das Bein in leichte Beugestellung begeben. Wenn diese Beugestellung nicht sofort in die Augen tritt, so liegt die Schuld daran, dass sie durch Beckenneigung corrigirt wird. Stets ist eine reelle Verkürzung vorhanden, da der Kopf höher steht als die Pfanne. Trotzdem kann das Bein in Folge der vorhandenen Abductionsstellung scheinbar verlängert sein. Unter dem *Poupart'*schen Band sieht man in der Leistengegend, bald mehr gegen die Spina anterior infer., bald mehr gegen das Tuberculum pubis zu eine kugelige Vortreibung, die sich bei Rotationen des Beines als der Schenkelkopf erweist. Am inneren Rande dieser Geschwulst pulsirt die Art. femoralis. Sie liegt auch wohl etwas auf der Wölbung der Geschwulst selbst und giebt sich dann dem palpirenden Finger durch ein deutlich schwirrendes Geräusch zu erkennen. Das Bein ist in der falschen Stellung derart fixirt, dass active Bewegungen ganz unmöglich, passive aber wegen der Spannung der hinteren unverletzten Kapselwand und des inneren Schenkels des Y-Bandes nur im Sinne der Abduction und Auswärtsrollung ein wenig, gar nicht dagegen im Sinne der Beugung, Adduction und Einwärtsdrehung ausführbar sind. Die Patienten vermögen sich zuweilen noch auf das luxirte Bein zu stützen und zu gehen, wahrscheinlich deshalb, weil sich der Schenkelhals gegen das unverletzte Lig. ileo-femorale anstemmt und der Kopf vielleicht auch eine Stütze an dem vorderen unteren Darmbeinstachel erlangt. Durch die Dehnung des Nerv. cruralis werden nicht selten heftige in das Bein ausstrahlende Schmerzen oder doch wenigstens dort das Gefühl des Taubseins und Eingenommenseins angegeben. Gelegentlich findet man auch bei diesen Luxationen Harnverhaltung. Die Glutäalgegend ist abgeflacht und die Glutäalfalte verstrichen. Der normale Trochantervorsprung fehlt.



Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

Die eigentliche Verrenkung auf das Schambein könnte verwechselt werden mit einem Schenkelhalsbruch. Eine solche Täuschung kann jedoch nicht stattfinden, wenn man die nachfolgenden differential-diagnostischen Tabellen vergleicht.

Die **Prognose** ist relativ die beste von allen Hüftgelenksluxationen. Es können jedoch noch längere Zeit nach geschehener Reposition neuralgische Schmerzen im Cruralis zurückbleiben. Aber auch bei nicht reponirten Luxationen kann sich die Gehfähigkeit wieder herstellen, indem sich auf dem Schambein eine gute Nearthrose entwickelt oder der Kopf eine gute Stütze gegen den unteren Darmbeinstachel findet. Die Flexion im Hüft- und Kniegelenk ist allerdings entweder aufgehoben oder vermindert, indem ja jetzt auch die vom Tuber ischii entspringenden Beuger des Unterschenkels nicht mehr normal fungiren können.


Zur **Therapie** empfiehlt sich die Reposition wieder nach einer der zwei folgenden Methoden.

1. **Methode der Manipulation nach Kocher,** bestehend in Hyperextension, Flexion unter gleichzeitigem Druck auf den Schenkelkopf und Rotation nach innen. Die Hyperextension in der vielleicht noch etwas verstärkten Auswärtsrotation und Abduction des Beines bezweckt eine Abhebelung des Kopfes vom Schambein. Der Femur bildet dabei einen doppelten Hebel, dessen langer Arm durch den Schaft, dessen kurzer durch den Hals und Kopf dargestellt wird, während als Stützpunkt der durch die Kapselreste fixirte Trochanter dient. Ist der Kopf flott geworden, so wird der Schenkelkopf mit der Hand gegen die Pfanne hingedrückt, damit er bei der jetzt zur Erschlaffung des Lig. ileo-femorale nothwendigen Beugung nicht wieder nach aufwärts gleitet. Die Beugung selbst geschieht bis zum rechten Winkel. Dabei wird der hintere untere Kapselring angespannt und um diesen dann durch die Einwärtsrotation der Kopf in die Pfanne gedreht.

2. **Middeldorpf's „Methodus mochlica."** Die Reposition geschieht durch Hyperextension, starke Flexion, Adduction und Rotation nach innen. Die Hyperextension hat den nämlichen Zweck wie bei der vorigen Methode. Das Bein wird jetzt aber viel stärker flectirt, möglichst so stark, dass ein spitzer Winkel entsteht. Der Kopf gleitet dabei auf der schiefen Ebene des oberen Pfannenrandes nach abwärts. Die nachfolgende

Adduction bringt ihn nun so an die Pfanne, dass sich der Schenkelhals auf den Pfannenrand aufstemmt. Um diesen festen Punkt

Fig. 248.



wird dann schliesslich durch die Innenrotation der Kopf in die Pfanne hineingehebelt.


Bei der Ausführung beider Methoden liegt der Patient auf dem Tischrand, damit die Hyperextension ohne Behinderung ausgeführt werden kann. Im Uebrigen gilt dasselbe wie bei den Luxationen nach hinten (Fig. 248).

b) Luxationes infrapubicae.

Diejenige Bewegung, welche zur Entstehung einer Luxation unter das Schambein hauptsächlich nothwendig ist, ist eine Abduction, erst in zweiter Linie eine Auswärtsrollung des Beines. Steht das Bein in einer solch abducirten und nach auswärts rotirten Stellung, so kann schon ein einfacher Stoss von aussen genügen, um den Kopf über den vorderen Rand der Pfanne hinüber zu treiben. In der Regel kommt allerdings nicht eine solche directe Gewalt in Betracht, sondern eine stärkere Flexion, so dass dann wieder die Hebelwirkung im Spiele ist. Der Schenkelkopf stemmt sich nämlich in Folge dieser Abduction, Aussenrotation und Flexion, indem sich am oberen äusseren Rande des Acetabulums ein Hypomochlion bildet, gegen die vordere untere Kapselpartie an, zersprengt dieselbe hier und tritt

nun direct auf das Foramen obturatorium (L. obturatoria). War die Flexion eine bedeutende, so kann er auch wohl noch tiefer nach unten gegen den aufsteigenden Sitzbeinast zu stehen kommen und im Perineum erscheinen Wir haben dann die Abart der Lux. obturatoria, die als L. perinealis bezeichnet wird. Wenn in dem Moment, in welchem bei stark flectirtem Beine der Schenkelkopf tief unten an der prominirenden Kante des Os ischii steht, die Gewalt nicht eine abducirende und aussenrotirende Wirkung hat, sondern die Rotation nach innen erfolgt, so kann der Kopf an dem unteren Pfannenrand nach hinten rutschen und eine Lux. ischiadica entstehen. Umgekehrt sahen wir ja schon, dass zuweilen bei der Reposition einer solchen Luxation nach hinten eine Lux. obturatoria entstehen kann, indem bei sehr starker Flexion der Kopf nach vorn rutscht (Lux. obturatoria secundaria.)

Fig. 249.




Die veranlassenden Ursachen nun sind mannigfaltiger Art. Es werden angegeben Verschüttungen, bei denen die Patienten in gebückter Stellung und mit abducirten Schenkeln von den Erdmassen am Rücken getroffen wurden, Fall von der Höhe auf die gespreizten Beine, Eingeklemmtwerden des Beines zwischen Balken und Umfallen des Körpers nach der Seite, Fall vom Pferd und Hängenbleiben in den Steigbügeln u. s. w.


Der ausgetretene Gelenkkopf (Fig. 249) steht mehr oder weniger hoch auf dem Foramen obturatorium, in der Regel in dessen unterem Abschnitt, so dass er etwa die Hälfte oder zwei Drittel der Membrana obturatoria deckt. Er kann dabei eine starke Compression der Vasa obturatoria und des Nervus obturatorius ausüben. Der Musculus obturator externus liegt zuweilen unter dem Kopf, häufiger aber verläuft er zugleich mit dem Adductor longus und brevis stark gespannt, mitunter sogar eingerissen über

demselben. Nach unten stützt sich der Kopf auf den oberen Theil des Adductor magnus. Der Trochanter major liegt mit seiner hinteren Fläche gerade in der Pfanne und hat die sich an ihm ansetzenden Glutäen ebenfalls stark nach innen gezogen. Die Kapsel ist vorn unten in wechselndem Umfang zerrissen. Ihre vordere obere Peripherie ist stets erhalten, spannt sich über den Schenkelhals hinüber und verhindert, dass der Kopf höher steigt, die Luxation also zu einer suprapubica würde. Dieser vordere obere Kapselumfang ist es auch, welcher in Gemeinschaft mit dem Lig. ileo-femorale die typische Stellung der Extremität erhält. Der hintere Umfang der Kapsel ist nicht gedehnt. Das Y-Band ist stark gespannt (Fig. 250). Sein innerer Schenkel rotirt den Femur nach aussen. Nur selten ist dieser innere Theil eingerissen. Dann nimmt natürlich die Auswärtsrollung ab. Bei der Lux. perinealis ist der Kapselriss im Allgemeinen ausgedehnter. Bei einer von *Bigelow* ausgeführten Section war dazu auch noch der äussere Schenkel des Y-Bandes abgerissen. Die Femoralgefässe verlaufen mit dem Nerv. cruralis vorn über dem Schenkelhals, indem zwischen ihnen und dem Knochen der Pectineus und Adductor brevis herziehen.

Fig. 250.



Die charakteristischen **Symptome** der **Luxatio obturatoria** sind mässige Flexion (ca. 35⁰), Abduction und Auswärtsrollung im Hüftgelenk und Verkürzung der Extremität (Taf. XXIII). Diese Stellungsanomalieen treten besonders bei Rückenlage der Patienten ein, nachdem man das Becken richtig gestellt hat. Dann ist das Bein abducirt, im Hüft- und Kniegelenk gebeugt, ruht dabei auf seinem äusseren Fussrand auf, schaut mit der Innenfläche des Knies nach vorn und ist messbar um




einige Centimeter verkürzt. Betrachtet man den stehenden Patienten, so gestalten sich die Verhältnisse etwas anders. Die Flexion ist dann wenig ausgesprochen, da der Patient seine Wirbelsäule lordotisch krümmt und das Becken nach vorn neigt. Gleichzeitig senkt er dasselbe aber auch und gleicht damit die Abduction aus, indem er beide Beine parallel zu stellen sucht. Dies hat dann eine scheinbare Verlängerung der Extremität zur Folge.

Eine solche Verlängerung der Extremität existirt aber in Wirklichkeit nicht. Man hat dieselbe allerdings vielfach angenommen, weil man sich vorstellte, dass auf dem Foramen obturatorium der Kopf tiefer stehen müsste als in seiner Pfanne. Genaue Messungen, von der Spina ilei ant. sup. zu dem tiefsten Punkt des Malleolus externus, aber haben ergeben, dass der Luxatio obturatoria keine Verlängerung, sondern im Gegentheil eine Verkürzung der Extremität zukommt. So fand *Malgaigne* eine Verkürzung von 7 Linien, *Treub* eine solche von 3 cm und *Lauenstein* gar eine solche von 5 Centimetern.

Auch die Auswärtsrollung kann der Patient maskiren, indem er die Fussspitze nach einwärts wendet. Wir haben dann das auf Tafel XXIII wiedergegebene Bild. Der Kranke stellt den Fuss nach vorn, berührt mit den Zehen den Boden, hat die Ferse etwas erhoben, das Knie gebeugt und das Hüftgelenk abducirt und nach aussen rotirt. Die Abduction und Beugung sind um so stärker ausgesprochen, je tiefer der Kopf steht.


Fig. 251.



Zu diesen augenfälligsten Erscheinungen kommen nun noch die Abflachung des Gesässes, das Fehlen des normalen Trochantervorsprunges, anstatt desselben die grubige Abflachung der Trochantergegend, eine Verbreiterung des Oberschenkels an seiner Wurzel und die Fixation des Gliedes in der falschen Stellung. Alle Bewegungen mit Ausnahme vielleicht einer geringen Abduction und Flexion sind aufgehoben. Der Kopf selbst macht eine

leichte Hervorwölbung der Weichtheile in der Gegend der Plica falciformis der Fascia lata und kann hier, wenn die Adductoren nicht zu stark entwickelt sind, erkannt werden. Oefters hat man allerdings nur das Gefühl des undeutlichen Rollens, wenn man Rotationsbewegungen mit dem Schenkel vornimmt. Jedenfalls ist der Kopf von dem Rectum aus deutlich abzutasten. Die Patienten vermögen oft unmittelbar nach der Verletzung grössere Strecken zu gehen, wahrscheinlich wohl deshalb, weil der Kopf auf dem Foramen ovale und an den erhaltenen oberen Kapselpartieen eine gute Stütze findet. Durch den Druck auf den Nerv. obturatorius und cruralis werden öfters heftige Schmerzen, mindestens aber Taubheit des Beines ausgelöst.

Fig. 252.



Die **Luxatio perinealis,** die bisher überhaupt nur 9mal beobachtet worden ist (*J. Riedinger* 1892) (Fig. 252), ist leicht zu erkennen. Das Bein steht ad maximum abducirt und, da so hochgradige Abduction wegen der Hemmung durch das Lig. ileo-femorale nur in Beugestellung möglich ist, ebenfalls ad maximum flectirt. Der Oberschenkel steht fast rechtwinklig zur Körperachse. Das spitzwinklig gebeugte Bein berührt mit der Aussenfläche den Boden. Aufrechtes Stehen auf beiden Beinen ist unmöglich, da eine solche hochgradige Stellungsanomalie vom Becken aus nicht corrigirt werden kann. Der Kopf ist deutlich zu fühlen. Er ragt hinter dem Scrotum oder unter den Adductoren

hervor. Der Druck auf den Bulb. urethrae verursacht zuweilen Retentio urinae.

Die Differentialdiagnose der Luxatio obturatoria von der Fractura colli femoris werden wir später besprechen.

Die **Prognose** nicht reponirter Luxationen auf das Foramen ovale ist keine so schlechte. Der Kopf bildet sich auf seiner Unterlage eine gute Nearthrose, und die Patienten vermögen nachher wieder ganz gut zu gehen. Durch die stete Belastung rückt der Kopf allmählich etwas höher, und es bekommt die Stellung des Gliedes dann Aehnlichkeit mit der bei der Luxatio suprapubica. Wir bilden einen solchen Fall nach *Busch* ab (Fig. 252). In demselben ist das Knie überstreckt, wohl um die gleiche Länge beider Beine zu erzielen. Im Uebrigen gilt dasselbe wie bei der Luxation auf das Schambein.

Zur **Therapie** empfehlen sich folgende Methoden der Reposition:

1. **Rationelle Methode Kochers**: Flexion bis zum rechten Winkel, Zug in dieser Stellung nach oben und starke Auswärtsrotation.


Die Flexion des Schenkels ist nöthig, um das Lig. ileofemorale zu entspannen. Ist aber das Bein rechtwinklig flectirt, so ist kein Theil der Kapsel gespannt. Da nun aber eine Spannung der hinteren Kapselabschnitte benützt werden soll, um die folgende Rotation um einen bestimmten Punkt ausführen zu können, so übt man einfach den Zug nach oben aus und versetzt dadurch die genannte Kapselpartie in die nothwendige Spannung. Dreht man nunmehr den Schenkel nach aussen und zwar möglichst stark, so zieht der sich drehende und sich dadurch verkürzende Kapseltheil nebst dem sich spannenden äusseren Schenkel des Y-Bandes den Kopf auf- und rückwärts in die Pfanne.

Bei der Luxatio perinealis kommt man ebenso zum Ziel, häufig aber auch schon dadurch, dass man einen einfachen Zug abwärts und einen starken Zug am obersten Theil des Oberschenkels nach aussen anwendet.

2. **Middeldorpf's „Methodus mochlica"** (Fig. 253): Beugung bis zum rechten Winkel, Adduction und Innenrotation. Die Beugung in der gegebenen Stellung des Gliedes erschlafft die Kapsel und das Y-Band und macht den Kopf an

seinem Stande frei. Damit nicht während derselben oder der folgenden Adduction der Kopf um die Pfanne herumgleitet und eine Luxatio ischiadica entsteht, wird während derselben die Extremität mit einem Handtuch zugleich nach oben gezogen. Die

Fig. 253.



Adduction bringt den Kopf an die Pfanne, die Innenrotation hebelt ihn in diese hinein.

Bezüglich der Complicationen und der veralteten Luxationen gilt das nämliche, wie für die hinteren Luxationen.

3. Luxationen nach unten, Luxationes infracotyloideae.

Die Luxationen direct nach unten unter die Pfanne sind sehr selten. Der Kapselriss liegt am unteren Pol der letzteren. Der Kopf ruht mit seiner oberen Convexität auf dem Tuber ischii, vorn und innen von den stark gespannten Adductoren, rückwärts von den ebenso gedehnten Kniebeugern gestützt. Ebenso sind der Ileopsoas und Pectineus und das Y-Band stark gespannt.


Die Luxation entsteht dadurch, dass das Bein eine forcirte Abduction, jedoch ohne jede Drehung, erfährt, zu-

weilen auch durch einen Stoss, welcher den gebeugten Schenkel direct nach unten treibt.

Auf dem Tuber ischii findet der Kopf nur wenig Stütze. Er geht daher gern in secundäre Stellungen über und zwar durch Abduction und Innenrotation in die der Lux. ischiadica, durch Adduction und Aussenrotation in die der Lux. obturatoria. Zuweilen entstand die Subcotyloidea auch, während eine Ischiadica oder Obturatoria eingerichtet werden sollte.

Die **Symptome** der regelmässigen Luxation, bei der das Y-Band erhalten ist, sind unverkennbar. (Fig. 254.) Das Bein ist im Hüftgelenk nicht ganz bis zum rechten Winkel flectirt, ebenso im Kniegelenk, so dass der Unterschenkel am Oberschenkel herabhängt. Dabei ist es leicht abducirt und nach aussen rotirt. Die Streckung ist unmöglich. Die übrigen Bewegungen sind wenig ergiebig, am freiesten noch die Rotationen. Es gelingt nicht immer, den Gelenkkopf an seiner falschen Stelle zu fühlen, da die gespannten, ihn deckenden Muskeln der Palpation hinderlich sind.

Fig. 254.



Bei den unregelmässigen, mit Zerreissung des Y-Bandes einhergehenden Luxationen ist die Stellung des Beines ganz atypisch. Bald ist es dann mehr gestreckt, bald einwärts, bald auswärts rotirt und abducirt.

Die **Prognose** ist günstig, da die Reposition leicht gelingt. Bei irreponirter unregelmässiger Luxation kann der Kopf unter der Pfanne einen Stützpunkt gewinnen und so das Gehen möglich sein.


Die **Therapie** bewirkt die Reposition in einfacher Weise durch einen Zug in der gegebenen, also flectirten und abducirten Richtung des Beines, dem man zum Schluss noch eine Auswärtsrotation zufügt.

4. Luxationen nach oben, Luxationes supracotyloideae.

Die Luxationen nach oben sind zwar auch selten, aber doch etwas häufiger als die nach unten. Wir verdanken *Blasius* eine eingehende Monographie dieser Verletzung auf Grund von 23 gesammelten Fällen.


Der Kopf steht entweder auf der Spina anterior inferior oder unter ihr oder zwischen ihr und dem vorderen oberen Darmbeinstachel (Fig. 255). Die Ursache am Lebenden ist wohl eine Flexion, Adduction und Auswärtsrollung. Sie ist daher als eine Varietät der Luxatio iliaca aufzufassen, nur dass jetzt die Schlussbewegung statt einer Innenrotation eine solche nach aussen war.

Fig. 255.



Der Kapselriss liegt in den hinteren Partien der Pfanne. Das *Bigelow*'sche Band verläuft vor dem abgewichenen Kopf und ist besonders in seinem äusseren Schenkel stark gespannt.

Die **Symptome** können bei oberflächlicher Betrachtung eine Luxatio ileo-pectinea vortäuschen. Eine sorgfältige Untersuchung wird jedoch vor einem solchen Irrthum schützen. Das Genauere ergiebt sich aus folgendem Befund (Taf. XXIV). Die Extremität steht gestreckt, adducirt, stark nach aussen gerollt, ist dabei verkürzt und lässt den Schenkelkopf unterhalb der Spina ilei anterior superior fühlen. Die Verkürzung erscheint wegen der Adduction des Schenkels noch grösser. Während die Adduction zuweilen wenig ausgesprochen ist, ist die Auswärtsrollung stets so hochgradig, dass die Fussspitze direct lateralwärts oder gar nach hinten gerichtet ist. Der Trochanter major ist je nach dem Grade der Auswärtsdrehung nach hinten oder



mehr seitlich gerückt, die Trochantergegend daher entweder eingesunken oder etwas prominirend. Die Schenkelachse erscheint lateralwärts dislocirt. Der obere innere Abschnitt des Oberschenkels erscheint daher convex nach aussen gebogen. Das Gesäss ist schlaff, breit und flach, seine Falte steht höher. An der Stelle, wo der Schenkel in die Inguinal- und Perinealgegend übergeht, findet man einige kleine, sehr deutliche Hautfalten. Die Beweglichkeit des Beines ist eine minimale, die Rotation nach innen ganz unausführbar, die Beugung in geringem Masse möglich.

Die **Prognose** ist günstig, da die Einrichtung leicht ist, veraltete Luxationen aber wegen der Stütze des Kopfes unter der Spina anterior superior eine gute Function des Beines erlauben.

Die **Therapie** besteht in der Reposition durch mässige Beugung und Adduction, Zug nach abwärts und Rotation nach innen.

Eine Unterart der Luxation nach oben bildet die von *Scriba* beschriebene Luxatio intrapelvica. In diesem Falle *Scriba*'s stand der durch die Bauchdecke deutlich fühlbare Kopf auf der Linea innominata, der Schenkelhals in der Fossa iliaca, der Trochanter major auf dem äusseren Theile des horizontalen Schambeinastes, auf der Spina ilei anterior inferior. Das Bein stand flectirt, adducirt und nach innen rotirt. Die durch Schlag einer Schaukel gegen die Brust entstandene Luxation wurde durch eine Hyperextension in eine Luxatio ileo-pectinea verwandelt und wie diese reponirt.


5. Die traumatischen Luxationen beider Hüftgelenke, die Doppelluxationen des Hüftgelenkes.

Im Jahre 1887 hat *Niehaus* die bisher beobachteten gleichzeitigen Luxationen beider Hüftgelenke zusammengestellt. Es waren deren damals 26. Mit einem eigenen Falle von *Niehaus* und zwei später veröffentlichten aus den Kliniken von *P. Bruns* und *Schönborn* hätten wir demnach jetzt über 29 Fälle zu gebieten. In diesen waren die beiden Luxationen 4 mal nach vorn (L. obturatoria) und 6 mal nach hinten (L. iliaca oder ischiadica), in den übrigen Fällen theils nach vorn, theils nach hinten erfolgt.

Die **Ursachen** der Doppelluxationen waren theils Verschüttungen, theils Stösse oder Schläge, welche den Rumpf gewaltsam nach vorn oder rückwärts drängten. Die Hüftgelenke wurden dabei in Hyperflexion oder Hyperextension gestellt und so das Austreten der Schenkelköpfe bewirkt, während vielleicht nebenbei noch die Gewalt dem Becken eine drehende Bewegung mittheilte.

Die **Symptome** waren in der Regel recht deutlich. Eine doppelseitige Luxation nach hinten erläutert die Fig. 256, in welcher neben den vorspringenden Trochanteren besonders die starke Lordose der Lendenwirbelsäule auffällt. Bei den doppelten Luxationen nach vorn springt besonders die starke Abduction der Beine in's Auge. In dem Falle *Ebner's* waren die Kniee 15 cm von einander entfernt.

Fig 256.



Die **Diagnose** wurde nicht immer sofort gestellt. Oefter wurde zunächst erst die eine Luxation eingerichtet und die zweite erst dadurch erkannt, dass die beiden Beine nicht parallel gelegt werden konnten. In dem Falle von *Niehaus* wurde bei sehr beträchtlicher Anschwellung am Becken anfangs eine doppelseitige Schenkelhalsfractur angenommen und erst später der Sachverhalt klargestellt.

Die **Prognose** ist eine relativ gute. In den bekannten 29 Fällen ist die Reduction mit nachfolgender Heilung 21 mal erfolgt. 4 Fälle blieben ungeheilt. Ein Patient starb infolge der vorgenommenen Resection der Schenkelköpfe, einer im Shoc (*Schönborn*).

Die **Reposition** ist auch bei beiden Luxationen nach einander in der von uns früher geschilderten Art und Weise vorzunehmen.

Brüche des Oberschenkels.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Betrachten wir das Oberschenkelbein, Femur, zunächst als Ganzes, so ist dasselbe ebenso wie der Humerus der Träger der Achsen seines oberen und unteren Gelenkes.

Der an seinem oberen Ende befindliche Gelenkkopf besteht aus einer rundlichen, nach innen, oben und unten und ein wenig nach vorne gerichteten Knochenmasse, die wir schon gelegentlich der Besprechung des Hüftgelenkes kennen gelernt haben. Er gliedert sich vom Oberschenkelschafte ab durch einen langen Hals, an dessen Basis sich die beiden Trochanteren befinden, Muskelhöcker, die hier viel stärker entwickelt sind als am Humerus. Die Achse des Halses ist in einem Winkel so an die Diaphyse angesetzt, dass der Trochanter major das obere Ende des Schaftes bildet. Dieser Schenkelhalswinkel sollte nach einer früher allgemein geltenden Ansicht beim Weibe kleiner sein als beim Mann, d. h. sich mehr einem Rechten nähern. Dies ist nun nicht der Fall. Nach neueren Untersuchungen von *Sharpey* ist der Winkel vielmehr beim Erwachsenen und beim Greis, beim Mann und beim Weib gleich und nur bei Kindern etwa um 2 Grade grösser. Im Allgemeinen beträgt er im Mittel 127°, mit Schwankungen von 115—140°. Nach überstandener Rhachitis wird er kleiner.

Der lange Schaft des Oberschenkelbeines hat oben einen mehr gerundeten, unten einen von vorne nach hinten breit gedrückten Querschnitt. Bei aufrechter Stellung convergiren beide Femora nach unten und stehen daher schief auf der unteren Fläche der Condylen, welche genau in die Horizontale zu liegen kommen.

Die Condylen selbst bilden ein breites Piedestal und sind von einander hinten durch eine tief eingreifende rauhe, vorne durch eine seichte geglättete Furche geschieden.

Bezüglich der Entwicklung des Femur müssen wir hervorheben, dass der Kopf aus einer besonderen Epiphyse hervorgeht, deren Fuge ziemlich genau dem Gelenkrand entlang läuft.

Die Trochanteren haben jeder einen besonderen Verknöcherungspunkt, die Condylen dagegen eine gemeinschaftliche Epiphyse, deren Fuge noch zwischen dem 18.—20. Lebensjahre besteht, und

vorn über die Patellarfurche, an den Seiten über die Epicondylen und hinten längs der Linea poplitea verläuft (Fig. 257).

Der Femur muss bei aufrechter Stellung des Menschen die ganze Schwere des Oberkörpers tragen. Nun wird die Widerstandsfähigkeit eines Knochens gesetzmässig dann bedeutend herabgesetzt, wenn derselbe eine Knickung seiner Achse erfahren hat. Dies ist aber beim Femur durch die winklige Abzweigung des Schenkelhalses der Fall. Hier wäre also der schwächste

Fig. 257.





Fig. 258.



Theil des Schenkelbeines, wenn die Natur nicht durch einen besonderen Bau des Schenkelhalses dafür gesorgt hätte, dass derselbe seine Aufgabe vollständig erfüllen kann.

Zunächst kommt hier in Betracht die etwas geschwungene Form des Schenkelhalses. Seine hintere Seite ist mehr convex als die vordere, die ausserdem etwas länger ist. Er hat ferner die Gestalt eines Keiles, dessen spitze Kante nach abwärts ge-

richtet ist. Betrachtet man ihn von oben, so erscheint er bedeutend schmäler als bei der Ansicht von vorn oder hinten. Er ist also gleichzeitig von vorn nach hinten etwas abgeplattet. Von seinem innern Umfange zieht eine stark vorspringende Leiste zum Trochanter minor.


Dort nun, wo er am meisten zu tragen hat, ist auch seine compacte Substanz am stärksten. Man nennt diese Stelle, welche dem innern untern Theil des Schenkelhalses entspricht, den *Adams*'schen Bogen. Derselbe stellt sich am Besten in einem Frontaldurchschnitt dar. Man sieht dann dass die Corticalis den obern Theil des Femur nicht überall mit gleicher Stärke umgiebt, dass sie vielmehr die grösste Mächtigkeit eben an jenem innern untern Halsumfang erreicht, dass sie sich dann allmählich verschmälert und schliesslich, den Kopf erreichend, diesen mit einer ganz dünnen Schicht überzieht (s. Fig. 272).

Weitere Kraft erhält der Schenkelhals dann noch dadurch, dass sich in der Höhe des Trochanter minor gegen die Mittellinie zu von der Oberfläche der Compacta eine ebensolche compacte Knochenschicht abhebt, etwa 1 cm tief in die Spongiosa eindringt und sich schliesslich unmittelbar unter dem Kopfe an der vorderen Fläche des Halses verliert. Dieses Gebilde nennt man entweder das *Bigelow*'sche Septum oder nach *Merkel*, der es später beschrieb, den Schenkelsporn (Fig. 258). Es dient dem darauf ruhenden Trochanter minor gewissermassen als Stütze und lässt die Spongiosa von sich in strahlenförmigen, einem Fächer vergleichbaren Zügen gegen die Aussen- und besonders gegen die Hinterseite des Trochanter major auslaufen.

Schliesslich ist die Festigkeit des Schenkelhalses ganz besonders abhängig vom Bau und der Anordnung seiner Spongiosa. Dem Mathematiker *Culmann*, dem Anatomen *v. Meyer* und den Chirurgen *Pacquard, J. Wolff, Heppner* und *Riedinger* verdanken wir eine klare Einsicht in dieses wunderbare Erzeugniss der Natur. Diese Autoren haben uns gezeigt, dass die Spongiosa stets derartig gestaltet ist, dass sie genau den Druck- und Zuglinien der Statik entspricht. Sie ist so gebaut, wie man nach mathematischer Berechnung einen „tragfähigen Knochen" herstellen würde. Im Einzelnen lassen sich, besonders auf dünneren Schliffen, die Knochenbälkchen in bestimmte Systeme auflösen, welche in regelmässig wiederkehrenden Linien, den *Pacquard-Meyer*'schen Linien, den Schenkelhals durchziehen

(Fig. 259). Das erste System beginnt in der Höhe des Trochanter major und zieht in parallelen Bögen durch den Schenkelhals zum innern und untern Abschnitte des Kopfes. Das zweite System entspringt an der gegenüberliegenden Seite in derselben Höhe und zieht derart gegen die Aussenseite zum Trochanter major, dass die sich kreuzenden Linien einen g o t h i s c h e n B o g e n umschliessen. Das dritte System geht vom Anfange des *Adams*'schen Bogens zum obern und innern Umfange des Kopfes, ist das dichteste und überträgt den Druck von Seite des Beckens sofort auf die Corticalis der Innenseite des Schenkelhalses. Andere Züge, die man aus der erläuternden Abbildung erkennt, sind wenig bedeutungsvoll. Die Plättchen des zweiten Systemes, die sich zuerst gegen den Trochanter major richteten, stellen sich nach *Riedinger* zuweilen schon ziemlich früh senkrecht und nehmen dann die entgegengesetzte Richtung ein, so dass sie nun in das dritte System übergehen.

Fig. 259.



Diese regelmässige Anordnung der Spongiosa wird nur hie und da von den sich in die Tiefe senkenden E r n ä h r u n g s- g e f ä s s e n des Halses unterbrochen. Der Schenkelkopf erhält sein Blut im jugendlichen Alter durch Gefässe, welche ihm durch das Lig. teres zugeführt werden. Im späteren Leben verschwinden diese Gefässe grösstentheils (*Langer*, *Senn*). Die Ernährung des Kopfes wird dann von der Schenkelhalsspongiosa aus besorgt.

Das Verhalten der H ü f t g e l e n k s k a p s e l haben wir schon früher besprochen. Hier sei nochmals hervorgehoben, dass sich die Kapsel v o r n a n d e r L i n e a i n t e r t r o c h a n t e r i c a ansetzt, dass sie dagegen h i n t e n n u r e t w a b i s z u r M i t t e d e s S c h e n k e l h a l s e s gelangt.

Frequenz u. Eintheilung der Oberschenkelbrüche.

Nach der Statistik von *P. Bruns* beträgt die Häufigkeit der Oberschenkelbrüche nur 6 %. Davon entfällt der 4. Theil auf den Schenkelhals. Dieser bricht besonders gern im höheren Alter. Im kindlichen Alter, namentlich im 1. Decennium, finden sich relativ häufig Brüche des Femurschaftes.

Wie am Humerus theilt man auch hier die Brüche ein in solche des oberen Endes, des Schaftes und des unteren Endes.

A. Fracturen am oberen Ende des Femur.

Die Brüche am oberen Ende des Femur umfassen

1. die Brüche des Kopfes,
2. die Brüche des Schenkelhalses,
3. die Brüche des Trochanter major,
4. die Brüche der Epiphysenlinie.

I. Fracturen des Femurkopfes.

Dupuytren behauptet dass der Schenkelkopf nach einem Fall auf die Füsse oder den Trochanter major gar nicht selten Compressionsfracturen erlitte, während die Verletzung als Contusion des Hüftgelenkes behandelt würde. Der Beweis für diese Behauptung ist nicht beigebracht worden, auch finden sich nirgends derartige Präparate. Den einzig sicheren Fall einer Schenkelkopffractur hat *Riedel* mitgetheilt. Ein 15jähriger Knabe war unter einen schweren Wagen gerathen. Das betreffende Bein ergab eine reelle Verkürzung von 5 cm. Es war flectirt und nach innen rotirt, stand also wie bei einer gewöhnlichen Luxatio iliaca. Bei passiven Bewegungen fehlte jedoch der federnde Widerstand, während undeutliche Crepitation zu fühlen war. Nach einer Incision auf die verletzte Stelle und Entfernung des Trochanter major zeigte sich, dass der Schenkelkopf und -hals der Länge nach in zwei Theile getheilt waren. Beide standen ausserhalb der Pfanne, deren hinterer oberer Theil eingedrückt war. *Riedel* glaubt, dass der Gelenkkopf zunächst auf den hinteren Pfannenrand geschoben, in dem Moment, in dem er auf diesem aufruhte, von einer zweiten Gewalt getroffen und nun durch den scharfen Pfannenrand in die zwei Theile zerschnitten wurde. Das obere äussere Fragment wurde

entfernt und der Rest des Kopfes in die Pfanne zurückgebracht. Die Heilung erfolgte mit vollständiger Ankylose des Gelenkes und 2 cm Verkürzung.

2. Fracturen des Schenkelhalses.

Frequenz, Aetiologie und anatomische Charaktere der Schenkelhalsbrüche.

Die Brüche des Schenkelhalses, Fracturae colli femoris, sind höchst seltene Erscheinungen bei Kindern und Erwachsenen. Sie werden erst häufiger nach dem 50. Jahr und betragen nach dem 70. über ein Drittel aller Fracturen. Diese Thatsache, dass ihre Häufigkeit mit dem Alter stetig zunimmt, derart, dass sie bei Greisen die absolut häufigsten Brüche werden, erklärt sich unschwer aus den Veränderungen, die der alternde Knochen erleidet. Wir haben gesehen, dass in der Blüthe des Lebens der Schenkelhals infolge seiner eigenthümlichen Gestaltung und seines anatomischen Baues wohl im Stande ist, die Last des Rumpfes zu tragen und äusseren Gewalten Widerstand zu leisten. Er vermag dies etwa bis in das 50. Lebensjahr hinein. Dann beginnt sich allmählig, wie am ganzen Skelett, so auch am Schenkelhals die senile Osteoporose, d. h. eine excentrische Atrophie der Knochensubstanz, geltend zu machen. Die Corticalis, besonders auch am *Adams*'schen Bogen wird dünner und dünner. Zahlreiche Spongiosa-Bälkchen werden resorbirt. So entstehen grössere Hohlräume, die sich mit gelbem Fettmark ausfüllen. Der *Merkel*'sche Sporn verschwindet zum grössten Theil. Der Schenkelhalswinkel nähert sich mehr einem rechten. Alle diejenigen Verhältnisse, welche früher die Widerstandsfähigkeit des Schenkelhalses bedingten, gehen somit verloren, und zwar bei Frauen eher als bei Männern; denn bei ersteren findet man die Brüche etwas häufiger als bei letzteren.

Es genügen nun oft auch nur ganz geringe Gewalten dazu, um Schenkelhalsbrüche herbeizuführen. So findet man als Ursache derselben angegeben nicht nur einen Fall auf die Füsse, die Kniee, das Gesäss oder einen Stoss oder Schlag gegen die äussere Hüftgegend, sondern sieht sie auch gar nicht so selten dadurch entstehen, dass die Patienten bei einem Fehltritt oder beim Stolpern sich gewaltsam aufrecht zu erhalten suchen.

Der Schenkelhals bricht vorzugsweise an zwei Stellen, einmal an seinem Uebergang in den Kopf, das andere

Mal an seiner Basis, seinem Trochanteransatz. Nach ihrem Verhältniss zur Hüftgelenkskapsel bezeichnet man die dem Kopf benachbarten Brüche in der Regel als intracapsuläre, die an der Basis gelegenen als extracapsuläre Fracturen. Daneben hat man dann noch die sogenannten gemischten Brüche, die vorn in der Regel intracapsulär, hinten dagegen extracapsulär verlaufen, da die Kapsel hinten ja nur etwa bis in die Mitte des Schenkelhalses reicht.

Die Erfahrung hat nun gelehrt, dass nach einem Fall auf den Fuss oder das Knie, also bei Einwirkung der Kraft in der Längsachse des Femur, meistens intracapsuläre Fracturen, also Fracturen in der Nähe des Schenkelkopfes entstehen, während extracapsuläre d. h. Fracturen der Trochantergegend sich finden, wenn die Gewalt von der Aussenseite des Trochanter her, also in der Längsachse des Schenkelhalses angriff.

Zahlreiche experimentelle Untersuchungen *(Heppner, Streubel, Riedinger, Rodet, Lardy, Mermillod)* haben uns in dieser Beziehung Aufklärung verschafft. Kräfte, die in verticaler Richtung, also vom Fuss oder dem Knie aus den Schenkel trafen, erzeugten schief verlaufende Brüche des Halses, nahe dem Kopf oder mehr gegen seine Mitte hin. Von der äusseren Trochanterfläche aus erhält man eingekeilte Fracturen des Halses an seiner Basis oder möglicherweise auch eingekeilte Brüche des anatomischen Halses mit starker Splitterung. Von vorn nach hinten wirkende Schläge erzeugten quere intracapsuläre Brüche. Durch forcirte Rotation des Oberschenkels erzielte schliesslich *Lardy* in einem Fall eine unvollständige eingekeilte Fractur.

Auch Fracturen durch Muskelzug bei Uebertreibung der physiologischen Hüftgelenksbewegungen, gelegentlich auch beim Heben schwerer Lasten, kommen hier vor. Im letzteren Fall kommen die Muskeln insofern in Betracht, als durch ihre Vermittlung der Druck der Last auf den Schenkelhals übertragen wird.

Besonders bemerkenswerth sind dann schliesslich noch die Rissfracturen des Schenkelhalses durch das Lig. Bertini, deren Kenntniss wir *Linhart* und *Riedinger* verdanken. Der Mechanismus dieser ist folgender: Beim Straucheln oder Ausgleiten wird der Rumpf plötzlich nach hinten übergeworfen, um das Hinfallen zu vermeiden. Hierbei wird durch starke Hyperextension im Hüftgelenk das Lig. ileo-femorale heftig angespannt und reisst

vermöge seiner grossen Stärke den Schenkelhals von seiner Basis ab. Diese Fracturen sind stets rein extracapsulär. Die vordere Bruchlinie ist sehr scharf, die hintere mehr zackig. Das Y-Band bleibt mit dem fracturirten Hals im Zusammenhang.


Wenden wir uns nun zu den pathologisch-anatomischen Charakteren der Schenkelhalsbrüche, so müssen wir zunächst erwähnen, dass hier gelegentlich **unvollständige Brüche, Infractionen**, vorkommen. Man kennt dieselben schon seit längerer Zeit *(Colles, Adams)*. In neuerer Zeit hat *Koenig* wieder auf sie aufmerksam gemacht.

Es handelt sich fast stets um rein intracapsuläre Verletzungen, nur zweimal fand man die Bruchlinie theils innerhalb, theils ausser-

Fig. 260.



Fig. 261.



halb des Gelenkes verlaufend. Bald ist die obere (Fig. 260), bald die untere (Fig. 261) oder hintere Wand des Schenkelhalses betroffen, während die gegenüberliegende Corticalis, in mehr oder weniger bedeutender Stärke unverletzt, die Continuität aufrecht erhält. Zuweilen ist gar keine Dislocation vorhanden; dann liegen die Ränder der queren Bruchspalte dicht an einander. In anderen Fällen ist dagegen der Schenkelkopf bald nach unten, bald nach hinten und oben umgebogen und die eingebrochene Wand des Halses in die Spongiosa des Kopfes eingekeilt. Diese Umbiegung setzt natürlich eine gewisse Nachgiebigkeit und Biegsamkeit der nicht gebrochenen Rindenpartie voraus, welche beide wiederum in der Rarefaction des Knochengewebes durch die excentrische Atrophie begründet sind. *(P. Bruns)*.


Die Infractionen entstehen durch schwache Gewalten, entweder schon durch das Körpergewicht allein oder durch Kräfte, die dadurch gemildert wurden, dass sie vorher schon andere Verletzungen erzeugten. So fand man neben den Infractionen gleichzeitig schon Fracturen des Trochanter major und des Oberschenkelschaftes.

An anatomischen Präparaten ist die Diagnose einer Infraction nur mit Vorsicht zu stellen, da geheilte vollständige, aber eingekeilte Brüche ein ähnliches Bild bieten können.

Die **vollständigen** Schenkelhalsbrüche theilt man, wie bereits erwähnt, ein in intracapsuläre, extracapsuläre und gemischte. Dabei ist noch hervorzuheben, dass alle diese Brüche mit Einkeilung einhergehen können, ja man spricht auch wohl geradezu von losen Schenkelhalsbrüchen im Gegensatze zu eingekeilten.

Man hat sich vielfach über die relative Häufigkeit der intra- und extracapsulären Fracturen gestritten und hat dann nach *Malgaigne* meistens die ersteren für häufiger angesehen. Dem scheint jedoch in Wirklichkeit nicht so zu sein. Nach der neuesten Zusammenstellung *Senn's* ist das Verhältniss vielmehr annähernd gleich, indem auf 313 Fälle 156 intracapsuläre und 157 extracapsuläre Brüche kamen. Dabei ist allerdings hervorzuheben, dass nach *Senn's* Erfahrungen rein extracapsuläre Brüche grosse Seltenheiten sind, dass vielmehr die sogenannten extracapsulären Brüche in der Regel gemischte sind.

Fig. 262.



Gehen wir nun etwas näher auf die einzelnen Bruchformen ein, so erwähnen wir zunächst, dass gelegentlich subperiostale Brüche vorkommen. Ebenso kann die Kapsel des Hüftgelenkes intact sein.

In der Regel sind allerdings beide, wenn auch öfters nur theilweise, eingerissen.

Die **intracapsuläre** Fractur hat häufiger eine schräge als quere Richtung. Sie verläuft am Saume des Kopfes da, wo der Hals am dünnsten ist (Fig. 262). Zuweilen ist auch ein Theil des

Kopfes mit in den Bruch inbegriffen. Die Bruchenden sind gewöhnlich kurzzahnig, selten gesplittert. Sie liegen entweder lose nebeneinander oder sind in einander eingekeilt. Im ersteren Falle ist keine Dislocation vorhanden, wenn die Kapsel intact ist. Ist diese verletzt, so steigt durch die elastische Retraction der am Trochanter major inserirenden Muskeln die Trochanterpartie des Halses in die Höhe. Der Trochanter major nähert sich dem Darmbeinkamme und wird am weiteren Hinaufrücken erst gehindert, wenn die unverletzten Kapseltheile einen Widerstand setzen oder

Fig. 263.





Fig. 264.




der Trochanter minor sich gegen das obere Bruchende anstemmt. Die Einkeilung erfolgt meist so, dass der untere und besonders der hintere Theil der Corticalis des peripheren Fragmentes in die Spongiosa des Kopfes eindringt. Beide Fragmente brauchen dabei nicht wesentlich aus ihrer ursprünglichen Lage verschoben zu sein (Fig. 263, 264 und 265). In der Regel ist aber doch der Kopf nach innen gewälzt und gleichzeitig oft so stark nach rückwärts geneigt, dass er sogar die Linea intertrochanterica posterior berühren kann (Fig. 266). An der vorderen Bruchlinie greifen dann die Zacken der Fragmente fest in einander. Hier und da treibt sich der untere Theil des Schenkel-

halses in die spongiöse Substanz des Kopfes in der Weise ein, dass der obere Theil auf der Gelenkfläche reitet (Fig. 267).

Fig. 265.



Fig. 266.




Bei Kindern und jugendlichen Individuen stellt sich die intracapsuläre Fractur mitunter als eine Lösung der Kopf und Hals verbindenden Epiphyse dar.

Fig. 267.



Fig. 268.



Die **extracapsuläre** Fractur hat in der Richtung ihrer Bruchlinie eine auffallende Gleichförmigkeit. Der Bruch durchsetzt

nämlich fast ohne Ausnahme den Trochanter major nahezu in seiner Mitte, indem er von dessen Spitze — entlang der Linea intertrochanterica — schief nach unten und vorne zieht und dort nahe

Fig. 269.





Fig. 270.



am Trochanter minor oder direct unter der Basis dieses Fortsatzes endigt (Fig. 268). Der Bruch ist dabei selten ein einfacher, indem in der Regel oberhalb des Trochanter minor noch eine zweite

Fig. 271.





Fig. 272.




Bruchlinie den Trochanter major in horizontaler Richtung durchdringt. In anderen Fällen ist der Trochanter major auch in mehrere Stücke gesplittert (Fig. 269), und es kann sich die Split-

terung ebenso, wenn auch sehr selten auf den Schenkelhals erstrecken. Am häufigsten bricht der hintere, von der Linea intertrochanterica posterior begrenzte Theil des Trochanter major und zwar in Gestalt eines länglichen Viereckes ab. Dieses Viereck hat verschiedene Länge, je nachdem der Trochanter minor mit gebrochen ist oder nicht. Nach *Riedinger* ist das Erstere die Regel. Der Trochanter minor kann aber auch ein eigenes Bruchstück bilden *(Linhart)*.

In der überaus grossen Mehrzahl der Fälle geht nun die extracapsuläre Fractur einher mit einer Einkeilung der Fragmente. Diese Einkeilung ist entweder nur eine unvollständige in der Art, dass sich nur eine Seite — gewöhnlich die hintere oder untere — des Schenkelhalses in die gegenüberliegenden Theile des Trochanter eintreibt (Fig. 270), oder viel öfter eine vollständige. Das Verhalten beider Fragmente ist dann derart, dass das Epiphysenfragment mit dem Schenkelhals tief in der Spongiosa der Trochanterpartie steckt (Fig. 271). Auch hierbei hat sich dann, wie dies besonders schön an Durchschnitten zu erkennen ist, das spitze Bruchende des Adams'schen Schenkelbogens und nach ihm der hintere Bruchrand am tiefsten in das zertrümmerte Gewebe eingegraben (Fig. 272). Dadurch aber wird wieder der Trochanter major nach hinten gewendet, dem Schenkelkopf genähert und der Schenkelschaft nach aussen gedreht.

Fig. 273.



In einigen Ausnahmefällen findet sich der Schaft des Femur nach vorn gewendet, so dass dann der Hals vorn kürzer geworden ist als hinten.

Der Schenkelhalswinkel wird selbstverständlich durch die beschriebene häufigste Art der Einkeilung verändert. Meistentheils steht der Hals nach der Fractur annähernd im rechten Winkel zum Schafte (Fig. 271). Es kommen aber auch Fälle vor, in denen der Schenkelhalswinkel vergrössert ist, indem der Kopf sich mehr aufrichtet. (Fig. 273).

Ist keine Einkeilung vorhanden, so stellt sich stets eine grössere Dislocation ein. Da die Kapsel des Hüftgelenkes

ja jetzt kein Hinderniss entgegensetzt, kann die elastische Retraction der am unteren Fragment inserirenden Muskeln voll zur Geltung kommen. Die Muskelaction tritt aber insofern in die Erscheinung, als die Glutäen und die combinirte Wirkung des Rectus femoris auf der Vorderseite und des Biceps, Semitendinosus und Semimembranosus auf der hinteren Seite den Oberschenkel nach oben und hinten an dem Schenkelhalsfragment vorbei in die Höhe ziehen.


Gleichzeitig wird dann noch die Schwere des Gliedes das untere Fragment in nachher noch näher zu erörternder Weise nach aussen zu drehen bestrebt sein (Tafel XXV).

Symptome der Schenkelhalsbrüche.

Wegen der Kürze des Schenkelhalses und seiner durch starke Weichtheile gedeckten Lage ist es am Lebenden unmöglich, den Sitz der Schenkelhalsbrüche ganz genau zu localisiren. Immerhin besitzen wir eine Reihe werthvoller Zeichen, welche die Diagnose annähernd sicher stellen lassen. Für die Praxis ist es dabei am wichtigsten, zu unterscheiden, ob die Fractur eine lose oder eingekeilte ist.

Die Symptome selbst sind, wie bei allen Fracturen, so auch hier, subjective und objective. Von den subjectiven haben wir zu nennen den Schmerz und die Störung im Gebrauch des Beines. Schmerzen sind bei Schenkelhalsbrüchen immer vorhanden. Sie sind im allgemeinen gering bei ruhiger Lage, treten dagegen mit grosser Heftigkeit ein bei activen und passiven Bewegungen des Beines. Sitzt die Verletzung nahe am Kopf, so werden die Schmerzen mehr in die Leistengegend verlegt, sitzt sie an der Schenkelhalsbasis, so finden sie sich mehr in der äusseren Hüftgegend und im oberen Theil des Schenkels und werden dann besonders durch Beuge- und Streckversuche lebhaft gesteigert. Die Gebrauchsstörung des Beines hängt, ausser von der individuellen Schmerzempfindlichkeit des Patienten, von der Art der stattgehabten Dislocation ab. Bei losen Fracturen können die Kranken die verletzte Extremität gar nicht bewegen oder sie wenigstens nicht in gestreckter Stellung von der Unterlage erheben. Bei intracapsulären Fracturen helfen sich die Patienten, wenn sie aufgefordert werden, ihr Bein zu erheben, zuweilen in der Weise, dass sie mit dem Hüftgelenk zugleich auch das Kniegelenk beugen und die Ferse, ohne sie zu erheben, auf

Taf. 25.



der Unterlage hingleitend, gegen die Hüfte hinziehen. Bei extracapsulären Brüchen sind solche Versuche in der Regel so schmerzhaft, dass sie lieber unterlassen werden. Sind die Fracturen eingekeilt, so ist selbst eine grössere Beweglichkeit des Beines nicht ausgeschlossen, indem dann die Patienten nicht nur das Bein erheben, sondern öfter sogar auf demselben stehen oder einige Schritte gehen können; namentlich bei eingekeilten extracapsulären Fracturen ist dies letztere der Fall.

Von den objectiven Symptomen (Tafel XXV) erkennt man durch die Besichtigung des Kranken zunächst eine durch Schwellung bedingte veränderte Gestalt der Hüfte. Die Leistenfalte ist entsprechend dem Sitz der Fractur verstrichen — bei Druck auf das Trigonum inguinale fühlt man auch wohl in der Tiefe eine winklige Knickung des Schenkelhalses. Ebenso ist die Gesässfalte weniger deutlich ausgeprägt als an der gesunden Seite. Im allgemeinen ist entsprechend der stärkeren Substanzzerstörung die Schwellung bedeutender bei den Fracturen an der Basis des Schenkelhalses. Hatten stärkere Blutergüsse stattgefunden, so erscheinen dieselben als Sugillationen um so früher und constanter an der Oberfläche, je näher die Fractur dem Schenkelschafte sitzt. Bei extracapsulären Fracturen finden sie sich besonders in der Trochanterengegend und erstrecken sich auch wohl weithin über den Oberschenkel. Bei intracapsulären Fracturen erscheinen sie nach einigen Tagen in der Leistengegend unterhalb des Lig. Pouparti.

Hat man die ebengenannten Zeichen berücksichtigt, so fällt weiterhin sofort die Auswärtsrollung des Beines auf. Die untere Extremität liegt schon in der Norm ein wenig nach aussen rotirt, eine Folge der leicht nach vorwärts gerichteten Stellung des Schenkelhalses. Diese schon normal vorhandene Auswärtsrollung des Beines wird nun nach der Schenkelhalsfractur vermehrt werden, bei eingekeilten Fracturen dadurch, dass sich vorzüglich die hinteren Abschnitte der Bruchflächen in einander eintreiben, wodurch natürlich der Schenkelschaft nach aussen herumgedreht werden muss, bei losen Brüchen aber durch die Eigenschwere des Gliedes. Zieht man die Achse der unteren Extremität, so geht dieselbe von der Spina anterior superior nach der Spitze der grossen Zehe. Der nach aussen von dieser Achse liegende Theil des Gliedes ist bedeutend schwerer als der nach innen liegende. Es ist daher selbstverständlich, dass sich das Glied nach aussen umlegt, wenn sein normaler Halt, der Schenkelhals, gebrochen ist. Der Grad der

Aussenrotation ist ein verschiedener. Bei eingekeilten Brüchen hängt er ab von dem Grade der Einkeilung der hinteren Bruchflächen, bei losen Brüchen liegt das Bein gewöhnlich auf seiner äusseren Seite mit leicht gebeugtem Hüft- und Kniegelenk, so dass die Ferse der kranken Extremität den Zwischenraum zwischen der Achillessehne und dem inneren Knöchel des gesunden Beines berührt. In solchem Falle gelingt es leicht, die Aussenrotation zu corrigiren, während dieses schwierig ist und auch gar nicht versucht werden soll bei eingekeilten Brüchen.


In sehr seltenen Fällen besteht keine Aussen-, sondern eine Innenrotation des Schenkels, nämlich dann, wenn, wie wir vorher schon angeführt, die Dislocation der Bruchenden in der Weise statthatte, dass sich die vordere Wand des Halses so in die Trochanterspongiosa einbohrte, dass das Trochanterfragment vor dem Halsfragment steht. Die Innenrotation ist dann schwer und nur durch gewaltsame Lösung der Einkeilung zu beseitigen. Gelegentlich erhält man eine Innenrotation des Beines wohl dadurch, dass, nach ursprünglich bestandener Aussenrotation, die Kranken selbst oder Hilfeleistende das Bein nach innen umgelegt hatten. Man kann dann natürlich leicht das Bein wieder nach aussen drehen.

Nächst der Aussenrotation ist das wesentlichste Zeichen des Schenkelhalsbruches die Verkürzung des Beines. Dieselbe hängt ab von der Abnahme des Schenkelhalswinkels, der sich ja mehr einem Rechten nähert, von der Einkeilung der Fragmente oder von ihrer Längsverschiebung aneinander. Bei einer Einkeilung kann sie nur so viel betragen als Schenkelhalssubstanz in die Spongiosa des Kopfes oder Trochanters eingedrungen ist, selten also mehr als etwa 2 Centimeter. Bei losen Fracturen kann sie dem gegenüber bedeutend zunehmen. Bei intracapsulären Fracturen wird allerdings die unverletzte Kapselpartie der Längsverschiebung bald einen Widerstand leisten, oder der Trochanter minor wird an das obere Fragment anstossen. Die Verkürzung wird also auch dann eine mässige bleiben und nicht leicht über 3 Centimeter hinausgehen. Erst wenn im Laufe der Zeit die Kapsel sehr nachgiebig wird, kann auch bei solchen intracapsulären Fracturen die Verkürzung noch etwas bedeutendere Werthe erreichen (*Bardeleben*). Bei losen extracapsulären Brüchen, bei denen, wie wir gesehen haben, das untere Fragment an dem Schenkelhals vorbei in die Höhe steigt, wird die Verkürzung natürlich am stärksten ausgeprägt sein. Die Längendifferenz beider Beine

kann dann bis zu 8 oder 10 Centimeter betragen. Eine allmählige Zunahme der Verkürzung kommt hier nicht vor, dagegen öfter eine plötzliche, wenn nämlich eine bestehende Einkeilung gelöst wird und der Schenkel dann plötzlich der Muskelwirkung anheimfällt.

Die Messung der Verkürzung ist nicht immer leicht. Am besten geschieht sie nach *Wight* in der Weise, dass man zunächst die beiden Spinae ilei ant. sup. in eine horizontale Ebene, die Beine aber parallel oder in gleich starke Abduction einstellt und dann die Entfernung folgender Punkte auf beiden Seiten vergleicht: 1) Die Entfernung der Spina ant. sup. von dem unteren Rand des innern, 2) von dem untern Rand des äussern Knöchels, 3) Die Entfernung von der Spitze des Trochanter major bis zum unteren Rande des äusseren Knöchels. 4) Die Entfernung des caput tibiae von dem unteren Rande des Malleolus internus. 5) Kann man dann noch von der Spina ilei ant. sup. nach hinten eine transversale Linie ziehen und den Abstand der Trochanterenspitze von dieser Linie auf beiden Seiten messen. (*Bryant.*) (Fig. 274.)

Fig. 274.




Hand in Hand mit der Verkürzung des Gliedes geht eine Entspannung der vom Becken an den Oberschenkel ziehenden Muskeln. Namentlich der Tensor fasciae latae und die Glutaeen werden erschlafft werden, da ja ihre Ursprungs- und Ansatzstellen jetzt einander genähert sind. Dadurch wird aber eine für die Schenkelhalsbrüche pathognomonische Erscheinung hervorgerufen. Untersucht man nämlich das Spatium zwischen Trochanter und Crista ilei, so findet man an der gesunden Extremität an dieser Stelle eine beträchtliche Resistenz, die durch die Spannung des Tensor fasciae latae und Glutaeus medius hervorgebracht wird, am gebrochenen Gliede jedoch durch Aufhebung

dieser Spannung eine tiefe Einsenkung. (*Allis*, *Bezzi*). (Fig. 275.)

Man ist mit diesen letzteren Maasnahmen bereits zur Palpation übergegangen. Dieselbe kann weiterhin bei nicht eingekeilten Fracturen zuweilen Crepitation und stets abnorme Beweglichkeit nachweisen. Crepitation wird man fühlen, wenn man am extendirten Glied Rotationsbewegungen vornimmt oder hinter dem Trochanter einen Druck ausübt. Ist man irgendwie zweifelhaft, ob die Fractur eine lose oder eingekeilte ist, so soll man unter keinen Umständen forcirt auf Crepitation untersuchen, da man sonst eine bestehende Einkeilung lösen und damit dem Patienten einen grossen Schaden zufügen kann; denn die Einkeilung ist sehr werthvoll für die Heilung. Fehlt sie, so pflegt stärkere und leichter wahrzunehmende Crepitation bei extracapsulärem Bruch vorhanden zu sein.


Fig. 275.



Die abnorme Beweglichkeit prüft man gewöhnlich, indem man mit dem Gliede rotirende Bewegungen vornehmen lässt, während man selbst die Hand auf die Trochantergegend auflegt. Man fühlt dann, dass der Trochanter major sich um einen kleineren Radius dreht als auf der gesunden Seite. Das ist bei eingekeilten Brüchen die natürliche Folge der Verkürzung des Schenkelhalses, Bei losen Brüchen wird dies Zeichen um so auffallender, je näher die Fractur dem Trochanter sitzt. Bei vollständig extracapsulären Brüchen dreht sich schliesslich der Trochanter um die Längsachse des Oberschenkels. Es gehört schon etwas Uebung dazu, um dies Symptom sich deutlich zu machen, das übrigens aus dem beistehenden Schema erhellt. (Fig. 276.)

Der Trochanter major selbst ist in Fällen extracapsulärer Fractur mit Einkeilung oder Splitterung etwas verbreitert. Stets ist er nach oben und rückwärts dislocirt und zwar im Verhältniss der stattgehabten Verkürzung und Aussenrotation. Bei stärkerer Verkürzung des Beines steht er hinten einige Centimeter über der *Roser-Nélaton*'schen Linie. Dies kann allerdings

Fig. 276.



nur geschehen, wenn der Trochanter minor mit abgebrochen ist. Derartige Fälle haben, wenn dann die Extremität zufällig nach innen rotirt liegt, grosse Aehnlichkeit mit einer Luxatio iliaca. *Malgaigne* kam in einem Falle erst von seinem Irrthume zurück, als die Repositionsversuche Crepitation ergaben.

Bei vorhandener Einkeilung intracapsulärer Fracturen springt der Trochanter weniger hervor, ebenso, wenn sich beide Fragmente an einander verschoben haben.

Diagnose der Schenkelhalsbrüche.

Wenn die eben angeführten Symptome alle deutlich vorhanden sind, so ist die Diagnose eines Schenkelhalsbruches unschwer zu stellen. Man wird dann auch leicht feststellen können, ob die Fractur näher dem Kopf oder näher dem Trochanter gelegen, ob sie lose oder eingekeilt ist. Die Zeichen können aber verwischt sein. So kann das Hüftgelenk stark geschwollen, die Verkürzung und Auswärtsrotation nur gering und die Function des Gliedes theilweise erhalten sein. Aber auch dann lässt sich die Fractur annähernd sicher erkennen, wenn man nur einen systematischen Gang der Untersuchung einhält und die Symptome so aufzufinden bestrebt ist, wie wir sie der Reihe nach geschildert haben. Im Allgemeinen ist es nicht zweckmässig, die Chloroformnarcose zu Hilfe zu nehmen. Man könnte in derselben zu leicht eine bestehende Einkeilung lösen, und gerade der starre Widerstand, den eingekeilte Brüche jedem Bewegungsversuch entgegensetzen, hilft am leichtesten zur Erkenntniss derselben. Ausserdem sprechen für

eine bestehende Einkeilung geringere Verkürzung und Aussenrotation des Beines, heftige Schmerzen an der Bruchstelle, stärkere Verbreiterung des Trochanter, beträchtliche Geschwulst und Sugillation um denselben, die Möglichkeit, das ausgestreckte Bein etwas zu erheben, und schliesslich die Aetiologie des Falles, indem ja die nach dem Fall auf den Trochanter entstehenden Fracturen meistentheils eingekeilte extracapsuläre sind.

Die genauere Betrachtung der Symptome, namentlich das Zusammenfassen des ganzen Symptomenkomplexes wird in einem vorliegenden Falle meist auch wohl die Entscheidung gestatten, an welcher Stelle des Halses die Fractur sitzt. Im übrigen haben wir die Unterscheidungsmerkmale in den folgenden Tabellen zusammengestellt. Aus denselben erhellt auch die Differentialdiagnose gegenüber den anderen Hüftgelenks- und Beckenverletzungen. Vorzüglich wird es sich um die Ausschliessung von halbseitigen Beckenbrüchen, von Luxationen des Oberschenkels nach vorn, und in den seltenen Fällen mit Innenrotation des Beines auch um Ausschliessung der Luxatio iliaca handeln.

Schwierig ist oft die differentielle Diagnose von einer Contusion des Hüftgelenkes. Auch bei dieser ist der Patient unfähig, das Glied zu brauchen. Ausserdem kann durch eine Beckenhebung auf der kranken Seite eine Verkürzung vorgetäuscht werden und das seinem Gewicht folgende Bein leicht gebeugt und nach aussen rotirt liegen. Wenn dann noch heftige Schmerzen die Untersuchung erschweren, so könnte man wohl einen Zweifel hegen, wird aber dann sicher gehen, wenn man einem Ausspruche *Hodyson*'s folgt. „Wenn ein älteres Individuum infolge eines Falles auf die Hüfte unfähig ist, das betreffende Bein zu gebrauchen, so ist es höchst wahrscheinlich, dass ein Schenkelhalsbruch besteht; dies um so mehr, wenn bei dem Falle keine besonders grosse Gewalt eingewirkt hat, wie sie nothwendig wäre, um eine Quetschung von solchem Grade herbeizuführen, dass der Schenkel dadurch unbrauchbar würde“. Zudem vermindern sich bei der Contusion allmählig alle Functionsstörungen und Beschwerden, während sie bei der Fractur eher zunehmen.

Man unterlasse nie, bei einem Schenkelhalsbruch zu untersuchen, ob nicht noch gleichzeitig ein Bruch des Schenkelschaftes besteht.


Bei den unvollständigen Schenkelhalsbrüchen steht das Bein in seiner natürlichen Stellung oder leicht nach aussen

rotirt und ist etwas verkürzt. Man wird wohl kaum die Diagnose ganz sicher stellen können. In der Regel wird die Verletzung als Contusion des Hüftgelenkes angesehen werden.

Prognose der Schenkelhalsbrüche.

Die Schenkelhalsbrüche sind keineswegs ungefährliche Verletzungen. Es kann zunächst, wenn auch selten, zu acuten Vereiterungen des Gelenkes kommen, die in Anbetracht des Alters der Patienten niemals zu unterschätzen sind. Plötzlicher Tod kurze Zeit nach der Verletzung kann eintreten infolge einer Fettembolie *(Koenig)*, indem das fettreiche Mark der Bruchstelle in die offenen Gefässlumina der Umgebung hineingepresst wird. Weitere Gefahren drohen dann dem Patienten durch die länger dauernde ruhige Bettlage. Einmal verschlimmern sich durch diese die bei alten Leuten häufigen chronischen Lungenaffectionen, so dass die Kranken an hypostatischer Pneumonie zu Grunde gehen, und zweitens entwickelt sich bei ihnen leicht Decubitus, welcher wiederum verhängnissvoll werden kann.

Fig 277.




Ueberleben die Patienten das Krankenlager, so ist die Heilung des Knochenbruches verschieden bei intra- und extracapsulären Fracturen.

Bei intracapsulären Fracturen bildet sich selten ein knöcherner Callus. *Senn* hat nur 54 wohlbeglaubigte derartige Fälle zusammenstellen können. Bei solcher knöchernern Consolidation findet man dann fast ohne Ausnahme den ganzen Schenkelhals geschwunden und den Kopf unmittelbar auf der Trochanterengegend aufsitzend (Fig. 277). Von einem Callus an der Oberfläche des Schenkelhalses ist dabei nur äusserst wenig zu bemerken. Den grössten Antheil zu einer derartigen knöchernen Heilung stellen wohl unvollkommene Brüche und solche mit Einkeilung. Zu ihrer Erzielung bei losen Brüchen ist unbedingtes Erforderniss eine Behandlungsweise, welche die beiden Fragmente in exactestem Contact hält.

In der Mehrzahl der Fälle heilt die intracapsuläre Fractur nur durch eine Pseudarthrose, indem ein mehr oder weniger straffes oder schlaffes Gewebe die grösstentheils sehr erheblich atrophirten Bruchenden mit einander verbindet. Gelegentlich formen sich auch wohl die Fragmente durch die später erfolgenden Bewegungen so gegen einander, dass das eine Bruchende zu einer Art Pfanne wird, das andere aber sich kopfförmig abrundet (Fig. 278). Das Kopffragment wird auch zuweilen ganz resorbirt, während sich das untere zu einer neuen Gelenkfläche abschleift.

Die Tragfähigkeit des Schenkelhalses wird durch die Pseudarthrosenbildung natürlich bedeutend herabgesetzt, und die Patienten vermögen sich später nur an Krücken oder Stöcken fortzubewegen. Gelegentlich wird die Function des Beines dadurch ermöglicht, dass das untere Fragment an der Hüftgelenkskapsel beim Gehen einen Widerstand findet und dass das Gewicht des Körpers von dem hypertrophirenden äusseren Schenkel des Y-Bandes und der Sehne des Obturator externus getragen wird.

Fig. 278.




Die ausbleibende Verknöcherung intracapsulärer Fracturen ist verschiedenen Umständen zuzuschreiben. Einmal ist es bei der Unzugänglichkeit der Bruchstelle sehr oft unmöglich, die zur Callusbildung nothwendige dauernde Berührung der beiden Fragmente zu erzielen. Weiterhin wird aber der abgebrochene Kopf sehr schlechten Ernährungsbedingungen unterworfen sein. Der Schenkelhals ist unter dem Einflusse der senilen Atrophie schon an und für sich schlecht mit Blut versorgt, dann aber erleidet der Kopf durch den Bruch noch direct eine Einbusse seiner blutzuführenden Bahnen. Die Gefässe, die durch das Lig. teres in ihn hineintreten können, sind kaum nennenswerth. Die Arteria nutritia colli aber, die in der Mitte des Halses eintritt, wird durch eine näher am Kopf liegende Fractur ausgeschaltet. Auch die aus dem umgestülpten Blatte der Kapsel in den Hals gelangenden kleinen Gefässe werden meist zerrissen und so die Blutzufuhr zum Kopf fast ganz abgeschnitten. Dazu kommt dann noch schliesslich der Mangel eines eigent-

lichen Periostes an dieser Stelle. Es sind also Gründe genug für die mangelnde Knochenneubildung vorhanden. Wahrscheinlich beruht wohl auch die Atrophie der Bruchenden, das Schwinden der Knochensubstanz auf dieser schlechten Ernährung des Gewebes.

Ganz anders gestalten sich die Verhältnisse bei den extracapsulären Fracturen. Dieselben gehen ja meist mit Einkeilung einher, und diese vermittelt die beste dauernde Adaption der Bruchenden. Auch wenn sich die beiden Fragmente an einander verschoben haben, pflegt hier die Callusbildung nicht zu leiden, ja sie ist zuweilen so bedeutend, dass durch die unförmlichen Massen die Bewegung des Hüftgelenks sehr gehindert wird. Ein Bild der gewöhnlichen ringförmigen Exostosenbildung nach eingekeilten Fracturen giebt die beistehende Figur 279.

Fig. 279.



Die vollständige Heilung des Bruches erfordert lange Zeit, 2—6 Monate. Dann stellt sich aber im Laufe der Zeit die Architectur der Spongiosa oft so vollständig wieder her, dass die Bälkchen wieder vollkommen den durch die Zug- und Druckkräfte an sie gestellten Anforderungen entsprechen *(J. Wolff)*.

Mit der Heilung der Fractur ist aber die Erwerbsfähigkeit des Patienten noch keineswegs hergestellt. Ein Teil der Patienten bleibt in Folge der allgemeinen Atrophie und der Verkürzung der Extremität, ein anderer in Folge der Pseudarthrosenbildung, wieder ein anderer in Folge von Steifigkeit im Hüft- oder Kniegelenk, die Mehrzahl dabei noch in Folge der bisweilen recht hochgradigen Verkürzung der Extremität arbeitsunfähig.

Nach *Haenel* gelangten von 19 Fällen nur 2 = 12 % zu völliger Heilung; dauernd geschädigt um durchschnittlich 56 %, blieben 13 = 77 %. Die mittlere Dauer der gänzlichen Erwerbsunfähigkeit betrug 8 Monate.

Eine Arthritis deformans entwickelt sich nicht so häufig nach Schenkelhalsbrüchen *(v. Volkmann, P. Bruns)*, als man dies bisher angenommen zu haben scheint.


Interessant sind einige Befunde, die *Arbuthnot Lane* gelegentlich machte. Er fand nämlich unter einer grossen Zahl Hüftgelenken, die er an den Leichen untersuchte, viele Schenkelhalsbrüche und von diesen wiederum 3, einen intra- und zwei extracapsuläre Brüche, bei welchen sich zwischen dem Schenkelschaft und dem Darmbein, dicht unter der Spina ilei ant. sup., durch vom Schenkelschafte aufsteigende Callusmassen ein vollständig neues Gelenk ausgebildet hatte.

Therapie der Schenkelhalsbrüche.

Die Behandlung der Schenkelhalsbrüche hat zwei Hauptaufgaben zu erfüllen, die Sorge für das Allgemeinbefinden des Patienten und die Sorge für Heilung der Knochen in richtiger Stellung.

Was die erste Indication betrifft, so gilt es vor allen Dingen, Decubitus und Lungenhypostasen zu vermeiden. Die Patienten werden desshalb von vornherein auf den *v. Volkmann-Hamilton*'schen Heberahmen (Fig. 144), oder auf das *Messner*'sche drehbare Bett, oder auch einfach auf eine gute Rosshaarmatratze gelagert. Mageren und schwachen Individuen giebt man sofort ein Wasser-

Fig. 280.



kissen und sorgt wie bei den Wirbelfracturen für grösste Reinlichkeit, besonders nach der Defäcation. Man lässt die Patienten weiterhin nicht während der ganzen Behandlungsdauer horizontal liegen, sondern gestattet ihnen schon bald eine halbsitzende Stellung einzunehmen.


Am allerbesten wäre natürlich eine Behandlungsweise, welche den Patienten überhaupt von der Bettlage befreien würde. Wir kommen auf diese später zurück.

Die zweite Indication erfordert zunächst die unmittelbare Reposition der Fragmente. Dieselbe ist aber selbstverständlich nur dann vorzunehmen, wenn es sich um nicht eingekeilte Fracturen mit stärkerer Dislocation handelt.

Man fasst dann den Fuss mit einer Hand an der Ferse, mit der anderen um den Rücken herum und giebt dem Beine, indem man leicht extendirt und nach innen rotirt, die natürliche Lage. Sobald man eine Einkeilung der Fragmente vermuthet, ist es durchaus unzulässig, gewaltsame Repositionsversuche zu machen, weil dadurch die Einkeilung gelöst werden und der Patient ihrer Vortheile für die Heilung verlustig gehen kann.

Was nun die Verbandmethoden betrifft, so kann man in Fällen eingekeilter Brüche mit geringer Verkürzung und Aussenrotation das Bein einfach zwischen Sandsäcken lagern und so ruhig liegen lassen. Bei Fällen mit stärkerer Dislocation könnten in Betracht kommen die Lagerung in einer *Bonnet*'schen Drahthose (Fig. 280) oder auf einem Planum inclinatum duplex (Fig. 281) oder der circuläre Gypsverband, der nicht nur

Fig. 281.




die verletzte Hüfte und das ganze kranke Bein, sondern auch die gesunde Beckenseite mit dem oberen Drittel des gesunden Oberschenkels umfassen müsste.

Diese Lagerungsapparate kommen in der Regel nur provisorisch in Betracht, der Gypsverband auch wohl zum Transport. Der eigentliche Fracturverband für die Schenkelhalsbrüche aber, die man in Bettlage behandeln will, ist der Heftpflasterextensions-Verband.

Diesem Streckverbande (Fig. 282) ist nach dem Vorgange des Amerikaners Gordon Buck von *v. Volkmann* seine heutige


Vollkommenheit gegeben worden. Seine Technik ist folgende: Ein 6—8 cm breiter Heftpflasterstreifen wird zu beiden Seiten der Extremität möglichst hoch oben vom Oberschenkel herab angeklebt bis etwa handbreit über die Malleolen. Von hier aus weichen die Streifen auseinander und bilden eine Schleife, in welche,

Fig. 282.



mehrere Centimeter von der Fusssohle entfernt, ein sog. Steigbügelbrettchen eingelegt wird. Dasselbe spreizt die Heftpflasterstreifen auseinander, damit sie keinen Druck auf die Malleolen ausüben können, und dient ferner zur Befestigung der Schnur für

Fig. 283.




die Extensionsgewichte. Die Streifen werden mit einer Flanellbinde am Glied befestigt und der Fuss auf eine T-Schiene mit gut gepolstertem Fersenausschnitt aufbandagirt. Nachdem das Heftpflaster nach Verlauf einiger Stunden festen Halt gewonnen hat,

werden die Gewichte angehängt, der Fuss aber gleichzeitig auf ein sogenanntes Schleifbrett (Fig. 283) aufgelegt. Dasselbe sichert die Ruhe der Extremität, verhütet besonders das seitliche Umkippen derselben und befördert die Extension durch Verminderung der Reibung.

Die Belastung selbst muss, wenn sie erfolgreich sein soll, mit starken Gewichten geschehen. Im Durchschnitt sind für muskelkräftige Individuen 10—15, höchstens 20, für schwächere 5—10 Pfund nothwendig. Die kranke Beckenseite soll bei wirkenden Gewichten niedriger stehen als die gesunde, das extendirte Glied daher etwa 2—4 cm länger erscheinen als das gesunde.

Die Contraextension geschieht entweder durch Höherstellen des Bettes am Fussende oder durch einen um die gesunde Hüfte angebrachten Gummischlauch oder dadurch, dass man den Patienten

Fig. 284.



mit dem gesunden Fuss sich gegen ein im Bette angebrachtes Trittbrett anstemmen lässt.

Bardenheuer fügt der Längsextension der Extremität durch passend angebrachte Heftpflasterstreifen stets noch eine Quer- und Rotationsextension hinzu, die wir aber bei Benutzung der *Volkmann*'schen T-Schiene für unnöthig halten.

Die durchschnittliche Heilungsdauer der Schenkelhalsbrüche bei dieser Methode beträgt etwa 8 Wochen. Die Heilung erfolgt dabei nach den Erfahrungen *v. Volkmann*'s mit nur äusserst geringer Verkürzung.


Der Extensionsverband gestattet dem Patienten, sich schon nach 8—14 Tagen aufrecht zu setzen, ist also auch in dieser Hinsicht sehr bequem.

Sollte das Heftpflaster Eczeme oder Furunkel auf der Haut hervorbringen, so kann man anstatt desselben feste Leinwandstreifen nehmen und diese mittelst Stecknadeln an einer zuerst angelegten Flanellbinde befestigen.

Nach *Morisani* kann man die Verkürzung, die durch die Verkleinerung des Schenkelhalswinkels entsteht, dadurch vermeiden, dass man die Extension in stark abducirter Stellung des Beines wirken lässt.

Die Bewegungsmöglichkeit der Patienten im Bett wird noch mehr gefördert durch Anwendung der Extension in suspendirter

Fig. 285.



Stellung des Gliedes. Dies erreicht in vorzüglicher Weise der *Beely*'sche Verband, der die Suspension an einer Gypshanfschiene gestattet. Dieselbe reicht von der Leiste bis zur Zehenbasis und trägt die Suspensionsringe etwas nach aussen von der Mittellinie, wodurch das Bein dauernd die Neigung zur Innenrotation beibehält (Fig. 284 u. 285).


Es sind noch eine Reihe anderer Extensionsvorrichtungen angegeben worden, so von *v. Dumreicher*, dessen nach *Bruns* modificirter Eisenbahnapparat aus beifolgender Zeichnung ersichtlich ist (Fig. 286), von *Hennequin*, *Tillaux* u. A. Alle diese Appa-

rate sind aber complicirter als die geschilderte *v. Volkmann*'sche oder *Beely*'sche Methode.

Die Extensionsbehandlung, wie wir sie eben geschildert haben, eignet sich vorzüglich für die Behandlung der extracapsulären Fracturen. Man lässt den Extensionsverband 3—4 Wochen liegen und macht dann dem Patienten einen Gypsverband, in dem er zunächst auf Krücken umhergehen kann.

Bei den sicher diagnosticirten intracapsulären Brüchen älterer Leute ist sie wohl kaum angezeigt, da die tausendfältige Erfahrung gelehrt hat, dass eine knöcherne Heilung dieser Fracturen doch nicht zu Stande kommt, sofern nicht eine Ein-

Fig. 286.



keilung bei denselben vorhanden ist. Solche Fracturen mit Einkeilung heilen, wie wir gesehen haben, recht gut und für sie eignet sich wohl ganz unzweifelhaft in vorzüglicher Weise die moderne ambulante Fracturbehandlung, wie wir das genauer bei den Brüchen der Oberschenkeldiaphyse besprechen werden. Man macht solchen Patienten einen Gehverband und lässt sie schon nach kurzer Zeit in demselben herumgehen. Selbstverständlich muss der Gehverband so zuverlässig angelegt sein, dass er eine Lösung der Einkeilung mit Sicherheit ausschliesst.

Soll man nun bei den intracapsulären Fracturen alter Leute, bei denen man aller Voraussicht nach doch keine knöcherne Heilung erzielt, auch durch Wochen hindurch die Patienten mit Streck- oder Geh-Verbänden quälen? Wir glauben nicht. Wir haben für solche Fälle unserer Ansicht nach nur die Wahl zwischen zwei Methoden. Die erste Methode ist die in letzterer Zeit namentlich von Frankreich aus empfohlene und sicher auch rationelle

ambulante Massagebehandlung. Man sucht durch diese Behandlung eine möglichst günstige Pseudarthrosenbildung zu erzielen und der Muskelatrophie entgegenzuarbeiten. Die Behandlung selbst hat in der Weise zu geschehen, dass man die Muskeln der ganzen Extremität durchstreicht und durchknetet, namentlich aber die Hüftmuskeln, dass man dann zunächst passive und später, sobald es die Schmerzen zulassen, auch active Bewegungen ausführt resp. ausführen lässt. Der Patient soll angehalten werden, sein Bein sobald als möglich zu bewegen und möglichst bald aufzustehen. Geht man in dieser Weise vor, so wird man ganz leidliche Resultate erzielen.


In der geschilderten Weise wird man bei heruntergekommenen schlecht genährten, catarrhalisch afficirten Patienten verfahren.

Hat man es dagegen noch mit verhältnissmässig gesunden Leuten zu thun, so kann man diesen eine unmittelbare operative Behandlung vorschlagen. Die Operation hätte in der Excision des Kopffragmentes zu bestehen. Bei aseptischem Wundverlaufe würde das Resultat, wie dies schon eine ganze Reihe derartiger Operationen gezeigt hat, sicher das denkbar beste sein, das sich überhaupt in diesen Fällen erzielen lässt. Nach der Operation wird für 14 Tage ein Gypsverband angelegt, dann wird die Nachbehandlung mit Massage und Gymnastik eingeleitet.

Operative Maassnahmen sind auch in anderer Weise versucht worden. Dieselben kommen namentlich für die extracapsulären Fracturen in Betracht und gehen darauf aus, durch den operativen Eingriff eine dauernde und exacte Fixation der Fragmente herbeizuführen.

So hat *Langenbeck* versucht, die Bruchenden durch Stahlschrauben oder Elfenbeinstifte zu vereinigen, ein Versuch, den später *König* und *Trendelenburg* nachgemacht haben.


Fig. 287.



So hat später *Senn* den Vorschlag gemacht, die Fragmente in Narcose zu reponiren, sie dann zu exasperiren und in einem

Gypsverband zu fixiren, oder noch radicaler das Einfügen der Bruchenden ineinander durch seitlichen Druck auf den Trochanter vermittelst einer in dem Verband angebrachten Pelotte oder vermittelst einer in die Mitte des Schenkelhalses durch Schraubenwirkung eingetriebenen schlanken Stahlspitze zu erreichen.

Fig. 288.



Derartige operative Eingriffe können wohl nur bei jugendlichen Individuen in Frage kommen. Sie würden aber wohl ganz überflüssig werden, wenn sich ein kürzlich von *Senn* sehr empfohlenes Verfahren bewähren würde, das nicht nur Fixation der Fragmente in ihrer richtigen Lage garantiren, sondern den Patienten sogar noch das Verlassen des Bettes unmittelbar nach der Verletzung gestatten soll.

Dieses Verfahren besteht in der Anlegung der beistehend abgezeichneten Schiene (Fig. 287), welche angelegt und durch Gypsbindentouren befestigt wird, während der Patient auf einem Schemel steht und ein Assistent dem kranken Bein durch Extension am Fuss seine normale Gestalt und Länge gibt (Fig. 288). Die Pelotte kommt gerade auf den Trochanter major zu liegen, sie drückt genau in der Richtung des Schenkelhalses und kann in diesem Druck täglich revidirt werden. Von Zeit zu Zeit wird sie vermittelst der Schraube gänzlich von der Haut entfernt, um diese durch spirituöse Einreibungen gegen Decubitus schützen zu können.

Bei veralteten Schenkelhalsbrüchen mit Pseudarthrosenbildung, die grosse Beschwerden machten, hat man neuerdings mit gutem Erfolg den Schenkelkopf unter aseptischen Cautelen exstirpirt (*Fock*, *König*, *Hoffa*). *Loretta* frischte in einem Falle einer 19 Monate alten intracapsulären Fractur die Fragmente mit dem *Ollier*'-

schen Raspatorium an und erreichte dadurch Consolidation der Fracturenden innerhalb 4 Wochen.

Differentialdiagnose der Hüftgelenksverletzungen.

Bei sorgfältiger Vergleichung der in den vorhergehenden Capiteln geschilderten Verletzungen finden sich einige derselben, die ähnliche Symptome darbieten und daher zu einer Verwechslung mit einander Veranlassung geben können. Es sind dies die Contusion des Hüftgelenkes, die *Malgaigne*'schen doppelten Verticalfracturen des Beckens, die Luxationen des Hüftgelenkes nach vorn, von denen wir hier nur die auf das Schambein berücksichtigen, und die Schenkelhalsbrüche, von denen wiederum lose, intra- und extracapsuläre und eingekeilte unterschieden werden müssen.

Wir führen die in Betracht kommenden Erscheinungen wieder in Tabellen an, indem wir nochmals darauf hinweisen, dass nicht der schematische Gebrauch derselben, sondern die genaueste Untersuchung des Patienten, eventuell in Narcose, die Diagnose sicherstellen wird.

I. Die Contusion des Hüftgelenkes.

1. Kommt in jedem Lebensalter vor.
2. Entsteht durch directe Gewalt, meist Fall auf den Trochanter.
3. Alle Zeichen bedeutender Quetschung um den Trochanter.
4. Schmerzen in der ganzen Hüfte, durch Bewegungen gesteigert.
5. Bewegung des Hüftgelenkes schmerzhaft, aber frei, besonders in Narcose.
6. Keine Crepitation.
7. Keine Verkürzung des Beines, höchstens scheinbar durch Beckenhebung.
8. Der Trochanter major steht in der *Roser-Nélaton*'schen Linie.
9. Das Bein ist zuweilen leicht nach aussen rotirt.
10. Der Schenkelkopf befindet sich an seiner normalen Stelle.

II. Malgaigne'sche doppelte Verticalfractur.

1. Kommt besonders bei kräftigen Männern vor.
2. Entsteht durch Compression des Beckens im frontalen oder diagonalen Durchmesser.

3. Die äussern Bedeckungen sind an den Angriffspunkten der Gewalt bedeutend gequetscht.
4. Schmerzen, besonders bei Druck gegen beide Darmbeine.
5. Bewegungen des Hüftgelenkes in Narcose frei.
6. Crepitation bei Druck gegen die Darmbeine.
7. Geringe Verkürzung des Beines bis zu $1^1/_2$ cm, in Folge Hohersteigens der ganzen Beckenhälfte.
8. Trochanter major steht in der *Roser-Nélaton*'schen Linie.
9. Das Bein ist leicht nach aussen rotirt.
10. Der Schenkelkopf befindet sich an seiner normalen Stelle.

III. Luxatio femoris suprapubica.

1. Kommt im allgemeinen selten im kindlichen Alter vor.
2. Entsteht durch Extension, Abduction und Aussenrotation des Beines.
3. Keine stärkere Quetschung an der Hüfte.
4. Keine besonders ausgeprägte Schmerzhaftigkeit.
5. Fixation des Schenkels in seiner falschen Stellung.
6. Keine Crepitation.
7. Verkürzung des Beines um einige Centimeter (bei Luxatio obturatoria verlängert).
8. Trochanter major steht, nach innen dislocirt, vor der Pfanne.
9. Das Bein steht abducirt und nach aussen rotirt.
10. Der Schenkelkopf ist auf dem Schambein zu fühlen.

IV. Fractura colli femoris intracapsularis.

1. Kommt fast nur im höheren Alter vor.
2. Entsteht schon durch unbedeutende Gewalten — Fall auf den Fuss, das Knie oder Gesäss.
3. Keine stärkere Quetschung oder Sugillation in der Umgebung des Gelenkes.
4. Wenig Schmerz bei ruhiger Lage, dagegen bei Bewegungen am Trochanter minor.
5. Beim Rotiren des Schenkels beschreibt der Trochanter major einen etwas kleineren Kreis als normal.
6. Crepitation kann erst entdeckt werden, wenn man dem Gliede seine normale Länge gegeben hat.
7. Verkürzung des Beines meist gering, kann später zunehmen.
8. Trochanter major steht wenig über der *Roser-Nélaton*'schen Linie und dem Acetabulum soviel genähert, als die Verkürzung beträgt.

9. Das Bein steht nach aussen rotirt.
10. Der Schenkelkopf articulirt mit der Pfanne.

V. Fractura colli femoris extracapsularis.

1. Kommt meist im höheren Lebensalter vor, aber auch in der Jugend.
2. Entsteht meist nach Einwirkung einer Gewalt auf den Trochanter major.
3. Alle Zeichen bedeutender Quetschung in der Gegend des Trochanter major.
4. Schmerz auch bei ruhiger Lage; Bewegungen wegen des Schmerzes nicht ausführbar.
5. Der Trochanter dreht sich bei Bewegungen (in der Narcose) nur um die Längsachse der Femur.
6. Crepitation leicht wahrnehmbar beim Auflegen der Hand auf den Trochanter major.
7. Verkürzung beträgt 6 Centimeter.
8. Trochanter major ist verbreitert oder selbst gesplittert und steht über der *Roser-Nélaton*'schen Linie.
9. Das Bein ist stark nach aussen rotirt.
10. Der Schenkelkopf steht in der Pfanne.

VI. Fractura colli femoris cum gomphosi.

1. Kommt im höheren Alter vor.
2. Entsteht meist nach Fall auf den Trochanter.
3. Alle Zeichen bedeutender Quetschung der Hüftgegend.
4. Meist bedeutende Schmerzhaftigkeit.
5. Das Bein zeigt eine auffallende Starrheit der Bewegungen.
6. Crepitation fehlt — soll auch nicht gewaltsam erzeugt werden.
7. Verkürzung beträgt bis zu 3 cm, ist aber oft sehr gering.
8. Der Trochanter major ist in der Regel verbreitert oder selbst gesplittert, kann aber auch bei intracapsulärer eingekeilter Fractur normal und nur etwas näher an das Acetabulum herangerückt sein.
9. Das Bein ist leicht nach aussen rotirt.
10. Der Schenkelkopf steht an seiner normalen Stelle.

Die seltenen Fälle von Schenkelhalsfractur, die mit Innenrotation des Beines einhergehen, könnten an eine Luxatio femoris iliaca denken lassen. Die Unterscheidung ist hier dadurch gegeben, dass bei der Luxation das Bein in seiner falschen Stellung

starr fixirt und der Schenkelkopf unter der Glutaealmuskulatur nachweisbar ist.


3. Isolirte Fracturen des Trochanter major.

Die Abtrennung des grossen Trochanter in seiner Epiphysenlinie oder im späteren Lebensalter der Bruch des Trochanter entsprechend seiner früheren knorpeligen Verbindung mit dem Femurschaft ist ohne begleitende Schenkelhalsfractur eine ausserordentlich seltene Verletzung. *Morris* vermochte kürzlich nur 6 wirklich sichere Fälle zusammenzustellen.

In diesen erfolgte die Fractur stets durch eine direct auf den Trochanter einwirkende Gewalt, gewöhnlich einen Fall oder Stoss auf denselben.

Die Dislocation des Fragmentes war eine verschiedene und abhängig von dem Verhalten des den Trochanter deckenden fibrösen, sehnigen Ueberzuges. War dieser nicht mitzerrissen oder wenigstens noch theilweise erhalten, dann blieben die Bruchstücke in gegenseitiger Berührung. In solchem Falle waren dann die **Symptome** die einer schweren Contusion, und nur der genau auf den Trochanter localisirte Schmerz, der sich bei Druck auf diese Gegend noch bedeutend steigerte, liess die Fractur annehmen. Waren dagegen die betreffenden Umhüllungen und damit die Muskelansätze vom Femur getrennt, so war das abgebrochene Fragment stets dem Zuge des Glutaeus medius und minimus gefolgt und stand

Fig. 289.



dann nach hinten und oben hinaufgerückt bis zu 6 cm entfernt von seinem Platze.

War keine zu starke Schwellung vorhanden, so zeigte eine solche Fractur das klinische Bild, wie es in Figur 289 wieder-

gegeben ist. An demselben ist besonders die Abplattung der Trochanterengegend bemerkenswerth.

Die Palpation des abgebrochenen Fragmentes ist wegen der Spannung der umgebenden Weichtheile, des öftern auch wegen der begleitenden Schwellung nicht gut möglich, dagegen gelingt es zuweilen, nach Flexion, Abduction und Aussenrotation des Beines Crepitation zu erzeugen, wenn man die Fragmente aneinanderdrückt. Wegen der Schmerzen halten die Patienten das verletzte Glied meist leicht gebeugt und einwärts rotirt. Die Bewegungen desselben sind nach allen Richtungen hin möglich.

Die Heilung erfolgt in der Regel durch Pseudarthrosenbildung. Ein knöcherner Callus kann sich nur entwickeln, wenn der intacte fibrös-periostale Ueberzug die Fragmente zusammenhält.

Die **Therapie** besteht in ruhiger Lagerung des Beines, in Abduction und Aussenrotation bei leichter Beugung im Knie- und Hüftgelenk.

4) Traumatische Epiphysenlösungen am oberen Femurende.

Am oberen Femurende haben wir, wie schon früher gesagt, mehrere Epiphysenlinien, am Kopf, am Trochanter major und minor. Traumatische Lösungen dieser Epiphysen sind nach *Tubby* und *Whitman* recht selten und nur an der Kopfepiphyse und der Epiphyse des Trochanter major beobachtet worden.

Von 14 die **Kopfepiphyse** betreffenden Fällen nimmt *Tubby* 9 als zuverlässig an; sie betrafen Patienten im Durchschnittsalter von 14—15 Jahren, also zu einer Zeit, wo der verknöcherte Kopf schon einen stärkeren Widerstand leistet, so dass die Gewalt auf der dünnen Epiphysenlinie an den schwächsten Punkt trifft. Die Gewalt war meist eine hochgradige. Man findet oft weiche Crepitation wie beim Aneinanderreiben von Knorpel, Verkürzung von $^3/_4$ bis höchstens 1 Zoll, Aussenrotation in geringem oder auch bedeutenderem Grade, aktive Beweglichkeit oft gut erhalten, so dass die Patienten bisweilen Anfangs noch zu gehen vermochten. Dies, sowie die Art der Rotation und Crepitation wechseln, je nachdem die den Schenkelhals in Form von Längsfalten überziehende Synovialis nicht, oder aber in bedeutenderem Masse zerrissen ist. Der Trochanter major kann über die *Roser*'sche Linie emporragen. Vor Verwechslung mit Fracturen des Halses schützt die Thatsache, dass intracapsuläre nicht vor dem 50., extracapsuläre nicht vor

dem 20. Jahre beobachtet werden. Bruch des Pfannenrandes hinten oben hat Luxation des Kopfes zur Folge. Da ein Einheilen des Kopfes durchaus unwahrscheinlich ist, so läuft bei den berichteten Heilungserfolgen wohl eine Täuschung unter, indem durch Ankylosirung des Kopfes durch den Entzündungsreiz Bildung eines falschen Gelenkes in der Epiphysenlinie erfolgen wird. Auch so erklärt sich die oft gute Function, sowie eine nachträglich bis zu $1^1/_2$ Zoll zunehmende Verkürzung, da das Längenwachsthum ja wesentlich von der oberen Knieepiphyse abhängt.

Von Epiphysenlösungen am **Trochanter major** fanden sich 5 sichere Fälle, während sie als Complication bei extracapsulärer Fractur häufiger vorkommen. 3 mal wurde sie durch Autopsie nachgewiesen, und war stets durch Einwirkung directer Gewalt entstanden; die betreffenden Individuen standen im Alter unter 17 Jahren. Ein merkliches Hinaufrücken des Trochanter fehlt meistens, in Folge des Vorhandenseins der vielen Sehnen- und Bandmassen. Bisweilen findet sich „weiche“ Crepitation, besonders bei Druck nach abwärts. Der Grad der Weichtheilerhaltung bestimmt auch den der Funktion, die eine sehr gute sein kann; ebenso hängt es davon ab, ob der Trochanter bei Rotation des Schenkels folgt, oder aber bei hohem Hinaufrücken vielleicht einen luxirten Kopf vortäuscht. Da der Trochanter von blutarmen Gebilden bedeckt ist und seine Ernährung vom Schafte aus erhält, so tritt leicht Vereiterung ein, besonders wenn die Diagnose auf Contusion gestellt war und die Patienten in den ersten Tagen umhergehen.

B. Fracturen der Diaphyse des Femur.

Die Brüche des Femurschaftes, deren Frequenz wir bereits kennen lernten, ereignen sich vorzugsweise bei arbeitenden Männern in dem 20.—60. Lebensjahr, kommen aber auch gern bei Kindern vor. Am häufigsten wird betroffen das Mittelstück, dann das obere und am seltensten das untere Drittel der Diaphyse.

Die Ursachen können in directen und indirecten Gewalten, ebenso aber auch im Muskelzug allein gelegen sein. Directe Kräfte müssen bei der Stärke des ausgewachsenen Femur schon sehr kräftig einwirken. Sie bringen den Bruch besonders am unteren Ende des Schaftes zu Stande und kommen als Auffallen einer schweren Last, Ueberfahrenwerden, zumal bei hohlliegendem Oberschenkel, Auftreffen einer Kugel zur Geltung. Derartige Brüche sind leicht mit einer bedeutenden Quetschung

der Weichtheile verbunden. Indirect kommen die Fracturen zu Stande durch einen Fall auf die Füsse. Sie sind dann Biegungsbrüche, indem der Femur wie ein über die Grenze seiner Elasticität gebogener Stab bricht, den man an seinem oberen Ende festhält und mit dem unteren kräftig auf den Boden aufstösst. Entsprechend seiner physiologischen Krümmung bricht der Femur in solchem Falle zuerst vorn an seiner Convexität, wird dagegen zusammengedrückt hinten an seiner Concavität, wenn die Fractur im mittlern und untern Drittel eintritt. Handelt es sich dagegen um Fracturen im oberen Drittel, dicht oder einige Centimeter unter dem Trochanter major, so findet man den Rissbruch aussen und vorn, die Quetschung aber innen und hinten, wiederum entsprechend der Krümmung des Knochens, die als Fortsetzung des *Adams*'schen Bogens ihre Concavität nach innen wendet (*Lossen*).

In anderen Fällen ist der indirecte Oberschenkelbruch ein Torsionsbruch. Er sitzt dann gewöhnlich im oberen Drittel und hat zu seinem Zustandekommen entschieden noch des Muskelzuges mitbedurft. So entstehen die Brüche, welche beobachtet wurden beim Versuche, einen Fusstritt auszutheilen, während der Fuss sein Ziel verfehlte, ferner die Brüche, die beim Kegelschieben eintreten in dem Augenblick, in welchem der Spieler sich beim Abwerfen der Kugel auf das vorgestreckte Bein stützt und letzteres zugleich durch den Schwung des Oberkörpers eine Drehung erleidet. Diese plötzliche Drehung spielt in der Erzeugung des Bruches wohl die Hauptrolle. So kommt er zuweilen auch bei Arbeitern zu Stande, welche ihren Körper plötzlich drehen, um herabstürzenden Gegenständen auszuweichen, und ebenso gelegentlich beim Versuche, veraltete Hüftgelenksluxationen durch Rotationsmanöver zu reponiren. Der Knochen wird durch solche Gewalten gewissermassen aufgerollt, daher der Bruch selbst ein spiraliger wird. Wir kommen hierauf später noch zurück.

Die Fracturen können unvollständige und vollständige sein.

Infractionen sind im Ganzen selten, kommen aber hier und da auch bei Erwachsenen vor, und sind dann vor den meist in der Längsrichtung verlaufenden Fissuren dadurch ausgezeichnet, dass die Trennungslinie mehr einen queren Verlauf hat. Sie gehen einher ohne jede winklige Knickung des Knochens.

Fissuren kommen als selbständige Bruchformen in der Diaphyse sehr selten vor. Als Beispiel führen wir eine Beobachtung *Bouisson*'s an. In derselben war die Fissur in Folge eines heftigen

den Oberschenkel schräg treffenden Schlages entstanden. Sie erstreckte sich über eine Länge von 15 cm und reichte von der Mitte der Diaphyse bis zum Condylus externus femoris.

Die vollständigen Brüche kommen in allen bekannten Variationen vor. Querbrüche finden sich zumeist nur bei rhachitischen Kindern oder bei Erwachsenen an der Epiphysengrenze. Sie sind zuweilen subperiostal oder doch wenigstens mit nur unvollständiger Periostzerreissung verbunden. Die Bruchflächen selbst sind meist stark gezackt. Die Zacken können sich verfangen und so eine Art Einkeilung bewirken. Im Uebrigen beschränkt sich die Dislocation dieser Brüche im wesentlichen auf eine leicht seitliche oder auch wohl leicht winklige Knickung.

Schrägbrüche kommen in überwiegender Mehrzahl vor. Die Schrägheit ist zuweilen so bedeutend, dass die Bruchflächen eine Strecke weit parallel der Längsachse verlaufen. Dabei sind sie oft so glatt und scharf, dass sie Aehnlichkeit mit einem Clarinettenmundstück haben und deshalb auch wohl Fractures en bec de flûte getauft worden sind (Fig. 290).

Besonderes Interesse erregen die durch Torsion entstandenen Spiralbrüche des Femur. Dieselben verdanken, wie wir ge-

Fig. 290.





Fig. 291.



sehen haben, oft dem Muskelzug ihr Dasein. Sie sind dadurch ausgezeichnet, dass die beiden Bruchstücke ausserordentlich steil

sind und sehr spitz auslaufen. Die eine Bruchlinie verläuft dabei in der Längsachse des Knochens, während die andere diesen in einer Schraubenlinie umgiebt (Fig. 291). Sie finden sich besonders häufig am oberen Ende des Femur, kommen aber auch weiter unten vor. Von beiden Bruchlinien gehen gern Fissuren aus, die sich bis in die benachbarten Gelenke erstrecken können. Die spitzen Bruchenden haben grosse Neigung, die umgebenden Weichtheile von innen nach aussen zu durchbohren und so Durchstechungsfracturen zu erzeugen. Die Spirale geht wiederum entsprechend der normalen Biegung des Femur meist von unten innen über die dorsale Fläche des Knochens hinweg und endet an der äussern obern Seite (*Stetter, Mermillod*).

Mehrfache Brüche und Splitterbrüche haben nichts Charakteristisches. Die ersteren finden sich in der Regel näher


Fig. 292.



Fig. 293.



am obern Ende in der Weise, dass ein Stück desselben herausgeschlagen ist. Der Femurschaft ist dann in 3 grosse Fragmente



Hoffa, Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

getheilt. Das mittlere Fragment durchsetzt nun aber nicht immer die ganze Dicke der Diaphyse gleichmässig. Es ist vielmehr öfter nur ein grösserer Splitter von der vorderen Fläche des Knochens abgelöst, und zwar besitzt dieser Splitter bei den durch Biegung entstandenen Brüchen die Gestalt eines dreieckigen Keiles (Fig. 292), bei den durch Torsion entstandenen aber eine ausgesprochene Rautenform (Fig. 293).

Wenn wir somit die verschiedensten Bruchvariationen am Femur antreffen, so besitzt die Form und Richtung des Bruches doch etwas Gesetzmässiges, je nachdem der Sitz desselben ins obere, mittlere oder untere Drittel des Schaftes fällt.

Im oberen Drittel finden sich fast nur Schrägbrüche, deren Bruchlinien von aussen und oben nach innen und unten verlaufen (Tafel XXVI). Im mittleren Drittel herrschen die Schrägbrüche vor. Hier ziehen aber die Bruchlinien in der übergrossen Mehrzahl der Fälle von hinten und oben nach vorn und unten. Der Bruch schneidet die Femurachse bald unter einem Winkel von 45 Grad, bald unter einem viel spitzeren, ja es kommen fast in der Längsachse des Schenkels verlaufende Zusammenhangstrennungen vor. Im unteren Drittel treffen wir an der Stelle, an welcher bereits die Spongiosa beginnt und die Corticalis dünner wird, quere, öfters aber auch wieder schräge Bruchflächen. Charakteristisch für diese letzteren ist eine Neigung von oben hinten nach vorn unten.

Wenn man sich den Verlauf dieser Bruchrichtungen an einem skelettirten Femur vergegenwärtigt, so wird man sofort einsehen, dass durch dieselben eine Verschiebung der Bruchflächen sehr begünstigt wird. Sie stellen ja gewissermassen schiefe Ebenen dar, an welchen ein Vorbeigleiten sehr erleichtert wird. In der That gehen denn auch alle diese Brüche, bei denen das Periost in der Regel ausgedehnt gelitten hat, mit geradezu typischen Dislocationen einher.

Diese Dislocationen hängen einmal ab von der Richtung der Gewalteinwirkung, die ja in der Regel von aussen her statthat und das untere Ende des Femur nach innen zu drängen bestrebt sein wird. Weiterhin spielt hier sicher die eigenthümliche Biegung des Femur selbst eine Rolle, und schliesslich kommt der Zug der an den Fragmenten inserirenden Muskeln in Betracht.

Allen Brüchen des Femur gemeinsam ist eine Drehung des unteren Bruchendes um seine Längsachse. Wir lernten dieselbe bereits bei den Schenkelhalsbrüchen kennen und treffen

sie hier wieder, indem wir das Bein in Folge seiner Eigenschwere nach aussen rotirt finden.

Daneben haben wir aber stets noch weitere Verschiebungen der Fragmente, die wiederum nach dem Sitz der Fractur variiren.


Bei den Brüchen im oberen Drittel (Tafel XXVI) folgt das obere Bruchstück dem Zuge des Ileopsoas und der Glutaeen und wird daher nach aussen, in Abductionsstellung, in weniger hohem Grade auch nach vorn, in Beugestellung gelangen. Das untere Fragment wird dagegen von der äusseren Gewalt und den starken Adductoren nach innen und oben dislocirt. Es entsteht so eine Kreuzung der Bruchenden, ein Reiten derselben, das sich durch eine Verkürzung des Beines und an der Bruchstelle selbst durch einen nach aussen und vorn vorspringenden Winkel zu erkennen geben muss. Bei mageren Leuten ist dieser sehr deutlich wahrnehmbar, bei muskulösen und fetten wird er dagegen zuweilen durch die gleichsinnige Biegung des Schenkelhalses verdeckt (*Roser*). Das obere Bruchende ist dabei gelegentlich noch gesplittert (*Bennet*).

Diese eben beschriebene Dislocation ist nun nicht immer vorhanden. Es besteht vielmehr bei den dicht unter den Trochanteren stattfindenden Brüchen, der Fractura subtrochanterica, zuweilen keine Verschiebung der Bruchenden, wenn diese auch schräg verlaufen. *Nicoladoni* macht dies abhängig von den anatomischen Verhältnissen dieser Gegend, indem der Knochen dort von einem derben, fibrösen, fest adhärenten, den Muskeln zum Ursprung dienenden Gewebe überzogen ist.

Bei den Brüchen im mittleren Drittel (Tafel XXVI) rückt entsprechend der Richtung der Bruchlinie das obere Fragment fast ausnahmslos vor das untere und ausserdem um so mehr nach aussen, je mehr sich der Bruch dem obern Drittel nähert. Liegt der Bruch unterhalb des Ansatzes der Adductoren, so ziehen dieselben das obere Fragment nach vorn und innen, während das untere Fragment nach aussen und hinter dem obern in die Höhe rückt.

Bei den Brüchen im unteren Drittel (Tafel XXVII) wird das obere Fragment durch die Adductoren ebenfalls nach vorn und innen gelangen. Es kommt zuweilen soweit nach vorn, dass es die Muskeln und die Bursa extensorum durchstösst und direct unter die Haut tritt und auch diese noch durchsticht.


Das untere Fragment rückt an der Hinterseite des oberen in die Höhe, indem es der elastischen Retraktion der



vom Becken an den Unterschenkel ziehenden Muskeln anheimfällt. Zuweilen erfährt es dabei noch eine derartige Verschiebung, dass seine Bruchfläche nach hinten gegen die Kniekehle gewendet wird. Dieses Verhalten wurde zuerst von *Boyer* constatirt und auf die Wirkung des Gastrocnemii geschoben. *Lauenstein*, der einen gleichen Fall beobachtete — bei demselben war durch das Fragment sogar der Nervus peroneus angespiesst, — glaubt nicht sowohl einen derartigen Muskelzug für diese Dislocation beschuldigen zu müssen, als einen nachträglichen Fall auf das bereits gebrochene Glied.

Die **Symptome** derjenigen Oberschenkelfracturen, die nur unvollständig sind oder unter einem theilweise erhaltenen Periostl iegen, beschränken sich auf den Schmerz, die Anschwellung an der Bruchstelle und die Functionsstörung des Beines. Wenn man die Patienten auffordert, das Bein von der Unterlage zu erheben, so wird an der Bruchstelle zuweilen eine winklige Knickung bemerkbar. An dieser Stelle wird man dann durch gegenseitige Verschiebung der Bruchenden an einander abnorme Beweglichkeit und Crepitation nachweisen können.

Fig. 294.



Sobald das Periost an der Bruchstelle gänzlich zerrissen ist, tritt stets auch die vorher beschriebene Dislocation der Fragmente ein, die sich im klinischen Bild sofort erkennen lässt, wenn man das kranke mit dem gesunden Bein vergleicht und dabei auch die normalerweise zwischen den beiden parallel neben einander gelegten Beinen bestehende Luftfigur berücksichtigt (Fig. 294). Es fällt dann zunächst die stets vorhandene Rotation des Fusses nach aussen auf. Der äussere Fussrand liegt auf der Unterlage auf, der innere Rand der Patella aber schaut gerade nach vorn. Weiterhin ist das fracturirte Bein stets verkürzt. Diese Verkürzung ist in verschiedenen Fällen verschieden. Sie kann nur gering sein, aber auch 12 bis 15 cm betragen, dies letztere dann, wenn die Fragmente nicht nur

winklig verschoben sind, sondern auch auf einander reiten. Die Verkürzung misst man am besten in der Weise, dass man die Spinae anter. sup. des auf einer festen horizontalen Unterlage liegenden Patienten so lagert, dass ihre Verbindungslinie die Körperachse senkrecht schneidet, dass man beide Oberschenkel parallel legt oder in möglichst gleiche Abduction und nun gegen die aufgerichteten Fusssohlen ein Brett stellt. Man misst dann den Abstand desselben von der Ferse des verletzten Beines und wird sich so selten um $^1/_2$ cm täuschen. An der Bruchstelle selbst ist dann schliesslich wenigstens bei schlechter genährten Individuen eine winklige Krümmung des Schenkels nach aussen und vorn oder auch direct nach vorn bemerkbar. Bei besser genährten Patienten wird diese Deformität zuweilen durch die gleichzeitige Schwellung verdeckt. Zuweilen kann man die Bruchenden auch direct fühlen oder sehen (Durchstechungsfracturen).

Die beschriebenen Zeichen sind so charakteristisch, dass die Diagnose eines Oberschenkelbruches meist auf den ersten Anblick zu stellen ist. Nicht so leicht ist es dagegen, besonders bei kräftigen Männern, ganz genau den Sitz des Bruches, den Verlauf der Bruchlinien und die stattgefundene Dislocation zu bestimmen. Da aber diese Verhältnisse für die einzuschlagende Therapie grosse Wichtigkeit besitzen, muss man sich doch Rechenschaft über dieselben geben können. Dazu chloroformirt man am besten den Patienten und wird sich dann bequem über die Lage der Dinge unterrichten können.

Die **Prognose** der Oberschenkelfracturen ist im ganzen eine günstige, indem selbst die früher so gefürchteten complicirten Brüche heutzutage unter dem Schutze der Aseptik anstandslos verlaufen. Die knöcherne Heilung erfordert bei Kindern etwa 4, bei Erwachsenen etwa 6—8 Wochen. Am schnellsten erfolgt die Callusbildung bei der jetzt meistens geübten Extensionsbehandlung, weil bei derselben an der Bruchstelle keine Hemmung der Circulation stattfindet und daher das zur Callusbildung nothwendige Material ungehindert zugeführt werden kann. Sie gleicht ferner auch die Verkürzung am vollständigsten aus. Während man früher bei den gewöhnlichen Schrägbrüchen zufrieden war, wenn die nach der Heilung zurückbleibende Verkürzung 2—3 cm betrug, hat *v. Volkmann* von 110 Oberschenkelfracturen, die mit Extension behandelt wurden, 87 ohne jegliche Verkürzung heilen sehen. In den anderen Fällen betrug dieselbe meistens nur $^1/_2$—1 cm. Im einzelnen ergaben die Brüche im oberen Drittel eine

Consolidationszeit von 40 Tagen, eine durchschnittliche Verkürzung aber von 0,4 cm, Brüche im mittleren Drittel 32 Tage und 0,2 cm, Brüche im unteren Drittel 34 Tage und 0,4 cm Heilungsdauer und Verkürzung *(Hertzberg)*.

Die knöcherne Heilung tritt aber nicht in allen Fällen mit Sicherheit ein; es kommen vielmehr gar nicht so selten auch Pseudarthrosen vor. Als Gründe derselben hat man gewöhnlich starkes Reiten der Fragmente oder Interposition von Muskelbäuchen zwischen dieselben erkannt. Wir müssen noch erwähnen, dass ältere Leute bezüglich der Lungenhypostasen und des Decubitus denselben Gefahren ausgesetzt sind wie bei den Schenkelhalsbrüchen, und dass Oberschenkelbrüche bei sehr fetten Personen nicht so selten auch durch Fettembolie tödlich werden. Schliesslich ist noch anzuführen, dass im Verlaufe der Oberschenkelbrüche des mittleren und unteren Drittels ziemlich häufig blutige oder seröse Ergüsse im Kniegelenk auftreten. Dieselben entstehen entweder durch das auch den Bruch veranlassende Trauma oder als Folge von Fissuren, die sich bis ins Gelenk hinein erstrecken. Entwickeln sie sich später bei den ersten Gehversuchen, so sind sie offenbar durch die allgemeine Trockenheit und Rigidität des immobilisirten Gelenkes zu erklären, auf welches die ersten physiologischen Bewegungen wie Distorsionen wirken (*v. Volkmann*). Derartige Ergüsse bleiben oft lange bestehen. Die anderen pflegen mit der Heilung des Knochenbruches auch resorbirt zu sein.

Die spätere Gebrauchsfähigkeit des Gliedes hängt ganz ab von der eingeleiteten Behandlung. War diese mangelhaft, so heilen die Brüche in ihrer fehlerhaften dislocirten Stellung. Davon zeugen die beistehenden Figuren 295 und 296, welche den typischen Dislocationen der Fragmente im obern und untern Drittel entsprechen. Interessant sind die von *Haenel* aus den Unfallsakten zusammengestellten Daten. Von 121 Oberschenkelbrüchen gelangten nur 39 zu völliger Heilung; andauernd geschädigt blieben 75 mit durchschnittlich 28% Erwerbsunfähigkeit. Die durchschnittliche Heilungsdauer betrug für die wiederhergestellten Fälle $13^1/_2$ Monate, die mittlere Dauer der völligen Arbeitsunfähigkeit $7^1/_2$ Monate. Die Resultate waren um so schlechter, je älter die Patienten waren. Die häufigsten Ursachen der Functionsstörung waren starke Verkürzungen des Oberschenkels und Steifigkeiten des Kniegelenkes. Im Uebrigen spielten eine grössere Rolle erhebliche Muskelatrophie,

Callushypertrophie und Schmerzhaftigkeit, Pseudarthrosen und Decubitus.

Die **Therapie** der Oberschenkelfracturen hat zunächst die Reposition der dislocirten Fragmente zu besorgen. Zu dem Zweck fixirt ein Gehilfe mit beiden aufgelegten Händen das Becken oder, wenn es geht, auch die obere Circumferenz des Femur. Ein zweiter Gehilfe ergreift mit der einen Hand die Ferse, mit der anderen den Fussrücken oder die Zehen und erhebt sanft das gebrochene Bein des, am besten chloroformirten, Patienten von der Unterlage,

Fig. 295.





Fig. 296.



übt dann einen kräftigen aber stetig wirkenden Zug aus und stellt dabei die Fussspitze so, dass die Längsachse des Metacarpalknochens der grossen Zehe, der innere Rand der Patella und die Spina anterior superior in eine Visirlinie zu liegen kommen. Bei den Brüchen im oberen und mittleren Drittel wird dabei die Extremität so weit abducirt, dass das untere Fragment dem oberen

wieder gegenübersteht. Man wird dabei zuweilen fühlen oder durch eine Einziehung der Haut über der betreffenden Stelle erkennen, dass das obere Fragment die benachbarten Weichtheile angespiesst hat. In solchem Falle könnte leicht eine Interposition von Muskeln stattfinden, und man muss daher die Anspiessung entweder durch rotirende Bewegungen der Weichtheile oder auch durch kleine Incisionen zu lösen suchen.

Ist nun die Reposition bewirkt, so handelt es sich jetzt darum, die Fragmente während der Heilungszeit dauernd in ihrer richtigen Lage zu einander zu erhalten. Das war bis vor Kurzem keine leichte Aufgabe, und man hat eine Menge von Verbandmethoden und Apparaten zu diesem Zweck ersonnen. Dieselben haben den Patienten sicher oft mehr geschadet als genutzt, und wir brauchen sie deshalb gar nicht aufzuzählen. Heute concurriren im wesentlichen nur Lagerungs- und Schienenverbände, Gypsverbände und die permanente Gewichtsextension.


Dieselben können alle gelegentlich in Frage kommen, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird. Von Lagerungsmethoden kommt zur provisorischen Retention der Fragmente, wenn man kein geeignetes anderes Material zur Hand hat, bisweilen die sog. *Pott*'sche Seitenlage in Betracht, zumal bei starker Aufrichtung des oberen Fragmentes. Der Patient wird auf die verletzte Seite gelegt, und Hüft- und Kniegelenk gebeugt. Man erreicht dadurch eine vollständige Muskelerschlaffung und stützt dann die Extremität durch nebengelegte Sandsäcke. Womöglich soll der Fuss etwas höher liegen als die Hüfte. Diese Lagerung ist auf die Dauer unbequem. Erträglicher wird sie, wenn man dem Patienten die Rückenlage gewähren kann. Dazu gebraucht man aber eine doppelt geneigte schiefe Ebene, ein Planum inclinatum duplex, auf welchem der Oberschenkel in aufsteigender, der Unterschenkel in absteigender Richtung liegt. Fig. 265 zeigt die von *v. Esmarch* angegebene doppelte schiefe Ebene. Man kann auf dieser gleichzeitig eine Extension ausüben, wenn die Länge des Oberschenkelbrettes die des Oberschenkels selbst etwas übertrifft, so dass das untere Rumpfende hohl liegt und durch sein Gewicht extendirt, während in der Kniekehle die Contraextension stattfindet. Man muss sich dann aber sehr vor einem zu starken Druck in der Kniekehle in Acht nehmen.

Diesen Nachtheil, dass in den Unterstützungspunkten leicht Decubitus entsteht, theilt die schiefe Ebene mit der sog. Aequilibrialmethode von Mojsisovics, bei der die Extension vom

Unterschenkel des im Hüft- und Kniegelenk gebeugten Beines aus stattfindet (Fig. 297). Wir wollen hier einschalten, dass *Karg* neuerdings empfohlen hat, bei älteren Leuten in dieser Stellung einen Gypsverband anzulegen, um ihnen das Aufsitzen eher zu ermöglichen. Ein solcher Verband dürfte wegen der Gefahr der Gelenksteifigkeit jedenfalls nicht zu lange liegen.

Die verschiedenen Schienenverbände sind nothwendig für den Transport der Verletzten. Sehr zweckmässig gestaltet sich derselbe in einer *Bonnet*'schen Drahthose (s. Fig. 280), in welcher das gebrochene Glied wenigstens eine bequeme und sichere Lagerung findet. Soll die Rinne die ganze Extremität sammt Hüfte und Becken aufnehmen, so stellt man dieselbe nach *Roser*'s Vorschlag am besten aus 2—3 Stücken her, die dann beliebig weit übereinandergeschoben und mit Schnüren zusammengebunden werden.


Fig. 297.



Sind derartige Schienen nicht zur Stelle, so ist recht praktisch auch eine starke Aussenschiene. Dieselbe muss etwa handbreit sein und sowohl über das Becken wie über den Fuss hinausreichen. Sie wird gehörig gepolstert und dann am Becken-, Knie- und Fusstheil mit einer Binde oder mittelst eines durch einen länglichen Ausschnitt in der Schiene hindurchgezogenen Cravattentuches fixirt. Am Fusstheil bringt man dann noch ein Brett an, mit dem man die Auswärtsrotation der Extremität beseitigt. Auf die Fracturstelle selbst wird vor Anlegung der Schiene eine dicke Compresse gelegt und so ein direkter Druck auf die nach aussen


gewichenen Fragmente ausgeübt. *v. Esmarch* hat diese Aussenschiene in sehr zweckmässiger Weise noch mit einer elastischen Wirkung ausgestattet. Er legt an der Extremität zuerst eine Heftpflasteransa mit Spreizbrettchen an und bringt dann die für den Kriegsfall zerlegbar gemachte lange Aussenschiene an. Dieselbe besitzt an ihrem oberen Ende zwei Einschnitte, an welchen der quere Beckengurt und ein Perinealschlauch zur Contraextension befestigt werden. Am untern, die Fusssohle überragenden Ende ist ein eiserner abnehmbarer Haken angebracht. Zwischen diesem und dem Spreizbrettchen wird innen ein Kautshuckschlauch eingeschaltet, welcher in beliebiger Spannung einen Zug in der Achse des Gliedes ausübt (Fig. 298).

Fig. 298.



Eine andere Schiene, die man sich leicht improvisiren kann, ist die *Smith*'sche vordere Drahtschiene (Fig. 299 u. 300). Sie wird aus Telegraphendraht hergestellt und hat sich namentlich bei Schussfracturen während der letzten Kriege bewährt. Das Drahtgestell besteht aus einem langen Rahmen mit zwei verschieb-

Fig. 299.




baren Bügeln zum Anknüpfen der Suspensionsschnüre. Der Rahmen wird an 3 Stellen, entsprechend dem Hüft-, Knie- und Fussgelenk leicht gebogen und auf die vordere Fläche der Extremität aufgelegt, nachdem die letztere von den Zehen an bis zum Becken eingewickelt und der Fussrücken sowie die Leistengegend durch untergelegte Kissen gegen den Druck der Schiene geschützt sind.

Schliesslich wird das Bein sammt dem Drahtgestell mit einer Binde umwickelt und an einem Stricke suspendirt (Fig. 300).

Die Anlegung der bisher genannten Verbände erfordert keine besonders grosse Geschicklichkeit, wohl aber ist diese für den Gypsverband nothwendig. Man kann diesen aber nicht entbehren, weil er bei dem Transport auf weitere Strecken und bei unruhigen Kranken, bei Deliranten immer noch am sichersten wirkt. Der Gypsverband für den Oberschenkelbruch muss das ganze gebrochene Bein von den Zehen bis zum Becken umfassen und auch den gesunden Oberschenkel

Fig. 300.




bis zu dessen Mitte umschliessen. Nur dann ist wirklich eine ruhige Lage der Fragmente möglich. Freilich ist deren Dislocation später, wenn die Weichtheile unter dem Verband abgeschwollen und atrophisch geworden sind, dadurch aber der Gypsverband lockerer wird, nicht ausgeschlossen, und das ist der grosse Nachtheil der Gypsverbände. Selbst unter dem besten derselben, der sofort nach der Fractur angelegt wurde, ist ein geringes seitliches Ausweichen der Fragmente und damit eine stärkere Verkürzung der Extremität nicht zu vermeiden. Niemals sollte man bei starker Weichtheilschwellung einen Gypsverband anlegen, da sonst das ganze Glied gangränös werden

könnte. *Hamilton* hat einen derartigen unglücklichen Ausgang zweimal beobachtet.

Zur Anlegung des Gypsverbandes legt man den Patienten auf eine sog. Beckenstütze, wie sie von *v. Volkmann*, *Bardeleben* u. A. angegeben worden ist, lässt die Reposition in vorherbeschriebener Weise ausführen und wickelt dann die Gypsbinden um, indem man zunächst die Fracturstelle und hierauf die benachbarten Gelenke vornimmt (Fig. 301).

Die entschieden beste definitive Verbandmethode für die Oberschenkelbrüche ist die permanente Gewichtsextension, die in gleicher Weise gehandhabt wird, wie wir sie bei den Schenkelhalsbrüchen kennen gelernt haben. Hier ist nur noch zu erwähnen, dass man unter das Knie ein Kissen legen muss, weil sonst eine Ueberstreckung desselben und damit heftige Schmerzen

Fig 301.




entstehen könnten. Bei den Fracturen im oberen und mittleren Drittel mit starker Abduction und Elevation des oberen Fragmentes, muss man das untere Fragment diesem entgegenführen. Es geschieht dies, indem man die Extension in abducirter Stellung der Extremität und auf einem Planum inclinatum simplex ausführt. Bei starker Winkelstellung der Fragmente ist es oft noch nöthig, einen seitlichen Zug zu Hülfe zu nehmen, in der Regel einen Zug nach innen und hinten zur Beseitigung des ja meist nach vorn und aussen vorspringenden Winkels. Dazu dient am besten eine Heftpflasterschlinge, welche an der vorspringenden Stelle angelegt, mittelst einer daran befestigten Schnur

und eines Gewichtes die gewünschte Wirkung herbeiführt. Die ganze Anordnung des Zugverbandes in solchem Falle erläutert die Fig. 302, die wir nach *Helferich* wiedergeben.

Ausserordentlich wichtig ist eine stete Controlle des Extensionsverbandes, damit kein Decubitus entsteht und damit vor allem auch stets die gewünschte Länge des Beines aufrecht erhalten wird. Dazu sind von Zeit zu Zeit genaue vergleichende Messungen vorzunehmen. Wie *Helferich* sehr richtig hervorhebt, muss die Messung des gesunden Beines stets in genau symmetrischer Stellung vorgenommen werden. Hierzu wird zunächst die horizontale Beckenaxe d. h. die Verbindungslinie beider Spin. ilei ant.

Fig. 302.




sup. bestimmt. Eine senkrecht auf ihre Mitte gesetzte und nach abwärts verlängerte Linie, z. B. eine Schnur oder ein Messband gestattet, den Grad der Abduction des verletzten, natürlich unverrückt im Verband liegenden Beines zu taxiren und das gesunde Bein durch einen Gehülfen in die gleiche Abduction und Flexion bringen zu lassen. Dann erst ergiebt die vergleichende Messung sichere Resultate.

Unmöglich wird die Heftpflasterextension bei den nahe am Kniegelenk gelegenen Brüchen, indem durch dieselbe leicht eine Dehnung und Erschlaffung der Kniegelenksbänder herbeigeführt


werden könnte. Für diese Fälle kann man sich, falls keine stärkere Dislocation vorhanden ist, mit der Lagerung des Beines auf einer *v. Volkmann*'schen T-Schiene (Fig. 303) oder noch besser

Fig. 303.



auf der neuen *Bruns*'schen Schiene (Fig. 304) begnügen. Ist aber eine Dislocation vorhanden, so kann man diese durch eine 8—12-tägige Extension, die während dieser kurzen Zeit nicht viel Schaden anrichten wird, beseitigen und dann einen Gypsverband anlegen.

Fig. 304.




Will man der Dislocation gleich von vornherein energisch entgegentreten, so haben *Beely* und *Treves* empfohlen, diese Brüche nicht in gestreckter Stellung, sondern mit gebeugtem Knie, eventuell verbunden mit Suspension zu behandeln. Nun sind aber zuweilen die Weichtheile der Kniekehle so stark geschwollen oder

ist ein solcher Bluterguss im Kniegelenk vorhanden, dass die gewünschte Beugung unmöglich wird. Unter solchen Umständen hat *Bryant* die Tenotomie der Achillessehne vorgeschlagen, um die Gastrocnemii, die ja die Dislocation des untern Fragmentes aufrecht erhalten, zu entspannen. *Treves* hat dies Verfahren 3 mal angewendet und nachher die Gewichtsextension in Streckstellung, die ja dann möglich wird, ausgeführt.

Die Heftpflastergewichtsextension verbunden mit Suspension erreicht man in zuverlässiger Weise mit der *Beely*'schen Gypshanfschiene (s. Fig. 268). Bei unruhigen Patienten muss derselben stets noch ein Beckentheil hinzugefügt werden.

Besondere Schwierigkeiten bot in früheren Zeiten die Behandlung der Oberschenkelbrüche bei kleinen Kindern. Die Beschaffenheit der kindlichen Weichtheile am Oberschenkel, die meist bedeutende Völle des Leibes standen der Application des Gypsverbandes im Wege. Auch Schienenverbände, bestehend in 3 kleineren, rings um die Fracturstelle angelegten und einer grösseren vom Fuss bis zum Becken reichenden Aussenschiene, wurden schlecht vertragen, da sich die Kinder stets beschmutzten und so Eczeme und Excoriationen unter dem Verbande entstanden. Dieser Gefahren ist man jetzt überhoben, seitdem *Schede* gelehrt hat, die Extension in verticaler Suspension des Gliedes auszuführen (Fig. 305).


Fig. 305.



Man legt die Heftpflasterstreifen wie bei Erwachsenen an, flectirt das Bein im Hüftgelenk und belastet dann dasselbe mittels Gewichten, die über die Rolle eines am Bett befestigten Galgens laufen, so

stark, dass der Steiss eben noch auf der Matratze aufliegt. Das Körpergewicht bildet dann eine genügende Contraextension. Man bedarf bei dieser Art der Extension geringerer Gewichtsmengen. 4—8 Pfund werden stets ausreichen. Das Verfahren ist sehr bequem. Die Kinder können dauernd rein gehalten werden, und die Consolidation ist ausserordentlich schnell, meist schon nach drei Wochen vollendet. Es ist nicht nöthig, wie dies *Lentze* empfohlen hat, den Fuss und Unterschenkel erst mit einem Gypsverband zu versehen und an diesem eine Art Schleifbrett anzubringen. Im Gegentheil kann durch eine solche Complication leicht Decubitus entstehen.

Fig. 306.



Bei den intra partum acquirirten Oberschenkelbrüchen benutzt man den Rumpf als Schiene und befestigt den an und für sich schon gebeugten Oberschenkel durch circuläre Heftpflasterstreifen an demselben. Mit diesem Verband kann das Kind auch gebadet, also für die Reinlichkeit genügend gesorgt werden.

Wenn nun unter dem Extensionsverband die Consolidation eingetreten ist und der Patient sein Bein von der Unterlage aufheben kann, so ist es doch nicht zweckmässig, ihn gleich aufstehen und Gehversuche machen zu lassen. Der Callus könnte sich wieder biegen oder gar brechen. Man legt dann lieber noch für einige Wochen einen abnehmbaren Wasserglasverband an und sucht das Bein erst durch eine methodische Massage und leichte Gymnastik zu kräftigen.

Der Extensionsverband ist derjenige Verband, welchen wir für die Zwecke des praktischen Arztes unbedingt am meisten empfehlen.


Wir wollen aber nicht einseitig sein und müssen daher noch derjenigen Methode gedenken, welche sich die ambulante Behandluug der Oberschenkelbrüche nennt und die sich neuerdings viele Liebhaber erobert hat.

Der erste, der mit der Behandlung frischer Brüche des Ober- und Unterschenkels gute Erfolge erzielte, war *Hessing*. Er fixirte das gebrochene Bein in einem Leimverband und legte über diesen einen über einem Holzmodell angefertigten Schienenhülsenapparat an, der eine permanente Extension der Extremität bei richtiger Stellung der Fragmente gestattete. Figur 306 stellt einen solchen Apparat dar.

Nach *Hessing*'s Princip sind dann neuerdings den gleichen Zweck verfolgende Schienen von verschiedenen Aerzten empfohlen worden. *Dombrowski*, *Reyer*, *Selenkow*, *Thomas*, *Harbordt*, *Heusner*, *Liermann*, *Bruns* sind hier zu erwähnen. Alle diese Apparate erreichen aber nicht die Vollkommenheit der *Hessing*'schen Apparate, wenn sie auch unzweifelhaft in der Hand sachverständiger Aerzte gute Dienste zu leisten im Stande sind.

Diejenige Schiene, welche dem Praktiker wohl am meisten von Nutzen sein wird, ist die *Bruns*'sche Geh- und Lagerungsschiene. (Fig. 307.) Dieselbe besteht im Wesentlichen aus zwei seitlichen


Fig. 307.



Stäben, einem Sitzringe und einem Steigbügel. Das Bein ruht hinten auf einigen breiten Leinwandstreifen, die zwischen den für verschiedene Grösse einstellbaren Stäben ausgespannt sind; vorne geschieht die Befestigung mit einigen schmalen Gurten. Nehmen

wir einen Fall von Schrägbruch im oberen Drittel des Oberschenkels an, so wird die Schiene zunächst als Lagerungsapparat verwendet, um für zwei Wochen zuerst eine kräftige Extension ausüben zu können. An das Bein werden beiderseits Heftpflasterstreifen angeklebt, die durch Vermittelung von Bändern gegen den Steigbügel angezogen werden. An den Steigbügel wird ein Fussbrett befestigt, welches eine Rolle zum Ueberleiten der Gewichte trägt (Fig. 308).

Fig. 308.



Wie bei der gewöhnlichen Gewichtsextension werden nun die Gewichte angehängt. Nach etwa zwei Wochen wird die Extension entfernt, ein leichter Gypsverband von den Zehen bis zur Leiste umgewickelt und darüber die Schiene wieder angelegt. Nunmehr fällt das Fussbrett weg; der Steigbügel wird so gestellt, dass er etwas von der Fusssohle absteht, das Bein wird durch die Streifen gegen den Steigbügel gezogen, die Contraextension aber dadurch gebildet, dass der Sitzring sich gegen das Tuber ischii anstemmt.

Jetzt vermag der Patient in dem Apparat umherzugehen und ist somit nicht mehr an das Bett gefesselt.

Die vorherige starke Extension ist nur bei Schrägbrüchen nothwendig. Bei einfachen Querbrüchen kann der Apparat sofort als Gehapparat eingerichtet werden.

Korsch und *Dollinger* haben nun neuerdings das Bestreben gehabt, die ambulante Behandlung der Oberschenkelbrüche noch

mehr zu vereinfachen, jede Schiene fortzulassen und den Verband lediglich aus Gyps herzustellen.

Korsch legt den Gypsverband, wie bei Unterschenkelbrüchen auf die glatt rasirte Haut ohne weitere Polsterung so an, dass er, von der Zehenbasis bis zur Hüfte reichend, sich unten gegen die Malleolen, den Fussrücken und die Ferse, oben vermittelst eines Sitzringes aus Draht und Blech gegen das Tuber ischii anstemmt. So sehr sich die *Korsch*'sche Methode für manche Unterschenkelbrüche eignet, so möchte ich doch die Anwendung derselben für Oberschenkelbrüche im Allgemeinen widerrathen. Nur derjenige soll sich daran wagen, der die Gypsverbandtechnik durch und durch beherrscht.


Das gleiche, wie vom Gypsverband nach *Korsch* müssen wir auch von der Methode *Dollinger*'s sagen. Uebrigens hat *F. Krause* selbst, der die ambulante Fracturbehandlung mit dem Gypsverband wesentlich ausgebildet hat, die ambulante Behandlung der Oberschenkelfractur vermittelst des Gypsverbandes widerrathen.

Dollinger will, ebenso wie beim Unterschenkelbruch eine Suspension des extendirten Beines ambulant dadurch erreichen, dass er die Fusssohle dick polstert und der Gypssohle ausserdem noch einen Gypsabsatz hinzufügt.

C. Fracturen des unteren Femurendes.

Die Fracturen am unteren Ende des Femur bieten eine grosse Aehnlichkeit mit den Fracturen am unteren Ende des Humerus. Auch hier haben wir Quer- oder Schrägbrüche direct über den Condylen, traumatische Epiphysentrennungen, T- und Y-förmige Fracturen und Brüche eines oder beider Condylen. Dazu kommt dann eine Reihe **unvollständiger** Brüche. Es handelt sich bei denselben um F i s s u r e n, welche in der Regel in der Längsrichtung des Knochens verlaufen. Sie beginnen im Gelenk, gewöhnlich in der Mitte zwischen beiden Condylen, durchsetzen den Gelenkknorpel und eine mehr oder weniger lange Strecke der Epiphyse, reichen auch wohl in die Diaphyse hinein oder umgrenzen den grössten Theil eines Condylus (Fig. 309).

Fig. 309.




Diese Fissuren entstehen gewöhnlich durch eine in der Längsrichtung des Knochens wirkende Gewalt, welche die Gelenkfläche direct oder indirect trifft und entweder einen Theil des Gelenkendes abzusprengen oder wie ein Keil in dieselbe einzudringen sucht. So wirkt z. B. direct ein Fall auf die Condylen bei flectirtem Knie oder indirect ein Sturz aus der Höhe auf die Füsse. Im letzteren Fall sind es die Tuberositäten der Tibia, welche auf die Condylen des Femur auftreffen und dieselben auseinander treiben.

Die **Symptome** dieser Fissuren sind die einer schweren Contusion des Kniegelenkes. Nur ein durch Percussion des Knochens auf diesen selbst localisirter heftiger Schmerz könnte die Diagnose einigermassen sicher stellen.

Die **vollständigen** direct über den Condylen verlaufenden Brüche zeigen so ziemlich dieselben Verhältnisse wie die schon besprochenen Fracturen im unteren Drittel des Femurschaftes. Es sind häufig subperiostale Querbrüche, doch kommen auch Schrägbrüche mit von hinten und oben nach vorn und unten oder umgekehrt verlaufender Bruchlinie vor. Das untere Fragment wendet sich öfter nach hinten und oben als nach vorn. Im letzteren Fall kann das Diaphysenfragment in die Kniekehle gelangen und dort die grossen Gefässe und Nerven verletzen.

Fig 310.



Für die T- oder Y-förmigen Fracturen (Fig. 310) können wir auf die gleichen Fracturen am unteren Humerusende verweisen, nur dass jetzt die Patella die gleiche Rolle spielt wie dort das Olecranon. Bei all' diesen Fracturen, welche in der Regel wenigstens theilweise intracapsulär verlaufen, ist ein Bluterguss im Kniegelenk vorhanden.

Die **traumatischen Epiphysentrennungen** am unteren Femurende sind nach *P. Bruns* die häufigsten von allen Lösungen der einzelnen Epiphysen. Diese grosse Frequenz erklärt sich wohl daraus, dass die untere Femurepiphyse lange Zeit einen sehr beträchtlichen Umfang besitzt und dass sie erst spät, gegen das 20. Lebensjahr hin, verknöchert. Die Ursachen sind bedeutende

indirect wirkende Gewalten, wie Hyperextensionen, Lateralflexionen und gewaltsame Umdrehungen des Kniegelenkes.

Die Trennungslinie verläuft entweder genau entsprechend der Knorpelfuge (Fig. 311) oder verfolgt die Epiphysenlinie nur theilweise und wendet sich dann schräg in die Epiphyse selbst hinein

Fig. 311.





Fig. 312.



(Fig. 312). Die Verschiebung der Fragmente findet wieder meist in der Weise statt, dass das obere nach vorn, das untere nach hinten ausweicht. Dabei kann das letztere einen gefährlichen Druck auf die Gefässe der Kniekehle ausüben.

Die **Diagnose** wird sicher gestellt, wenn neben den anderen Fracturzeichen abnorme Beweglichkeit dicht über dem Kniegelenk, weiche knorpelige Crepitation, die genannte Dislocation der Fragmente vorhanden ist und die Verletzung sich bei einem jugendlichen Individuum zugetragen hat. In den meisten Fällen wird wohl die genaue Untersuchung in Narcose die Diagnose sichern und sind Verwechslungen mit einer Luxation der Tibia nach hinten kaum zu fürchten.

Die **Prognose** ist keine günstige. Selbst in dem Fall, dass knöcherne Heilung eintritt, bleibt doch für das spätere Leben die Gefahr einer Wachsthumshemmung zurück, denn das Hauptlängenwachsthum des Femur geht ja von dieser unteren Epiphyse aus. Die complicirten Verletzungen, die besonders bei Zerreissung der Gefässe und Nerven der Kniekehle bisher die Amputation des

Gliedes verlangten, werden wohl unter dem Schutze der Aseptik in Zukunft auch günstiger verlaufen. Wiederholt hat man so schon mit glücklichem Ausgang die Excision der Femurepiphyse vorgenommen.

Als Beispiel einer glücklich geheilten traumatischen Epiphysenlösung am unteren Femurende führen wir den 1889 beschriebenen Fall von *Mayo Robson* an. Ein 16 jähriger Knabe war am linken Knie von dem Hufschlag eines Pferdes getroffen worden. Das Bein war um mehrere Centimeter verkürzt. Das Knie stand leicht gebeugt; alle Bewegungen in demselben waren ausserordentlich schmerzhaft. Das Bein war stark angeschwollen. Diese Schwellung war die Folge der gestörten Circulation. Weder in der Art. tibialis antica noch der postica konnte ein Puls gefühlt werden. Man fühlte die untere Femurepiphyse deutlich in der Kniekehle und konnte leicht feststellen, dass durch die Bruchkante der Femurdiaphyse die Poplitealgefässe comprimirt wurden. In der Narcose wurde die Dislocation ausgeglichen, die Extremität auf der *Mac-Intyre*'schen Schiene gelagert und durch weitere Behandlung mit Massage eine vollkommene Heilung erzielt.

Die **Brüche der einzelnen Condylen des Femur** setzen immer eine sehr beträchtliche Gewalt-Einwirkung voraus. Dieselbe kann

Fig. 313.




Fig. 314.



direct erfolgen als ein Fall oder Schlag oder indirekt als Lateralflexion des Kniegelenkes, indem das Lig. laterale den Condylus abreisst. Die Querfracturen des Condylus, die wir gleich kennen

lernen werden, entstehen bei einer seitlich auf das Bein einwirkenden Gewalt durch Zug des einen Lig. cruciatum *(Braun)*.

Die Bruchlinien umgrenzen den Condylus entweder nahezu kreisförmig, oder sie beginnen in der Fossa intercondylica und gehen schräg durch die Epiphyse in die Diaphyse hinein (Fig. 313). Es kann auch wohl lediglich ein grösserer Theil der Gelenkfläche des Condylus abgesprengt sein, oder es kann ein Condylus in querer, frontaler Richtung abgebrochen sein und dann entweder in seiner normalen Stellung bleiben (*Braun*) oder nach hinten und oben dislocirt werden (*Rehn*).

Das abgebrochene Fragment kann durch das theilweise erhaltene Periost oder die nicht zerrissenen Lig. cruciata in seiner normalen Lage erhalten werden. In anderen Fällen steigt es seitlich und nach hinten in die Höhe (Fig. 314) oder gelangt auch wohl mehr nach vorn und hat dann je nach der Verschiebung gleichzeitig auch eine Drehung der Tibia nach innen oder aussen im Gefolge.

Die **Symptome** bei bestehender Dislocation sind Verbreiterung des Gelenkes, abnorme Beweglichkeit, Crepitation und eine abnorme Stellung des Unterschenkels. Indem nämlich die Tibia dem abgebrochenen Condylus folgt, entsteht bei Brüchen des Condylus internus ein traumatisches Genu varum, bei Brüchen des Condylus externus ein traumatisches Genu valgum. Der Unterschenkel zeigt dabei stets eine auffallende Beweglichkeit nach der Seite der Fractur hin.

Die **Prognose** ist dubia wie bei allen Gelenkfracturen. In Folge des intraarticulären Blutergusses kann eine fibröse Ankylose des Gelenkes zurückbleiben, es kann sich später eine Arthritis deformans entwickeln oder eine fehlerhafte Heilung in Varus- oder Valgusstellung erfolgen. Auch Pseudarthrosen wurden beobachtet, dadurch entstanden, dass sich ein Lappen der eingerissenen Gelenkkapsel zwischen die Bruchenden eingeklemmt hatte (*Trendelenburg*). Von 15 Unfallverletzten *Haenel's* wurden nach durchschnittlich $16\frac{1}{2}$ Monaten nur 5 geheilt; 9 blieben um durchschnittlich 25% dauernd geschädigt. Die Dauer der gänzlichen Erwerbsunfähigkeit betrug im Mittel 8 Monate.

Die **Therapie** aller der genannten Fracturen des unteren Femurendes besteht darin, dass man die Reposition und Retention der Fragmente in ihrer richtigen Stellung ausführt und Steifigkeit des Gelenkes zu verhüten sucht.

Die Reposition richtet sich ganz nach der bestehenden Dislocation. Man giebt dem Bein durch Zug und Gegenzug eine richtige Stellung, stellt das Kniegelenk in ganz leichte Beugung und drückt die Fragmente mit den Fingern in ihre richtige Lage. Besteht eine grosse Neigung zur Wiederkehr der Dislocation, so könnte man die Condylen durch Annagelung an ihrem Platze fixiren (*Trendelenburg*). Bei traumatischen Epiphysentrennungen mit starker Dislocation des unteren Fragmentes nach hinten könnte man vielleicht ebenfalls die aseptische Nagelung vornehmen wie bei den analogen Verletzungen am oberen Humerusende.

Die Fixation des Gliedes wird man, so lange noch beträchtliche Schwellung besteht, in einer *v. Volkmann*'schen T-Schiene erreichen. Besteht keine Schwellung oder ist dieselbe nach 8—10 Tagen verschwunden, so legt man am zweckmässigsten am leicht gebeugten Kniegelenk einen Gypsverband oder eine *Beely*'sche Gypshanfschiene an. Die permanente Extension würde sich nur dann empfehlen, wenn man über den Heftpflasterverband noch einen Gypsverband anlegt.

Für die Brüche direct über den Condylen gilt in gleicher Weise wie für die Brüche des unteren Femurschaftdrittels der *Bryant*'sche Vorschlag der Tenotomie der Achillessehne.

Besondere Sorgfalt muss man später, wenn nach 4—6 Wochen die Consolidation eingetreten ist, dem Kniegelenk zuwenden und durch Massage und Gymnastik für die Wiederherstellung seiner Beweglichkeit sorgen. Zuweilen ist auch noch nach der Heilung das Tragen einer stützenden Kniekappe anzurathen.

Brüche der Kniescheibe.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Die Kniescheibe, Patella, ist von vorn nach hinten abgeplattet und besitzt die Gestalt eines Dreieckes mit nach unten und ein wenig nach innen gerichteter Spitze. Ihre vordere Fläche ist rauh und durch die Haut gut hindurch zu fühlen. Ihre hintere Fläche ist überknorpelt und durch eine verticale Kante in zwei Felder getheilt, von denen das äussere dünner und breiter, das innere aber viel dicker ist. Der Knorpelüberzug hört am unteren Viertel

der Patella auf, so dass die Spitze etwa in einer Höhe von 2 und einer Breite von 4,5 Centimetern knorpellos ist. Dieser Theil der Patella dient dem retropatellaren Fettpolster zur Anlagerung und liegt vollständig extracapsulär. Brüche desselben würden also ebenfalls extracapsuläre sein (*Rödiger*).

Die Patella ist als Sesambein in die Quadricepssehne eingeschaltet und wird auf ihrer Vorderfläche von starken Fascien gedeckt. Da diese Weichtheile bei den Kniescheibenbrüchen eine grosse Rolle spielen, verdienen sie eine besondere Aufmerksamkeit. Präparirt man die Haut über dem Kniegelenk ab, so trifft man nach Durchschneidung einer zweiblätterigen, oberflächlichen Membran auf die eigentliche fibröse Fascie des Oberschenkels. Dieselbe heftet sich unterhalb und seitlich von dem äusseren Rande der Patella an die seitlichen Fasern der Quadricepssehne und an den sehnigen Ueberzug der Patella an und geht dann, sich mit dem Periost der Tibia verbindend, in die Fascia cruris über.

Entfernt man diese oberflächliche Fascie, so folgt jetzt eine fibröse Membran, welche den Sehnenbündeln des Quadriceps aufliegt und sich ebenfalls auf den Unterschenkel forterstreckt. Schliesslich erscheint die breite Sehne des Quadriceps selbst, welche sich an der Vorderfläche und den Seitenrändern der Patella inserirt und sich hier in drei grössere Züge spaltet. Der mittlere Zug, den man als die directe Fortsetzung der Sehne ansehen kann, geht als sehnige Aponeurose — Lig. patellae proprium genannt und innig mit der rauhen Vorderfläche der Kniescheibe verwebt — in das Lig. patellae inferius über, welches selbst wieder an der unteren Spitze der Patella entspringend, seinen Halt an der Tuberositas tibiae findet.

Von diesem mittleren Hauptstrang durch lockeres Bindegewebe geschieden liegen fibröse Faserzüge, welche den Vastus internus mit der Tibia verbinden. Ebenso lassen sich an der äusseren Seite festere Einlagerungen isoliren, welche sich an die Tibia ansetzen und sich weit hinauf in die Fascia lata verfolgen lassen (tendon du faisceau der Franzosen). Diese beiden seitlichen Verstärkungen der Aponeurose sind gewissermassen als ein Reservestreckapparat aufzufassen.

Die sehnige Ausbreitung des Quadriceps bildet so mit der Patella gewissermassen eine Kappe, welche das Knie an seiner vorderen Seite deckt. Wird diese Kappe abgehoben, so erscheint die Synovialschicht des Gelenkes, welche beiderseits noch durch

dünne, von der Patella bis zu den Condylen gehende Fasern, die sog. Seitenbänder der Kniescheibe, verstärkt wird.

Frequenz, Aetiologie und pathologische Anatomie.

Die Brüche der Kniescheibe sind im ganzen seltene Verletzungen. Sie betragen nach der Zusammenstellung von *P. Bruns* nur 1,3 % aller Brüche. Sie kommen dabei am häufigsten im mittleren Lebensalter (zwischen 30—50 Jahr), fast gar nicht im Kindesalter vor. Die rechte und linke Patella wird annähernd gleich häufig betroffen. Bezüglich des Geschlechtes ist eine bedeutende Bevorzugung des männlichen vorhanden. Das Verhältniss von Männern zu Frauen stellt sich so, dass die ersteren etwa viermal so häufig Fracturen erleiden als letztere.

Die Veranlassung der Kniescheibenbrüche kann eine directe Gewalt oder ein Muskelzug sein. Die Entscheidung über die Art der Entstehung ist nicht immer mit Bestimmtheit zu treffen, da die Aussage des Kranken gewöhnlich einen Fall auf das Knie angibt. Dieser Fall kann aber ebenso die Ursache der Fractur als die Folge des unmittelbar vorher durch Muskelzug entstandenen Kniescheibenbruches sein. Einen Anhaltspunkt zur Entscheidung hat man darin, dass die durch Muskelzug entstandenen Brüche in der Regel quere sind, während die directen Brüche entweder in der Längsrichtung verlaufen oder Stern- oder Splitterbrüche sind.

Die directen Brüche entstehen durch einen Schlag gegen die Patella, z. B. mit einem Pferdehuf oder durch einen Fall, wobei dann der Bruch meist so zu Stande kommt, dass die Patella auf einen hervorragenden Körper, in der Regel spitzige Steine, aufschlägt.

Etwa ein Fünftel *(Bähr)* aller Kniescheibenbrüche entsteht durch Muskelzug. Der Kranke strauchelt oder gleitet auf ebenem Boden aus, versucht, um das Fallen zu vermeiden, sich aufzurichten oder rückwärts zu beugen, und contrahirt zu dem Zweck plötzlich und heftig seinen Quadriceps.

Diese plötzliche Muskelanspannung reisst dann die Patella quer durch. Wir haben es also mit einem typischen Rissbruch zu thun. Viel seltener zerreisst der Muskel selbst oder das Lig. patellae.

Die reine Muskelwirkung kommt nur dann zur Geltung, wenn die Fractur bei gestrecktem Beine eintrat. Das kommt jedoch,

und zwar wohl nur dann, wenn die Festigkeit der Patella keine bedeutende ist, wenn also eine gewisse Prädisposition für die Fractur besteht, verhältnissmässig selten vor.

Weit häufiger ist, wie gesagt, das Kniegelenk im Augenblicke des Bruches gebeugt, dann verbindet sich der Muskelzug mit einer indirecten Gewalt. Bei der Beugung des Kniegelenkes ruht nämlich die Patella nur mit ihrer Mitte auf der Femurrolle auf. Ihr unterer und oberer Rand liegen gewissermassen hohl und werden durch das Lig. patellae einerseits und die Quadricepssehne andererseits fixirt. Das Lig. patellae zieht dabei den unteren Rand der Patella nach vorn und unten, die Quadricepssehne jedoch den oberen Rand nach hinten und oben, also in einem Winkel mit der Zugrichtung des Lig. patellae. Wird nun der Quadriceps plötzlich contrahirt, so wird die Patella zunächst auf die Condylen aufgepresst werden, und befindet sich dann in demselben Verhältniss wie ein Stab, den man über dem Knie zu beugen sucht. Sie bricht dann wie dieser in querer Richtung auseinander. Selbstverständlich kann dabei ein Fall auf das Knie die brechende Gewalt unterstützen. Dass bei diesem Mechanismus die Fractur in der Regel an der Uebergangsstelle des Kniescheibenkörpers in die Spitze der Kniescheibe liegt, hat seinen Grund darin, dass an dieser Uebergangsstelle der unterstützte Theil der Patella in den nicht unterstützten übergehe. Ausserdem prädisponirt aber auch noch die Anordnung der Spongiosabälkchen in der Patella zum Sitz der Fractur an der Uebergangsstelle, weil gerade hier sich der schwächste Theil des Knochens befindet (*Baehr*).

Eine besondere Entstehungsweise setzen gewisse indirecte Kniescheibenbrüche voraus, die man als Secundärfracturen bezeichnet. Es sind das diejenigen Fälle, bei welchen die Kniescheibe zur Zeit der Verletzung krankhaft verändert war, also eine pathologische Prädisposition bot. Die Patella besitzt dann entweder eine grössere Brüchigkeit (*Vrolik*), oder das betreffende Kniegelenk hat durch die vorausgegangene Kniescheibenerkrankung eine dauernde Verminderung seiner Brauchbarkeit erlitten, wodurch es wiederum leichter zu jenen typischen Unfällen kommt, welche Patellarfracturen erzeugen (*Maydl*).

Wenden wir uns zu den **pathologisch-anatomischen Charakteren** der Patellarfracturen, so ist bereits mehrfach betont worden, dass die durch Muskelzug entstehenden Brüche der Quere

n a c h verlaufen (Fig. 315). Der Bruch durchsetzt aber die Patella nicht vollständig transversal, es finden sich vielmehr gar nicht so selten auch l e i c h t s c h r ä g verlaufende oder b o g e n f ö r m i g e Bruchlinien. Der Bruch selbst sitzt dabei in der Regel dort, wo der Körper der Patella in die Spitze derselben übergeht. Ziemlich häufig ist bloss die Spitze der Kniescheibe abgerissen, so dass der Bruch e x t r a c a p s u l ä r liegt. Viel seltener wird nur ein Stückchen des oberen Randes im Zusammenhange mit der Quadricepssehne abgelöst.

Fig. 315.



Die Querbrüche können schliesslich auch u n v o l l k o m m e n e sein, d. h. nicht die ganze Dicke des Knochens durchdringen. So hat man schon Präparate gefunden, bei denen eine Zusammenhangstrennung bloss auf der hinteren Fläche sichtbar war. Möglicherweise entstehen derartige Infractionen durch einen heftigen Anprall gegen das untere Femurende. In anderen Fällen war die Fractur im Knochen eine vollständige, dagegen war der knorpelige Ueberzug der Gelenkfläche intakt geblieben.

Gelegentlich finden sich m u l t i p l e transversale Fracturen, durch welche die Patella in 3 oder 4 übereinander liegende Stücke getrennt wird (Fig. 316).

Fig. 316.



Sehr selten sind L ä n g s b r ü c h e. Die beiden Fragmente sind entweder gleich gross, oder eines ist breiter als das andere. Gelegentlich wird auch nur ein schmaler Theil des Randes abgesprengt. Die Ursache der Längsbrüche ist stets eine directe Gewalt.

Ebenfalls nur durch directe Gewalt entstehen die S p l i t t e r b r ü c h e der Patella (Fig. 317). Dieselben gehören zu den häufigsten Fracturen, denen dieser Knochen überhaupt ausgesetzt ist. Die Splitterung ist entweder eine ganz unregelmässige oder eine sternförmige, indem die Bruchlinien von einem Mittelpunkt

ausstrahlen, Sternbrüche, (Fig. 318), oder dergestalt, dass sog. T-Brüche entstehen. Kugeln schlagen oft ein einfaches Loch durch die Patella. Neben diesen Lochschüssen kommen jedoch auch Splitterschüsse vor.

Die Längs- und Splitterbrüche der Patella sind durch eine geringe Neigung zur Dislocation ausgezeichnet. Die Fragmente verschieben sich hier gar nicht oder nur unmerklich.

Fig. 317.





Fig. 318.



Anders gestaltet sich das Verhältniss bei den Querbrüchen, Auch hier bleiben die beiden Fragmente in gegenseitiger Berührung. wenn, wie das öfters der Fall ist, der sehnige Ueberzug der Kniescheibe erhalten ist. Ist die Aponeurose aber zerrissen, so folgt das obere Fragment dem sich contrahirenden Quadriceps, es entsteht eine Diastase der Fragmente. Dieses Klaffen derselben kann von wenigen Linien bis zu 10 und mehr Centimetern betragen. Die höchsten Grade finden sich dann, wenn sich der Querriss des Knochens noch in die seitlichen Weichtheile neben der Patella und in die Kniegelenkskapsel hinein erstreckt.

Auch eine starke Anfüllung des Kniegelenkes mit Flüssigkeit wird die Bruchstücke auseinander drängen. Ein solcher mehr oder weniger erheblicher Erguss findet sich aber in der Regel, indem das aus den zerrissenen Blutgefässen des Knochens und der Kapsel ausströmende Blut sich in das Gelenk ergiesst. Wir sagen in der Regel, denn es kann, wie *Riedel* zuerst gezeigt hat, der Bluterguss gelegentlich durch eine Sprengung des oberen Gelenkrecessus aus dem Gelenk heraus in die benachbarten Weichtheile, d. h. namentlich unter den Quadriceps hineingetrieben werden. Die beweisendste Beobachtung *Riedel*'s war folgende. Bei einer reinen Querfractur der Patella fanden

sich bei der Section im Kniegelenke nur wenige Blutgerinnsel. Dagegen war der obere Recessus an seiner Spitze an 2 Stellen in Gestalt zweier schlitzförmiger Oeffnungen perforirt. Von diesen aus erstreckte sich ein gewaltiger Bluterguss zwischen Vastus internus und den Knochen 20—25 cm weit an der Innenseite des Oberschenkels hinauf. Später kann dann zu diesem Hämarthros noch eine traumatische seröse Synovitis hinzukommen.

Zuweilen wird durch das eine oder andere Fragment die hintere Wand der Bursa praepatellaris verletzt, so dass dann das Blut auch in diesen Schleimbeutel eindringt und eine kugelige Vorwölbung desselben bedingt.

Neben der Diastase der Fragmente können dieselben auch seitlich gegeneinander verschoben oder auf die Kante gestellt sein, indem sich namentlich die Bruchfläche des oberen Fragmentes öfters gerade nach vorn oder gerade nach hinten wendet.

Besondere Aufmerksamkeit beansprucht bei den Querbrüchen das Verhalten der die Kniescheibe überziehenden Aponeurose. Dieses sehnige Gewebe auf der Patella ist elastischer als der Knochen. Denken wir uns nun den Knochen bereits gebrochen und sich zurückziehend, so lässt sich ein Moment vorstellen, in welchem die Aponeurose noch Stand hält und den Zwischenraum zwischen den Fragmenten überbrückt. Sie wird jetzt überdehnt, verliert damit ihre Elasticität und zerreisst schliesslich, wenn die Kraft gross genug ist, an einer tieferen Stelle als der Knochen. So entstehen verschieden lange Fetzen und Lappen überdehnten Gewebes, welche in die Oeffnung zwischen die Fragmente hineingepresst werden. Die Mehrzahl dieser Fetzen bleibt an dem oberen oder unteren Fragment hängen und wird durch den äusseren Luftdruck mechanisch an die Bruchzacken angespiesst. Einige Fransen tauchen auch wohl in das Gelenk ein. Andere Male hängt ein grösserer Lappen wie ein Vorhang zwischen den beiden Fragmenten herab. Gelegentlich findet man auch bandartige Streifen quer von einer Seite nach der anderen Seite des Gelenkes ziehend. Diese Streifen können dann sogar unter das obere Fragment herunterschlüpfen.

Die Kenntniss dieser sehr wichtigen Verhältnisse verdanken wir vor allen *Mac Ewen* und *König*. Ich habe persönlich das Verhalten

der Aponeurose experimentell untersucht und dabei die eben geschilderten, durch klinische Beobachtungen erhobenen Befunde bestätigen können. Von solchen Versuchen stammen die vorstehenden Abbildungen. Fig. 319 zeigt den Moment, in dem die Aponeurose noch erhalten ist. Dieser Zustand kann auch am Lebenden vorkommen. Wir haben dann den sogenannten sublligamentösen Patellarbruch. Zerreisst dann der fibröse Ueberzug, so ist die Ueberdehnung des Gewebes allerdings erstaunlich gross, so dass die einzelnen Fetzen das Doppelte und 3fache der normalen Länge erreichen können. Fig. 320 lässt am Rande des oberen Fragmentes deutlich die Grenze der Aponeurosenzerreissung erkennen, während

Fig. 319.





Fig. 320.



gleichzeitig ersichtlich ist, wie die unelastischen Fetzen und Lappen sich über das untere Fragment herübergelegt und sich an dessen Zacken angespiesst haben.

Besonders wichtig ist die Thatsache, dass beim Zerreissen der Weichtheile der Streckapparat nicht immer in seiner gesammten Breite betroffen wird. In der Regel verhält sich die Sache vielmehr so, dass nur der mittlere Theil einreisst, der Reservestreckapparat dagegen, d. h. die seitliche Verstärkung der Aponeurose durch fibröse Faserzüge, intact bleibt.

Das Lig. patellae inferius findet man im Vergleich mit der gesunden Seite stets etwas verkürzt.


Gelegentlich findet man beide Patellae gebrochen.

Complicirte Kniescheibenbrüche sind sehr selten. Sie erfolgen, abgesehen von den durch Schuss oder eine Hiebwaffe entstehenden Verletzungen hauptsächlich in der Weise, dass der Hufschlag eines Pferdes neben dem Knochenbruch noch eine Risswunde der bedeckenden Haut bewirkt oder ein Fall auf scharfkantige Steine oder Scherben stattfand oder das Kniegelenk überfahren wurde. Oft sind diese Fracturen dann noch weiter dadurch complicirt, dass fremde Körper — Sand, Steine u. s. w. in die Gelenkhöhle eingedrungen sind.

Symptome der Kniescheibenbrüche.

Die subjectiven Zeichen eines Kniescheibenbruches sind sehr ausgesprochene. Der Kranke fühlt in der Regel, wenigstens bei den durch Muskelzug entstandenen Brüchen, das Krachen des Knochens. Unmittelbar darauf stürzt er unter heftigen Schmerzen hin und ist dann ausser Stande, das verletzte Bein zu gebrauchen. Diese Gebrauchsstörung ist sehr eigenthümlich. Die Patienten vermögen sich vielleicht noch aufzurichten, doch ist das Gehen meist unmöglich. Zuweilen können sie sich in der Weise noch fortbewegen, dass sie das gesunde Bein vorsetzen und das verletzte gestreckt gehaltene nachziehen, indem sie gelegentlich die Unbeweglichkeit dieses letzteren durch Umfassen mit ihren Händen sichern. Befinden sich die Kranken in der Rückenlage, so ist ihnen das Erheben ihrer Ferse vom Lager unmöglich, sie helfen sich dann auch wieder durch Umfassen ihres Unterschenkels. Wenn auch das Vorwärtsgehen und das Treppensteigen unausführbar sind, so kann das Rückwärtsgehen zuweilen dadurch geschehen, dass sich der Oberschenkel auf die Hemmungsbänder der hinteren Kapselwand aufstützt.

Fig. 321.




Lassen die eben geschilderten Zeichen schon an einen Kniescheibenbruch denken, so sind die objectiven Fractursymptome auch so auffallend, dass die Diagnose meist unschwer zu stellen ist (Fig. 321).

Bei der Inspektion findet man den Unterschenkel in grösserer oder geringerer Flexion je nach der grösseren oder geringeren Zerreissung des fibrösen Ueberzuges. In den Vordergrund der Erscheinungen tritt sodann die Anschwellung des Gelenkes, die Folge des in dasselbe eingetretenen Blutergusses. Man sieht die Kapsel prall gespannt, besonders zu beiden Seiten der Patella, und nimmt dabei trotzdem die Vertiefung wahr, welche sich zwischen den beiden Fragmenten befindet. Mitunter ist allerdings gerade der auf der Patella liegende Schleimbeutel durch eine Blutansammlung stark ausgedehnt. Dann findet man über der Mitte des Gelenkes eine kugelige Vorwölbung. Anderemale setzt sich die Schwellung bei Perforation des oberen Recessus als brettharte Infiltration längs der innern Seite des Oberschenkels fort. Vor der Patella bildet sich auch meist eine ansehnliche Ecchymose aus.

Nach dem Gelenkerguss fällt am meisten die Dislocation der Fragmente auf, die man durch die Besichtigung, noch besser aber durch die Betastung erkennt. Je nach dem stärkeren oder schwächeren Klaffen der Bruchstücke ist die Diastase derselben durch die Haut hindurch kaum mit dem Fingernagel fühlbar oder aber so bedeutend, dass man bequem mehrere Finger zwischen die Fragmente einlegen kann. In jedem Falle wird das Klaffen der letzteren durch Beugung vermehrt (Fig. 322).

Fig. 322.



Auch bei Längsbrüchen, bei denen sonst keine Verschiebung besteht, kann eine solche durch Beugung des Gelenkes herbeigeführt werden, indem dann die an den Seitentheilen der Kniescheibe angehefteten Bündel der Mm. vasti angespannt werden.

Fühlt man bei Querbrüchen einen mässig klaffenden Spalt, so muss man sich vergewissern, ob dieser auch wirklich zwischen den zwei Fragmenten besteht. Man kann hier nämlich einer Täuschung insofern verfallen, als ein scheinbarer Spalt auch dann vorhanden sein kann, wenn eine mässige Blutung in den präpatellaren Schleimbeutel stattgefunden hatte. Der Rand dieses letzteren kann dann geschwollen, seine Mitte aber weich sein, wodurch dasselbe Gefühl der Depression vorgetäuscht wird, wie wir es schon bei den Schädelbrüchen kennen gelernt haben.

Neben dem Klaffen der Fragmente ist durch die Palpation eine seitliche Verschiebbarkeit, zuweilen auch eine Kantenstellung derselben nachweisbar, dagegen wird man die Bruchenden nicht immer so einander nähern können, um Crepitation hervorzurufen.

Nur bei sehr bedeutender Schwellung der ganzen Kniegegend könnte man zweifelhaft sein, ob im gegebenen Falle nicht nur eine einfache Contusion des Kniegelenkes vorliegt. Hier wird sich die Diagnose in der Narkose stellen lassen, auch ohne Zuhilfenahme der von *Middeldorpf* für solche Fälle empfohlenen Acupunkturnadel.

Prognose und Verlauf der Kniescheibenbrüche.

Ueberlässt man einen Kniescheibenbruch sich selbst, so gestaltet sich der Verlauf meistens so, dass die Anschwellung des Gelenkes innerhalb der ersten Wochen immer mehr und mehr verschwindet und sich die von einander abstehenden Fragmente einander nähern. Findet dann keine ärztliche Behandlung statt, so pflegen sich die Fragmente nicht zu vereinigen, und es bleibt dann auch jede noch so schwache Extensionsbewegung ausgeschlossen. Während die Resorption des Gelenkergusses vorschreitet oder durch gewisse therapeutische Maassnahmen beschleunigt wird, kann bei den sogen. subligamentösen Fracturen, bei denen die Fragmente in direkter Berührung bleiben, im Laufe von 30–40 Tagen eine knöcherne Vereinigung derselben stattfinden. Wir wissen dies nach den Erfahrungen, die mit der *v. Volkmann*'schen Methode der Knieresection mit querer Durchtrennung der Patella gemacht wurden; denn hier heilt die Patella so gut wie ausnahmslos wieder knöchern zusammen. Aber auch Fracturpräparate selbst beweisen die Möglichkeit der knöchernen Heilung. Wir bilden z. B. einen Fall der Tübinger Klinik ab, in welchem die Callusbildung so

exact erfolgte, dass man später die Bruchstelle nur an einer Einsenkung an der vorderen Fläche, einem etwas dichteren Gefüge der Spongiosa, sowie einem keilförmigen Defecte des Knorpelüberzugs erkennen konnte (Fig. 323). Ein anderes schönes Bei-

Fig. 323.



Fig. 324.



spiel knöcherner Heilung (Fig. 324) entstammt der Beobachtung *Bryant*'s.

Eine solche knöcherne Heilung ist auch die Regel bei den Längs- und Splitterbrüchen der Patella. Sie bleibt dagegen aus bei allen denjenigen Querfracturen, bei denen es nicht möglich ist, die Fragmente in dauernder Apposition zu erhalten, oder bei denen dieselben von vornherein weit klaffen. Bei allen diesen Brüchen kommt es nur zur Heilung durch eine fibröse Zwischensubstanz (Fig. 325). Dabei können aber die beiden Bruchstücke beträchtlich hypertrophiren, so dass schon eines derselben den normalen Umfang der Patella erreicht.

Fig. 325.



Zuweilen glaubt man am Lebenden eine vollständig knöcherne Heilung erzielt zu haben, wird dann aber durch die Section eines Besseren belehrt. So theilte kürzlich noch *Bogdanik* einen einschlägigen Fall mit, in dem statt des erwarteten Callus sich ein 2—3 mm breiter weisslicher Streifen von knorpeliger Consistenz darbot.

Der Grund der mangelnden Callusbildung bei Patellarbrüchen ist in verschiedenen Verhältnissen gesucht worden. *A. Cooper* beschuldigte die geringe Knochenproduktionsfähigkeit der Kniescheibe, deren Blutgefässe mangelhaft entwickelt seien und die kein eigentliches Periost, sondern nur einen sehnigen Ueberzug besitze. Dieser Grund ist nicht stichhaltig! Tritt doch die knöcherne Heilung ein bei Längs- und Splitterbrüchen, bei der zum Zweck der Kniegelenksresection querdurchsägten Patella, findet doch öfter eine Regeneration nekrotisch abgestossener Patellarfragmente nach complicirter Fractur statt und finden sich endlich auch bei sonst fibröser Verbindung nicht gar so selten knöcherne Inseln und stalaktitenartige Auswüchse in dem Bindegewebe.

Man kam so darauf, anzunehmen, dass lediglich und allein die Diastase der Fragmente, die Schwierigkeit, dauernd Knochen gegen Knochen zu erhalten, die Ursache der Pseudarthrosenbildung sei. Hier hatte man nun wieder mit den Ursachen der Diastase zu rechnen. Die Retraction des Quadriceps, die unmittelbar nach der Verletzung erfolgt, hört bald wieder auf und ist in der Narkose jedenfalls leicht zu überwinden. An dem Quadriceps konnte daher nicht die Hauptschuld liegen, und es wurde deshalb der intraarticuläre Bluterguss, der bei einigermassen beträchtlicher Grösse die Fragmente klaffend erhalten muss, als hauptsächlichstes Hinderniss für die Callusbildung angesehen.

Unzweifelhaft kommt diesem Bluterguss eine grosse Bedeutung in der angeregten Frage zu. Er ist aber nicht der alleinige Grund, dass in manchen Fällen ungeachtet einer sehr sorgfältigen Behandlung die Callusbildung vereitelt wird. In diesen Fällen kommt dasjenige Verhältniss in Betracht, das uns *Mac Ewen*, *König* u. A. gelehrt haben: Die Zwischenlagerung und Anspiessung der sehnigen Aponeurose der Patella an die Bruchflächen. Durch die Einschaltung dieses Gewebes wird die zur Callusbildung nothwendige Berührung der Knochen selbst mit einander verhindert, und es entsteht die Pseudarthrose in gleicher Weise, wie sie sich z. B. am Oberschenkel nach Interposition eines Muskelbauches entwickelt. Entfernt man dieses Gewebe durch Operation und bringt nachher die Knochen durch die Naht in Berührung, so tritt nunmehr knöcherne Heilung ein.

Fibröse Heilung ist also bei den auf unblutigem Wege behandelten Kniescheibenbrüchen die Regel. Selten kommt es

zwischen den beiden Fragmenten zur Ausbildung eines wirklichen falschen Gelenkes.

Die fibröse Zwischensubstanz kann nur wenige Millimeter breit und straff, aber auch mehrere Centimeter lang und sehr schlaff sein. So fand sich z. B. in einer Beobachtung *Brunner*'s bei einer Diastase von $7\frac{1}{2}$ cm eine fibröse Zwischenmasse zwischen den Fragmenten, die mit der verdickten Fascie fest verschmolzen war und dicht an den Fragmenten $\frac{3}{4}$ cm, in der Mitte 4 mm Dicke besass. In einem anderen Fall, den *Körte* beschrieben hat, war bei einer Diastase von 5—6 cm eine etwa 3 mm dicke fibröse Zwischenmasse vorhanden. Dieselbe wurde gebildet von den normaler Weise vor der Patella liegenden Sehnenfasern (Fascia lata, Sehnenfasern von der Strecksehne), sodann von Fasern, die direct aus der Bruchfläche hervorkamen und endlich von der das Band inwendig deckenden Gelenkkapsel. In manchen Fällen wird eine solche ursprünglich schlaffe Verbindung mit der Zeit straffer, in der Regel aber wird sie mit dem Gebrauche des Gliedes mehr und mehr verlängert.

Wie steht es nun mit der Brauchbarkeit des Gliedes bei einer solchen langen Zwischensubstanz? Man hat bis vor Kurzem die „schlecht geheilten" Fälle, die nach der Entlassung aus der Behandlung nur mit Hülfe eines Stockes, einer Krücke oder einer Kniekappe gehen konnten und das stetige Gefühl der Unsicherheit beim Aufrechthalten zeigten, immer auf Rechnung der schlaffen Pseudarthrose gesetzt. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass dem nicht so ist. Das functionelle Resultat der Patellarfracturen ist keineswegs von dem Grade der Diastase abhängig. Man hat eine grosse Reihe von Fällen zusammengetragen, in denen bei geringer Diastase der Gang hinkend und unsicher war, während bei anderen eben so zahlreichen trotz eines Abstandes der Fragmente von 10, 12 und mehr Centimetern der Gebrauch des Gliedes sich so gut wie normal erwies.

Die Erklärung dieser letzteren Thatsache ist eine einleuchtende. Zunächst ist durch die Einschaltung der fibrösen Zwischensubstanz die Sehne des Streckmuskels verlängert und entspannt. Je länger die Zwischensubstanz ist, um so geringer wird der Streckwerth bei der Zusammenziehung des Muskels sein. Allein unter dem Einfluss des wiederaufgenommenen Gebrauchs des Gliedes macht sich das Gesetz geltend, das man als Selbstregelung der Muskellänge bezeichnet. Nach diesem Gesetz vollzieht sich eine allmähliche Schrumpfung und Verkürzung der Muskelfasern,

bis dieselben im Zustande der Contraction die normale Spannung erreicht haben. Dann ist die Verlängerung der Sehne ausgeglichen und der Quadriceps wieder in annähernd normaler Weise thätig. Die Natur hilft sich hier ebenso, wie sie dies nach Zerreissung des Streckmuskels selbst oder des Ligamentum patellae thut. Neben der Retraction der Quadricepsfasern hilft dann auch die sich stets findende Verkürzung des Lig. patellare die Verlängerung des ganzen Streckapparates ausgleichen. So fand *Brunner* das Band um gut 4 cm gegen das der anderen Seite geschrumpft.

Die Function des Beines nach einer Patellarfractur hängt ferner wesentlich auch vom Grade der Zerreissung der Weichtheile ab, welche die Patella mit dem Unterschenkel verbinden. Selbst wenn die Wirkung des Quadriceps völlig ausgeschaltet ist, kann nämlich die Streckbewegung im Kniegelenk noch ganz gut geschehen, wenn auf der innern Seite des Gelenkes die Faserzüge noch erhalten sind, welche vom Vastus internus nach der Fascia cruris hinziehen, und wenn auf der äusseren Gelenkseite die Faserzüge intact sind, welche vom Tensor fasciae latae nach dem Unterschenkel hinziehen, kurz wenn der Reserveapparat für die Streckung noch erhalten ist (*v. Bergmann, Brunner, Körte*). Dieser Reservestreckapparat kann dann im Laufe der Zeit recht ansehnlich hypertrophiren und so wieder ein annähernd normales Streckvermögen zu Stande bringen.

Selbst bei starker Diastase kann demnach durch Schrumpfung der Quadricepsfasern, durch Schrumpfung des Lig. patellare und durch Hypertrophie des erhaltenen Reservestreckapparates eine gute Function des Beines gewährleistet werden.

Wenn demnach die Dislocation der Fragmente nicht die Schuld trägt an der Unbrauchbarkeit des Gliedes, wie man sie zuweilen findet, so muss man nach andern Gründen suchen, weshalb selbst bei mässiger Diastase die Streckfähigkeit des Beines unvollständig und ganz unmöglich, das Gehen unsicher und beschwerlich sein kann.

Hier können wesentlich drei Verhältnisse eine Rolle spielen: 1. eine Atrophie des Quadriceps, 2. ein vollständiger Mangel jeder fibrösen Zwischensubstanz zwischen den Fragmenten und 3. eine feste Verwachsung des oberen Fragmentes mit der Vorderfläche des Femur.

Alle drei Vorkommnisse, von denen wir das erste bereits durch *Malgaigne* kennen, die letzteren jedoch besonders durch *P. Bruns* erfahren haben, können auch wohl gelegentlich nebeneinander vorkommen.

Die Atrophie des Quadriceps beruht wohl hier und da auf einer gewaltsamen Zerrung und Quetschung des Muskels selbst oder auf einer anhaltenden Unthätigkeit desselben während der immerhin langen Dauer der Fracturheilung, der Hauptsache nach ist sie aber, wie ich nachgewiesen habe, ebenso wie alle anderen arthritischen Lähmungen als eine reflectorische aufzufassen.

Was das Ausbleiben einer fibrösen Vereinigung der Fragmente betrifft, so wurde dasselbe beobachtet bei schwächerer und stärkerer Diastase der Fragmente. Die Bruchflächen liegen dann ganz frei, und die Verbindung beider Fragmente wird nach den Präparaten von *Adams*, *Berger*, *Ssalischschew* u. A. nur vermittelt durch die verdickte oberflächliche Fascie, welche seitlich in den Bandapparat des Kniegelenkes übergeht. Der Mangel einer solchen Zwischensubstanz lässt sich auf zweierlei Weise erklären. In der einen Reihe von Fällen bildet sich bei der Heilung der frischen Fractur von vorneherein keine Vereinigung der Fragmente. Das Hinderniss kann darin liegen, dass die Bruchflächen weit von einander abstehen oder einander nicht gegenüber liegen, sondern nach vorn oder hinten gekehrt sind, oder es liegt darin, dass sich die vorher besprochenen Gewebstheile zwischen die Bruchflächen eingeklemmt haben. In einer anderen Reihe von Fällen bleibt die Wiedervereinigung erst nach einer erneuten Fractur aus. Solche Refracturen aber können sowohl in der seit der ersten Fractur bestehenden ligamentösen Zwischensubstanz als in den beiden Fragmenten selbst erfolgen. Sie gehen nicht selten einher mit einer Zerreissung der bedeckenden Haut.

Beim Mangel einer Zwischensubstanz muss nun aber die Streckbewegung nicht jedesmal aufgehoben sein. Sie kann vielmehr auch dann noch durch Vermittlung der seitlichen Verstärkungsbänder des Kniegelenkes und der derben Faserzüge stattfinden, welche vom Vastus externus und internus, sowie vom Tensor fasciae latae an die Tibia und die Seitenränder des unteren Fragmentes herantreten.

Was schliesslich die Anheftung des oberen Fragmentes an die Vorderfläche des Oberschenkels be-

trifft, so kann diese dadurch entstehen, dass bei der Anspiessung des aponeurotischen Ueberzuges durch die Bruchflächen die Fransen und Fetzen des ersteren mit der hinteren Kapselwand verwachsen.

Durch eines oder das andere der genannten Verhältnisse wird also die Unbrauchbarkeit des Beines erklärt. Damit ist aber die Zahl der Störungen noch nicht erschöpft, welche nach Kniescheibenbrüchen zurückbleiben können. Wir haben vielmehr noch zu erwähnen, dass sich im Anschluss an den Gelenkerguss zuweilen eine hyperplasirende Entzündung entwickelt, durch welche die Gelenkfläche der Patella sowohl wie die des Femur und der Tibia mit zottigen Wucherungen bedeckt wird. Die Kranken fühlen dann bei Bewegungen des Gelenkes ein knarrendes Geräusch. Anderemale kommt es zu einer wirklichen Arthritis deformans, ja sogar, besonders nach complicirten Brüchen, zu einer vollständigen Ankylose des Gelenkes. Sehr oft bleibt anhaltender Schmerz im Gelenk zurück und ebenso die Neigung zu lang andauerndem Oedem des Gliedes.

Selbst in den günstig verlaufenden Fällen bleibt für die erste Zeit meistens eine gewisse Steifigkeit des Gelenkes bestehen. Die vollständige Bewegungsmöglichkeit desselben kehrt in der Regel erst nach Monaten und Jahren zurück. *Baehr* hat kürzlich 46 Fälle von Kniescheibenbrüchen mitgetheilt. Von diesen waren nur 4 völlig abgelaufen, während 42 Patienten nach einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von etwa 50 Monaten noch eine Rente von durchschnittlich 34 $^0/_0$ bezogen. Die Schwäche, welche das ursprünglich verletzte Bein zurückbehält, und die dadurch erforderlichen grösseren Anstrengungen, welche das andere Bein zu machen hat, führen nicht allein zu den vorher schon genannten Refracturen, sondern auch dazu, dass der Patient leicht auch noch die andere Kniescheibe zerbricht.

Ein besonderes Interesse beanspruchen die

Refracturen der Patella.

Eine Patella, die einmal gebrochen, bricht nicht selten noch einmal. Entweder ist die Ursache der Refractur eine directe Gewalt oder der Muskelzug. Der Mechanismus des Bruches ist in beiden Fällen der gleiche wie beim frischen Bruch. Die meisten Refracturen ereignen sich bei den ersten Gehversuchen oder in

nicht zu langer Zeit nach der ersten Fractur. Es kommen aber auch Fälle vor, wo der zweite Bruch erst nach Jahren eintritt.

Stumpff hat 1894 die Refractur der Patella, die durch Muskelzug entstanden war, ausführlich behandelt. Er fand nahezu 30 derartige Fälle genauer beschrieben.

Beim zweiten Bruch reisst entweder die fibröse Zwischensubstanz durch, oder die Fractur findet in einem der beiden Fragmente statt. Wenn die Refractur im ersten Jahre nach dem ersten Bruch statthate, so handelt es sich fast ausnahmslos um eine Zerreissung der Zwischensubstanz, kommt der zweite Bruch dagegen später zu Stande, so ist meist eines der alten Patellarfragmente betroffen und zwar in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle das obere. Diese letzteren Fälle geben eine bessere Prognose, als die unter Ruptur des fibrösen Callus einhergehenden Fälle. Auch hier handelt es sich für die Prognose wesentlich darum, ob der Reservestreckapparat des Gelenkes erhalten ist. Ich habe kürzlich durch die Massagebehandlung bei einem schweren Fall von Refractur mit starker Quadricepsatrophie ohne Erhaltung des Reserveapparates einen sehr guten Erfolg erzielt.

Therapie der Kniescheibenbrüche.

Für die Behandlung der Kniescheibenbrüche ist eine gleich grosse Anzahl von Methoden angegeben worden, wie für die Schlüsselbeinbrüche, wieder ein Beweis, dass keine Methode alles zu leisten vermag. Wir brauchen nicht alle Verbandarten aufzuzählen, können uns vielmehr damit begnügen, nur die Mittel und Wege anzugeben, welche wirklich rationell sind.

Die Indicationen, denen die Behandlung gerecht werden muss, sind: 1. die Beseitigung des Gelenkergusses, 2. die Coaptation der Fragmente, 3. die Retention der Fragmente bis zur erfolgten Consolidation, 4. die Bekämpfung der Quadricepsatrophie und 5. die Wiederherstellung der Functionen des Kniegelenkes.

Zur Erreichung dieser Ziele stehen uns im Allgemeinen drei Gruppen von Behandlungsweisen zur Verfügung: 1. Die passende Lagerung der Extremität in Verbindung mit der Immobilisation derselben und gewissen Verbandarten, 2. die Massagebehandlung und 3. operative Eingriffe.


Wir wollen diese Gruppen in der Weise betrachten, dass wir jeder einzelnen Behandlungsweise sogleich ihre Kritik folgen lassen. Der denkende Arzt wird sich dann selbst sein Urtheil bilden und sofort erkennen, dass er nicht nach der Schablone handeln kann, sondern in jedem einzelnen Falle individualisiren muss.

Da die passende Lagerung des Beines allen Behandlungsarten gemeinschaftlich ist, so gebührt ihr bei dieser Besprechung der Vorrang. Sie hat den Zweck, den Quadriceps zu erschlaffen. Dies geschieht aber am besten in der Weise, dass man das Bein auf eine einfach geneigte schiefe Ebene legt, dadurch die Ferse etwa 20 cm über das Lager erhebt und gleichzeitig den Rumpf in eine halbsitzende Stellung bringt.

Die Entspannung des Quadriceps soll die Coaptation der Fragmente gestatten. Sie thut dies jedoch nur dann, wenn das Kniegelenk annähernd leer ist, denn sobald sich in diesem auch nur ein einigermassen beträchtlicher Bluterguss befindet, ist es unmöglich, die Bruchflächen an einander zu passen. Dieselben schaukeln dann vielmehr auf dem Erguss und legen sich, wenn man sie einander entgegenführt, nicht etwa an einander, sondern sie „kanten" sich, so dass sie sich weiter von der Mitte des Femur entfernen.

Es kommt also darauf an, den Gelenkerguss zu beseitigen. Zu diesem Zwecke dient besser als das Auflegen einer Eisblase die Anlegung eines Compressivverbandes mit Flanell- oder noch zweckmässiger mit elastischen Binden, wobei man stets eine *v. Volkmann*'sche Poplitealschiene oder eine *Watson*'sche Schiene (Fig. 326) anwenden muss, um einen Druck auf die Gefässe der Kniekehle zu vermeiden. Durch einen


Fig. 326.



solchen elastischen Compressivverband gelingt die Resorption des Blutes durchschnittlich innerhalb 8—14 Tagen, und nun ist es möglich, die Fragmente einander zu nähern. Sie werden mit den Fingern zusammengedrückt und in ihrer richtigen Lage durch

eine Testudo genu inversa oder dachziegelförmig sich deckende Heftpflasterstreifen, die man nach *Alcock* wie bei dem gebrochenen Olecranon anlegt, fixirt. Practischer als diese einfachen Verbände ist der *v. Bramann*'sche „Schmetterlingsverband" (Fig. 327). Dieser letztere besteht aus zwei ganz gleichen Verbandstücken: An ein ca. 5 cm langes und 4 cm breites, starkes, aber gut dehnbares Gummistück ist auf den beiden schmäleren

Fig. 327.



Seiten je ein ca. 25 cm langer sich etwas verbreiternder Heftpflasterstreifen so angenäht, dass Heftpflasterstreifen und Gummi einen Winkel von etwa 165 Grad bilden, dass also das ganze Verbandstück in der That an einen Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln erinnert. Dieser Verband wird so angelegt, dass ein Gummistück oberhalb des oberen, das andere unterhalb des unteren Fragmentes angelegt wird. Die Heftpflasterstreifen laufen dann wie die Touren der Testudo, um sich auf der Hinterseite der Wade resp. des Oberschenkels zu kreuzen. Beide Schmetterlinge werden durch Binden-

touren fest fixirt. Man legt das Bein zunächst in eine *v. Volkmann*'sche Schiene, die bis zum obern Drittel des Oberschenkels reicht. Beim Anwickeln der Schiene lässt man die Gegend des Kniegelenkes frei und klebt die Heftpflasterstreifen auf der Hinterseite der Schiene fest. So vermeidet man am besten einen Druck auf die Gefässe der Kniekehle. Sind die Streifen locker geworden, so müssen sie wieder fester angezogen werden.

Complicirter als dieser Verband ist die *Heusner*'sche Vorrichtung der Fixation der Fragmente in ihrer richtigen Stellung zu einander. *Heusner* verwendet Gummizüge, deren Anordnung besser als durch viele Worte durch die beistehende Figur erläutert wird (Fig. 328). Ueber diese Verbände legt man dann wohl noch einen Gypsverband, den man nach acht Tagen erneuern muss, um die gelockerten Streifen wieder straffer anzuziehen. Der Contentivverband bleibt 6—7 Wochen liegen. Den Patienten wird nicht gestattet, vor der achten Woche zu gehen; dann aber beginnen vorsichtige Beuge- und Streckversuche.

Fig. 328.



Diese Behandlungsweise, wie sie eben geschildert worden, ist diejenige, welche bis vor kurzer Zeit die geläufige war. Die Resultate, die man mit ihr erzielte, sind von *Brunner*, *Ruland*, *Beck*, *Brümmer*, *Bull* u. A. erforscht, worden, indem dieselben die Patienten nach Jahren wieder untersuchten. Uebereinstimmend fanden sie, dass niemals eine knöcherne Heilung eingetreten war, ausser bei subligamentösen Fracturen, dass vielmehr eine fibröse Zwischensubstanz in der Länge von 1—2 cm die Regel bildete, dass dieselbe bisweilen aber auch 5 und mehr cm betrug. Das aktive Extensionsvermögen war meistens ein vollkommen normales, weniger dagegen das Beugungsvermögen. Die Patienten waren gewöhnlich mit wenig biegbarem Knie entlassen worden. Die Beugefähigkeit besserte sich dann im Laufe der Jahre, wurde jedoch nie eine vollständige. Die Gebrauchsfähigkeit des Gliedes stellte sich stets erst sehr langsam wieder her, meistens verging darüber ein halbes bis ein ganzes Jahr. Neben diesen günstigen Fällen fand sich aber auch eine ganze Reihe von solchen, die wir oben als schlecht geheilt bezeichnet haben.

Wir haben vorher als eine Indication aufgestellt die Beseitigung der Quadricepsatrophie, sahen aber, dass bei der eben genannten Lagerungs- und Verbandmethode auf den Quadriceps überhaupt keine Rücksicht genommen wurde. Man betrachtete es früher geradezu als ein günstiges Zeichen, wenn der Quadriceps sich schlaff anfühlte, da dies ja die bezweckte Entspannung bedeutete, und man beachtete nicht, dass dieses weiche widerstandslose Gefühl unter dem Fingerdruck und die Undeutlichkeit der Contouren bei versuchter Contraction die Zeichen der beginnenden Atrophie waren. Sobald man den wahren Thatbestand erkannte, versuchten einige Chirurgen auch die Behandlung dieser Atrophie und zwar durch Faradisation und Massage. Die Faradisation erzielte in einzelnen Fällen gute Resultate. Dieselben wurden aber übertroffen von denen der Massage. Das Verdienst, diese letztere in die Therapie der Patellarfracturen eingeführt zu haben, gebührt *Metzger*, *Tilanus* und *Ruland*.

Die Massagebehandlung nimmt keine Rücksicht auf die Vereinigung der Fragmente, sie will die Patienten möglichst früh zu Gehversuchen sowie activen und passiven Bewegungen des Kniegelenkes führen und die Steifheit des Gelenkes, die Kapselschrumpfung und die Atrophie der Muskeln gar nicht zu Stande kommen lassen.

Sie wird nach *Tilanus* in folgender Weise geleitet. Der Kranke wird in's Bett gelegt, die geschädigte Extremität hoch gelagert und immobilisirt. Am ersten Tage werden nur kalte Compressen aufgelegt, einerseits um durch die Kälte die intraarticuläre Blutung zu stillen, andererseits um die Patienten empfindungsloser gegen den Schmerz zu machen. Am nächsten Tage wird zum Zwecke der Resorption des Blutergusses das Knie mit einer elastischen Binde umwickelt, und gleichzeitig beginnt — zweimal innerhalb 24 Stunden — die Massage des Oberschenkels. Die linke Hand drängt das obere Fragment nach unten, die rechte Hand macht aus dem Handgelenk klopfende und knetende Bewegungen (Tapotement und Pétrissage) in der ganzen Ausdehnung der Streckmuskulatur bis hinab in die seitlichen Kniegelenksregionen. Die Massage dauert 10 Minuten. Bald werden mit der Massage active und passive Bewegungen combinirt. Nach 8 Tagen muss der Kranke aufstehen und Gehversuche machen. Nach 14 Tagen ist dann das Gehen schon so leicht, wie bei den durch Immobilisation behandelten Fällen erst nach 2 Monaten. Die durchschnittliche Dauer der Behandlung beträgt 40 Tage.

Trotz der frühzeitigen Bewegungen vergrössern die Fragmente nicht ihren Abstand. Im Gegentheil nähern sie sich mit der Resorption des Blutergusses, und zum Schlusse ist ihre Entfernung viel geringer als bei anderen Methoden.

Diesen Vortheil, die kurze Dauer der Behandlung, die Möglichkeit, diese letztere auf die einfachste Weise durchzuführen, so dass sie jeder Arzt leicht verwenden kann, und schliesslich die guten functionellen Resultate rühmt *Tilanus* als Vorzüge seines Verfahrens. Die functionellen Erfolge der Massagebehandlung sind gute. *Tilanus* erreichte in seinen sechs Fällen vollständige Streckfähigkeit und active Beugungsmöglichkeit bis zu 60°. Gleich günstige Erfahrungen haben auch *Helferich, v. Bergmann, Wagner, König, Rosenbach, Körte, Hagedorn, v. Mosetig, zum Busch* und gewiss noch viele Andere gemacht. Sehr viel kommt es natürlich, wie bei allen Gelenkbrüchen, auf den guten Willen und die Energie des Kranken an. Je mehr der Patient mithilft, desto eher wird er geheilt, und desto besser ist das Resultat.

Immerhin liegt die Gefahr nahe, dass hier und da Misserfolge eintreten können. Der Erfolg bei Kniescheibenbrüchen hängt doch wesentlich ab von dem Zustandekommen oder dem Ausbleiben der Vereinigung der Fragmente. Die Sorge für letztere muss daher stets die erste Aufgabe einer rationellen Therapie der Kniescheibenbrüche sein. Jedenfalls ist der Gedanke von *Tilanus* ein ausserordentlich glücklicher, und die Massage des Quadriceps wird unter allen Umständen ein wirksames Beförderungsmittel zur Erhaltung der activen Gebrauchsfähigkeit des Gliedes sein. Wir möchten sie nur nicht in den Vordergrund der ganzen Behandlung stellen, sondern sie nur als frühzeitiges Hilfsmittel verwenden, nachdem man vorher die Bruchflächen nach Kräften durch die vorhergenannten Mittel, zweckmässig namentlich durch den beschriebenen *v. Bramann*'schen Verband, gegen einander fixirt hat.

Diese genaue Fixation der Bruchflächen gegen einander bezwecken auch alle die operativen Eingriffe, von denen wir die Punction des Gelenkes, die Anwendung unmittelbarer Retentionsapparate, die Sehnennaht, die sogen. Peripatellarnaht, die Arthrotomie und Naht der Bruchenden und schliesslich die subcutane bleibende Metallnaht kennen.

Die Punction des Gelenkes wurde von *v. Volkmann* eingeführt. Dieselbe strebt die möglichst frühzeitige Entfernung


des Blutes aus dem Gelenke an, von der Anschauung ausgehend, dass der Hämarthros einmal die Vereinigung der Fragmente verhindern, dann aber auch gar nicht so selten zu einer späteren serösen Synovitis des Gelenkes Veranlassung geben könne. *Schede* fügte der Punction noch die Ausspülung des Gelenkes mit 3%iger Carbolsäure hinzu, um auch alle Gerinnsel aus dem Gelenk entfernen zu können. Darin liegt nämlich ein Nachtheil des Verfahrens, dass zuweilen schon sehr frühzeitig eine Gerinnung des Blutes eintritt, so dass dann die Aspiration desselben durch den Troicart unmöglich wird. Solche Misserfolge hatten *Langenbeck*, *Lauenstein*, *Wahl*, *Koenig*, *Lücke*, *Kroenlein* und wohl auch andere Chirurgen, ohne dass ihnen der Vorwurf gemacht werden kann, zu lange mit der Operation gewartet zu haben.

Die Punction, eventuell die *Schede*'sche Operation ist, das hat die Erfahrung gelehrt, unter streng aseptischen Cautelen ausgeführt, ein ungefährlicher Eingriff. Sie kann daher für denjenigen, der die Aseptik beherrscht, bei sehr bedeutenden Gelenkergüssen empfohlen werden. Sie kürzt dann sicher den Heilungsverlauf ab. Bei mässigem Hämarthros kommt man mit dem elastischen Compressionsverband und der Massage wohl eben so rasch zum Ziel. Nach der Punction werden die Fragmente mit Heftpflasterstreifen einander genähert und darüber ein wiederholt zu erneuernder Gypsverband angelegt.

Der Punction gegenüber stehen nun alle diejenigen Maassnahmen, welche die Fragmente direct angreifen.

Zu denselben gehören zunächst die unmittelbaren Retentionsapparate. Der älteste und berühmteste derselben

Fig. 329.




ist die *Malgaigne*'sche Klammer, die aus zwei scharfen Doppelhaken besteht, welche direct in die beiden Fragmente eingesetzt und durch eine horizontale Schraube bis zur völligen Berührung der Bruchflächen einander genähert werden (Fig. 329). Die Klammer ist vielfach modifizirt worden. Sie ist auch schon in ihrer alten

Form für hartnäckig auseinanderweichende Fragmente ein sehr brauchbares Instrument, welches, unter aseptischen Maassnahmen angelegt, für den Patienten höchstens einige Schmerzen mit sich bringt. Wurde nicht aseptisch verfahren, so hat sie allerdings schon manche Eiterung, selbst mit tödlichem Ausgange verursacht.

Trélat suchte die Verwundung der Haut und des Knochens dadurch zu vermeiden, dass er an die Ränder der Patella zwei modellirte Guttaperchaschienen anlegte und die Haken erst in diese einliess. (Fig. 330). Die Guttaperchaplatten müssen sehr exact liegen, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen. Will man solche Platten anwenden, so ist es einfacher, diese durch Binden

Fig. 330.



oder Heftpflaster zu fixiren, und während sie noch weich sind, Haken in sie einzulassen, welche man dann durch einen Gummischlauch verbindet *(Hagedorn)*.

Gleichwerthig mit dem *Malgaigne*'schen Verfahren, aber heutzutage kaum noch geübt, ist das Vorgehen von *Moreau*, *Dieffenbach* und *Ollier*, welche Metallzapfen in die Fragmente einbohrten und diese durch eine Art umschlungener Naht oder durch Bindenzügel einander näherten. *Ollier* legt sogleich einen Gypsverband an und entfernt die stählernen Zapfen, sobald der Verband erhärtet ist.

Gewissermassen einen Uebergang zu denjenigen Operationen, welche das Kniegelenk selbst eröffnen, bildet die von *v. Volkmann* schon in vorantiseptischer Zeit angegebene Sehnennaht, die kürzlich wieder von *Baum* und *Körte* sehr empfohlen worden ist, da sie eine sehr gute Adaption der Fragmente gestattet. Ein starker Seidenfaden oder ein Silberdraht wird nach Entleerung des Gelenkes quer durch die Quadricepssehne, ein ebensolcher quer

durch das Lig. patellae gezogen. Die Fäden oder Drähte sollen nicht in das Gelenk eindringen. Sie werden dann nach der Durchführung durch die Aponeurosen mit ihren Enden fest über Jodoformgazebäuschchen, welche Druckgangrän der Haut sowie ein Aufkanten der Fragmente verhindern, zusammengeknotet, während ein Assistent die Bruchstücke möglichst nahe an einander drückt. Auf die Stichöffnungen wird Jodoform aufgestreut, und über das ganze ein Hefpflasterverband oder ein Gypsverband angelegt. Nach 14 Tagen bis 3 Wochen werden die Fäden entfernt und nun die Massagebehandlung wie oben beschrieben fortgesetzt. Nach vier Wochen konnten die Patienten schon ohne weiteren Schutzverband auftreten und sechs Wochen nach dem Unfall ihre Arbeit in unbeschränktem Masse wieder aufnehmen. Die Erfolge waren also sehr zufriedenstellend und fordern entschieden zu weiteren Versuchen auf.

An diese Methode der Sehnennaht, welche den Vortheil hat, das Gelenk unverletzt zu lassen, reiht sich ein Verfahren an, welches von *Kocher* vorgeschlagen und als „peripatellare Naht“ bezeichnet worden ist. *Kocher* punctirt zunächst das Gelenk, entfernt aus demselben den Bluterguss und führt dann mittelst einer stark gekrümmten Nadel einen doppelten Silberdraht am unteren Rande des unteren Fragmentes hinein, führt ihn unterhalb der Gelenkoberflächen der Bruchenden hindurch und am oberen Rande des oberen Fragmentes wieder heraus und knotet dann die Silberdrähte auf der Patella über einer Krüllgazerolle. Um die Faltung der Haut zu vermeiden, werden von der oberen Stichöffnung nach abwärts und von der unteren nach aufwärts 2 cm lange, nur die Haut durchtrennende Incisionen gemacht. Als Nachtheile dieser Methode wurde von anderer Seite *(Kroenlein)* die Entstehung von Hautdecubitus und ein beständiges Kanten der Fragmente beobachtet. Im übrigen waren die functionellen Resultate günstig. Den Hautdecubitus kann man nach einer weiteren Mittheilung *Kocher*'s dadurch beseitigen, dass man anstatt der zwei kleinen Schnitte einen einzigen Längsschnitt macht. Das Kanten der Fragmente aber könnte man durch Aufkleben eines circulären Heftpflasterstreifens über die Bruchfläche wohl verhüten.

Nachdem man die Gefahren der Gelenkeröffnung durch aseptische Wundbehandlung auszuschalten gelernt hatte, lag es nahe, auch bei Patellarfracturen das Gelenk breit zu eröffnen und die directe Knochennaht auszuführen. Zwar haben schon in vorantiseptischer Zeit *Severinus*, ein berühmter

italienischer Arzt, *Dieffenbach* und *Rhea-Barton* bei veralteten, schlecht geheilten Patellarfracturen die Fragmente angefrischt und zusammengebunden, in zielbewusster Weise jedoch bei frischem Bruch, unter antiseptischen Cautelen hat zuerst *Lister* selbst die Knochennaht ausgeführt und ein treffliches Resultat erreicht. Viele andere Chirurgen haben dann die Operation wiederholt, so dass dieselbe nach den Zusammenstellungen von *Brunner, Dennis, Söderberg, Brümmer, Pletzer, Müller, Pannetier, Armirail* u. A. heutzutage schon weit über 200 mal ausgeführt worden ist. Die Interposition der sehnigen Aponeurose zwischen die Bruchflächen, welche unbedingt deren Heilung durch knöchernen Callus verhindern muss, kann nur durch die Blosslegung der Fragmente beseitigt werden. So sagen *Mac Ewen* und andere Anhänger der Knochennaht, von denen wir als energischen Vertreter ganz besonders *Trendelenburg* hervorheben müssen, der sie allein 24 mal mit sehr befriedigenden functionellen Resultaten ausgeführt hat.

Da fragt es sich denn, sind die durch die Knochennaht erzielten Resultate wirklich soviel günstiger als diejenigen, welche man mittelst der anderen eben beschriebenen Methoden erreichen kann? Zahlreiche Zusammenstellungen von Fällen, die mittelst der Knochennaht behandelt und nach Jahren untersucht wurden, lassen hier schon ein ziemlich abschliessendes Urtheil fällen. Die Heilung erfolgte allerdings in vielen Fällen mit knöcherner Vereinigung und vollkommener Herstellung der Brauchbarkeit des Gliedes und zwar in so kurzer Zeit, wie es durch die Behandlung mittelst der andern Methoden, mit Ausnahme vielleicht der Massagebehandlung nicht gelingt. Diesen günstigen Erfolgen steht dagegen eine bedeutende Anzahl von Misserfolgen gegenüber, in denen Ankylose entstand oder wegen Vereiterung des Gelenkes amputirt werden musste oder gar der Tod eintrat, so dass der Eingriff keineswegs als ein ungefährlicher gelten kann.

Wenn nun aber auf ungefährlichem Wege gute functionelle Resultate erzielt werden können, wie wir dies ja gesehen haben, so ist die blutige Naht eines frischen Kniescheibenbruches nur dann berechtigt, wenn das Gelenk bereits durch eine gleichzeitige Weichtheilwunde eröffnet ist.

Der mit der aseptischen Technik vollständig vertraute Arzt wird vielleicht von dem Gesagten dann eine Ausnahme machen und die Knochennaht anwenden dürfen, wenn es darauf ankommt

bei jugendlichen Individuen ein durchaus leistungsfähiges Knie zu erhalten.

Ihre volle Berechtigung hat dagegen die Knochennaht bei veralteten, schlecht geheilten Brüchen. Man kann sie dann nach den Angaben *van der Meulen*'s zuweilen gewissermassen ohne Gelenkeröffnung machen, indem durch die Organisation des Blutgerinnels am hinteren Rande der Fragmente eine das Gelenk abschliessende Membran vorhanden sein kann.

Auch bei Refracturen bald nach der Heilung, wo eine mangelhafte Wiedervereinigung der zerrissenen Bandmasse zu befürchten ist, ist die Knochennaht wohl das beste Verfahren.

Die Technik der Knochennaht in frischen Fällen ist einfach. Die Fragmente werden durch einen Quer- oder Längsschnitt blossgelegt, das Blut aus dem Gelenk entfernt, an die Bruchflächen angespiesste Theile des sehnigen Ueberzugs weggeschnitten, die Fragmente durchbohrt und dann mit Silberdraht, Catgut oder Seide genäht. Die Nähte werden kurz abgeschnitten und nach 6—8 Wochen entfernt oder auch eingeheilt. *Périer* verzichtet auf das Nähen der Knochen selbst, vereinigt durch eine Schlingennaht vielmehr nur die beiden fibrös-periostalen Ueberzüge der Fragmente.

Ceci hat die Technik in der Weise geändert, dass er die subcutane bleibende Metallnaht einführte. Die Fragmente werden in diagonaler Richtung durch die Haut hindurch durchbohrt, ein Silberdraht mit sorgfältiger Vermeidung von Schlingenbildung in Form einer 8 durch die Bohrlöcher hindurch geführt und die Enden des Drahtes dann geknüpft. Dieser Metalldraht soll einen die Callusbildung anregenden mechanischen Reiz ausüben, die Patella so verstärken, dass die Funktion des Gliedes schon nach 6—8 Tagen ermöglicht werden kann, und nicht nur bei Querbrüchen, sondern auch bei Splitterbrüchen gute Dienste leisten.

Bei veralteten Brüchen werden die Fragmente vor der Knochennaht erst angefrischt. Schwierig ist in solchen Fällen meistens das Aneinanderbringen der Fragmente, indem dieselben durch Adhäsionen an ihrer falschen Stelle fixirt sind. Man muss in solchen Fällen die Fragmente erst frei machen. Das obere Fragment kann dadurch beweglich gemacht werden, dass man es umschneidet. Kommt man damit allein nicht

zum Ziele, so kann man es herabdrängen, indem man den Quadriceps nach dem Verfahren von *Mac Ewen* verlängert. Zu dem Zweck macht man mehrere querstehende Reihen von V-förmig klaffenden Incisionen in den Muskel, welche sich dann bei starkem Anziehen der Sehne Y-förmig schliessen.

Bei sehr weitem Zwischenraume zwischen den Fragmenten genügt auch eine solche Lockerung des oberen Fragmentes noch nicht. In solchen Fällen empfiehlt *v. Bergmann* die Tuberositas der Tibia und mit ihr das Lig. patellae schräg abzumeisseln und dann das untere Bruchende nach oben zu drängen. Die Fragmente heilen dann knöchern, und ebenso verwächst die Tuberositas tibiae auch wieder an den noch bestehenden Berührungspunkten knöchern mit ihrer Unterlage. Eine Nekrose derselben ist nicht zu befürchten. *v. Bergmann* und *Sonnenburg* erreichten auf diese Weise gute Resultate.

Die Längs- und Splitterbrüche der Patella erfordern einfach die Anlegung eines Contentivverbandes mit nachfolgender Massage und Gymnastik des Gelenkes und der Muskulatur.

Werden bei zu schlaffer Pseudarthrose andere Maassnahmen von dem Patienten nicht gestattet, so muss derselbe einen Stützapparat tragen, bei welchem ein vorn über das Knie hinziehendes Gummiband die Quadricepssehne ersetzt.

Luxationen der Kniescheibe.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Zum Verständniss der Patellarluxationen ist es zunächst nothwendig, gewisse Bezeichnungen anzuführen, welche einzelnen Bestandtheilen des unteren Gelenkendes des Femur durch *H. von Meyer* gegeben worden sind.

Die beiden Condylen des Femur tragen seitlich ebenso wie die des Humerus je einen, wenn auch nicht so sehr hervorspringenden Epicondylus. Die seitliche Fläche zwischen diesem Epicondylus und dem darunter liegenden Gelenkflächenrande des zugehörigen Condylus heisst Planum epicondylicum externum und internum. Die abgerundete verticale Furche, welche die Patellarfläche durchzieht, gibt derselben die Form einer Rolle,

Trochlea. Der tiefe Einschnitt zwischen den beiden Condylen wird zum Sulcus trochleae. Dieser setzt sich nach oben in eine flache Grube fort, die sich auf der vorderen Fläche des Femur findet und den Namen Fovea supratrochlearis führt. Crista supratrochlearis externa und interna ist die Leiste, welche von dem Rande der Trochlea an der vorderen Fläche des Femur aufsteigend, die Fovea supratrochlearis nach aussen und innen begrenzt.

An der Gelenkfläche der Patella zeigt sich eine durch eine kreuzförmige Leiste hervorgebrachte Eintheilung in vier Felder. Fasst man je zwei und zwei dieser zusammen, so kann man ein oberes und unteres Doppelfeld — geschieden durch die wagrechte Leiste — und ein inneres und äusseres Doppelfeld — geschieden durch die senkrechte Leiste — unterscheiden.

Lig. ileo-tibiale nennt *H. von Meyer*, der nach *Malgaigne* die Lehre der Patellarluxation am meisten gefördert hat, jenen Fascienstrang, welcher die Sehne des M. tensor fasciae latae darstellt und sich an den äusseren Rand der Patella ansetzt.

Die Articulation der Patella mit der Trochlea des Femur ist keine Gelenkverbindung im eigentlichen Sinne, da sie nicht zwischen übereinstimmenden Flächen stattfindet. Sie ist vielmehr nur eine Rutschbahn, in welcher die convexe Fläche der Patella auf der ebenfalls convexen Trochlea hin- und hergleitet. Der Weg, den sie auf dieser Bahn zurücklegen kann, beträgt 7—9 Centimeter.

Die Patella selbst ist dabei nur als Sesambein in die Strecksehne eingeschaltet. Sie kann sich nicht verschieben ohne eine entsprechende Betheiligung dieser Sehne, und sind daher ihre Luxationen eigentlich auch nur Sehnendislocationen.

Einige weitere Einzelheiten der Kniescheibenbewegung werden wir später noch kennen lernen.

Frequenz und Eintheilung der Patellarluxationen.

Die Kniescheibenverrenkungen sind seltene Verletzungen. Es existiren kaum 200 Beobachtungen in der Litteratur. Die Patella wird normaler Weise durch die passiv gespannte Sehne des Quadriceps fest auf ihre Unterlage aufgedrückt und kann von dieser nur durch schiebende oder torquirende Kräfte verdrängt werden.

Bei der Verschiebung wird sie seitwärts geführt, während ihre Gelenkfläche stets dem Femur zugewendet bleibt. Sie kann nach aussen oder innen verschoben werden. Luxationen können aber nur nach aussen stattfinden, denn eine nach innen verschobene Patella muss durch den Muskelzug sogleich wieder an ihre richtige Stelle gebracht werden, da sie an dem innern Condylus nicht fixirt bleiben kann. Das ergiebt sich unmittelbar aus der Betrachtung des inneren Condylus; denn das Planum epicondylicum internum besitzt annähernd die Form einer Kugelfläche, der innere Rand der Trochlea aber und die Crista supratrochlearis interna springen sehr wenig hervor.

Die Luxation nach aussen kann eine vollständige und unvollständige sein.

Erfährt die Patella eine Torsion, so bleibt sie entweder an ihrem Platze, indem sie eine Drehung um ihre eigene Längsachse erleidet, so dass ihre Gelenkfläche von dem Femur abgehoben und frei hingestellt wird, oder sie entfernt sich von ihrem Platze, indem sie sich um eine quere, horizontal gedachte Achse drehend, in das Kniegelenk eingekeilt wird. Wird sie in der ersten Stellung fixirt, so resultirt eine sog. verticale Luxation, bleibt sie aber in der zweiten Stellung fixirt, so haben wir die horizontale Luxation und dabei kann ihre Gelenkfläche entweder nach oben oder nach unten schauen. Schliesslich kann sich die Patella auch vollständig umdrehen, so dass ihre Gelenkfläche unter die Haut zu liegen kommt, Inversion der Patella.

Wir haben also folgende thatsächlich vorkommenden Luxationen der Patella zu unterscheiden:


1. Luxationen durch Verschiebung:
 a) vollständige (nach aussen),
 b) unvollständige (nach aussen).
2. Luxationen durch Verdrehung (Torsion):
 a) Verticale Luxation
 α) nach innen,
 β) nach aussen.
 b) Horizontale Luxation
 α) nach oben,
 β) nach unten.
 c) Totale Umwendung der Patella.

1. Luxationen durch Verschiebung.

Die **Luxationen der Patella nach aussen** können vollständige und unvollständige sein.

Bei der **vollständigen** Luxation liegt die Patella mit ihrer Gelenkfläche neben dem Condylus externus, auf dessen Planum epicondylicum. Ihre innere Kante ist nach vorn, ihre äussere nach hinten gerichtet. Sie ist in dieser Lage etwas beweglich und erfährt namentlich bei Beugung des Kniegelenkes eine Verschiebung nach hinten. Sie kann aber auf ihren normalen Platz nicht zurückkehren, weil sie neben dem Condylus durch das ebenfalls nach

Fig. 331.



hinten gewichene Lig. ileo-tibiale und die Strecksehne fest gehalten wird. Diese letztere fixirt sie dadurch, dass sie ebenfalls mit über den äusseren Condylus gelagert ist und von selbst nicht wieder über den äusseren Rand der Trochlea in ihre normale Gleitfurche gelangen kann (Fig. 331).

Sectionen und Leichenversuche haben ergeben, dass eine solche vollständige seitliche Luxation stets einen Längsriss der Kniegelenkskapsel erzeugt. Der innere Rand dieses Risses fühlt sich nach *Streubel* gespannt an, noch mehr aber die schief nach aussen ziehende Extensorensehne. Auf der Aussenseite werden das Seitenband des Gelenkes und die Kapsel zu einer ziemlich tiefen Falte umgeschlagen.

Die Patella kann nun auf zwei Wegen nach aussen luxirt werden, nämlich 1) über die vordere Fläche oberhalb der Trochlea, 2) zwischen der Tibia und dem Condylus externus femoris. Das Gleiten in der ersten Bahn kann nur in der Streckung, dasjenige in der zweiten Bahn nur in der Beugung des Kniegelenkes zu Stande kommen.

Von diesen Wegen ist der erstere der häufigere.

Betrachten wir ihn etwas näher, so ist es schon lange bekannt, dass plötzliche Muskelcontractionen die Veranlassung der. Verrenkung sein können. Wie aber *v. Meyer* gezeigt hat, müssen für eine solche Wirkung der Streckmuskeln vorher erst gewisse Grundbedingungen erfüllt sein. Es muss nämlich in dem Augenblick, in welchem die Contraction des Quadriceps erfolgt, das Kniegelenk entweder überstreckt oder einwärts geknickt sein, oder es muss eine Rotation der Tibia nach aussen bestehen. Diese letztere aber kann wiederum entweder nur eine Theilerscheinung der Ueberstreckung sein als sogenannte Schlussrotation, oder aber auch direct durch eine Verdrehung des ganzen Beines hervorgebracht werden.

Alle diese genannten Zustände des Kniegelenkes können vereinzelt oder in verschiedener Vereinigung entstehen bei ungeschicktem Auftreten oder Aufspringen der Patienten, beim Anstemmen ihres Fusses gegen irgend einen Gegenstand, z. B. beim Ringen, beim Fallen mit seitlich eingebogenem Knie und Versuch, sich im Falle aufzurichten, oder beim Auffallen schwerer Gegenstände auf das eingeknickte Knie, z. B. bei Verschüttungen durch Erdmassen.

Der Mechanismus der Verletzung ist dabei folgender: In der Streckstellung des Knies liegt das untere Doppelfeld der Patella auf dem oberen Theile der Trochlea. Durch eine energische Contraction der Streckmuskeln kann sie jedoch noch höher herauf gezogen werden, so zwar, dass schliesslich nur noch ein schmaler Saum ihrer Gelenkfläche mit der Trochlea in Berührung steht.

Unter gewöhnlichen Umständen gelangt sie freilich nicht so hoch, weil das gespannte Lig. patellae Widerstand leistet. Erst unter den vorher genannten Bedingungen des Kniegelenkes, durch welche die Trochlea gewissermassen gesenkt wird, vermag sie ihre höchste Lage einzunehmen. Als Widerstände für die Fixirung in dieser Lage wirken dann der Gegendruck des obersten Theiles des äusseren Trochlearandes und der Gegendruck der Crista supratrochlearis externa. Dieser letztere Widerstand ist aber verhältnissmässig unbedeutend und wird durch die Contraction des Quadriceps leicht überwunden, wenn erst der Hauptwiderstand, d. h. die stützende Anlagerung an den äusseren Trochlearrand durch die Ueberstreckung oder Einknickung des Kniegelenkes oder die Rotation der Tibia überwunden ist.

Diese letzteren Zustände bleiben natürlicherweise von dem Verletzten unbeachtet, so dass dieser nur über seine Muskelanstrengung zu berichten weiss. Es gebührt ihnen aber nach dem Gesagten ein grosser Antheil bei den sogenannten durch Muskelcontraction entstandenen Luxationen.

Selbstverständlich kann auf diesem „oberen" Weg die Luxation auch durch directe Gewalten zu Stande kommen. Vorausgesetzt ist dabei wieder die Streckstellung des Knies. Die Richtung der einwirkenden Gewalt selbst muss aber zwei Kräfte enthalten, eine, welche die Patella nach oben schiebt, bis sie den Halt an dem äusseren Ende der Trochlea verliert, und eine zweite, welche in querer Richtung die gehobene Patella nach aussen verschiebt — in einer schräg von innen und unten kommenden Gewalt sind diese beiden Kräfte vereinigt. *Streubel* konnte so auch experimentell die Luxation mit einer Tischlerschraube erzeugen.

Wenn der eben besprochene Weg des Hinübergleitens der Patella über den Condylus auch der einfachste und häufigste ist, so fehlt es doch nicht an Fällen, in welchen zur Zeit der Einwirkung der luxirenden Gewalt eine gebeugte Stellung des Knies vorhanden war. In der That lässt sich auch bei einer Beugung von etwas weniger als einem rechten Winkel die Patella in der Rinne zwischen dem Condylus externus der Tibia und des Femur in die luxirte Stellung hineinführen. So mag die Luxation wohl in den Fällen entstehen, in denen Reiter mit ihrer Patella gegen Baumstämme oder bei Attaken gegen andere Reiter anstossen.

Man hat vielfach das Genu valgum als prädisponirendes Moment für die Luxation nach aussen bezeichnet. In der That treffen beide Erkankungen des Oefteren zusammen. *Malgaigne, Isermeyer* und andere Autoren sind der Ansicht, dass das Genu valgum eine Folge veralteter, nicht reponirter Luxation sei, indem die veränderte Zugrichtung der Streckmuskeln durch ihre directe Einwirkung auf die Tibia und ihren Seitendruck auf das Kniegelenk ein Genu valgum und eine Rotation der Tibia nach aussen herbeiführen müsste. Auch bei angeborenen Luxationen der Kniescheibe beobachtet man meistens an dem befallenen Knie eine Valgusstellung.

Für frische Fälle von Patellarluxationen bei Genu valgum könnten *Hueter*'s Erklärungen zutreffen. Nach ihm ragt bei Genu valgum der Condylus internus femoris mehr hervor, und es entsteht so eine von innen nach aussen geneigte schiefe Ebene, welche die Patella leichter nach aussen gleiten lässt. Ausserdem entsteht bei Genu valgum bekanntlich an dem Condylus externus eine ziemlich tiefe Grube oder Rinne. Bei gebeugtem Knie ruht der grössere Theil der Patellargelenkfläche auf dem Condylus externus femoris, und nur ihr inneres Doppelfeld berührt den inneren Rand des Condylus internus femoris. Sobald nun ein Genu valgum aus der gebeugten Stellung in die gestreckte übergeht, kann es geschehen, dass der hohe Längsfirst der Patella sich in die erwähnte Rinne des Condylus externus stellt — und zwar um so leichter, je tiefer sie, also je hochgradiger das Genu valgum ist. Die Contraction des Quadriceps aber muss dann nothwendig die Patella über die Rinne und über den äusseren Rand der Gelenkfläche neben den Condylus externus femoris führen, während die Kapsel nur eine mässige Zerreissung erfährt.

Die **unvollständige** Luxation der Patella nach aussen ist dadurch bestimmt, dass die Patella nicht auf dem Planum epicondylicum liegt, sondern über dem äusseren Rande der Trochlea, vor der Crista supratrochlearis festgestellt ist. Sie hat dabei eine solche Stellung, dass ihre Gelenkfläche nach innen sieht und ihr innerer Rand nach vorne vor dem unteren Ende des Femur hervorragt. Die Patella hat in solchen Fällen gewissermassen einen Anlauf zur vollständigen Luxation genommen. Es ist aber nicht zu einer solchen gekommen, da das Kniegelenk nicht stark genug nach vorn oder nach innen eingeknickt oder die Patella durch die Gewalt nicht hoch genug hinauf am Oberschenkel

in die Höhe gehoben wurde, um die Crista supratrochlearis zu überschreiten. Sie reitet vielmehr mit ihrem Sulcus auf dieser Kante und wird auf derselben fixirt von aussen durch den Zug des Lig. ileo-tibiale, von innen durch den Widerstand ihrer noch unversehrten Verbindungen und schliesslich durch den Gegendruck der nach vorne gedrängten Haut.

Symptome der Luxationen nach aussen.

Die Anzeichen einer **vollständigen** Abweichung der Patella sind unverkennbar (Fig. 331). Der Kranke ist gewöhnlich zusammengeknickt und kann sich zumeist nicht wieder erheben. Jede active Bewegung ist aufgehoben, die passive aber unter heftigen Schmerzen und in sehr engen Grenzen möglich. Das Bein liegt im Hüft- und Kniegelenk leicht flectirt. Das ganze Knie erscheint breiter, der Condylus internus springt stark hervor, die Patella aber befindet sich, selbst noch bei stärkerer Geschwulst bemerkbar, neben dem Condylus externus, während sich statt der normalen spitzrundlichen Knieform eine Vertiefung auf der Höhe des Gelenkes findet.

Bei der Palpation dringt man vorn in die leere Fossa intercondylica. Neben dem Condylus fühlt man an ihrer Form und geringen Beweglichkeit die Patella. Sie hat die Haut in einer Falte emporgehoben, von der aus man nach aufwärts die Quadricepssehne, nach abwärts das Lig. patellae verfolgen kann. In dem Gelenke befindet sich in der Regel ein mehr oder weniger erheblicher Bluterguss.


Die Symptome der **unvollständigen** Luxation sind weniger bezeichnend. Das Bein steht häufiger gestreckt als gebeugt, die Veränderung des Knies ist geringer, die vordere Knierundung nicht ganz geschwunden. Man fühlt den äusseren Rand der Patella deutlich nach aussen verschoben, den inneren aber vorn hervorspringend. Neben letzterem erkennt man die zur Hälfte freie Fossa intercondylica und fühlt strangartig gespannt den Quadriceps und das Lig. patellae.

2. Luxationen durch Torsion.

a. Verticale Luxationen.

Bei der verticalen Luxation hat die Patella eine halbe Drehung um ihre senkrechte Achse gemacht, so dass sie mit einem Seitenrande in der Mitte der Trochlea, genauer in der Fossa supratrochlearis steht und ihre Ebene senkrecht gegen die vordere Fläche des Femur richtet (Fig. 332). Nur ganz ausnahmsweise findet sich die vertical luxirte Patella neben

Fig. 332.



dem Condylus externus. Die Verletzung gleicht dann einer einfachen Luxation nach aussen, nur ist jetzt die Gelenkfläche nach aussen gerichtet (*Parkes*).

Die verticale Luxation ist eine innere oder äussere, je nachdem die Gelenkfläche der dislocirten Patella nach innen oder nach aussen sieht.

Die Verletzung ist in dieser Form eigentlich eine Torsion der Strecksehne, für die allerdings die Patella den Angriffspunkt bietet. Dieser Angriffspunkt aber muss durch zwei Kräfte dargestellt sein, welche an den einander gegenüberstehenden Rändern der Patella in einem einander entgegengesetzten Sinne wirken. Von einem

solchen Kräftepaar muss z. B. die eine den inneren Rand der Patella niederdrücken, die andere aber deren äusseren Rand heben. Diese zweite Kraft braucht keine wirklich active zu sein, sie kann vielmehr durch einen Widerstand gebildet werden, welchen die Patella an der inneren oder äusseren Wand der Trochlea bei gebeugtem Knie zu finden vermag.

So entstehen denn die verticalen Luxationen durch einen die Patella von der Seite und etwas von vorn treffenden starken Druck oder Stoss, wenn ein solcher den Rand der Patella in ihrer Lage auf der Trochlea trifft, und zwar entsteht eine Luxatio externa, wenn diese Einwirkung den inneren Rand, eine interna, wenn sie den äusseren Rand der Patella trifft.

Es giebt aber auch Fälle, in denen allein der Muskelzug als ätiologisches Moment anzusehen ist. Der Patient hatte dann stets das Knie stark seitlich eingebogen, dasselbe dabei gleichzeitig mit dem Oberschenkel nach einer Seite, z. B. nach links rotirt, hierdurch den Vastus internus stärker contrahirt als den externus und somit den innern Rand der Patella um den äussern als Achse aufgestellt, während der Fuss irgendwie fixirt war (*Malgaigne, Fort, G. Middeldorpf, Goehlich*).

Die Luxatio interna und externa werden gleich häufig beobachtet. Die innere entsteht im allgemeinen bei stärkerer Beugung des Knies als die äussere.

Die Fixation der torquirten Patella findet nach *Malgaigne* dadurch statt, dass sich die Patella mit ihrer nach hinten gestellten Kante in die Spongiosa der Fovea supratrochlearis einwühlt. Diese Erklärung genügt aber sicherlich nicht vollständig. Die Fixation ergiebt sich vielmehr zum grössten Theil aus der elastischen Gegenspannung der beiden Seitenränder der Strecksehne, welche ja über den oberen Rand der Patella hinziehend, in einem Bogen erhoben wird.

Die Kapsel muss stets bedeutend zerrissen sein, um eine Kantenstellung der Patella zu erlauben. Ihre unverletzten Theile müssen sich ferner mit der Patella drehen und lassen sich dann neben der gespannten Extensorensehne als straffe Stränge fühlen. Diese Spannung und Drehung der Kapsel trägt dann wohl auch etwas zur Fixation der Kantenstellung bei, wenigstens bot sie in einem Falle *Streubel's* ein schwer zu überwindendes Repositionshinderniss.

Riedel fand in einem veralteten irreponiblen Falle das Lig. patellae durchrissen und auch die Quadricepssehne defect. Er ex-

stirpirte daher die gleichzeitig über den äusseren Condylus hinweg nach oben dislocirte Patella mit gutem functionellen Resultat.

Die verticalen Luxationen werden sehr viel seltener beobachtet als die seitlichen. Unter 120 von *Streubel* gesammelten Fällen von Kniescheibenverrenkungen befanden sich nur 21, also ungefähr $^1/_6$ verticale.

Symptome der verticalen Luxationen.

Die verticale Verrenkung ist eine so eigenthümliche Verletzung, dass man ihre Erscheinungen niemals vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat (s. Fig. 332). Das Bein fand sich in der Regel vollständig gestreckt, doch erwähnen *Malgaigne*, *Hamilton* und *G. Middeldorpf* auch Fälle mit leichter Beugestellung des Knies. Dieses selbst ist in der Weise verändert, dass sein Durchmesser von vorn nach hinten bedeutend vergrössert ist. Anstatt seiner normalen Wölbung sieht man eine scharfe Knochenkante vorspringen und zwar in der Regel nicht genau in der Mittellinie, sondern mehr dem Condylus externus oder internus zugewendet. Zu beiden Seiten dieses Längsfirstes fallen die Weichtheile stark ab, ja sie sind zuweilen förmlich eingezogen. Die Quadricepssehne und ihre Fortsetzung, das Lig. patellae verlaufen aufs äusserste gespannt über die obere Kante des Vorsprunges. Namentlich der Verlauf der Quadricepssehne ist diagnostisch sehr bezeichnend. Die Sehne verläuft nämlich in einem nach innen convexen Wulst an der Innenseite des Gelenkes bei der inneren Luxation, bei der also die Gelenkfläche der Patella nach innen schaut, und umgekehrt in einem nach aussen convexen Bogen, wenn die Gelenkfläche der Patella nach aussen schaut, also eine äussere Luxation vorliegt. Betastet man den Vorsprung, so kann man bei nicht zu starker Geschwulst und nicht zu stark gespannter Haut wohl die Leiste auf der überknorpelten Fläche durchfühlen. Die Function des Beines ist vollständig aufgehoben. Passiv kann man unter heftigen Schmerzen des Patienten ganz geringe Bewegungen etwas ausgiebigere in Narcose ausführen. Die Patella erlaubt auch zuweilen leichte Bewegungen um ihren aufgestemmten Rand als Achse. *(Griffith.)* In einem kürzlich beschriebenen Falle von *Goehlich* von Verticalluxation der Patella nach aussen war als

weiteres Zeichen der Verletzung eine enorme Varusstellung des gleichseitigen Fusses vorhanden, die nach gelungener Reposition sofort verschwand.

In einem Falle, in dem die vertical luxirte Patella neben dem Condylus externus stand, fand *Parkes* die Kniecontour bedeutend verbreitert, die Fossa intercondyloidea anterior deutlich unter der Haut abtastbar. An der äusseren Seite des Condylus externus befand sich eine starke Hervorragung, welche durch die vertical gestellte Patella gebildet wurde in der Weise, dass dieselbe mit ihrem inneren Rande aufruhte, die subcutane Fläche nach innen, die Gelenkfläche nach aussen gewendet. Das Bein war in leichter Beugung unbeweglich. Ebenso war die Kniescheibe vollständig fixirt infolge starker Anspannung des Tensor fasciae latae und des Lig. patellae. Wegen des Tiefstandes des medialen Kniescheibenrandes war die Quadricepssehne schlaff, weich und seitlich verschiebbar. Der 20jährige Patient war beim Aufsteigen auf einen Wagen ausgeglitten, mit gebeugtem Knie gefallen und hatte sich dabei mit letzterem gegen einen grossen Kohlenblock gestossen.

b. Horizontale Luxationen.

Bei den horizontalen Luxationen hat sich die Kniescheibe zwischen die Gelenkflächen des Femur und der Tibia eingekeilt und ist in dieser Lage vollständig fixirt. Wir kennen erst drei einschlägige Beobachtungen und können uns demnach über diese seltenen Verletzungen am besten dadurch orientiren, dass wir diese Beobachtungen selbst anführen.

Wir unterscheiden horizontale Luxationen nach oben und solche nach unten. Bei den ersteren schaut die Gelenkfläche der Patella nach oben, bei den letzteren nach unten.

Ein Beispiel für die horizontale Luxation der Patella nach oben ist die Beobachtung *Szuman*'s:

Ein 27jähriger Mann war unter die Walze einer Häckselmaschine gerathen und hatte von dieser mehrere Stösse und Schläge in die Gegend des linken Knies erhalten. Bei der Untersuchung bald nach der Verletzung fand *Szuman* das Knie stumpfwinklig flectirt. Dasselbe konnte unter grossen Schmerzen für den Patienten passiv gebeugt, aber nicht ganz gestreckt werden. Die Haut über dem Kniegelenk ist hochgradig gequetscht, tief schwarzblau verfärbt, leicht ödematös. In der Mitte der sugillirten Partie, wo sich sonst die Patella befinden sollte, ist eine

sicht- und fühlbare Vertiefung vorhanden. Dagegen findet sich in der Gegend des äussern Seitenbandes ein auffälliger, quer verlaufender, ziemlich scharfkantiger Vorsprung, der sich gleichsam aus einer zwischen dem Condylus externus des Femur und der Tibia befindlichen Lücke hervorhebt. Von diesem Vorsprung zieht sich an der Aussenseite des Knies ein recht straff gespannter, breiter Strang nach oben in den Musculus quadriceps hinein, während ein anderer Strang etwas weniger gespannt nach unten an die Tuberositas tibiae hinzieht. Der quere Vorsprung liess sich ein wenig hin- und herbewegen. Er wurde gebildet durch den innern Rand der Patella. Der nach oben hinziehende Strang war die Sehne des Quadriceps, der nach unten hinziehende das Ligamentum patellae.

Reposition in Narcose war unmöglich. *Szuman* eröffnete daher das Kniegelenk mit einem subpatellaren Schnitt wie zur Resection des Gelenkes. Zwei hinter die Patella hakenförmig eingeführte Finger waren auch jetzt nicht im Stande, dieselbe aus ihrer Stellung zu rücken.

Die Patella lag ungefähr horizontal zwischen dem Condylus externus femoris und der Tibia fest eingekeilt. Das Lig. patellae war gedehnt, theilweise gedreht und ins Gelenk hineingezogen, auch etwas eingerissen. Die Gelenkfläche der Patella sah nach oben, ihre vordere Fläche nach unten. Die Crista verticalis, welche die Gelenkfacetten der Patella trennt, war hinter der Rundung des Condylus externus femoris eingeklemmt und hatte die beiden Kreuzbänder ziemlich glatt durchtrennt. Das äussere Seitenband war in Fetzen zerrissen, ebenso war die Gelenkkapsel an der äusseren Gelenkseite verletzt. Ein zweiter noch ausgedehnterer Kapselriss befand sich in der Richtung nach innen und oben von dem Patellarrand. Die Quadricepssehne war auf die äussere Fläche des Knies dislocirt und vollendete durch ihre Spannung die Einkeilung der Patella. Nach Erhebung dieses Befundes durchschnitt *Szuman* das Lig. patellae, liess einen Assistenten mit einer Hakenzange an dem Ligament ziehen, setzte selbst zwei Finger hakenförmig hinter die Patella und versuchte, dieselbe in ihre normale Lage zu schieben. Nach mehreren Versuchen gelang dies, indem die Patella mit einem plötzlichen Ruck ihre Einkeilung aufgab. Dabei fiel ein kleines, von dem Rande der Patella stammendes loses Knochenstückchen aus dem Gelenke heraus.

Die Wundheilung erfolgte ohne Störung in 5 Wochen, doch wurde das Gelenk nicht wieder vollständig beweglich.

Was die Entstehungsursache dieses Falles betrifft, so ist es wahrscheinlich, dass zuerst im Moment des Falles oder durch die Walzenschläge eine Luxatio patellae lateralis externa und durch die Fortwirkung der Schläge, besonders auf die Gegend der unteren Spitze der luxirten Patella bei gebeugtem Knie eine Eintreibung der Kniescheibe in das Kniegelenk hinein stattfand. Dabei wurde das erwähnte Stückchen vom Patellarrande abgesprengt, das Lig. lat. externum und die Lig. cruciata von der vordringenden Patellarkante durchrissen, während die Patella selbst eine Drehung um eine horizontal gedachte Achse erfuhr.

Von den **horizontalen Luxationen nach unten** kennen wir zwei Fälle, die von *Midelfast* und *Deaderik* behandelt wurden.

Zu *Midelfast* wurde ein 12jähriger Knabe gebracht, der sich durch den Fall auf einen scharfen Stein angeblich eine Patellarfractur zugezogen haben sollte. Bei der Untersuchung schien auch das untere Fragment vorhanden zu sein, es stand aber ganz unbeweglich fest. Ein oberes Fragment war dagegen nicht zu fühlen. Das Knie sollte unmittelbar nach der Verletzung gebeugt gewesen sein, wurde dann aber passiv gestreckt und in dieser Stellung fixirt. Um das vermuthliche untere Fragment beweglich zu machen, wurde das Kniegelenk eröffnet. Dabei zeigte es sich nun, dass die Quadricepssehne vom oberen Rande der Kniescheibe abgerissen und diese selbst in das Kniegelenk zwischen Femurcondylen und Tibia eingekeilt war. Als Patellarfragment hatte also der nach vorn gerichtete untere Rand der Patella mit dem stark gespannten Lig. patellae imponirt. Die Patella wurde leicht reponirt, die Kapsel und Wunde vernäht und prima intentio erzielt.

Der Fall *Deaderik*'s ging ebenfalls mit Zerreissung der Quadricepssehne einher. Die Verletzung betraf einen 19jährigen Menschen, der beim Aufspringen auf einen sich in Bewegung setzenden Eisenbahnzug verunglückte. Die Kniescheibe war an ihrem oberen Rande von ihren Befestigungen vollständig losgerissen und hatte sich mit einer Drehung um die quere Achse so fest in die Fossa intercondylica femoris gelegt, dass die Reposition erst nach vieler Mühe und mit Einsetzung eines Stahlzackens in den Knochen gelang.

c. Vollständige Umdrehung, Inversion der Patella.

Die Torsion der Patella, welche bei der verticalen Luxation eine unvollendete, auf halbem Wege stehengebliebene ist, kann in sehr seltenen Fällen so vollständig werden, dass ihre subcutane Fläche auf die Trochlea und ihre Gelenkfläche nach vorne unter die Haut zu liegen kommt. (Fig. 333).

Fig. 333.



So lag in einer Beobachtung *Gaulke*'s die Kniescheibe ganz auf dem Condylus externus femoris, war hier fixirt und schaute mit ihrer hinteren Fläche nach vorne und innen, mit ihrer vorderen nach hinten und aussen.

Wragg sah folgenden Fall: Ein Neger hatte von einem Wagen einen Stoss gegen das rechte Bein erhalten. Bei der Untersuchung war der Unterschenkel ausgestreckt; an der äusseren Seite des Kniegelenkes trat ein scharfer Knochenrand unter der Haut hervor, der etwa einen halben Zoll hoch von der Condylenfläche abstand; die innere Seite des Kniegelenkes erschien schlaff und eingedrückt; man fühlte hier den Gelenkrand des inneren Condylus und weiter nach aussen in der Tiefe, etwa einen halben Zoll von dem die Gelenkfläche nach innen begrenzenden rauhen Rande entfernt, einen festliegenden Knochenrand. Die Strecksehne und das Lig. patellae fühlte man unter der Haut als harte, gewundene Stränge.

Schliesslich finden sich noch gleiche Beobachtungen von *Castara*, *E. Watson* und *Riedel-Voigt*.

Hervorzuheben ist, dass der aussen liegende innere Rand der Patella mehr prominirt als der innen liegende äussere Rand, eine Thatsache, welche leicht verständlich ist, da ja die Crista supratrochlearis externa mehr hervorspringt als die interna. Das Lig. patellae war in dem Falle *Riedel*'s vollständig, die Quadricepssehne zur Hälfte abgerissen.

Selbstverständlich kann die Verletzung nur dann statthaben, wenn die Gelenkkapsel selbst zu beiden Seiten längs der Patella ausgiebig zerrissen wird

Die Symptome sind die einer unvollständigen seitlichen Luxation. Die richtige Diagnose wird nur dann gestellt werden können, wenn man die Gelenkfläche der Patella durch die Haut abzutasten vermag.

Prognose der Patellarluxationen.

Ist die Einrichtung einer Patellarluxation gelungen, so kehrt in der Regel die Funktion des Kniegelenkes ohne jede Störung zurück. In anderen Fällen bleibt eine Neigung zu Recidiven zurück, so dass die Luxation auf die geringfügigsten Anlässe hin, z. B. beim Tanzen, Laufen, unbedeutendem Springen wieder eintritt. (Habituelle Luxation). *Béreaux* hat die recidivirenden Luxationen der Patella ausführlich behandelt. Die 1894 erschienene Arbeit stützt sich auf etwa 50 in der Litteratur niedergelegte Beobachtungen.

Werden Luxationen nicht eingerichtet, so bleibt bei unvollständiger Abweichung eine gewisse Schwäche und Neigung zum zeitweiligen Einknicken bestehen. Aber selbst bei vollständiger Luxation können die Verletzten allmählig wieder ihr Bein zu gebrauchen lernen. Beugung und Streckung des Gelenkes bleiben aber meist erschwert, der Gang unsicher und besonders das Bergab- und Treppabsteigen sehr mühsam. Daneben entwickelt sich, wenigstens bei jugendlichen Individuen, infolge der veränderten Wirkung des Quadriceps oft ein Genu valgum, denn der nach aussen gerichtete Zug desselben muss den Unterschenkel in einen nach Aussen offenen Winkel zum Oberschenkel ziehen und ihn gleichzeitig nach aussen drehen.

Bei verticalen Luxationen können die Patienten auch wieder gehen lernen, doch kann das Knie in seiner falschen Stellung auch fast vollständig steif bleiben.

Therapie der Patellarluxationen.

In frischen Fällen ist die Einrichtung der Patellarluxationen in der Regel leicht. Es muss dazu vor allen Dingen der Quadriceps und das Lig. patellae entspannt werden. Dies geschieht durch Beugung des Beines in der Hüfte und Streckung im Knie. Nach dem Vorgange *Hamilton's* lässt

man den Verletzten sich auf einen Stuhl oder Tisch setzen, erhebt seinen Fuss auf die eigene Schulter und nähert sich dann möglichst seinem Becken. Die Reposition geschieht dann in der Weise, dass man bei Luxationen nach aussen die Patella fasst, sie zunächst etwas nach oben und dann erst nach innen an ihre normale Stelle drängt. Man kommt so in der Regel leicht und ohne Narcose zum Ziel.

Bei verticaler Luxation chloroformirt man am besten wegen der heftigen Schmerzen und reponirt dann durch Rotation, indem man die torquirte Extensorensehne als Anhaltspunkt benutzend, die Patella in umgekehrter Richtung dreht. Eine vorsichtige Kniegelenksbeugung unterstützt dabei meist die Reposition, gewaltsame Kniebeugung muss jedoch durchaus widerrathen werden. indem dabei nicht nur Fracturen der Patella, Zerreissungen des Lig. patellae, Einknickungen der vorderen Wand des Femur eintreten, sondern die verticale Luxation auch in eine vollständige Inversion verwandelt werden kann.

Lassen sich frische Luxationen nicht auf die angegebene Art reponiren, was wohl nur bei der Kantenstellung vorkommt, so ist das Hinderniss wahrscheinlich vorzugsweise in der Spannung der eingerissenen und gedrehten Kapselwand zu suchen, da wiederholt das Lig. patellae und selbst die Extensorensehne erfolglos durchschnitten worden sind. In solchen Fällen könnte man unter aseptischen Cautelen die verletzte Stelle blosslegen und die Hindernisse direct beseitigen. *König* hat auf diese Weise kürzlich eine veraltete verticale Luxation geheilt. Es bleibt dann die Gelenkeiterung aus, welche alte Chirurgen erlebten, indem sie die Kapsel eröffneten und mit einem Elevatorium die Patella umzuwälzen suchten.

Eine vollständig umgedrehte Patella hat *Riedel* kürzlich ganz exstirpirt mit fast vollständiger Wiederherstellung der Kniegelenksbeweglichkeit.

Zur Behandlung der **habituellen** Patellarluxationen sind verschiedene operative Verfahren versucht worden.

Lucas - Championnière frischte bei einer Luxation nach aussen den Condylus externus an, um die Patella so zur Verwachsung mit demselben zu bringen.

In anderer Weise operirte *Roux* ebenfalls bei einer Luxation nach aussen, welche ihrer Trägerin, einem 13 jährigen Mädchen, starke functionelle Störungen verursachte.

Da man bei jeder Anspannung des Quadriceps, wobei sich jedesmal die Patella nach aussen luxirte, deutlich beobachten konnte, dass nur die dem Vastus externus entsprechende Partie sich contrahirte, während sich am oberen inneren Rande der Kniescheibe eine deutliche Lücke bildete, schloss *Roux*, dass der innere Theil des Quadriceps von der Kniescheibe abgerissen sei und der Vastus externus gewissermassen das Uebergewicht erhalten habe. Er legte diesen letztern daher durch einen Längsschnitt bloss und durchschnitt ihn quer, um ihn provisorisch ausser Action zu setzen. Dann legte er durch einen zweiten Schnitt die Aponeurose des Vastus internus frei, fand dabei den Riss in dieser, frischte denselben an und vernähte ihn. Ausserdem wurde von dem gleichen Schnitt aus das Lig. patellae von seinem Ansatz am Knochen losgelöst und nach einwärts transplantirt. Der Erfolg war ausgezeichnet. Die Luxation kehrte nach vollendeter Heilung selbst bei den lebhaftesten Bewegungen nicht wieder.

Pollard durchschnitt bei einer Luxation nach aussen den Vastus externus, frischte den Knochen an und exstirpirte ausserdem einen Theil der inneren Kapselpartie.

Le Dentre hat 1892 von einem inneren Längsschnitt aus, aus der erweiterten Kapsel eine Längsfalte gebildet, dieselbe als dicken Wulst zusammengenäht und dann mit der Hautwunde vereinigt. Der Erfolg war ein ausgezeichneter. Diese *le Dentre*'sche Operation ist so einfach auszuführen, dass sie wohl als Methode der Wahl bezeichnet werden darf.

Luxationen des Kniegelenkes.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Kniegelenk wird gebildet durch die Articulation des unteren Femurendes mit dem oberen Ende der Tibia. Es sind dabei gewissermassen zwei Gelenke dadurch gegeben, dass je ein Condylus femoris und eine Facette der Tibia durch die Fossa intercondylica am Femur und die Eminentia intercondylica an der Tibia getrennt sind.

Die Gelenkflächen beider Oberschenkelcondylen sind in sagittaler und frontaler Richtung convex. Der laterale Condylus ist

gegen die Incisura intercondylica mit einem fast sagittalen Rande begrenzt und wird selbst nach vorn immer breiter, der mediale dagegen besitzt einen gegen die Incisur concaven Rand und ist überall gleich breit. Er ist daher nicht nur im Sinne der Flexion, sondern auch der Rotation gekrümmt, während dagegen der laterale Condylus nur eine Flexionskrümmung besitzt.

Von den Gelenkflächen der Tibia ist die innere längsoval und tellerförmig ausgehöhlt, die laterale in sagittaler Richtung mehr eben oder nur wenig convex. Nur die der Eminentia intercondylica zunächst liegenden Antheile sind den entsprechenden Flächen des Femur vollständig angepasst. An den übrigen Theilen wird die Congruenz dadurch hergestellt, dass sich zwischen Tibia und Femur zwei halbmondförmig gestaltete, aus derbem Bindegewebe bestehende Bandscheiben einschalten.

Diese Menisci sind ebenfalls asymmetrisch. Der mediale ist offener und heftet sich mit seinem vorderen dünnen Ende ganz vorn am Rande der Gelenkfläche der Tibia, mit seinem stärkeren hinteren Ende hinter der Eminentia an. Der laterale dagegen ist stärker gebogen, umkreist nahezu die ganze Gelenkfläche der Tibia und ist mit seinem vorderen Ende unmittelbar vor der Eminentia befestigt.

Wir wollen gleich hier erwähnen, dass diese Bandscheiben bei den Bewegungen des Kniegelenkes mit den Condylen des Femur gleiten und dass hierbei der lateralen ein grösserer Spielraum überlassen ist als der medialen.

Zwei Gruppen starker Bänder befestigen die beiden Gelenkflächen des Femur auf der Tibia. Die eine Gruppe stellen die Lig. cruciata vor, welche im Gelenk gelegen, die Scheidewand zwischen den beiden seitlichen Femoro-tibialgelenken vervollständigen. Das vordere Kreuzband geht von dem Condylus externus femoris zum vorderen, das hintere vom Condylus internus femoris zum hinteren Ende der Eminentia intercondylica tibiae. Die zweite Gruppe wird gebildet von den Seitenbändern des Kniegelenkes. Das äussere derselben, Lig. laterale externum, geht vom Epicondylus externus zum Köpfchen der Fibula. Das innere besteht eigentlich aus zwei Bändern, dem Lig. laterale internum longum et breve. Beide entspringen an dem Epicondylus internus femoris, ziehen dicht auf einanderliegend senkrecht nach abwärts und setzen sich das erstere an der Innenfläche der Tibia, das letztere an der Bandscheibe an.

Die Kapsel des Kniegelenkes unterscheidet sich von allen anderen Gelenkkapseln durch ihre grosse Ausdehnung — sie be-

ginnt am Femur etwas oberhalb der Knorpelgrenze und setzt sich dicht unter dem Knorpel des Tibiakopfes fest und weiterhin dadurch, dass ihre äusseren derben Schichten hauptsächlich ein Erzeugniss der umliegenden Muskeln sind. An der oberen Seite stellt diesen äusseren Faserbelag dar die Sehne des Quadriceps, an der hinteren Seite die Sehnen des M. popliteus, semimembranosus und gastrocnemius.

Die im Kniegelenk möglichen Bewegungen sind Beugung, Streckung und Rotation des Unterschenkels. Eine solche Rotation des Unterschenkels nach aussen stellt sich stets als Schlussbewegung der Streckung ein, in Folge der eigenthümlichen Gestaltung der Femurcondylen.

Die Hemmung der Bewegungen geschieht theils durch extreme Verschiebung der Semilunarknorpel, theils durch die Seiten- und Kreuzbänder. Die Streckung findet ihre Grenzen in dem Moment, in welchem Femur und Tibia in einer Geraden stehen, die Tibia zudem etwas nach aussen rotirt, durch die Spannung des Lig. cruciatum posterius, der Seitenbänder, der hinteren Kapselwand und schliesslich dadurch, dass sich der äussere Meniscus an eine kleine dreieckige Facette, die sog. Hemmungsfacette der Femurrolle, anstemmt. Die Beugung wird gehemmt durch die Spannung des Lig. cruciatum anterius sowie durch die Berührung von Unter- und Oberschenkel.

Frequenz und Eintheilung der Kniegelenksluxationen.

Wegen der Festigkeit des Kniegelenkes, bedingt durch seinen starken Bandapparat und die Breite der Gelenkflächen, wegen des Mangels einer seine Bewegungen stark hemmenden Knochenkante sind Luxationen desselben relativ selten. Immerhin existieren doch nach einer sehr vollkommenen Zusammenstellung *Cramer*'s 270 Fälle in der Litteratur. Sie setzen stets eine bedeutende Gewalteinwirkung voraus und ereignen sich besonders bei älteren Männern, ungleich viel seltener bei Frauen.

Je nach der Richtung der Gewalt und der Stellung des Beines unterscheidet man im allgemeinen vier verschiedene Formen der Luxation:

1) Luxation der Tibia nach vorn,
2) Luxation der Tibia nach hinten,
3) Seitliche Luxation der Tibia nach aussen oder innen,
4) Rotationsluxation der Tibia.

Alle diese verschiedenen Luxationen können vollständige und unvollständige sein.

1. Luxationen der Tibia nach vorn.

Die Verrenkung der Tibia nach vorn ist die häufigste der Kniegelenksluxationen. Unter den 270 Fällen *Cramer*'s waren 109 Luxationen nach vorne.

Die Ursache dieser Verletzungen ist entweder eine directe Gewalt oder eine bedeutende Ueberstreckung des Gelenkes. Stets sind es aber die Condylen des Oberschenkels, welche die Kapsel sprengen und sich von der Tibia entfernen.

Eine directe Gewalt muss den Oberschenkel so treffen, dass sie ihn kräftig nach hinten schiebt. Das Knie kann dabei in Beugung oder Streckung stehen. Die Luxation kommt jedoch so entschieden seltener zu Stande als durch Ueberstreckung. Bei einer solchen drängen die Condylen des Femur gegen die Seitenbänder und die hintere Kapselwand und zwingen diese zum Nachgeben. So entsteht die Luxation, wenn Patienten von einer Höhe herab auf die Füsse stürzen oder wenn sie bei schnellem Laufen, vielleicht bergabwärts, die Bewegung selbst plötzlich einzuhalten versuchen oder dazu gezwungen werden, indem sie mit ihrem Unterschenkel in ein tieferes Loch gerathen. In beiden Fällen erhält der Körper das Uebergewicht nach vorn und erzeugt so die Verschiebung der Gelenkenden.


Unruh hat versucht, die Luxation nach vorn an der Leiche herzustellen. Ueberstreckte er den Unterschenkel bis zu einem rechten Winkel mit dem Oberschenkel und liess dann eine Beugebewegung folgen, so entstand die Luxation, wenn der Unterschenkel während der Beugung stark nach vorn gedrückt wurde. Dabei blieben die Seitenbänder erhalten, während die Kreuzbänder zerrissen. Es gehörte immerhin eine grosse Kraft dazu, die Luxation so zu erzeugen. Leichter entstand sie, wenn der Unterschenkel bei der Beugebewegung nicht nur nach vorn gedrückt, sondern gleichzeitig adducirt und nach innen rotirt wurde. Dann zerriss das äussere Seitenband, während das innere intact blieb. Wurde dann an demselben Gelenk durch forcirte Abduction auch noch das innere Seitenband zerrissen, so gelang es nun spielend leicht, die Luxation herzustellen und zu reponiren. Eine Verrenkung mit alleiniger Erhaltung des äusseren Seitenbandes liess sich nur dann

herstellen, wenn nach Sprengung der hinteren Kapselwand durch Ueberstreckung das Lig. laterale internum durch kraftvolle Abduction eingerissen worden war.

Die pathologische Anatomie der Unterschenkelverrenkung nach vorn ist relativ einfach. Die Luxation ist entweder eine unvollständige, dann ruhen die Condylen des Femur auf den hinteren Partien der tibialen Gelenkfläche, oder sie ist — und das in der Mehrzahl der Fälle — eine vollständige, dann ruht die Vorderfläche der Condylen des Femur auf der hinteren scharfen Kante der Tibia auf, oder die letztere ist an den Condylen ganz in die Höhe gerückt, so dass ihre hintere Fläche auf der Trochlea liegt. Oefters ist dabei die Tibia zugleich schwach seitwärts gerückt, so dass ihr innerer Condylus nach der inneren Seite oder der Kopf der Fibula nach der äusseren Seite herausragt (Fig. 334 und 335).

Es ist klar, dass solche hochgradigen Verschiebungen der Gelenkenden gegen einander nur mit bedeutender Verletzung der benachbarten Weichtheile einhergehen können. Die Kapsel wird

Fig. 334.



stets zu beiden Seiten der Kniescheibe ausgiebig zerrissen. Die Lig. lateralia können vollkommen unversehrt sein *(Urlichs)*, finden sich aber in der Regel auch zerrissen, und es kann sich der Riss dann auch noch durch die Aponeurose des Vastus externus und


internus forterstrecken. *v. Volkmann* beobachtete in einem Falle eine so vollständige Ausreissung des Lig. laterale ext. vom Knochen, dass die Rinde des zugehörigen Epicondylus in der Grösse eines Markstücks entblösst war. Die Lig. cruciata sind immer fetzig zersprengt, das Lig. patellae proprium dagegen meist unverletzt. Von den umgebenden Muskeln sind die beiden Köpfe des Gastrocnemius vollständig zerquetscht oder auch theilweise noch erhalten. Die Nerven und Gefässe der Kniekehle werden selten zerrissen, wohl nur bei gleichzeitiger Zerreissung der bedeckenden Haut. Sie verlaufen dagegen stark gespannt in der Furche zwischen den beiden Femurcondylen. An den Knochen selbst wurden neben Absprengungen kleinerer Knochenstücke vollständige Zertrümmerungen des Tibiakopfes, Rissfracturen des Fibulaköpfchens durch das äussere Seitenband und schliesslich Lösung der Gelenkverbindungen zwischen der Tibia und Fibula beobachtet.

Die **Symptome** der Luxation sind unverkennbar. Bei der **unvollständigen** Verrenkung (Fig. 334) hat das Knie seine normale Wölbung verloren, dagegen steht die Gelenkfläche der Tibia derart nach vorn vor, dass sie sich leicht unter der Haut abtasten lässt. Letztere ist stark gespannt, durch die vorspringende Tuberositas tibiae oft auch weisslich verfärbt. Die Patella liegt schlaff, und mit der Femurrolle ein wenig zurückgesunken, in der Regel nach aussen. Die Condylen des Oberschenkels ragen in der Kniekehle hervor. Das Bein steht gestreckt und kann nur wenig gebeugt werden.

Noch greifbarer gestaltet sich das Bild der **vollständigen** Verrenkung (Fig. 335), das wir nach einem von *Kaarsberg* beschriebenen Falle wiedergeben. Das Kniegelenk scheint wie nach hinten zusammengeknickt. Vorn erhebt sich vorspringend die Tuberositas tibiae. Sie setzt sich in das nach hinten umbiegende Lig. patellae fort, zu dessen beiden Seiten man tief eindringen und die Gelenkfacetten der Tibia fühlen kann. Die Mitte der Gelenkfläche wird von der Patella eingenommen, welche sich entweder, steil nach hinten gerichtet, gegen die Femurrolle anlehnt oder platt, die Vorderfläche nach oben gedreht, der Tibia wie ein Deckel aufliegt. Das erstere ist der Fall, wenn die Femurcondylen noch auf der Hinterkante der Tibia aufruhen, das letztere, wenn sich die Gelenkflächen gänzlich verlassen haben. Der obere Patellarrand sieht nach hinten und ist vom Bauche des erschlafften Quadriceps durch mehrere

tiefe, halbkreisförmige Hautfalten geschieden. Die Fossa poplitea ist verstrichen. An ihrer Stelle gewahrt man die beiden Buckel der Femurcondylen dicht unter der unverletzten Haut. Das Bein steht in Streckung, meist sogar in Ueberstreckung und ist je nach der Grösse und Weite des Kapselrisses entweder fixirt oder freier beweglich. In Fällen bedeutender Zerstörung konnte man den Unterschenkel an

Fig. 335.



dem erhobenen Femur förmlich baumeln lassen. Stets ist eine Verkürzung des Beines vorhanden, wenn die Gelenkenden ausser Berührung gerathen sind. Bei unverletzter Haut beträgt dieselbe aber nicht mehr als 3—5 cm. Bei Compression der Kniekehlengefässe und Nerven fehlt der Puls in der Art. dorsalis pedis, und es kommt zum Gefühl von Ameisenkriechen und Taubsein des Fusses.

Nach dem Gesagten unterliegt die Diagnose keiner Schwierigkeit. Die einzig mögliche Verwechslung mit einer Fractur oder Epiphysenlösung am unteren Femurende kann durch genaue Betastung der Gelenkenden wohl stets vermieden werden.

Die **Prognose** der Luxation ist in Beziehung auf die Brauchbarkeit des Gliedes eine zweifelhafte, indem selbst bei unvollständiger Luxation das Gehen zumeist mangelhaft und die volle Beugung unmöglich ist. Nach Zerreissung der grossen Gefässe und

Nerven kann es zu Gangrän des Beines kommen. Die Reposition geschieht aber in der Regel leicht, doch können selbst nach geschehener Einrichtung Thrombosen in den Gefässen entstehen, sobald diese einem länger dauernden Druck ausgesetzt gewesen waren. Dann kommt es in den günstigeren Fällen auch nachträglich noch zu Circulations- und trophoneurotischen Störungen, in den schlimmeren aber zu Lähmungen, ja selbst zu Gangrän des Beines. Eine andere Unannehmlichkeit, die nach Reposition der Luxation zurückbleiben kann, ist eine Lähmung der Streckmuskeln des Fusses. *Kaarsberg* berichtet über eine solche, die ein halbes Jahr nach der Verletzung zwar gebessert, aber noch nicht ganz aufgehoben war.

Die complicirten Luxationen, die früher wegen Vereiterungen und Verjauchungen des Blutextravasates die Amputation verlangten, werden wohl heutzutage unter dem Schutze der Aseptik auch günstiger verlaufen.

Die **Therapie** besteht in der Reposition durch Extension am Unterschenkel, Contraextension am Oberschenkel oder an einem Perinealgurt und directer Impulsion der Gelenkenden, indem der Operateur dieselben mit seinen Händen, die einander entgegendrücken, in ihre richtige Lage drängt.

Man kommt auch wohl zum Ziele, wenn man nach geschehener Distraction der Gelenkenden das Knie beugt.

Hueter empfiehlt als rationelle Methode die Ueberstreckung der Tibia mit nachfolgender Beugung derselben, während gleichzeitig ein Druck mit der Hand das obere Tibiaende nach hinten drängt. Dabei ist allerdings die Gefahr zu beachten, dass die Hyperextension die ohnehin schon gespannten Nerven und Gefässe trennen könnte.

2. Luxationen der Tibia nach hinten.


Die Luxation der Tibia nach hinten ist wiederum entweder eine **vollständige** oder **unvollständige.** Im ersteren Falle sind die Femurcondylen ganz vor die der Tibia gerutscht, im letzteren ruhen sie noch auf der vorderen Kante der Tibia auf. *Cramer* hat 53 Fälle aus der Litteratur zusammengestellt.

Die Luxation entstand in der Mehrzahl der Fälle durch eine directe Gewalt, welche das Knie in ganzer oder halber Beugung von vornher traf und die Tibia direct nach hinten stiess.

So wirkten auffallende Lasten oder das Auffallen mit dem gebeugten Unterschenkel gegen irgend einen kantigen Gegenstand. Der umgekehrte Mechanismus, ein Stoss von hinten gegen den Femur erzeugt die Luxation viel seltener. *Stetter* sah sie bei einem jungen Menschen entstehen, der beim Herablaufen von einem steilen Berg plötzlich still stehen wollte. Er stemmte dabei den einen Fuss gegen weichen Lehmboden, schnellte den Oberkörper gewaltsam zurück, fühlte in dem betreffenden Knie einen heftigen Schmerz und brach sofort zusammen. *Kraske* sah in einem Falle die Luxation folgendermassen entstehen. Während das Gelenk flectirt war, wurde das Femur durch die Gewalt des Körpers, der im Laufen begriffen, noch eine Triebkraft nach vorn hatte, über die Tibia hinaus getrieben, als letztere nach dem Laufen durch einen unvermuthet tiefen Sprung plötzlich ruhig gestellt wurde.

Die Kapsel reisst bei dieser Luxation in ihren hinteren Partieen, indem dieselben von den Tibiacondylen gesprengt werden. Die Seitenbänder und das Lig. patellae können erhalten sein (*Vast*),

Fig. 336.



finden sich ebenso oft aber auch verletzt. Die Lig. cruciata sind stets zerrissen und die Semilunarknorpel meist dislocirt. Die umgebenden Muskeln können intact sein, man fand aber sogar schon die Quadricepssehne abgerissen. Da die hintere Kante der Tibia


scharf ist und keinen Ausschnitt besitzt, so erleiden die Gefässe und Nerven der Kniekehle bei vollständiger Verrenkung immer eine bedeutende Zerrung und Quetschung. Die Gefässe können auch wohl einreissen, so dass dann traumatische Aneurysmen entstehen.

Die **Symptome** der Verrenkung nach hinten entsprechen in umgekehrter Weise denen der Luxation nach vorn.

Bei der **unvollständigen** Luxation (Fig. 336) steht der Unterschenkel gewöhnlich ganz leicht flectirt. Die Femurcondylen springen nach vorn hervor, so dass die Patella etwas nach hinten abgewichen ist und der Durchmesser des Gelenkes von vorn nach hinten vergrössert wird.

Bei der **vollständigen** Luxation (Fig. 337) sind die Zeichen natürlich noch viel ausgesprochener. Hier hat der Durchmesser des Gelenkes von vorn nach hinten die doppelte Breite wie normal. Von vorn und von der Seite betrachtet, hängt der Oberschenkel sozusagen über den Unter-

Fig. 337.



schenkel herab, von hinten dagegen hat man das vollkommenste Bild eines Genu recurvatum, indem der Unterschenkel förmlich nach vorn umgebogen erscheint. Vorn treten die beiden Femurcondylen so stark hervor, dass ihre

ganze Schleiffläche gefühlt werden kann. Die Patella liegt ganz horizontal, so dass ihre Vorderfläche direct nach abwärts sieht. Zu beiden Seiten ihres Ligamentes finden sich tiefe Einsenkungen der Haut. Hinten springt der obere Rand der Tibiaepiphyse hervor. Ueber ihr verläuft straff gespannt die Haut. Haben sich die Gelenkenden gegen einander verschoben, so besteht neben diesen Zeichen noch eine Verkürzung des Beines. Active Bewegungen der Extremität sind nicht möglich, passive in geringem Grade unter heftigen Schmerzen.

Kaarsberg beobachtete eine Luxation der Tibia nach hinten complicirt mit einem Schrägbruch des Condylus ext. femoris. Die Extremität war ein wenig nach aussen rotirt und eine Verkürzung von 2—3 cm vorhanden.

Zur **Differentialdiagnose** könnte nur eine Fractura supracondylica femoris mit Dislocation des unteren Fragmentes nach hinten in Frage kommen, wenn etwa ein starker Bluterguss die Contouren verwischt hat. Hier entscheidet wieder die genaue Palpation in Narcose, welche bei der Fractur abnorme Beweglichkeit, Crepitation und Unversehrtheit der Gelenkverbindungen nachweisen wird.

Die **Prognose** der Luxation nach hinten ist quoad functionem eine bessere als die der Luxation nach vorn, indem selbst bei nicht eingerichteten unvollständigen (*Malgaigue*, *Lossen*, *Schröter*) und vollständigen (*Karewski*) Luxationen die Gehfähigkeit fast normal werden kann. So konnte die Patientin *Karewski*'s ihr Bein in normalen Grenzen beugen und strecken. Die Gebrauchsfähigkeit des Beines kann aber dadurch zuweilen gestört werden, dass Nervenlähmungen entstehen. Der oben erwähnte Patient *Stetter*'s behielt trotz leicht gelungener Reposition eine mehrmonatliche Lähmung der Peronealmuskulatur zurück. In einer Beobachtung *Lossen*'s entwickelte sich infolge Zerreissung des inneren Seitenbandes nachträglich ein Genu valgum. Schliesslich kann es nach Zerreissung oder Thrombose der Kniekehlengefässe zu Gangrän des Fusses kommen.

Die **Therapie** bewirkt die Reposition leicht durch Distraction der Gelenkenden, verbunden mit directer Impulsion derselben. Man kann auch wohl den Unterschenkel erst extendiren und ihn dann beugen, bis der Fuss das Gesäss berührt, und so die Einrichtung erzielen.


3. Seitliche Luxationen der Tibia nach aussen oder nach innen.

Die seitlichen Luxationen der Tibia sind sehr selten. Es sind nach *Cramer* im ganzen ungefähr 48 äussere und 18 innere beschrieben worden. (Fig. 338).

Die Luxation ist dabei fast stets nur eine unvollkommene, so dass z. B. bei der Luxation nach aussen der innere Condylus der Tibia so weit nach aussen verrückt wird, dass er unter den äusseren Condylus des Oberschenkels zu stehen kommt und umgekehrt.

Die Luxation setzt die Zerreissung eines oder beider Seitenbänder mitsammt der anliegenden Kapselpartie und die Zerstörung der Lig. cruciata voraus. In Fällen vollständiger Luxation, welche in der Regel durch schwere Gewalten wie Maschinenverletzungen

Fig. 338.



entstehen, ist meist die Haut eingerissen, so dass die Condylen durch die gequetschten Weichtheile hervorragen.

Im Uebrigen ist die Ursache entweder ein seitliches Umknicken des Knies beim Fallen oder Springen auf die Füsse, beim Zusammenbrechen unter einer schweren Last oder eine Abbiegung des Oberschenkels sammt dem Stamme nach der einen oder anderen

Seite, während der Unterschenkel auf irgend eine Weise fixirt ist. Die äusseren und inneren Condylen der Tibia und des Femur werden dabei von einander abgehebelt, die Seitenbänder und die Kapsel zerreissen, und die Gelenkenden gleiten von einander ab. In seltenen Fällen drängt auch wohl eine directe Gewalt, z. B. aufstürzende Erdmassen, das Femur und die Tibia zur Seite.

Die **Symptome** der Verletzung werden meisterhaft von *Pitha* geschildert. Der Durchmesser des Kniegelenkes ist verbreitert. Auf der äusseren bezw. inneren Seite ragt der Kopf der Tibia hervor, zuweilen so vollständig, dass ihre ganze obere Gelenkfläche tellerförmig frei zu sehen ist und man bequem mehrere Finger auf sie auflegen oder ein Trinkglas darauf stellen könnte. Die Haut ist dann auf der fast ebenen Gelenkfläche straff und glatt gespannt. Sie schmiegt sich unter einem scharfen rechten Winkel an den Oberschenkel an, ist durch den Rand der Tibia weisslich verfärbt und droht jeden Augenblick durchzuschneiden. Auf der entgegengesetzten Seite tritt der betreffende Condylus femoris unter eben so schroffem Absatze zum Unterschenkel hervor. Die Patella wird mit der Tibia nach aussen oder innen verzogen und steht in der Regel schief, fast quer. Der Fuss ist des öfteren nach aussen gedreht bei einer äusseren, nach innen bei einer inneren Luxation.

Die **Diagnose** der Verletzung ist leicht. *Stetter* lässt an eine momentane Verwechslung mit einer in Folge der Fractur eines Condylus femoris entstandenen seitlichen Verschiebung des Unterschenkels denken, wobei zugleich das Fragment etwas nach oben dislocirt und der Unterschenkel gebeugt ist. Die Dünne der bedeckenden Weichtheile würde jedoch stets gestatten, den abgebrochenen Condylus zu fühlen.

Die **Prognose** der Verletzung ist eine relativ günstige, indem die Einrichtung meist leicht gelingt und die Gebrauchsfähigkeit des Beines nachher eine gute wird. Die Reposition kann aber gelegentlich auch nicht gelingen, so dass operative Eingriffe nöthig werden.

Bei nicht eingerichteten Luxationen bleiben Beugung und Streckung des Gelenkes stets mangelhaft, während sich überdies noch je nach der Art der Verrenkung ein Genu varum oder valgum ausbildet.

Die **Therapie** vollzieht die Reposition durch Zug am Unterschenkel und directes Hineindrücken des Tibiakopfes an seine

normale Stelle. Will die Reposition nicht gelingen, so kann man unter aseptischen Cautelen auf das Hinderniss, die gespannte eingeklemmte Kapsel einschneiden und dieselbe beseitigen (*Braun, Schlange*).

Als Beispiel einer gelungenen Reposition führen wir einen kürzlich von *Bauer* mitgetheilten Fall an. Ein 62 jähriger Mann hatte durch einen Schlag, der die innere Seite seines Unterschenkels traf, eine vollständige Luxation der Tibia nach aussen erlitten. Bei der Untersuchung fiel neben der Schwellung des Knies sofort eine Verbreiterung desselben auf. Bei der Betastung des um 8 cm verkürzten Beines fühlte man innen das nur von Haut bedeckte Femurende. Die Patella war nach aussen gerückt, sehr beweglich und leicht abhebbar. Hinter ihrem oberen Rande fühlte man das obere Ende der Tibia, deren ganze Gelenkfläche man genau abtasten konnte. Die Reposition gelang leicht durch Zug und Druck. Die Heilung erfolgte langsam aber vollkommen mit normal beweglichem Gelenk.

Als ein weiteres Beispiel, bei welchem die Reposition erst auf operativem Wege gelang, sei die Beobachtung von *Schlange* erwähnt. Ein 57 Jahre alter Herr war beim Herabstürzen von der Höhe zwischen Bretter und Balken eingeklemmt worden. Er hatte heftige Schmerzen und konnte sein Bein sofort nicht bewegen. Es zeigte sich das typische Bild einer Subluxation der Tibia nach aussen. Da die Reposition in der Narcose misslang, wurde das Gelenk durch einen Längsschnitt blossgelegt. Die Kapsel war an ihrer Verbindungsstelle mit dem Femur an der inneren Seite abgerissen; ausserdem war die Muskulatur des Vastus internus etwa eine Handbreit über dem Kniegelenk durchtrennt. Durch diesen Kapsel- und Muskelriss war der Condylus internus femoris ausgetreten. Die abgerissenen Kapsel- und Muskeltheile waren in die Fossa intercondylica femoris gerathen und bildeten einen festgespannten Ring, welcher den Knochen so umklammerte, dass erst nach Incision desselben die Reposition gelang. Das Resultat war ein sehr gutes, indem die Function des Gelenkes fast in normaler Weise wiederhergestellt wurde.

4. Rotationsluxationen der Tibia.


Bei den Rotationsluxationen der Tibia ist dieselbe nach aussen oder innen verschoben, so zwar, dass die Dislocation in deren einen oder anderen Diagonale vor sich geht. Es liegen

nach den neuesten Zusammenstellungen *Wille*'s und *Cramer*'s überhaupt nur 34 Beobachtungen vor und zwar 15 vollständige und 19 unvollständige Luxationen.

Bei der **vollständigen** Luxation handelt es sich um vollständige Aussenrotationen mit 2 Typen, einmal einer reinen Rotation, zweitens um Rotationen mit gleichzeitiger Subluxation nach aussen und hinten.

Als Beispiel citiren wir den Fall *Wille*'s, den dieser an dem linken Bein einer weiblichen Leiche fand. Es zeigte sich an diesem Beine erstens eine Rotation des Unterschenkels nach aussen um etwa 90° mit sehr starker Dislocation der Patella nach aussen; zweitens eine unvollständige Luxation der Tibia nach hinten und aussen und drittens eine Neigung des Unterschenkels gegen den Oberschenkel um einen Winkel von ungefähr $1^1/_2$ R., welcher nach hinten und innen offen war (Fig. 339). Das Knie stand in äusserster Extensionsstellung; weitere Extension war unmöglich; die Beugung gelang dagegen bis zur Berührung der beiderseitigen Hautflächen.

Fig. 339.



Nach Leichenexperimenten, die *Dubreuil* und *Martellière* sowie *Wille* anstellten, ist es wahrscheinlich, dass die Luxation durch eine Gewalt entsteht, welche den Unterschenkel — vielleicht nach vorgängiger Luxation der Patella nach aussen — nach aussen rotirt und gleichzeitig abducirt.

Um die Erscheinungen der **unvollständigen** Luxationen zu charakterisiren, führen wir die am besten beschriebene Beobachtung *Sulzenbacher*'s an.

Das Knie war gestreckt, der Unterschenkel so rotirt, dass bei der Rückenlage des Kranken der äussere Fussrand auf der Unterlage auflag. Ausserdem war er parallel zu sich nach hinten und aussen gerückt. Trotz der bedeutenden Schwellung der Kniegegend trat das untere Femurende mit den Condylen deutlich

hervor, und die Weichtheile unterhalb desselben liessen sich tief eindrücken. Unterhalb des Condylus internus war ein bohnengrosses freibewegliches Knochenstück zu fühlen. In der Kniekehle fühlte man das obere Ende der Tibia nach hinten und aussen prominirend. Die äussere Gelenkfläche mit dem unter ihr liegenden Wadenbeinköpfchen kam am meisten nach hinten zu stehen und konnte durch die Weichtheile hindurch betastet werden. Die vordere Tuberositas tibiae sah nach aussen und hatte mit dem unverletzten Lig. patellae propr. die Patella lateralwärts gezogen, so dass diese knapp an die Aussenseite des Condylus externus zu liegen kam. Sie war quer gelagert, sah mit ihrem inneren Rande nach vorn, mit ihrer vorderen Fläche nach aussen oben. Verkürzung 3 cm. Die Verletzung war dadurch entstanden, dass ein Balken den inneren Fussrand traf, den Fuss nach aussen rotirte und am Boden festhielt, während der Oberkörper nach vorne überfiel — also Rotation und Hyperextension im Knie.

Die **Reposition** geschieht durch Extension an der in ihre richtige Stellung rotirten Tibia und directe Impulsion ihres Kopfes mittelst Händedruck.

Wir wollen schliesslich noch einmal darauf hinweisen, dass bei allen irreponibeln Kniegelenksluxationen die aseptische Arthrotomie angezeigt ist.

Bei complicirter Luxation muss von vorn herein strengste Aseptik walten. Bei Zerreissung der Nerven und Gefässe der Kniekehle ist die primäre Amputation indicirt.

Die **Nachbehandlung** der eingerichteten Kniegelenksluxationen besteht darin, dass man das Glied für 2—3 Wochen in eine Hohlschiene, bei nicht zu starker Schwellung auch wohl in einen Contentivverband legt und dann vorsichtig mit Massage und Gymnastik beginnt.

Bei veralteten, schlecht geheilten Fällen könnte man vielleicht noch durch eine nachträgliche Resection der Gelenkenden brauchbare Glieder erzielen *(Doutrelepont)*.

Zu den Luxationen, die im Kniegelenk vorkommen können, gehören auch die Verschiebungen der Zwischenbandscheiben, die sogenannten

Luxationen der Zwischenknorpel.

(Internal derangement of the knee joint.)

Die Verschiebung der Zwischenbandscheiben ist eine schon lange gekannte Verletzung. Sie war schon *Bass, Bromfield, Hey*

bekannt und ist von *Cooper* genauer beschrieben worden. Später wurde aber ihr Vorkommen geleugnet, und die durch sie bedingten Erscheinungen wurden auf das Vorhandensein freier Gelenkkörper zurückgeführt. Wenn nun auch letztere ein ähnliches Bild darbieten können, so ist doch eine Dislocation der Zwischenknorpel sicher möglich. Dies beweisen anatomische Befunde, die man theils am Lebenden, theils an der Leiche gewonnen hat. *P. Bruns* konnte im Jahre 1892 schon 43 dieser sicheren Beobachtungen feststellen. 27 derselben betrafen den Meniscus internus, 13 den Meniscus externus.

Die Luxation des inneren Meniscus kommt also etwa doppelt so häufig vor wie die des äussern.

Der anatomische Befund bei der Luxation des Meniscus internus gestaltet sich etwa folgendermassen. Weitaus am häufigsten ist die vordere Insertion des Semilunarknorpels an der Tibia ausgerissen; dieselbe ist dabei oft auch noch eine kürzere oder längere Strecke aus ihrer Bandverbindung mit der Gelenkkapsel gelöst. Das vordere Ende des Meniscus ist dann abnorm beweglich; es ist ferner bald nach vorne oder nach hinten in das Innere des Gelenkes verschoben, bald umgeschlagen oder zusammengefaltet oder in Fransen zerspalten.

Nur selten ist der Meniscus an seiner hinteren Insertion abgerissen; das hintere Ende ist dann in der Regel nach vorn umgeschlagen.

Bei einigen Beobachtungen (3 mal unter 27 Fällen) fand sich der mittlere Theil des Meniscus abnorm beweglich und nur einwärts verschoben oder umgebogen.

Mehrmals fand sich der Meniscus in seiner Substanz durchtrennt oder gespalten; die Fragmente waren dann gelegentlich mit rechtwinkeliger Knickung wieder zusammengewachsen, oder das eine Fragment stand zungenförmig vom anderen ab oder hing nur noch wenig mit demselben zusammen.

In ganz ähnlicher Weise gestalten sich die Verhältnisse bei der Luxation des äusseren Semilunarknorpels. Unter den 13 Fällen war der Meniscus 5 mal an seinem vorderen Ende, und 1 mal an seinem hinteren Ende getrennt; zweimal zeigte er sich in seinem mittleren Theil getrennt und verschoben.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass eine complete Luxation des Meniscus nicht vorkommt, dass vielmehr nur seine vordere oder hintere Hälfte nach innen oder aussen und dabei gleichzeitig etwas nach vorn oder hinten luxirt werden kann.

Bei den Bewegungen der Gelenkenden tritt das abgerissene Ende des Meniscus entweder beständig hervor und zurück, so dass es bei der Beugung und Streckung aus der Gelenkspalte aus- oder einschnappt, oder es wird zwischen den Gelenkenden eingeklemmt und umgeknickt oder zusammengefaltet.

Aetiologie. *P. Bruns* stellte fest, dass es zunächst unzweifelhafte Fälle von Spontanluxation der Semilunarknorpel giebt. In diesen Fällen genügen schon ganz geringe Gewalten zur Entstehung der Luxation. Bei den Betroffenen muss man eine Prädisposition zur Verletzung annehmen, die darin beruht, dass die vordere Insertionsstelle des medialen Meniscus sehr dünn und schwach entwickelt ist und dass daneben vielleicht noch eine grössere Rotationsmöglichkeit des Kniegelenkes besteht.

Auch eine allmähliche Abtrennung der vorderen Insertionsstelle hält *P. Bruns* für möglich und zwar durch häufige Wiederholung gewisser Bewegungen, wie beständiges Arbeiten auf den Knieen.

Die Luxation des Meniscus, wie siei m Anschluss an Verletzungen entsteht, ist durch eine forcirte Rotation des Unterschenkels bei gebeugtem Kniegelenk zu erklären, und zwar führt eine forcirte Aussenrotation zur Ausreissung des vorderen Endes des innern Meniscus. Die Voraussetzung dabei ist, dass ein fester Bandapparat, namentlich straffe Seiten- und Kreuzbänder, vorhanden sind, welche bei der Rotation die Gelenkflächen des Femur und der Tibia fest aufeinanderpressen. Der Meniscus wird dann durch den ihm fest aufliegenden Femurcondylus gehindert, sich, wie er das sonst thut, mit der rotirenden Tibia mitzubewegen; die Hemmung dieser Bewegung spannt ihn stark an und führt schliesslich zur Abreissung seiner vorderen Insertionsstelle.

Diese von *P. Bruns* entwickelte Lehre 'vom Mechanismus der Meniskenruptur steht im schroffsten Widerspruch zu der bisher allgemein gültigen, von *Dubreuil* und *Martellière*, von *Pitta*, *Loreta* und *Knoth* ausgesprochenen Ansicht, dass die Luxation nur bei schlaffem Bandapparat entstehen könne. Ein solcher spielt wohl nur eine Rolle in den seltenen Fällen, in denen nur eine abnorme Beweglichkeit der Menisken, keine Ruptur derselben vorliegt.

Was die **Gelegenheitsursachen** betrifft, so erwähnen die englischen Chirurgen zahlreiche Beispiele, in denen die Verletzung beim Fussballspielen entstand. Der Unterschenkel wurde dabei

jedesmal gewaltsam rotirt. Mehrmals kamen die Luxationen beim Turnen zu Stande, oder beim Sprung aus der Höhe oder über ein Hinderniss hinweg, oder beim Fall oder Zubodengeworfenwerden, wobei das Knie oder der Unterschenkel unter den Körper zu liegen kommt.

Die **Symptome** der frischen Verletzung sind etwa folgende: Nach der veranlassenden Ursache fühlt der Verletzte ganz plötzlich einen heftigen Schmerz in der inneren oder äusseren Seite des Kniegelenkes, so dass er sich öfters nicht mehr recht aufrecht zu erhalten vermag. Kommt er zur Untersuchung, so steht das Knie halb gebeugt und ist in dieser Stellung so vollständig fixirt, dass jede Bewegung, besonders jeder Streckversuch die heftigsten Schmerzen hervorruft. Immer folgt eine Schwellung des Gelenkes durch acuten Erguss und eine entsprechende Gebrauchsstörung. Diese letztere verliert sich nun allmählich und tritt im weiteren Verlaufe nur noch zeitweise auf. Die frische Luxation geht allmählich in die veraltete resp. habituelle Luxation über. Die Erscheinungen dieser ähneln denen eines freien Gelenkkörpers. In kürzeren oder längeren Zwischenräumen treten plötzlich Anfälle von heftigem Schmerz und Bewegungshemmung auf, welche von einer Einklemmung der abgerissenen Meniscusenden zwischen den Gelenkflächen herrühren. Die Anfälle werden oft durch bestimmte Bewegungen, namentlich beim Treppensteigen, bei rascher Drehung des Körpers, beim Aufstehen vom Sitz u. s. w. ausgelöst. Mit einem heftigen Schmerz steht das Knie in leichter Beugung fest und kann eine Zeitlang nicht bewegt werden. Der Patient kann nicht gehen, bis er bei einer stärkeren Bewegung das Gefühl hat, als ob ein beweglicher Theil im Gelenk nachgiebt oder mit einem deutlichen Ruck einschnappt. Erfolgen diese Anfälle seltener, so sind sie jedesmal von einem Erguss in das Gelenk gefolgt. Die objective Untersuchung giebt in der Regel ein positives Resultat. Am häufigsten fühlt man an der inneren oder äusseren Hälfte der Gelenkspalte einen beweglichen flachen Körper, der bei der Streckung des Gelenkes hervortritt, bei der Beugung desselben in der Gelenkspalte verschwindet. Bei dem Ein- und Ausschnappen ist ein deutlicher Ruck oder ein Knacken zu fühlen und zuweilen auch zu hören.

In einer anderen Reihe von Fällen lässt sich ein beweglicher Körper nicht fühlen. Man findet dann aber die betreffende Partie der Gelenkspalte abnorm verbreitert und vertieft, sowie bei Druck entschieden empfind-

lich. Es sind das diejenigen Fälle, in denen die abgerissenen Enden in das Innere des Gelenkes verschoben sind.

Bezüglich der **Prognose** ist zu bemerken, dass hier und da eine dauernde Functionsstörung bestehen bleibt, indem das Auftreten Schmerzen macht, so dass das Gehen nur mit gestrecktem Beine oder mit Hülfe eines Stockes möglich ist.

Die **Reposition** vollzieht man nach *Hey*, *Sandham*, *Aleotti* u. a. am zweckmässigsten in der Weise, dass man zunächst kräftig an der Tibia extendirt, sie dann so stark als möglich beugt und in dieser Stellung einige Aus- und Einwärtsrotationen des Unterschenkels folgen lässt, indem man eventuell einen gleichzeitigen Druck auf den vorspringenden Meniscus ausübt. Man hält dann den Patienten für einige Tage im Bett und lässt später, um Recidive zu vermeiden, längere Zeit eine Kniekappe tragen. Die Aussicht, dass die Heilung auf diese Weise eintritt, ist aber eine geringe.

Bei habitueller Luxation kann nur durch einen operativen Eingriff ein brauchbares Glied erzielt werden. Entweder näht man den Meniscus wieder an das Periost an (*Annandale*, *Davis-Colly*, *Allingham*), oder man exstirpirt ihn vollständig (*Croft*) oder partiell (*Bruns*).

Als das normale Operationsverfahren empfiehlt *P. Bruns* die partielle Exstirpation des Meniscus, die ihm und anderen Chirurgen (*Madelung*, *Haenel*, *Lardy*) stets günstige Resultate geliefert hat. Der Fortfall selbst des ganzen Meniscus schädigt die Funktion des Gelenkes nicht. Die Exstirpation geschieht von einem Längsschnitt aus.

Luxationen des oberen Tibiofibulargelenkes.


Das obere Tibiofibulargelenk liegt an der hinteren Seite des äusseren Condylus der Tibia. Die Gelenkflächen beider Knochen sind beinahe eben. Sie werden durch eine derbe Kapsel mit einem vorderen Verstärkungsbande verbunden. Das Gelenk selbst gestattet nur eine ganz geringe Beweglichkeit und kommunicirt zuweilen mit dem Kniegelenk. Traumatische Verrenkungen dieses Gelenkes sind chirurgische Seltenheiten. Nur neben anderweitigen Verletzungen, wie den Luxationen des Kniegelenkes, den Fracturen des Fibulaköpfchens und den Fracturen des oberen Tibiaendes hat man sie öfters beobachtet. So ist zum Beispiel in der

untenstehend abgezeichneten Beobachtung *Malgaigne*'s eine Luxation der Fibula nach innen und oben nach einem Schiefbruch der Tibia erfolgt (Fig. 340). Diese Luxationen des Fibulaköpfchens bei gleichzeitiger Fractur des oberen Tibiaendes lassen sich zwanglos mit den Luxationen des Radiusköpfchens bei Fractur der Ulna vergleichen. Es existiren aber im Ganzen nur 10 derartige Aufzeichnungen in der Litteratur (*Hirschberg*).

Die **isolirten Verrenkungen der Fibula** können nur nach vorn oder hinten erfolgen.

Bei der **Verrenkung nach vorn** steht der Kopf der Fibula neben der Tuberositas tibiae. Die Verletzung ist nach *Hirschberg* bisher erst 9 mal beobachtet worden. Die Ursache war in diesen Fällen nur einmal eine directe sonst stets eine indirecte Gewalt, und zwar ein Sturz in Folge eines Fehltrittes, wobei es sich jedoch nicht um ein einfaches Hinfallen, sondern um ein solches nach vorherigem Straucheln, einem krampfhaften Versuch sich zu halten, einem Hängenbleiben, handelte. Bei dieser Entstehung spielt aber sicher auch ein abnorm starker Zug der von der Vorderseite der Fibula entspringenden Muskeln, Extensor digitorum communis, Extensor hallucis longus und Mm. peronei, mit.

Fig. 340.



Hirschberg konnte die Luxation an der Leiche nach Durchschneidung der Bandverbindungen zwischen Tibia und Fibula durch Zug an den obengenannten Muskeln, schwerer durch Adduction und Streckung des Fusses bei gleichzeitiger Beugung des Kniees herstellen.

Die **Symptome** der Luxation sind folgende: Die Patienten klagen über das Gefühl des Ameisenkriechens und Ein-

geschlafenseins im Unterschenkel. Das Bein steht gestreckt, der Fuss adducirt. Das Bein kann im Sitzen frei bewegt werden, aber der Kranke vermag nicht auf ihm zu stehen. Dicht unter der Kniescheibe nach aussen und unten neben dem Lig. patellae tritt unter der Haut eine etwa tauben eigrosse knöcherne Geschwulst hervor, während das Fibulaköpfchen an seiner normalen Stelle verschwunden ist. Die Sehne des Biceps bildet nicht mehr den äusseren Pfeiler der Kniekehle, sondern beschreibt einen Bogen nach vorn, der sich an die vordere Knochengeschwulst ansetzt. Wenn man von letzterer mit dem Finger nach abwärts geht, so überzeugt man sich, dass sie der verschobenen Fibula angehört.

Die **Prognose** ist günstig. Die völlige Heilung erfolgte durchschnittlich nach 14 Tagen.

Die **Reposition** geschieht durch directen Druck auf das Fibulaköpfchen nach hinten, während Fuss und Unterschenkel gebeugt sind.

Wir führen als Beispiel der isolirten Verrenkung des Fibulaköpfchens den Fall *Jobard*'s an. Ein 30jähriger Mann fiel die Treppe herunter auf die linke Seite, wobei er im linken Bein ein krachendes Geräusch vernahm. Das Bein war extendirt, der Fuss adducirt, das Stehen unmöglich. Im Sitzen liessen sich dagegen die Bewegungen frei ausführen. Dicht unter der Patella, nach aussen von dem Lig. patellae fühlte man unter der Haut eine eigrosse, knöcherne Geschwulst, während das Fibulaköpfchen an seiner normalen Seite fehlte und die Bicepssehne einen Bogen nach vorn beschrieb. Die Reposition gelang erst nach Beugen des Unterschenkels durch directen Druck mit dem Daumen auf das Fibulaköpfchen. Die Heilung erfolgte vollständig.

Von isolirten **Verrenkungen des Fibulaköpfchens nach hinten** sind nur wenige Fälle beobachet worden. Ein Patient *Dubreuil*'s fühlte, als er einen Sprung machen wollte, plötzlich einen heftigen Schmerz in der Gegend des Wadenbeinköpfchens. Bei der Untersuchung fand sich dieses letztere 3 cm hinter den äusseren Condylus der Tibia dislocirt und konnte hier deutlich unter der Haut abgetastet werden. Der Fuss stand nach aussen rotirt. Der Unterschenkel wurde halb gebeugt und mit der Hand an seine richtige Stelle gedrückt. Dies gelang, aber die Luxation trat am andern Tage wieder ein, und erst nach zwölftägiger Ruhe

und Unbeweglichkeit des Beines blieb die Reposition bestehen. *Dubreuil* und *Malgaigne* hielten in diesem Falle die Luxation für entstanden durch die plötzliche Contraction des Biceps.

Eine zweite Beobachtung der Verrenkung nach hinten stammt von *Parkinson*. Derselbe sah sie bei einem 24 jährigen kräftigen Manne ohne Zerreissung des Lig. laterale extern. und ohne Knochenbruch. Der Patient war beim Ringen hingestürzt mit abducirtem und im Knie flectirtem rechtem Bein, auf das ihm sein Gegner fiel. Die Einrichtung gelang erst in Narcose bei äusserster Beugung im Knie und Druck auf das Köpchen der Fibula, erst von hinten nach vorn, dann von aussen nach innen.

Schliesslich erwähnen noch *Richardson, A. Conzels* und *Cooper* gleiche Verletzungen.

Hirschberg erzeugte die Luxation an der Leiche nach Durchschneidung des die Fibula und Tibia verbindenden Kapselbandes durch directen Zug an der Bicepssehne von der Innenseite des Oberschenkels her.

Zu erwähnen ist noch, dass bei den Fibulaluxationen gleichzeitig auch das Lig. laterale externum des Kniegelenkes mehr oder weniger gedehnt und dass das Kniegelenk selbst zuweilen in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

Namentlich mit Rücksicht auf diese letztere Thatsache empfiehlt es sich, zur Erhaltung des reponirten Köpfchens an seinem richtigen Platze nach geschehener Einrichtung die Extremität durch einen festen Verband zu fixiren. Bei Luxation nach vorn wird dazu die gestreckte Stellung des Knies die beste sein, bei Luxationen nach hinten aber die gebeugte, um den Bicepszug auszuschalten. Bei letzteren Luxationen besteht oft Neigung zu Recidiven. Dann muss man durch vorherige Bindeneinwickelung und ein geeignetes Polster einen gelinden Druck auf das Fibulaköpfchen ausüben.

Eine sofort von selbst reponirte **Luxation der ganzen Fibula**, sodass dieselbe an der Tibia in die Höhe geschoben war, hat *Sorbet* beobachtet. Ebensolche Verletzungen beschreiben auch *Roger* und *Stromeyer*. Dieselben waren durch eine von unten nach oben wirkende Gewalt entstanden, welche durch den äusseren Fussrand auf die Fibula übertragen wurde. Es handelte sich dabei aber wahrscheinlich nur um Diastasen, die ohne Zerreissung des Lig. interosseum möglich sind.

Luxationen am unteren Ende der Fibula kommen gelegentlich bei Knochenbrüchen oder Luxationen des Fussgelenkes vor. Sie wurden beschrieben von *Schmalz, Bernstein, Kugler, Chelius* und *Nélaton. Humphry* und *Helferich* sahen sie als pathologische Verrenkungen bei Wachsthumsstörungen an der Tibia in Folge von Osteomyelitis und Nekrose.

Brüche des Unterschenkels.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Das Skelet des Unterschenkels wird von der Tibia und Fibula gebildet. Beide Knochen sind durch das obere und untere Tibiofibulargelenk sowie durch das Lig. interosseum mit einander verbunden und stellen mit ihren unteren Enden eine Gabel dar, deren Zinken — die Malleoli — den Talus als obersten Fusswurzelknochen zwischen sich aufnehmen. Die Tibia ist dreiseitig gebaut, so dass man an ihr 3 Flächen und 3 Ränder unterscheidet. Die vordere innere Fläche ist in ihrem oberen Theile convex, im unteren Drittel aber concav. Sie ist nur von der Haut, der Fascie und dem Periost bedeckt und deshalb der äusseren Untersuchung sehr zugänglich. Das gleiche lässt sich von der vorderen Kante sagen. Dieselbe ist im oberen Drittel sehr scharf, verschwindet aber nach unten in der breiten abgerundeten, über dem Malleolus internus gelegenen Fläche. Die Tibia hat als alleiniger mit dem Femur in Gelenkverbindung stehender Knochen die ganze Last des Körpers zu tragen. Sie ist deshalb besonders in ihrem oberen Theile sehr stark und breit. Nach unten hin wird sie schwächer. Man sieht dies am besten, wenn man sie von der Seite her betrachtet. Dann fällt einem sofort die Abnahme des sagittalen Durchmessers auf, und man erkennt, dass die schwächste Stelle sich an der Grenze des mittleren und unteren Drittels befindet. Hier ist dann auch gleichzeitig die Stelle, wo die Concavität der vorderen inneren Fläche am stärksten ist und wo sich die Spongiosabälkchen abzublättern beginnen, so dass die compacte Substanz des unteren Drittels bedeutend dünner wird als die des mittleren. Es wird uns also nicht wundern, wenn wir später an dieser Stelle die meisten Unterschenkelfracturen

antreffen werden. An seinem unteren Ende wird der Knochen wieder breiter.


Die Fibula besitzt einen dreikantigen, schmalen Schaft, der sich am oberen Ende zum Köpfchen, Capitulum fibulae, verdickt.

Tibia und Fibula besitzen an ihren oberen und unteren Enden Epiphysen, die etwa zwischen dem 16. und 20. Lebensjahr verknöchern (Fig. 341).

Frequenz der Unterschenkelbrüche.

Die Brüche der Unterschenkelknochen gehören nächst denen der Vorderarmknochen zu den am häufigsten vorkommenden Brüchen. Sie werden mit 15—16% ebenso oft beobachtet, wie die Brüche der Rippen und des Schlüsselbeines.

Fig. 341.



Die Fracturen selbst betreffen weitaus am meisten kräftige Männer im 30. –40. Lebensjahre. Dann folgt das dritte, dann das fünfte Decennium. Bei Kindern und Greisen werden die Unterschenkelbrüche so selten, dass sie kaum den fünften Theil derjenigen der Oberschenkelbrüche oder derjenigen des vierte Decenniums erreichen.

Bezüglich der Antheilnahme beider Knochen an den Fracturen ist es festgestellt, dass am häufigsten beide Knochen gleichzeitig in ihrem Schaft brechen. Dann folgen die Brüche eines oder beider Knöchel. Am seltensten sind die isolirten Brüche an der Tibia und an der Fibula.

Wie bei den Vorderarmknochen empfiehlt es sich auch hier, die Fracturen beider und der einzelnen Knochen gesondert zu betrachten.

A. Brüche beider Unterschenkelknochen.

Wenn man gemeinhin von einem Unterschenkelbruch spricht, so versteht man darunter stets den Bruch beider Knochen. Dieser Sprachgebrauch rührt wohl daher, dass beide Knochen ungleich viel häufiger brechen als die einzelnen allein.

Die *Ursachen* dieser Brüche sind *directe* oder *indirecte* Gewalten. *Hamilton* beschuldigt des öfteren auch den *Muskelzug*; doch ist diese Ansicht durch andere Autoren nicht bestätigt worden.

Die *directen* Brüche sind vielleicht etwas häufiger als die indirecten. Bald entstehen sie durch ein Wagenrad, welches über das Glied hinweggeht, bald durch das Auffallen eines schweren Körpers von beträchtlicher Höhe herab, bald durch einen heftigen Schlag mit dem Hufe eines Pferdes oder einem andern Gegenstand. Der Bruch liegt dann *gewöhnlich im mittleren Drittel*, seltener im unteren und noch seltener im oberen Drittel. Diese Bevorzugung des mittleren Drittels lässt darauf schliessen, dass der *directe* Bruch meist ein *Biegungsbruch* ist, indem die beiden Knochen am Knie und Fuss unterstützt sind und die Gewalt dieselben in gleicher Weise bricht wie einen von beiden Seiten her belasteten Stab. Ein solcher bricht aber der Quere nach in seiner Mitte entzwei. So ist denn auch der directe Biegungsbruch der Unterschenkelknochen ein *querer*. Die Entstehung durch Biegung lässt sich in solchem Falle oft genug an den Bruchenden selbst direct nachweisen. Es ist für den Biegungsbruch bezeichnend, dass die Bruchlinie Neigung hat, sich gabelig zu theilen und einen Keil zu umschreiben, dessen Basis der concaven Seite der Biegung zugekehrt ist. So finden wir denn auch, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, dass von dem Querbruch der Tibia von beiden Bruchflächen aus schräg verlaufende Fissuren ausgehen, welche jene Keilform andeuten (Fig. 342). Am *oberen* Ende des Unterschenkels kommen directe Brüche des Oefteren bei Eisenbahnunfällen vor, indem die Knochen im Augenblick des Zusammenstosses der Züge durch die gegeneinander getriebenen Sitzbänke der Wagen förmlich abgequetscht werden.

Fig. 342.



Die *indirecten* Brüche entstehen entweder durch einen einfachen Fall auf ebener Erde in Folge eines falchen Trittes oder durch Fall von einer grösseren Höhe herab auf die Füsse oder ähnliche Gewalten. Der Bruch ist dann auch hier *meist durch Biegung* entstanden, sitzt aber jetzt im Gegensatz zu dem directen Bruch nicht in der Mitte des Unterschenkels, sondern an der *Grenze seines mittleren und unteren Drittels*,

wo sich, wie wir gesehen haben, seine schwächste Stelle befindet. Der indirecte Bruch kann aber auch durch eine gewaltsame Torsion des Unterschenkels entstehen, wenn die Knöchel fixirt sind und der Rumpf durch eine plötzliche Schwenkung gedreht wird. Es entstehen dann in gleicher Weise wie am Oberschenkel die Spiralbrüche. Schliesslich ist der indirecte Bruch zuweilen auch ein Abknickungsbruch, indem der Körper nach der Seite umfällt, während das untere Ende des Unterschenkels zwischen Steinen, Balken u. dgl. festgehalten wird. Er sitzt in solchem Falle ziemlich nahe an den Knöcheln, selten im oberen Drittel.

Wenn der Bruch auf directem Wege erfolgte, so können beide Knochen gleichzeitig und in gleicher Höhe gebrochen sein. Das ist aber im ganzen nur selten der Fall, denn man findet die Fibula meist einige Centimeter höher gebrochen als die Tibia. Es ist, wie dies beim indirecten Bruch die Regel ist, zunächst die Tibia allein gebrochen und die Fibula erst später unter der Körperlast zusammengeknickt.

Die **pathologisch-anatomischen Charaktere** der Unterschenkelbrüche sind sehr mannigfaltig. Im ganzen selten beobachtet man Infractionen, sieht sie aber gelegentlich dann entstehen, wenn eine directe Gewalt den hohl liegenden Unterschenkel trifft.

Von den vollständigen Brüchen haben wir schon die durch Biegung entstandenen Querbrüche kennen gelernt. Dieser Querbruch hat etwas sehr Charakteristisches. Die Bruchfläche liegt fast senkrecht zur Achse der Knochen, lenkt aber ganz vorne an der Tibia etwas nach unten ab, so dass das obere Fragment in einen vorderen Stachel oder Zahn ausläuft. Auch das untere Fragment ist gezahnt. Die Zacken beider Fragmente greifen in einander, so dass keine Verschiebung des Knochens entsteht.

Ungleich häufiger als diese Querbrüche sind Schrägbrüche der Unterschenkelknochen. Diese schiefen Brüche pflegen in der Regel von oben aussen nach unten innen zu verlaufen (Fig. 343 u. 344). Dazu kommt dann, mehr oder weniger ausgeprägt, noch eine gleichzeitige Richtung von hinten und oben nach unten und vorn. Es wird dann der der Tibiakante angehörige Theil des oberen Bruchstückes keilförmig oder in Form eines Klarinetten-Mundstückes zugespitzt. Die Dislocation dieser Fracturen ist meistens eine typische. Die Fragmente sind zunächst der Länge nach an einander verschoben, so zwar, dass das untere Fragment hinter und oft auch etwas nach

aussen an dem oberen emporgleitet. Zu gleicher Zeit stellen sich beide auch in einen nach hinten offenen Winkel mit einander, so dass die Spitze des oberen Fragmentes nach vorn gedrängt wird und hier die Haut in die Höhe hebt oder anspiesst oder durchbohrt.



Fig. 343.


Fig. 344.


Das untere Fragment ist zudem in Folge der Schwere des Fusses, welcher wegen des Bruches beider Knochen seinen Halt verliert, mehr oder weniger nach aussen rotirt (Tafel XXVIII).

Als Ursache dieser so häufig sich findenden Art der Verschiebung ist neben der Form und Richtung des Bruches, neben der Richtung der einwirkenden Gewalt und neben mannigfachen mechanischen Insulten, welche nach geschehenem Bruch auf die Fragmente statthaben, hauptsächlich wohl der Zug der Muskeln zu beschuldigen. Die Wadenmuskeln vermitteln durch ihre elastische Retraction die Längsverschiebung und die winklige Abweichung des unteren Fragmentes, während das obere durch den Quadriceps in seiner nach vorn dislocirten Stellung erhalten wird.

Selten ist bei den Schrägbrüchen die Richtung der Bruchlinie und der Dislocation umgekehrt, wie oben beschrieben wurde. Die Bruchlinien ziehen dann von oben und vorn nach unten und hinten, während das untere Fragment nach vorn verschoben wird und auf dem unteren Ende des oberen Fragmentes reitet.

Wie am Oberschenkel finden sich auch an den Unterschenkelknochen auf die vorher beschriebene Weise entstandene Torsions-(Spiral-)brüche. Bei diesen Spiralbrüchen ist ein geradezu typischer Befund der, dass von der Spitze des einspringenden Winkels des unteren Fragmentes eine schraubenförmig gewundene

Fig. 345. Fig. 346. Fig. 347.



Fissur bis in die Gelenkfläche hinabsteigt. Zuweilen durchsetzt diese Fissur dann noch die Gelenkfläche nahe ihrem hinteren Rande und steigt an der hinteren Fläche der Tibia wieder in die Höhe, so dass ein dreieckiges Stück von jener Fläche umschrieben wird (Fig. 345).

Gosselin glaubt, dass diese Fissuren durch eine Keilwirkung von Seiten des oberen Fragmentes entstehen, indem dieses in das untere eingetrieben werden soll. Für viele Fälle mag das zutreffen. *Houel* hat aber ganz richtig eingewendet, dass man mitunter das spitze Ende des oberen Fragmentes so dünn und zerbrechlich findet, dass es unmöglich als ein Keil wirken konnte.


Die Bruchlinie der Fibula fällt bei den Spiralbrüchen meistens in die fortgesetzt gedachte Richtung der Bruchlinie der Tibia.

Schliesslich haben wir noch die Splitter- und die mehrfachen Brüche zu erwähnen.

Die Splitterbrüche entstehen meist durch directe Gewalt und stellen oft vollständige Zermalmungen vor (Fig. 346). Es giebt aber auch hier wieder gewisse Typen. So findet man zuweilen, wenn der Patient zur Seite gestossen wurde und ein Rad über die innere Fläche seiner Tibia an der Grenze zwischen unterem und mittlerem Drittel herüberging, die compacte Substanz der inneren Fläche in rautenförmige Fragmente zerbrochen und in die Markhöhle getrieben oder nach aussen hin dislocirt. Hat das Rad höher oben getroffen, so zeigt die compacte Substanz zahlreiche spitze Splitter, während die Kanten als lange Fragmente noch ausserdem abgelöst sind. Die Fibula ist dabei in beiden Fällen an der Stelle der Gewalteinwirkung gesprengt.

Doppelbrüche der Tibia sind im ganzen selten. Mehrfache Brüche finden sich nicht selten durch Biegung entstanden in der Weise, dass der typische keilförmige Splitter von der äusseren Seite und dem vorderen Rande der Tibia abgelöst und nach aussen gegen die Tibia getrieben ist (Fig. 347).

Fig. 348.



Die Unterschenkelbrüche sind sehr oft complicirt. Einmal kann die directe Gewalt schwere Zerreissungen und Zermalmungen der Weichtheile setzen, so dass oft genug die Bruchenden blossliegen; dann aber kommen auch sehr häufig Durchstechungsfracturen vor. Bei diesen sind die Wunden meistens scharf und glatt. Sie können aber auch sehr gequetscht und nebenbei noch durch vorgefallene Weichtheile, insbesondere zerrissene Muskelbündel oder durch die vorstehenden Bruchenden ausgefüllt sein (Fig. 348).

Zerreissungen der grösseren Gefässe des Unterschenkels beobachtet man ziemlich oft, selbst bei subcutanen Fracturen. Seltener sind Verletzungen der Nerven.


Die **Symptome** der Unterschenkelbrüche hängen wesentlich davon ab, ob eine Dislocation der Fragmente besteht oder nicht.

Bei dem ohne Dislocation einhergehenden verzahnten Querbruch finden wir zunächst nur die Functionsstörung des Gliedes und den localen Bruchschmerz. Der Verletzte ist durchaus unfähig, sich auf sein Bein zu stützen, und klagt beim Abtasten der Tibia an der betreffenden Stelle über heftige Schmerzen. Man ist dann schon berechtigt, die Fractur anzunehmen, auch wenn man keine Niveaudifferenzen an der Tibia finden kann.

Ganz anders gestalten sich die Verhältnisse bei dem Schiefbruch mit seiner charakteristischen Dislocation. Hier fällt sofort, und wegen der oberflächlichen Lage der Tibia ausserordentlich deutlich, die Deformität auf. Der betreffende Unterschenkel ist verkürzt und nach aussen rotirt. An seiner vorderen Kante drängt das spitze obere Fragment die Haut empor und erzeugt an dieser Stelle eine stumpfwinklige Knickung, so dass die Ferse dem Knie genähert ist und der Fuss die Spitzfussstellung eingenommen hat. In solchem Falle ist es dann leicht, Crepitation und abnorme Beweglichkeit nachzuweisen, und es besteht selbstverständlich gleichzeitig vollständige Gebrauchsunfähigkeit des Gliedes. (Taf. XXVIII).

Ist die Dislocation nicht in so hohem Maasse vorhanden, oder wird sie durch ein stärkeres Blutextravasat verdeckt, so erlaubt doch auch dann eine sorgfältige Untersuchung, wenn nöthig in Narcose, die Erkennung des Bruches. Man tastet zu dem Zweck langsam und vorsichtig mit beiden Händen die Kante der Tibia von oben nach unten ab und kann dann schwerlich die Verschiebung an der Bruchstelle übersehen. Von der Richtung des Bruches überzeugt man sich, indem man ober- und unterhalb dieser Stelle die Tibia fasst und die beiden Hände in entgegengesetzter Richtung an einander verschiebt.

Nach dem Gesagten unterliegt die Diagnose der Unterschenkelbrüche kaum Schwierigkeiten. Zweifelhaft kann man aber zuweilen, besonders bei muskelkräftigen Personen, über den Sitz und die Beschaffenheit des Fibularbruches bleiben. Meist gelingt es jedoch, durch eine genaue Untersuchung die federnden und selbst crepitirenden Bruchenden nachzuweisen.




Die **Prognose** der Unterschenkelbrüche gestaltet sich am günstigsten bei den einfachen Querbrüchen. Die knöcherne Heilung erfolgt bei diesen innerhalb 5—6 Wochen. Je schiefer der Bruch ist und je beträchtlicher die Dislocation, um so langsamer vollzieht sich die Callusbildung. Dann dauert es aber noch viele Monate, bis das Bein wieder einigermassen gebraucht werden kann, und oft genug ist auch dann die Heilung mit Dislocation erfolgt, so dass lange Zeit dauernde Schmerzen und ödematöse Anschwellungen des Gliedes zurückbleiben.

Haenel berechnet für die Unterschenkelbrüche bis zur völligen Restitution 7 Monate. Von 46 Fällen blieben 16 dauernd geschädigt. Die durchschnittliche Herabsetzung der Erwerbsfähigkeit bei diesen Patienten betrug 20%.

Jottkowitz macht mit Recht darauf aufmerksam, dass sich die Prognose wohl in der Zukunft noch bedeutend bessern wird, wenn unmittelbar an die Behandlung der Fractur sich eine passende medico-mechanische Nachbehandlung anschliessen wird. Er berichtet über das Material der Knappschaftslazarethe in Königshütte. Von 31 Diaphysenfracturen wurden bei einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 151 Tagen 8 = 26 % völlig erwerbsfähig; 23 = 74 % waren nach der Entlassung durchschnittlich um 27,6 % in ihrer Erwerbsfähigkeit beschränkt.

Fig. 349.



Die häufigsten Deformitäten, die man nach solchen schief geheilten Brüchen beobachtet, sind eine Ausbiegung des Unterschenkels nach hinten und eine winkelige Knickung desselben, so dass ein O-Bein entsteht (Fig. 349).

Durch Zwischenlagerung von Muskelbäuchen zwischen die Bruchenden oder zu frühzeitigen Gebrauch des Gliedes, wodurch die gebildeten spärlichen Knochenbrücken wieder zerbrechen, kommt es hie und da auch zu P s e u d a r t h r o s e n b i l d u n g. Ziemlich häufig verwachsen Tibia und Fibula durch einen brückenförmigen Callus (Fig. 350). Die Einwirkung dieses Callus stört jedoch, obgleich er die Beweglichkeit beider Knochen gegen einander aufhebt, die Function des Fussgelenkes nur in geringem Grade. Da-

gegen leidet die Gebrauchsfähigkeit des Beines stets sehr durch die meist erhebliche Muskelatrophie.

Die complicirten Fracturen des Unterschenkels, die früher wegen Eiterung, Necrose, Pyämie sehr gefürchtet waren, verlaufen unter antiseptischen Cautelen durchaus anstandslos.


Die **Therapie** der Unterschenkelbrüche hat zunächst die Reduction der Fragmente zu besorgen. Diese ist leicht bei Querbrüchen mit geringer Dislocation, indem sie durch ein einfaches Anziehen des Fusses in der Richtung der Gliedachse geschieht. Schwierig kann sie bei dislocirten Schiefbrüchen werden. Dann ist man oft genöthigt, den Patienten zu narcotisiren, und sollte dies stets thun, sobald man auf irgend einen Widerstand stösst. Man braucht die Narcose jedoch ausserdem auch noch vielfach zur Anlegung des Fracturverbandes selbst. Nach der Angabe *Verneuil*'s kann man die Narcose dadurch vermeiden, dass man dem Patienten eine Morphiuminjection macht und dann unterhalb der Fracturstelle einen Heftpflasterextensionsverband mit einem Gewicht von 6—8 kg anlegt. Unter dem Einfluss dieses Verbandes sollen die krampfhaft contrahirten Beuger des Fusses erschlaffen und in kurzer Zeit soll dann die Reposition gelingen. Nach erfolgter Reduction muss man warten, bis die Muskeln wieder völlig erschlafft sind, was in 2—3 Stunden stets der Fall ist. Dann wird der Extensionsverband entfernt und, während die richtige Stellung der Extremität inne gehalten wird, der definitive Verband angelegt.

Fig. 350.



Die Einrichtung des Bruches geschieht durch Zug und Gegenzug oberhalb und unterhalb der Bruchstelle und directes Hineindrücken der Fragmente in ihre richtige Lage durch die Hände des Arztes. Der Gegenzug wird ausgeübt vermittelst einer Perinealschlinge

Fig. 351.



oder in der Weise, dass ein Gehülfe mit seinen beiden Händen den unteren Theil des Oberschenkels umgreift und ihn kräftig fixirt (Fig. 351). Den Zug besorgt ein zweiter Gehülfe, indem er den Fuss mit einer Hand an der Ferse, mit der andern um den Rücken umgreift, sich dann zurücklegt, beide Ellenbogen an seinen Rumpf nimmt und diesen dann zurückfallen lässt. So übt er den Zug mittelst seines eigenen Körpergewichtes aus und wird daher auch weniger ermüden, als wenn er lediglich mit der Kraft seiner Arme wirken würde. Für den am Fuss extendirenden Assistenten gelten folgende Regeln. Er muss zunächst kräftig ziehen, um die Verkürzung des Unterschenkels auszugleichen. Dann muss er die Ferse heben, um das obere Ende des unteren Fragmentes nach hinten zu drängen und damit das Vorstehen des spitzen Bruchendes des oberen Fragmentes nach vorn zu beseitigen, und schliesslich muss er durch eine geeignete Drehung des Fusses die Rotation des unteren Fragmentes um seine Längsachse aufheben. Diese letztere Maassnahme ist eine sehr wichtige, denn die Function des Fusses leidet in ganz bedeutendem Maasse, wenn die Heilung auch nur mit einer geringen Dislocatio ad peripheriam statthat. Um ein solches Ereignis sicher zu vermeiden, hat der den Fuss haltende Gehülfe folgendes zu beachten. Er muss zunächst daraufsehen, dass die Patella genau horizontal, also parallel mit der Unterlage steht. Dann stellt er den Fuss genau rechtwinkelig und giebt ihm die Stellung, dass eine Linie, welche er sich dem inneren Rande der Patella entlang gezogen denkt, den Innenrand der grossen Zehe schneidet, dass also die Achse des Fusses mit der Querachse der Patella einen rechten Winkel bildet. Dies ist die allgemeine Regel, die dann Giltigkeit hat, wenn auch die Tibia des gesunden Fusses eine Mittelstellung innehat. *Ledderhose* hat nun aber mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass schon normaler Weise der untere Theil des Unterschenkels gegen den oberen des öfteren nach aussen oder nach innen verdreht ist. Man muss also unter allen Umständen, wenn eine solche Verdrehung des gesunden Fusses aus der Mittelstellung heraus besteht, auch dem gebrochenen Fuss durch Verschiebung an der Bruchstelle genau die gleiche Lage geben, die auch der gesunde Fuss inne hat, denn sonst wird das verletzte Bein gegenüber dem gesunden mit einer Verdrehung heilen. Besondere Schwierigkeiten bereitet der Reposition oft die Anspiessung der Fascie oder der Haut durch die

Spitze des oberen Fragmentes. Man muss dann versuchen, durch geeignete Beugebewegungen die Anspiessung zu lösen. Misslingen diese Versuche, so kommt man mit kleinen aseptischen Einschnitten zum Ziel. Eine Erweiterung der Wunde zum Zwecke der Reposition erfordern ferner von vornherein nicht so selten die Durchstechungsfracturen.

Ist nun die Reposition vollendet, indem der Arzt selbst noch den Bruchenden ihre richtige Lage gegeben hat, so folgt jetzt die Aufgabe, die Wiederverschiebung derselben zu verhüten. Dies kann entweder bei gestreckter oder leicht gebeugter Stellung des Unterschenkels geschehen. Es kommt in der Regel wenig darauf an, ob man das Kniegelenk beugt oder streckt. Man beobachtet zwar zuweilen, besonders bei Fracturen im oberen Drittel, dass die Fragmente sich besser aufeinander halten lassen, wenn das Knie gebeugt ist und hierdurch der Gastrocnemius erschlafft wird. Gewöhnlich wird aber wohl die Streckung des Kniegelenkes sicherer sein, weil sie nicht, wie die Beugung, eine Rotation im Knie zulässt.


Die Retention der Fragmente kann man nun auf vielfache Weise erzielen. Es kommen hier wieder die verschiedensten Lagerungsmethoden, Suspensionsvorrichtungen, Schienen- und Contentivverbände in Betracht. Permanente Extension ist wegen der Kürze des Angriffspunktes für die Heftpflasterstreifen nicht anwendbar. Wir werden aber später bei den Knöchelbrüchen sehen, wie sich die Distraction auch hier anwenden lässt. Im gegebenen Fall wird diejenige Verbandart den Vorzug verdienen, welche die ruhige, bequeme, schmerzlose Lagerung des ganzen Beines und die sichere Retention der Fragmente auf die einfachste Weise erreicht.

Von den Lagerungsvorrichtungen ist, wenigstens als provisorisches Mittel, sehr zu empfehlen die *Pott*'sche Seitenlage, welche in gleicher Weise gehandhabt wird, wie wir das bei den Oberschenkelbrüchen kennen gelernt haben. Man kann mit ihr bei willenskräftigen Männern selbst die vollständige Heilung erzielen (*Middeldorpf, Maas*).

In früheren Jahren waren als Lagerungsapparate vielfach im Gebrauch die sogenannten Beinladen, wie solche von *Petit, Heister* u. a. angegeben worden sind. Man kann sie aber gut entbehren. Wollte man eine derartige Lade anwenden, so wäre am passendsten die *Scheuer*'sche Beinlade (Fig. 352). Dieselbe hat wenigstens den Vorzug, dass sie rasch und einfach aus einigen Holzlatten hergestellt werden kann. Sie würde sich also gut als Nothverband eignen.


Sehr zweckmässig zur Lagerung sind die *Bonnet-Roser*'schen Drahtstiefel. Dieselben, besonders in der ihnen neuerdings von *Cramer* gegebenen Gestalt, haben das Bequeme, dass man sie leicht verändern, verkürzen, zurechtbiegen, dass man an jeder beliebigen Stelle Bänder durchziehen, Kissen oder Watte einschieben oder ein

Fig. 352.



Fenster offen lassen kann. Man muss aber darauf achten, dass der Drahtstiefel genügend tief ist, d. h. genügend hohe Seitenwände besitzt. Denn ohne diese gewährt er keinen genügenden Halt nach der Seite hin. Je besser ein solcher Stiefel der Form und Grösse des Individuums angepasst ist, je genauer er anliegt, desto mehr kommt er in seiner Wirkung dem Contentivverbande gleich. Man braucht dann den Apparat nur ein wenig auszufüttern, das Bein in der richtigen Stellung hineinzulegen und dasselbe durch Bindentouren zu fixiren. Mittelst dieser letzteren kann man auch ganz leicht den Drahtstiefel zur Suspension benutzen.

Fig. 353.




Die Suspension geschah sonst durch die verschiedensten Schwebevorrichtungen. Man kann diese aber besser ersetzen durch die *Smith*'sche vordere Drahtschiene (Fig. 300) oder die *Beely*'sche Gypshanfschiene (Fig. 353). Diese letztere reicht vom unteren

Drittel des Oberschenkels bis zu den Köpfchen der Metatarsalknochen und wird mit 4 bis 5 Suspensionsringen versehen. Das Kniegelenk steht bei der Anlegung der Schiene in leichter, das Fussgelenk in rechtwinkliger Flexion. Das Bein wird in gleicher Weise gehalten, wie wir dies beim Oberschenkelbruch kennen gelernt haben.

Einen Uebergang von den Lagerungsapparaten zu den Schienenverbänden stellen die *v. Volkmann*'sche und die *Bruns*'sche Schiene dar. Beim Gebrauch derselben ist besonders die Fersengegend zu polstern, da sonst leicht Decubitus dortselbst entsteht. Indicirt sind diese Schienen stets, wenn eine starke Schwellung an der Bruchstelle besteht. Sie sind aber auch bei nicht dislocirten Quer- und Schiefbrüchen bis zur definitiven Heilung am Platz. Im übrigen kommen Schienenverbände nur als Nothverbände in Betracht. Sie sind als solche oft nicht zu entbehren und kommen dann besonders als seitliche und als circulär angelegte zur Anwendung. Die seitlichen Schienen heissen auch wohl englische. Als Beispiel derselben diene die *Sharp*'sche Schiene (Fig. 354), die vom Becken bis über den Mittelfuss reicht, für den Knöchel einen Ausschnitt hat und im Kniegelenk ein Charnier besitzt. Die Schiene wird gut gepolstert angelegt und macht das Bein und den Fuss gleichsam zu einem Stück. Sie genügt aber für sich allein nicht zur gehörigen Sicher-

Fig. 354.




stellung der Bruchenden. Man bedarf vielmehr neben ihr noch anderer Lagerungsvorrichtungen, wie Spreukissen oder Sandsäcke.

Das letztere gilt auch von den circulär angelegten kürzeren Schienen, welche überhaupt nur bei Kindern gebraucht werden sollten.

Sehr brauchbare Schienen zum Transport kann man sich aus Strohgeflecht herstellen, zumal wenn man noch einige Blechstreifen zu Hülfe nimmt (Fig. 355).

Der circuläre Gypsverband empfiehlt sich besonders für einfachere Fälle und für die späteren Stadien eines Unterschenkelbruches. Er muss das rechtwinklig stehende Fussgelenk und das Kniegelenk mit fixiren, die Zehen aber frei lassen. Die Ferse wird am Besten mit in den Verband hineingenommen, muss aber gut gepolstert werden. Die Fracturstelle wird zuerst mit

Fig. 355.



einer Mullbinde umwickelt. Ueber diese kommen dann direkt die Gypsbinden, die man aber ja nicht fest anziehen darf. Sie sollen vielmehr nur einfach abgerollt werden. Sonst bekommt man unweigerlich Decubitus, Schmerzen und Oedem des Beines. Sobald Schmerzen unter dem Verbande entstehen und die Zehen sich bläulich färben, muss derselbe sofort abgenommen werden.

Mit einem gut sitzenden, wirklich festen Gypsverband kann man es wagen, die Patienten schon bald umhergehen zu lassen, ja es eignet sich eigentlich die moderne ambulante Fracturenbehandlung gerade am besten für die Diaphysenbrüche des Unterschenkels. Nachdem *F. Krause* diese Behandlungsmethode zuerst empfohlen hatte, ist sie von den verschiedensten Seiten weiter ausgebildet worden. So haben namentlich *Korsch, Albers, Thiem H. Schmidt*, *Dollinger* und *Elbogen* das Verfahren empfohlen. Für, solche Collegen, die das Verfahren nachprüfen wollen, empfehlen wir, sich genau an die Vorschriften von *F. Krause* zu halten. Diese sind folgende:

Soll der Verletzte schon einige Tage nach erlittenem Unfall in den Stand gesetzt werden umherzugehen und sich dabei auch wirklich auf das gebrochene Glied stützen, so muss sich der Gypsverband so genau allen Umrissen des Gliedes anschmiegen, dass er dessen Form wie ein Modell wiedergiebt; andererseits darf er unter keinen Umständen den allergeringsten Druck auch nur an einer kleinen Stelle ausüben, er würde dann nicht er-

tragen werden und schädlich wirken. Im grossen und ganzen wird der Gypsverband wie ein *Sayre*'sches Gypscorsett angefertigt, nur wird hier, statt des Tricotschlauches eine Mullbinde verwendet, die in doppelter Lage überall unmittelbar auf die Haut, also ohne jede Wattepolsterung, gelegt wird. Sind Schrunden oder kleine Weichtheilverletzungen vorhanden, so wird die Mullbinde an diesen Stellen durch Jodoformmull ersetzt. Die Art und Weise, wie die Kranken vor Anlegung des Gypsverbandes zu behandeln sind, um jede Dislocation auszugleichen, haben wir schon besprochen.

Durch starken Zug an Hacke und Fuss und entsprechenden Gegenzug am Oberschenkel wird das gebrochene Glied in richtiger Stellung gehalten und über die doppelte Bindenschicht unmittelbar der Gypsverband gelegt. Man verwendet schwach appretirte Gazebinden, die mit bestem Modellirgyps eingerieben sind, niemals Gypsbrei. Der Verband erhält durch diese gleichmässige Verbindung von festen und weichen Stoffen einen gewissen Grad von Elasticität und damit grössere Haltbarkeit.

Während des Abwickelns der feuchten Gypsbinden muss jedes Zerren vermieden werden, auch thut man gut, bei mangelnder Uebung mit den ersten Binden keine Umschläge zu machen, sondern sie lieber durchschneiden zu lassen. Durch sorgsames Streichen werden während des Umlegens der Binden die einzelnen Schichten in innige Berührung gebracht und genau der Form des Gliedes angeschmiegt. Der Sohlentheil wird durch Longuetten verstärkt. Der Verband reicht von den Köpfchen der Mittelfussknochen bis über die Mitte des Oberschenkels hinauf. Bei Unterschenkelfracturen im unteren Drittel kann das Kniegelenk durch ein Charnier beweglich gestellt werden. Ein solcher Verband soll die Körperlast tragen, er muss daher genügend stark gemacht werden. Aber trotzdem giebt er genau die Contouren des Beines wieder, wenn man nur überall ungefähr gleich viele Bindenschichten übereinander legt. Man kann daher auch im Verbande sehr gut die Stellung der Bruchenden beurtheilen.

Das Kniegelenk wird in ganz leichte Beugung gebracht, der Fuss muss vollkommen rechtwinklig zum Unterschenkel, eher noch in leichter Dorsalflexion, ferner in mittlerer Lage zwischen Supination und Pronation, eher etwas mehr in Supination stehen.

Der Verletzte bleibt nach Anlegung des Gypsverbandes noch ein- bis zweimal 24 Stunden im Bett. Wird nach dieser Zeit alles in Ordnung befunden, so soll der Kranke unter Benutzung

des verletzten Gliedes umhergehen. Hierbei ist man etwas von der Willenskraft der betreffenden Leute abhängig. Manche gehen sofort an zwei Stöcken oder am *v. Volkmann*'schen Bänkchen, andere müssen zunächst gestützt werden, bis sie das ängstliche Gefühl, sie könnten sich Schaden thun, überwunden haben. Mit Geduld bringt man aber auch schüchterne Gemüther dazu, fest auf das gebrochene Glied aufzutreten. Ein Zwang wird nie ausgeübt, die Kranken überzeugen sich sehr schnell selbst von den Vortheilen der ambulanten Behandlung.

Empfinden sie an der Bruchstelle überhaupt Schmerzen, so sind diese gewöhnlich nicht erheblich und pflegen bei fortgesetztem Gebrauch abzunehmen. Die Zehen schwellen beim Umhergehen zuweilen an, was ja auch schon beim Hängenlassen des verletzten Beines eintreten kann, das Oedem verschwindet aber, wenn der Verband nirgends einen schädlichen Druck ausübt, in der Rückenlage. Daher wird der Kranke angewiesen, jedesmal wenn er sich setzt, das verletzte Glied hochzulegen. Man kann die Leute mit einem passenden Schuh sehr gut auch auf der Strasse umhergehen lassen.

Bei einfachen Fracturen könnte der Verband bis zur vollendeten Consolidation liegen bleiben. Es ist indess doch besser, ihn in etwa 14 Tagen zu wechseln, um zu sehen, ob die Dislocation auch wirklich völlig ausgeglichen ist.


Ein gut sitzender Gypsverband beseitigt am vollkommensten die Neigung des oberen Fragmentes, sich nach vorn zu verschieben, besonders wenn man während des Erstarrens der Gypsbinden durch Bindenzügel die richtige Lage der Bruchenden aufrecht erhält.

Diese Neigung des oberen Fragmentes, mit seiner unteren Spitze die Haut vorn emporzudrängen, hat den Aerzten schon viele Schwierigkeiten bereitet. Man hat, um ihr entgegen zu wirken, schon die Tenotomie der Achillessehne ausgeführt, — die Wadenmuskeln drängen ja das untere Fragment gegen das obere — oder hat das spitze Bruchende resecirt (*Stromeyer*), oder hat besondere Apparate construirt, um dasselbe dauernd herabzudrängen. Am bekanntesten ist von diesen der sog. *Malgaigne*'sche Stachel, der an einem den Unterschenkel umgreifenden Bügel angebracht, in das hervorragende Fragment hereingeschraubt wird und dasselbe niederhält (Fig. 356). Der Stachel ist wirksam und unter aseptischen Cautelen auch durchaus ungefährlich.

Bei complicirten Fracturen mit stärkerer Dislocation der Fragmente könnte man die directe aseptische Knochennaht

ausführen. Im Uebrigen würde dann das Glied am besten in einen Contentivverband gelegt werden. In Fällen von sogenannter protrahirter Callusbildung, in denen auch nach 5—6 Wochen kein fester Knochenring gebildet worden, ist es empfehlenswerth, dem Patienten einen genau passenden, abnehmbaren Wasserglasverband zu machen und ihm in demselben das Gehen zu gestatten, damit er selbst die Exasperation seiner Bruchenden ausführen kann. Man darf auch, nach den Erfahrungen der *Schönborn*'schen Klinik, entsprechend dem Fussgelenk ein Gelenk in dem Verbande anbringen und damit der späteren Gelenksteifigkeit entgegenwirken.

Fig. 356.



Unter welchem Verbande man nun auch die Heilung der Fractur erzielt hat, als Nachbehandlung muss stets eine mehrere Wochen dauernde Massage und Gymnastik des Gliedes, verbunden mit Douchen und Bädern desselben folgen, um seine völlige Gebrauchsfähigkeit wieder zu erzielen.

Eine gesonderte kurze Betrachtung müssen wir den **intra partum entstehenden Unterschenkelbrüchen** zuwenden, auf die neuerdings *v. Büngner* (1890) die Aufmerksamkeit der Chirurgen lenkte.


Diese Fracturen entstanden meistens in der Art, dass bei forcirter Extraction an den Füssen Tibia und Fibula in der unteren Diaphysenhälfte brachen. Entsprechend der Richtung des Zuges stellte sich dabei an der Fracturstelle eine Dislocatio ad axin mit nach vorn geschlossenem, nach hinten offenem Winkel her, indem die Unterschenkelknochen in diesem Sinne abgeknickt wurden. In dieser Winkelstellung verharren die Fragmente auch nach der Geburt, indem der Quadriceps femoris das obere Fragment erhoben erhält, während die Wadenmuskulatur das untere Fragment nach hinten zieht.

In seltenen Fällen entsteht die Fractur aber auch, ohne dass die Geburt durch Kunsthülfe beendigt worden ist. In diesen Fällen brechen vielleicht die Unterschenkelknochen bei länger dauernder Austreibungsperiode dadurch, dass sie heftig gegen die mütterlichen Schambeinäste angepresst wurden.

Die **Diagnose** der Fracturen ist aus der Deformität ohne Weiteres zu erschliessen.

Die **Prognose** ist eine ungünstige, indem es regelmässig zur Pseudarthrosenbildung kommt, theils in Folge mangelnder Behandlung, theils in Folge der schrägen Bruchrichtung und der hartnäckigen Winkelstellung der Fragmente, die ihrerseits wiederum durch Anspiessen oder Interposition der benachbarten Theile schädlich wirkt.

Fig. 357.



Die Bruchenden fanden sich bei diesen Pseudarthrosen in ausserordentlichem Maasse atrophirt (Fig. 357). Daneben war die ganze Extremität im Wachsthum zurückgeblieben, oft sehr hochgradig bis zu 15 cm, und dadurch die Function derselben sehr beeinträchtigt oder ganz vernichtet.

Diese Pseudarthrosen lassen sich vermeiden, wenn man unmittelbar nach der Geburt die passende Therapie einschlägt, d. h. den Unterschenkel unmittelbar nach der Geburt mit Einschluss der benachbarten Gelenke in einem Schienenverband fixirt, nachdem man die dislocirten Fragmente exact reponirt hat.

Bekommt man aber die Kinder schon mit den Pseudarthrosen in Behandlung, so empfiehlt *v. Büngner* eine schräg-longitudinale Osteotomie oder eine schräge Resection der Bruchenden auszuführen, die Wunde per secundam heilen zu lassen und die Patienten möglichst bald in einer Wasserglashülse oder gut gearbeiteten Schienenhülsenapparaten auf die Beine zu bringen.

B. Brüche der Tibia.

I. Brüche am oberen Ende der Tibia.

Die Brüche am oberen Ende der Tibia können entweder nur einen Theil des Knochens betreffen oder die ganze Dicke desselben durchsetzen. Im ersteren Fall werden kleinere oder grössere Stücke vom Gelenkrande abgetrennt, im letzteren entstehen die ausserordentlich seltenen Quer- und Splitterbrüche oder traumatischen Epiphysenlösungen. Alle diese Brüche eröffnen das Kniegelenk, daher wir sie als

a) **Gelenkbrüche des oberen Tibiaendes** zusammenfassen können.

Die Gelenkfläche der Tibia ist nach einem Fall auf die Füsse gelegentlich von vielfachen Fissuren durchsetzt. So fand z. B. *Campaignac* 4 Längsfissuren, von denen eine von der Mitte der Gelenkfläche ausging und sich in gewundenem Verlauf 13 Centimeter nach abwärts erstreckte, bei einem Patienten, der von einer beträchtlichen Höhe herabgefallen war. Andere Male ist ein Stück der Gelenkfläche durch das Ligamentum cruciatum abgerissen und bleibt an diesem hängen (*Hutton, Poncet, Dittel*) (Fig. 358). Relativ am häufigsten ist durch schräg verlaufende Bruchlinien ein Theil des Gelenkrandes und zwar meist der eine oder andere Condylus abgebrochen (Fig. 359), doch

Fig. 358.





Fig. 359.




kann eine Abquetschung auch ziemlich parallel der Gelenkfläche erfolgen (Fig. 360). Diese letzteren Brüche entstehen in der Regel durch directe Gewalten, Auffallen schwerer Lasten, Hufschlag u. s. w. und bilden den Uebergang zu den mehr weniger quer verlaufenden Brüchen (Fig. 361). Diese kommen nach Einwirkung sehr starker Kräfte zu Stande. Das obere Fragment stellt sich dann zuweilen in Flexion, während der übrige Unterschenkel gestreckt ist. Zu der queren Trennung gesellt sich nicht selten noch eine Splitterung des oberen Fragmentes in

Fig. 360.



Fig. 361.



mehrere Stücke, auch kann sich die Diaphyse der Tibia in die Epiphyse einkeilen und die letztere auseinandertreiben (Fig. 362). Schliesslich beobachtet man bei jüngeren Individuen auch vollständige Epiphysenlösungen. *P. Bruns* fand unter 100 derartigen Verletzungen 4 am oberen Ende der Tibia. *Helbing* vervollständigte 1894 die Casuistik mit einem in der Greifswalder Klinik beobachteten Fall auf im Ganzen 7 Beobachtungen. Die Epiphysenlösungen waren durch Lateralflexionen des Unterschenkels

mit und ohne Torsion desselben oder durch Hyperextensionen des Kniegelenkes entstanden. Ihre Prognose kann insofern ungünstig werden, als später eine Hemmung des Längenwachsthums eintreten könnte (Fig. 363).

Die **Symptome** aller dieser Bruchformen setzen sich zusammen aus den Erscheinungen an der Bruchstelle selbst und dem Bluterguss in das Gelenk. Dieser fehlt nie und ist oft so bedeutend, dass dagegen die eigentlichen Fracturzeichen zurücktreten. Die letzteren können dann weiterhin noch mehr verdeckt werden, wenn eine beträchtliche Weichtheilschwellung besteht, wie dies nach Einwirkung der schweren directen Gewalten die Regel ist. Man muss sich dann öfters nur mit einer Vermuthungsdiagnose begnügen und den Fall im Interesse der Kranken so behandeln, als läge eine Fractur vor. Bei geringerer Schwellung wird man

Fig. 362.





Fig. 363.



durch Percussion des Knochens Fissuren, durch den Nachweis von Crepitation, abnormer Beweglichkeit und Deformität aber die vollständigen Brüche nach ihrer Form und Richtung nachweisen können. Die Untersuchung wird wesentlich erleichtert durch die oberflächliche Lage des Knochens, nur muss man sich vorher schon am Gesunden in der Palpation der Theile geübt haben.

Als eine besondere, durchaus typische Form der Gelenkfracturen sind die von *Wagner* sogenannten **Compressionsfracturen des oberen Tibiaendes** zu erwähnen, deren Kenntniss wir *König*, *v. Volkmann* und vor allem *W. Wagner* verdanken.

Nach *Wagner*'s Beobachtungen — er sah allein 9 Fälle — sind diese Compressionsfracturen des oberen Tibiaendes, wie er sie analog den Compressionsfracturen der Wirbelkörper bezeichnet, gar nicht so selten. Ihr Mechanismus ist immer der, dass bei einem Fall auf die Füsse der oder die massigen, starken Condylen des Oberschenkels gewissermassen das „Dach der Tibia eindrücken“. Der Fall auf die Füsse aber muss mit grosser Wucht geschehen, wie dies z. B. bei Bergleuten der Fall ist, welche in den Schacht hinabfallen.

Ebenso wie *Wagner* hat *Albers* die Compressionsfractur der Tibia bei mit dem Fahrstuhl abgestürzten Bergleuten gesehen. In einem von *Oenike* beschriebenen Falle war die Wucht des Sturzes nicht so bedeutend; es handelte sich nur um einen Sprung vom Velociped; in einem Falle von *Sonnenburg-Gurau* war die Schuld einfach ein Sprung von einer nicht hohen Treppe herab.

In weitaus den meisten Fällen scheint es nur der Condylus internus tibiae zu sein, der diese Verletzungen erleidet, es kann aber auch die äussere Seite des Tibiakopfes mitbetroffen sein, ja es kann sogar gelegentlich nur der Condylus externus zerquetscht, der Condylus internus aber intact sein, so in drei Beobachtungen von *Wagner*, *Oenike* und *Sonnenburg-Gurau*.

Dieses überwiegend häufigere Befallensein des inneren Condylus ist mechanisch leicht zu erklären, denn bei einem Fall auf die Füsse muss er, als der Schwerlinie des Körpers am nächsten liegend, auch am ersten von der Kraft getroffen werden. Der äussere Condylus dagegen kommt erst bei stärkerem Anprall an die Reihe. Er dürfte ausserdem noch durch die säulenförmig ihn stützende Fibula etwas geschützt sein. In den Fällen, in denen nur der Condylus externus verletzt ist, ist vielleicht an eine vorherige Abknickung des Kniegelenkes im Sinne des Genu valgum zu denken.

Die pathologisch-anatomischen Charactere der Compressionsfracturen sind wechselnde. In den leichteren Fällen ist die Corticalis der Gelenkfläche nur etwas eingedrückt. In den schwereren ist sie uneben, zerklüftet, tief eingebrochen und hinabgesunken, in die Spongiosa der Epiphyse eingekeilt, während die letztere zusammengepresst, von tiefreichenden Fissuren durchsetzt ist. Oefters sind Theile des Semilunarknorpels miteingeklemmt. An den betreffenden Condylen des Femur finden sich ebenfalls regelmässig Durchbrechungen und Ablösungen der Corticalis.

Die Symptome der leichteren Compressionsfracturen können übersehen werden, da die Kranken zuweilen noch umhergehen

können und der mehr oder weniger starke Bluterguss ins Gelenk ihre Schmerzen und Klagen zu erklären scheint. Man muss in solchen Fällen, wenn die Aetiologie der Verletzung auf eine Compressionsfractur hinweist, genau palpiren und wird dann doch stets eine starke Druckempfindlichkeit am Condylus internus oder externus nachweisen und dortselbst auch eine Verdickung und Wulstung unterhalb der Gelenklinie fühlen können. Vielleicht besteht dann daneben noch eine abnorme seitliche Beweglichkeit.

In den schwereren Fällen, den eigentlichen Compressionsfracturen, ist dagegen das klinische Bild ein sehr bezeichnendes. Wir nehmen für die folgende Schilderung einen Bruch des Condylus internus an. Die Erscheinungen bei Betroffensein des Condylus externus sind dann die entsprechend umgekehrten. Das Kniegelenk erscheint geschwollen durch einen Bluterguss. Es steht in leichter Beuge- und starker Genu-varum-Stellung, letzteres oft so hochgradig, dass es bis 5 cm nach aussen abweicht (Fig. 364). Dabei ist es sehr druckempfindlich, besonders im ganzen Umfang unterhalb der Gelenklinie.

Die ganze Partie fühlt sich daneben gewulstet an, wie wenn der obere Theil der Tibia über den Rand hinweggequollen wäre. Druckempfindlich ist stets auch die Gegend des Ligamentum laterale externum. Die seitliche Beweglichkeit des Kniegelenkes ist erheblich gesteigert und unterhalb der Gelenklinie gegenüber dem anderen Beine bedeutend vergrössert.

Die **Prognose** aller der bisher besprochenen Fracturen des oberen Tibiaendes ist wie die aller Gelenkfracturen zu stellen. Die Heilung kann zwar mit vollständiger Gebrauchsfähigkeit des Kniegelenkes erfolgen, oft genug aber leidet sie in erheblichem Maasse. Es kann zunächst zu einer Lockerung des Gelenkes kommen, so dass das Gelenk namentlich nach den Seiten hin abnorm beweglich wird. Es können sich am Gelenk aber auch Adhäsionen entwickeln, so dass es steif wird. Losgelöste Theile der Gelenkfläche können zu freien Gelenkkörpern werden, welche dann später eine operative Behandlung erheischen. Vor Allem aber entwickelt sich sehr leicht, besonders im Anschluss an die Compressionsfracturen, eine Arthritis deformans des Gelenkes (Fig. 365). Schliesslich kann es nach traumatischen Epiphysenlösungen zu einer Wachsthumshemmung der Extremität

kommen, wie wir dies bereits nach einer Beobachtung *Bryant's* gezeigt haben (Fig. 363), oder dauernd ein Genu varum oder valgum zurückbleiben.

Die **Therapie** hat auf die ebengenannten Nachtheile Rücksicht zu nehmen und kann viel zur Vermeidung derselben beitragen. Sie besteht am besten in einer Distraction der Gelenkenden mittelst der Heftpflastergewichtsextension, die ja bei so hohem

Fig 364.





Fig 365.



Sitz der Fractur am übrigen Unterschenkel Halt genug findet. Man legt dann auf das Gelenk selbst noch eine Eisblase oder unterwirft es der elastischen Compression, kann auch wohl bei sehr beträchtlichem Bluterguss die Punction ausführen. Ist die Gelenkschwellung vorbei, so kann man dann nach etwa 8—14 Tagen dem Gliede die richtige Stellung in einem Gypsverbande geben. Jedenfalls kann die Consolidation nicht vor der sechsten

Woche erwartet werden. Dann aber sorgt eine vielleicht schon etwas früher begonnene Massage und später noch eine rationelle Gymnastik für völlige Gebrauchsfähigkeit des Gliedes.

Complicirte Gelenkfracturen werden aseptisch behandelt, schlecht geheilte Fälle eventuell später resecirt.

b) **Rissbrüche der Spina tibiae.** Beim Neugeborenen und auch später noch liegt an Stelle der nachherigen, dem Ligamentum patellae zum Ansatz dienenden Tuberositas oder Spina tibiae vor dem Knochen der Epiphyse und Diaphyse eine dicke Knorpellage. Dieselbe beginnt später zu ossificiren, vereinigt sich mit der oberen Epiphyse und bildet dann einen Fortsatz dieser, der vor dem Ende der Diaphyse herabreicht. Im Alter von 15—20 Jahren zeigt dieser Fortsatz, die Spina tibiae, stets noch eine knorpelige Verbindung mit seiner Unterlage.

Zwischen dem Ligamentum patellae und der Tibia selbst liegt ein Schleimbeutel, die Bursa infragenualis, welche von der Kniegelenkskapsel nur durch eine dünne Membran geschieden ist.

Man muss sich diese anatomischen Verhältnisse vergegenwärtigen, wenn man die Rissbrüche der Spina tibiae verstehen will.

Es sind das seltene Verletzungen. *E. Müller*, der ihnen kürzlich seine besondere Aufmerksamkeit schenkte, konnte im Ganzen nur 8 einschlägige Beobachtungen mittheilen. Von diesen 8 Fällen betrafen 6 jugendliche, noch im Wachsthum begriffene männliche Individuen, 2 ältere Personen.

Von 6 Fällen betrafen 5 die rechte, 1 die linke Unterextremität, ein Verhältniss, das wohl mit der bevorzugten Inanspruchnahme der rechten Körperhälfte in Einklang zu bringen ist.

Die Ursache der Verletzung war in allen Fällen nahezu die gleiche, nämlich ein Sprung in die Weite oder in die Höhe. Der Abriss der Spina geschah dabei in der Regel bei dem Versuche, den Körper durch eine gewaltsame Anstrengung vor einem Falle nach rückwärts zu bewahren.

Wie schon der Name ausdrückt, entsteht der Bruch der Spina tibiae durch Abreissung und zwar entweder durch eine active Contraction des Quadriceps oder durch eine übermässige Dehnung dieses Muskels, indem zum Beispiel in einer Beobachtung *Weinlechner*'s der betreffende Patient nach einem kraftvoll ausgeführten Sprunge mit dem Gesäss auf seine eigene Wade fiel.

Da nun eine gewaltsame active und passive Spannung des Quadriceps so selten Fracturen der Spina tibiae bewirkt, vielmehr weit häufiger Zerreissungen des Muskels selbst oder seiner Sehne oder des Lig. patellae oder Querbrüche der Kniescheibe, so muss im gegebenen Fall eine besondere Prädisposition vorgelegen haben. Eine solche Prädisposition aber liegt in der vorherbeschriebenen Art der Entwicklung der Spina aus einem selbständigen erst spät mit der Tibia knöchern verwachsenden Fortsatz. Da der Rissbruch so selten eintritt, so muss man vielleicht annehmen, dass in den betreffenden Fällen die knöcherne Verwachsung mit der Tibia noch gar nicht eingeleitet war, so dass es sich also um eine reine Epiphysenlösung handeln würde. In den im späteren Lebensalter sich ereignenden Fällen ist der Bruch wohl nur theilweise im Knorpel verlaufend, also eine Combination von Rissbruch und Epiphysenlösung vorhanden. Es kann aber auch eine echte Fractur der Spina, also ein echter Rissbruch eintreten, wenn die Verknöcherung schon ganz stattgefunden hatte, oder schliesslich auch nur eine unvollständige Abreissung bestehen, indem der Knochen noch theilweise durch Periost- oder Rindentheile mit seiner Umgebung in Zusammenhang geblieben ist. Es kann dann das Fragment durch den Muskelzug mit seiner Spitze um eine horizontale Achse nach aufwärts gedreht werden (*P. Vogt*).

Wie sich nun aber auch im einzelnen Falle die Art der Trennung verhält, in der Ausdehnung des Bruches besteht jedenfalls eine grosse Verschiedenheit. Einmal ist die ganze Spina abgerissen, andere Male nur grössere oder kleinere Stücke derselben, so dass die Basis des Knochenfragmentes zwischen 2 und 5 Centimetern schwanken kann. Jedenfalls kommen auch allmähliche Uebergänge zu den Zerreissungen des Kniescheibenbandes an seinem Tibiaansatz vor (*Richet*).

Die **Symptome** der Rissfractur der Spina gestalten sich ähnlich denen einer Querfractur der Kniescheibe. Unmittelbar bei der Verletzung empfinden die Patienten ein Nachgeben, einen Riss oder Krach oder einen Schmerz in der Kniegegend. Sie sind darauf unfähig, das Bein zu strecken. Die Kniescheibe ist in ihrer Contour und Form vollständig erhalten, jedoch stets mehr oder weniger in die Höhe gerückt, von $2^1/_2$ bis zu 4 Centimetern. *Landsberg* beobachtete eine Verschiebung der Kniescheibe um 10 cm nach aufwärts. Diese starke Dislocation ist aber wohl jedenfalls darauf zurückzuführen, dass in dem betreffenden Falle ausser dem Abriss der Spina tibiae gleichzeitig auch eine Zer-

reissung der seitlich sich an das Lig. patellae anschliessenden vorderen Ansätze der Kniegelenkskapsel erfolgt war. Das Hauptzeichen ist nun das, dass man 4—6 Centimeter je nach der Höhe, in welche die Patella hinaufgerückt ist, unterhalb der Spitze der Patella einen grösseren oder kleineren Knochenvorsprung fühlt, der mit dem Kniescheibenbande zusammenhängt und sich mit demselben verschieben lässt. Die Verschiebbarkeit besteht sowohl in seitlicher als longitudinaler Richtung, in letzterer allerdings nur bei vollständiger Fractur. In mehreren Fällen bestand dazu noch Crepitation.

Ausserdem war fast stets noch ein Bluterguss im Kniegelenk vorhanden. Das Blut gelangt in dasselbe, indem die schmale Verbindung der Bursa infragenualis mit der Kniegelenkskapsel bei dem Zustandekommen der Fractur mit durchrissen wird.

Vergegenwärtigt man sich die angeführten Symptome, so wird man bei einigermassen genauer Untersuchung die Diagnose richtig stellen können. Eine Verwechslung ist nur möglich mit einem Querbruche der Patella, wenn die Lage des abgerissenen Knochenstückes unterhalb des Ligamentes für eine solche oberhalb desselben gehalten wird. Dieser Irrthum ist in der That *O. Will* passirt, indem er sogar das Gelenk durch einen Längsschnitt breit eröffnete, um die Naht bei der vermeintlichen Patellarfractur anzulegen.

Die **Prognose** der Rissfractur ist eine gute. In sämmtlichen bisher frisch zur Behandlung gekommenen Fällen ist, allerdings oft erst nach mehreren Monaten, die Gebrauchsfähigkeit des Gliedes wieder vollständig hergestellt worden. In veralteten, nicht behandelten Fällen ist dagegen das Endresultat mangelhaft. So war in einem Falle, den *Pitha* zu Gesicht bekam, die ganze Extremität abgemagert, die Streckung und Feststellung des Knies wenig kräftig und wenig andauernd und das Gehen nur mit einem Stock und ester Kniekappe möglich. Eine Osteophytenwucherung an der Tibia bezeichnete die Stelle des Knochenausrisses.


Die Art der Anheilung gestaltete sich im übrigen so, dass in den 7 frischen Fällen 6 mal eine knöcherne Verwachsung mit der Unterlage erfolgte. Nur einmal kam es zur Pseudarthrosenbildung bei einem besonders unruhigen und unfolgsamen Patienten. Die fibröse Bandmasse war aber derb und fest, so dass gleichwohl die Gebrauchsfähigkeit des Beines nicht litt. Wir haben früher schon gesehen, dass *v. Bergmann* die Spina tibiae abmeisselte, um bei veraltetem schlecht geheiltem Patellarbruch das untere Frag-

ment dem oberen entgegenführen zu können, und dass auch in diesem Falle, wie in einer weiteren gleichen Beobachtung *Sonnenburg*'s die Spina knöchern mit der Meisselfläche verwuchs, in soweit sie noch mit derselben in Berührung stand.

Die **Therapie** hat die Aufgabe, die durch den Quadriceps emporgezogene Spina zu reponiren und an ihrer Stelle zu fixiren Hierzu genügt in der Regel ein Binden- oder Heftpflasterverband, der in Achtertouren das Fragment gegen die Tibia angedrückt erhält und selbst noch durch einen in Streckstellung des Knies angelegten Gyps- oder Wasserglasverband gedeckt wird. Diese Verbände müssen mindestens 6 Wochen liegen bleiben, um einer ligamentösen Vereinigung vorzubeugen. Sollte das Fragment eine grosse Neigung zur Dislocation besitzen, so könnte man es aseptisch auf seiner Unterlage festnageln.

c. **Brüche des Tibiaschaftes.** Am Schafte der Tibia kommen zunächst Fissuren vor. Dieselben verlaufen entweder der Länge nach, so in einer, ein Kind betreffenden Beobachtung von *Hornridge*, in der die Fissur in die Epiphysenfuge auslief, während die letztere selbst theilweise gelöst war (Fig. 366), oder es sind Spiralfissuren. Eine solche zeigt ein Präparat von *P. Bruns*, das einem Mann entstammt, der verschüttet worden war und gleichzeitig eine Oberschenkelfractur erlitten hatte (Fig. 367).

Fig. 366.



Eine Infraction der Tibia eines Erwachsenen beschreibt *Menzel*. Durch Ueberfahren eines Wagenrades waren etwa $^7/_8$ der Peripherie der Tibia quer durchbrochen. Nur die innere Tibiakante, über welche gerade das Rad herübergefahren war, war vollkommen unversehrt, auch ohne jede Spur von Fissur.

Im Ganzen sind solche unvollständigen Brüche Seltenheiten. Aber auch die vollständigen Trennungen des Tibiaschaftes kommen nicht häufig isolirt vor, da die einwirkende Gewalt oder auch die Körperlast meist noch die Fibula mitbricht.

Sind vollständige Brüche vorhanden, so können sich alle schon vorher beschriebenen Bruchformen, die auch bei gleichzeitigem Fibulabruch vorkommen, hier wiederholen.

Im Ganzen finden sich aber doch am häufigsten durch directe Gewalt entstandene Querbrüche oder leichte Schrägbrüche. Eine

Dislocation der Fragmente fehlt meist, da die intacte Fibula gewissermassen als Schiene dient, doch kann sich auch hier das obere Fragment nach vorn, das untere nach hinten begeben.

Am unteren Ende der Tibia finden sich nicht so selten Epiphysenlösungen. *P. Bruns* fand sie 11 mal unter 100 Fällen. Die Trennung stellt meist zum Theil eine reine Epiphysenlösung, zum Theil eine reine Fractur vor, indem sie an der einen Seite in der Epiphysenlinie einsetzt, derselben eine Strecke weit folgt und dann in schräger Richtung in die Diaphyse ausläuft (Fig. 368). Es bleibt dann am Rande der Epiphyse ein kleineres oder grösseres diaphysäres Stück sitzen.

Fig. 367.





Fig. 368.



Die **Symptome** dieser Brüche sind viel weniger ausgesprochen, als die der Brüche beider Unterschenkelknochen. Man findet meist nur den localen Schmerz, eine Ecchymose, die nach einigen Tagen auftritt, und wohl auch eine geringe ödematöse Anschwellung der Weichtheile. Nur bei Dislocation des oberen Fragmentes nach vorn wird die Diagnose leichter. Dann fühlt man beim Abtasten der Tibiakante die Unebenheit derselben und kann an der betreffenden Stelle abnorme Beweglichkeit und Crepitation hervorrufen. Der Patient vermag aber selbst unter diesen Umständen öfters noch das Bein als Stütze zum Gehen zu gebrauchen.

Die **Prognose** der Verletzung ist im Ganzen eine günstige. Die Heilung pflegt innerhalb 4—6 Wochen einzutreten. Bisweilen kommt es allerdings auch bei diesen isolirten Brüchen zur Pseud-

darthrosenbildung, wahrscheinlich wohl dann, wenn man die Fractur nicht entdeckt und den Patienten zu frühzeitig gehen lässt. Es kann dann die Fibula bedeutend stärker, vielleicht auch gebogen werden und nun als Stütze für das Körpergewicht dienen.

Die **Therapie** ist sehr einfach. Das Glied wird in einem Schienen- oder Contentivverband für 4—6 Wochen fixirt, später aber methodisch massirt.

Einer kurzen Erwähnung würdig sind:

d) **Die sog. intrauterinen Brüche der Tibia.** Es sind keine wirklichen Fracturen, sondern congenitale Hemmungsbildungen. Sie gehören daher nicht hierher, sondern in das Gebiet der orthopädischen Chirurgie (siehe *Hoffa*: Lehrbuch der orthopädischen Chirurgie II. Auflage, S. 636).

C. Brüche der Fibula.

a) **Brüche des Fibulaköpfchens.** Nachdem *Hyrtl*, *Führer*, *von Lotzbeck* u. A. zuerst einen Rissbruch des Fibulaköpfchens durch die Wirkung des M. biceps beschrieben hatten, hat man diesem Bruch später mehr die Aufmersamkeit zugewendet. Er ist dann neuerdings genauer studirt und experimentell untersucht worden von *Dumollard*.

Als Ursachen, welche eine Fractur des Wadenbeinköpfchens hervorrufen können, nennt *Dumollard* zunächst eine Hyperextension des Unterschenkels. Die bei einer solchen erfolgende Dehnung des Lig. laterale externum des Kniegelenkes soll das Köpfchen abreissen können. Eine diese Entstehungsweise bestätigende klinische Beobachtung existirt jedoch bis jetzt noch nicht. Die meisten bisherigen Fälle sind vielmehr durch den Muskelzug allein oder in Verbindung mit einer forcirten Adduction des Unterschenkels hervorgebracht worden. So war zum Beispiel ein Patient *Duplay*'s von einem Treibriemen gefasst und mehrmals gegen die Erde geschleudert worden. Er gab dabei genau an, mit der Aussenseite des Beines so auf den Boden aufgeschlagen zu sein, dass das Bein stark nach innen gebogen gewesen sei. Diese Beobachtung zeigt, dass beim Zustandekommen des Bruches jedenfalls noch eine directe Gewalt betheiligt war, und so konnte denn auch *Dumollard* ohne gleichzeitige directe Gewalt die Fractur nie erzeugen. Es giebt aber sicher reine Fälle von Rissbrüchen. Dieselben entstehen bei Menschen, welche sich, im Begriffe zu fallen, kräftig auf eine Extremität stützen und durch die dazu nöthige

Muskelaction ihr Fibulaköpfchen abreissen. *Tietze* beschrieb so eine Fractur, die bei einem mit dem Pferd gestürzten Reiter eintrat, in dem Moment, als er sich von dem auf ihm liegenden Pferde frei zu machen versuchte. Gegen eine directe Fractur sprach hier die völlige Nichtbetheiligung des Nervus peroneus sowie das Fehlen aller Zeichen einer Gewalteinwirkung an der Bruchstelle.

Sjöberg sah einen Rissbruch entstehen bei einem Patienten, der eine übermässige Anstrengung des Musculus triceps machte, um einer forcirten Adduction des Unterschenkels entgegenzuwirken.

Pathologisch-anatomisch unterscheidet *Dumollard* 3 Formen des Bruches: Erstens kennt er, bei sehr heftiger Gewalteinwirkung, einen Splitterbruch des Köpfchens, zweitens einen Sternbruch desselben, wobei es in drei Stücke zersprengt ist, von denen das grössere dem Lig. laterale externum oder der Sehne des Biceps anhängt, und drittens eine subperiostale Fractur des Halses des Wadenbeinköpfchens.

Wichtig ist nun, und dadurch wird die Fractur interessant, die bei derselben mögliche Verletzung des ja das Wadenbeinköpfchen umschlingenden Nervus peroneus und des Nervus cutaneus cruris externus. *Dumollard* unterscheidet eine directe und indirecte Verletzung dieser Nerven, je nachdem sie im Moment des Bruches durch Knochensplitter gequetscht oder durch die einwirkende Gewalt gedehnt, gezerrt oder andererseits im Verlaufe der Heilung durch Callusbildung gedrückt oder in einen anhaltenden entzündlichen Zustand versetzt werden.

Die **Symptome** der Fractur sind ziemlich charakteristisch. In der Gegend des Fibulaköpfchens bemerkt man unter der Haut eine kleine, harte, seitlich stark bewegliche Geschwulst, welche sich bei Beugung des Knies in Folge der Bicepswirkung aufrichtet, bei Streckung desselben aber senkt. Unter dieser Geschwulst ist eine Vertiefung zu fühlen, unterhalb deren man wiederum das obere Ende des unteren Fragmentes nachweisen kann. In Folge der Schlaffheit des Lig. laterale, dessen unteres Ende ja am Fibulakopf inserirt, besteht eine gesteigerte seitliche Beweglichkeit des Kniegelenkes nach innen. Zu diesen Zeichen kommen dann noch die der Nervenverletzung. Schon unmittelbar nach der Verletzung entstehen lebhafte Schmerzen, die von der Bruchstelle auf die ganze äussere Fläche des Unterschenkels und den Fussrücken ausstrahlen. Daneben findet man dann eine mehr weniger vollständige Lähmung der Muskeln an der vorderen und

äusseren Seite des Unterschenkels und einen Verlust der Sensibilität in dem von den Nerven versorgten Gebiet, also in der Gegend oberhalb des äusseren Knöchels, auf dem Fussrücken und dem Rücken der beiden ersten Zehen.

Die **Prognose** der Verletzung hängt wesentlich ab von dem Grade der Nervenverletzung. In den schlimmeren Fällen bleibt die Lähmung dauernd bestehen. Es gesellen sich dann noch trophische Störungen hinzu, so dass in einem Falle sogar die Amputation nöthig war. Es kann sich aber auch eine schwere Neuritis entwickeln. So beobachtete *Terrier* einen Patienten, bei dem sich in der Umgebung der anästhetischen Stellen anfallsweise heftige Neuralgieen, zugleich mit dem Auftreten eines festen Oedems entwickelten. Möglicherweise wird dann der Nerv von den gebildeten Callusmassen umschlossen und gedrückt. Es kommt übrigens nicht immer zur Callusbildung, denn *Duplay* fand bei seiner Section eine Pseudarthrose.

Die **Therapie** hat zunächst die Fractur zu behandeln. Dies geschieht nach Reposition der Fragmente durch Fixation des Gliedes in irgend einem Contentivverband. Weiterhin tritt dann die Behandlung des verletzten Nerven in den Vordergrund. Neben der Anwendung von Massage, Electricität, Bädern und Douchen kommen hier auch Operationen, und zwar Befreiung der Nerven von Knochensplittern oder einschnürenden Callusmassen und ferner die Dehnung oder Resection und Naht derselben in Betracht. *Weier* erreichte in einem 1888 mitgetheilten Fall von Rissfractur des Fibulaköpfchens durch einfache Ausräumung der Blutcoagula eine vollständige Heilung unter Rückgang der Peroneuslähmung. *Miculcz* führte in dem von *Tietze* beschriebenen, oben erwähnten Falle mit bestem Erfolge die Knochennaht aus.

b) **Brüche des Fibulaschaftes.** Isolirte Brüche des Fibulaschaftes in seinem mittleren und oberen Drittel sind seltene Verletzungen. Sie entstehen meist durch directe Gewalt und verlaufen dann transversal. Es kommen hie und da einfache Infractionen vor (*Cloquet*). Bei den vollständigen Brüchen findet kaum eine Dislocation der Fragmente statt, oder dieselbe ist so gering, dass sie unter der dicken Muskelschicht der Wade nicht gefühlt werden kann.

Die **Symptome** sind daher nicht sehr ausgesprochen. Meist ist man auf die Gegenwart eines fixen Schmerzes an einer bestimmten Stelle des Knochens, welcher durch Bewegungsversuche

gesteigert wird, angewiesen. Oefters constatirt man auch, dass das obere Fragment seine Lage nicht mit dem untern ändert, wenn man auf letzteres einen Druck ausübt oder wenn man es zugleich mit dem Fusse rotirt. Bei solchen Versuchen fühlt man auch wohl Crepitation. Endlich pflegen sich im Verlaufe des Bruches entlang der Fibula Ecchymosen einzustellen. Dieselben sind aber nur dann wahrzunehmen, wenn sie nicht durch die in Folge der directen Gewalt entstandene Weichtheilquetschung verdunkelt werden. Die Patienten vermögen meist noch zu gehen.

Die **Prognose** der Verletzung ist eine günstige. Die knöcherne Heilung tritt innerhalb 4—5 Wochen ein.

Die **Therapie** besteht in Anlegung eines Schienen- oder Contentivverbandes mit Feststellung des Fusses.

D. Brüche am unteren Ende der Tibia und Fibula, Brüche der Knöchel.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.


Zum Verständniss der Brüche am unteren Ende der Tibia und Fibula, sowie später der Luxationen an den Fussgelenken ist es nothwendig, sich die anatomisch-physiologischen Verhältnisse dieser Theile zu vergegenwärtigen. Der Anfänger wird dabei gut thun, sich das Gesagte mit Hülfe eines Skelettes klar zu machen. Der Fuss bewegt sich am Unterschenkel in dem sogenannten Sprung- oder Talocruralgelenk, das durch die gabelförmige Umgreifung des Talus von Seiten der Malleolen der Tibia und Fibula gebildet wird. Der Talus selbst ist dann wieder mit dem ganzen übrigen Fuss gelenkig verbunden, so jedoch, dass sich der Calcaneus weniger als der Vorderfuss an diesen Bewegungen betheiligt. Man bezeichnet daher dieses zweite als Talotarsalgelenk (*Hueter*).

Betrachten wir zunächst das **Talocruralgelenk**. Die leicht sattelförmig gebaute Talusrolle, die eine von vorn nach hinten ziemlich regelmässig convexe Oberfläche besitzt, ist vorn breiter als hinten, indem die convexe Knorpelfläche durch zwei schiefe, nach hinten convergirende Ränder von den seitlichen, ebenfalls knorpelüberzogenen, zur Gelenkverbindung mit den Knöcheln dienenden Flächen getrennt wird. Die convexe Knorpelfläche der Talusrolle passt nun in die in sagittaler Richtung concave, ebenfalls von convergirenden Seitenrändern begrenzte Endfläche der Tibia und bildet

mit dieser ein Charniergelenk, in dem die beiden Malleolen und die sie vorn und hinten verbindenden Ligamenta tibiofibularia ein seitliches Abgleiten der Tibia verhindern. Der Umfang der tibialen Gelenkfläche ist etwa um ein Dritttheil kleiner als der Umfang der Talusrolle. Ihre Form wird aber dadurch veränderlich, dass Tibia und Fibula in ihrem unteren Gelenk einer durch die Bänder vermittelten, elastischen Bewegung fähig sind. Rückt die Tibia auf den hinteren schmäleren Theil der Talusrolle, so schmiegt sich der Malleolus fibulae oder externus ihr ganz nahe an. Rückt sie dagegen nach vorn, so klemmt sich der breitere Theil der Talusrolle zwischen die Knöchel ein und hebt den lateralen Knöchel hinten von der Tibia ab.

Die Kapsel des Sprunggelenkes heftet sich vorne und hinten in einigem Abstande von den Gelenkflächen am Talus an, geht dann von hier an die Ränder der Knöchel und der Tibio-fibularbänder und inserirt an den Rändern der Gelenkfläche der Tibia,

Fig. 369.



deren vorderer stumpfer Rand noch in den Gelenkraum aufgenommen ist. Starke Bandmassen verstärken diese Kapsel (Fig. 369). Man kann im Allgemeinen ein äusseres und ein inneres Seitenband annehmen.

Das äussere Seitenband zerfällt in drei Bündel. Das vordere, Lig. talo-fibulare anticum, geht mit parallelen

Fasern vom vorderen Rande des Malleolus externus zum vorderen Rande der seitlichen Malleolarfläche des Talus. Das hintere, Lig. talo-fibulare posticum, zieht als derber Faserstrang aus der rauhen Grube an der inneren Fläche des Malleolus externus zu dem hinteren Fortsatze des Talus und schliesst sich an die Fasern der hinteren Kapselwand an. Das dritte, Lig. calcaneo-fibulare ist brückenförmig von der Spitze des Knöchels schief nach hinten zur Aussenseite des Fersenhöckers gespannt.

Das innere Seitenband ist fächerförmig gestaltet. Es heisst deshalb Lig. deltoides. Seine vordersten dicht gedrängten und zugleich oberflächlichen Bündel gehen als Lig. tibio-naviculare bis zum Os naviculare. Die darauffolgenden Bündel heften sich an dem Sustentaculum tali an, Lig. calcaneo-tibiale. Nach diesen kommen Fasern, die den hinteren Rand des Bandes bilden und sich am Talus ansetzen, Lig. talo-tibiale posticum. Das Lig. talo-tibiale anticum erscheint erst nach Entfernung dieser letzteren Fasern.

Die Bewegungen nun, die im Talocruralgelenk möglich sind, sind Hebung und Senkung des Fusses. Diese Bewegungen vollziehen sich um eine quere, etwa durch die Knöchel gelegte Achse. Die Senkung der Fussspitze bezeichnet man auch als Beugung oder besser als Plantarflexion, die Hebung als Streckung oder besser Dorsalflexion. Die Mittelstellung des Fusses ist die zum Unterschenkel rechtwinklige. Von dieser Mittelstellung aus kann der Fuss in gleicher Ausdehnung plantar- und dorsalflectirt werden. Die ganze Excursionsmöglichkeit beträgt nach den Gebrüdern *Weber* etwa 78°. Bei gelenkigen Füssen erreicht sie selbst einen rechten Winkel.

Die Hemmung der Plantarflexion geschieht durch das Anstossen der hinteren, etwas gebogenen Kante der tibialen Gelenkfläche gegen den hinteren Rand des Talus, sowie durch die Anspannung der vorderen Fasern der Seitenbänder, die Hemmung der Dorsalflexion durch das Anstemmen des vorderen Randes des Malleolus internus gegen die seitliche Hervorragung der Talusrolle und die Spannung der hinteren Fasern der Seitenbänder. Ausserdem sind für die Hemmung der Bewegungen noch die bi- und polyarthrodialen Muskeln von grosser Bedeutung. So ist z. B. bei gebeugtem Kniegelenk die Dorsalflexion viel ausgiebiger möglich, als bei gestrecktem Kniegelenk, weil sich im letzteren Fall der Gastrocnemius hemmend in den Weg stellt.

Zu dem **Talotarsalgelenk** combiniren sich drei Gelenke, von welchen das Talo-naviculargelenk die Hauptrolle übernimmt, während die Gelenke zwischen Talus und Calcaneus und zwischen Calcaneus und Os cuboides nur Mitbewegungen ausführen. Das Talo-naviculargelenk wird von der convexen Fläche des Taluskopfes und einer Pfanne dargestellt, welche aus der concaven Fläche des Naviculare und einer Facette des Calcaneus besteht, welche sich auf dem Sustentaculum tali befindet. Die Pfanne wird dann noch durch Bandmassen ergänzt, welche vom Sustentaculum zum Naviculare ziehen. Die Kapsel dieses Gelenkes folgt ziemlich genau den Rändern der Gelenkflächen. Das Talo-calcanealgelenk wird durch congruente Flächen der concaven unteren Fläche des Talus und der convexen oberen Fläche des Calcaneus gebildet, ebenso stimmen die Gelenkflächen des Gelenkes zwischen Calcaneus und Os cuboides miteinander überein. Beide Gelenke besitzen gesonderte, den Gelenkrändern folgende Kapseln und seitliche und plantare Verstärkungsbänder.

Die Bewegungen des Talotarsalgelenkes gehen im Allgemeinen um eine schräge Achse vor sich. Dieselbe verläuft in einer Linie, die man sich vom Fersenhöcker nach vorn und oben bis zur rauhen Fläche des Taluskopfes gezogen denken muss. Um diese Achse kann sich nun der Fuss in zweierlei Weise drehen. Einmal kann sich die Fussspitze der Medianebene nähern, dabei muss aber nothwendigerweise der innere Fussrand gehoben werden. Diese Bewegung nennt man Adduction oder, nach Analogie mit der gleichsinnigen Bewegung der Hand, Supination des Fusses. Zweitens kann die Fussspitze nach aussen gewendet werden, wobei wiederum gleichzeitig eine Erhebung des äussern Fussrandes erfolgen muss. Diese Bewegung heisst Abduction oder Pronation des Fusses.

Eine Hemmung dieser Bewegungen kann direct nur in dem Gelenk zwischen Talus und Calcaneus entstehen, indem sich am Schluss der Bewegungen Knochenpunkte berühren. — Beim Schluss der Adduction berührt das hintere Ende des Sustentaculum tali das hintere innere Ende des Taluskörpers, beim Schluss der Abduction stösst die Dorsalfläche des Proc. anterior calcanei gegen die Vorderfläche des freien äusseren Randes des Talus vor dem Malleolus externus. Im Uebrigen werden die Hemmungen durch die festen Bandverbindungen zwischen Calcaneus und Talus einer-

seits und Calcaneus und Os cuboides andererseits auf die beiden anderen Gelenke übertragen.

Die Fracturen am unteren Ende des Unterschenkels sind sehr häufige Verletzungen und haben das Eigenthümliche, dass sie fast stets durch indirecte Gewalt entstehen. Es kann natürlich auch ein Wagenrad, das über die Knöchel geht, diese einmal brechen, das sind aber Ausnahmen.

Man kann im Wesentlichen zwei Gruppen der indirecten Fracturen unterscheiden, 1) solche, welche durch Compression des Unterschenkels in verticaler Richtung und 2) solche, welche durch aussergewöhnliche Bewegungen des Fusses entstehen. Die ersteren sind seltener und bilden die Gruppe der supramalleolären Brüche, die zweiten sind ungleich häufiger und bilden die Gruppe der Knöchelbrüche. Wir müssen beiden Gruppen unsere volle Aufmerksamkeit schenken.

E. Brüche über den Knöcheln, Fracturae supramalleolares (*Malgaigne*).

Als Bruch über den Knöcheln (Fracture susmalléolaire) hat *Malgaigne* zuerst einen Bruch beschrieben, der einige Centimeter oberhalb der Gelenklinie des Sprunggelenkes verläuft und das letztere meistens eröffnet.

Der Bruch kann wohl durch Ueberfahren eines Wagenrades entstehen, hat aber in der bei weitem grössten Mehrzahl der Beobachtungen seine Ursache in einem Sturz aus der Höhe auf die Füsse, wobei der Talus gegen die Knöchel angedrängt wird und dieselben sprengt. *Tillaux* hat diese Brüche experimentell erzeugen können, wenn er den Fuss forcirt adducirte. Er glaubt, dass bei dieser Manipulation die Lig. tibio-fibularia eine Rolle spielen, indem sie nach dem Bruch der Fibula im unteren Drittel an der Tibia einen Zug ausüben, sodass diese auf der äusseren Seite durch Abreissen, auf der innern durch Einknicken abbreche.

Die Bruchformen selbst wechseln in mehr oder weniger erheblicher Weise. Bald besteht nur eine fast quere Trennung beider Knochen, bald ist der Bruch unregelmässiger, breitgezackt und das untere Fragment der Tibia und der Fibula dabei noch selbst in mehrere Stücke zerbrochen (Fig. 370). Oefters war neben dem Bruch der Malleolen noch ein Stück von der vorderen oder hinteren

Gelenkfläche der Tibia abgesprengt. So war in einem Falle von *Chassaignac* und *Richelot* der Fuss nach innen dislocirt und scheinbar verkürzt, die Fibula gebrochen und ihr Malleolus nach hinten gedrängt. Die Section zeigte dann, dass ein Stück vom hinteren Rand der tibialen Gelenkfläche abgebrochen und stark nach hinten verschoben war, dass es aber noch den Talus berührte. Die Bänder waren intact. In einem anderen Falle *Chassaignac*'s war die Tibia 4 Finger breit über dem Gelenk gebrochen, das obere Fragment in das untere eingekeilt und dieses in 4 Fragmente zersprengt. Die Fibula war ebenfalls doppelt gebrochen. Ein anderes Beispiel ist von *Poncet* beschrieben. Die Fig. 371 zeigt die Richtung der Bruchlinien in diesem Fall, in welchem das untere Ende des Unterschenkels in 7 Bruchstücke getheilt war.

Fig. 370.





Fig. 371.



Die **Symptome** dieser Brüche lassen sich nicht einheitlich aufstellen. Sie wechseln je nach der vorhandenen Dislocation der Fragmente. Sind diese nur seitlich verschoben, so erscheint die Gegend über dem Fussgelenk verbreitert. In anderen Fällen ist der Fuss ganz nach der einen oder anderen Seite abgewichen, so dass sich auf der convexen Seite ein oberhalb der Gelenklinie befindlicher Knochenvorsprung darstellt, oder er ist nach auf-

wärts in das Spatium interosseum dislocirt, womit dann eine vollständige Diastase zwischen der Tibia und Fibula gegeben ist. Das untere Bruchstück kann sich mit dem Fuss durch den Zug der Wadenmuskeln auch nach hinten und oben begeben und die vordere Fläche der Tibia auf der Gelenkfläche des Talus nach vorn gleiten, so dass der ganze Vorderfuss verkürzt erscheint und die Verletzung einer Luxation des Fusses nach hinten gleicht (*Richet, Aysagner*).

Die Diagnose lässt sich nur durch sorgfältige Palpation stellen. Die Narcose ist dazu wohl stets nothwendig, da in der Regel eine starke Anschwellung besteht und der intra- und periarticuläre Bluterguss die Contouren verwischt. Die Hauptsache ist, festzustellen, dass die Bruchlinien sich über dem Gelenk befinden.

Die **Prognose** dieser Verletzungen ist keine günstige. Sie gehören wegen der bedeutenden Gewalt, die ihre Erzeugung voraussetzt, zu den schwersten Unterschenkelbrüchen, und man erzielte bisher auch bei passender Behandlung oft nur ein ankylotisches Fussgelenk.

Die Behandlung selbst wird in Gemeinschaft besprochen mit derjenigen der

F. Brüche der Knöchel; Malleolarfracturen.

Die Knöchelbrüche sind nach den Fracturen beider Unterschenkelknochen die häufigsten Brüche des Unterschenkels. So kamen in dem London-Hospital während zweier Jahre allein von den Brüchen am unteren Fibulaende 236 Fälle zur Beobachtung. 196 derselben waren auf indirectem und nur 38 auf directem Wege entstanden. Die Ursache der übrigen war unbekannt. Diese Zahlenverhältnisse lassen sofort das ungleich häufigere Vorkommen der indirecten Gewalten erkennen. In der That treten directe Gewalten fast in den Hintergrund. Nach *Clippingdale,* dem wir die obigen Zahlen verdanken, bestehen sie meist in einem Stoss oder Schlag gegen die innere oder äussere Seite des stehenden Beines. Demgegenüber zeigen die indirecten Gewalten eine grosse Mannigfaltigkeit.

Entweder ist es ein Umkippen des Fusses nach aussen oder innen auf unebenem Boden, welches die Fractur erzeugt, oder der Fuss bleibt in irgend einem Hinderniss, einem Loch im Wege, zwischen Steinen, in einem Wagengeleise stecken, und der Körper

fällt nach der Seite um, oder der Fuss wird zwischen irgend welchen Gegenständen fixirt, und der Unterschenkel macht eine drehende Bewegung, um ihn zu befreien, oder es findet ein Sturz von einer Höhe herab statt, und der Fuss trifft mit dem innern oder äussern Fussrand auf, sodass er gewaltsam um seine Längsachse herumgewälzt wird.

Es handelt sich in allen diesen Fällen um Uebertreibung der physiologischen Bewegungen des Fusses, und zwar um forcirte Pro- und Supinationen, oder um gewaltsame Drehungen der Fussspitze nach ein- und auswärts um eine verticale, durch den Unterschenkel hindurchgehende Achse, eine normaler Weise unmögliche Bewegung.

Alle diese Bewegungen gehen wesentlich im Talotarsalgelenk vor sich. Trotzdem sind Verletzungen dieses Gelenkes sehr selten und zwar deshalb, weil im Augenblicke der Verletzung der Fuss durch seine Muskeln gewissermassen in einen starren Hebel verwandelt wird, der die Gewalten auf das Talocruralgelenk fortpflanzt.

Je nachdem nun die Gewalt sich früher erschöpfte oder sich völlig entfalten konnte, bewirkt sie entweder einfache Distorsionen oder Fracturen oder Luxationen des Sprunggelenkes. Sehr häufig lassen sich die Distorsionen nur schwer von den Fracturen unterscheiden, und ebenso besteht zwischen den Fracturen und den Luxationen nur ein gradueller Unterschied, sodass man die Fracturen sehr passend auch als „Verrenkungsbrüche" bezeichnet hat (*Stromeyer*).

Zum Verständniss dieser Verrenkungsbrüche ist es wichtig, sich die Anatomie des Sprunggelenkes zu vergegenwärtigen. Wie wir gesehen haben, bewegt sich die Rolle des Talus in der Hohlrolle der Tibia und wird in dieser festgehalten durch die beiden Knöchel und die diese verbindenden Bandmassen. Wenn nun heftige Gewalten den Charniermechanismus des Sprunggelenkes zu stören suchen, so können sie zunächst auf die Bänder wirken. Diese Bänder aber sind sehr fest und widerstandsfähig, und es geschieht daher auch hier das, was wir schon an anderen Körperstellen gesehen haben, sie halten selbst Stand und reissen lieber die ihnen zum Ursprung dienenden Knochenfortsätze ab, sie erzeugen Rissbrüche (Fractures par arrachement). Wirken die Gewalten aber auf den Talus selbst, so kann dieser nur dann aussergewöhnliche Bewegungen machen, wenn er entweder die Gelenkverbindung zwischen Tibia und Fibula

trennt, also eine Diastase derselben erzeugt, oder wenn er die Knöchel abknickt oder abquetscht (Fracture par divulsion.) In den meisten Fällen von Knöchelbrüchen combiniren sich diese verschiedenen reissenden, brechenden und knickenden Gewalten.

Man ist schon in früher Zeit bemüht gewesen, den Mechanismus der Knöchelbrüche klarzulegen. *Richerand, Boyer*, *Dupuytren*, *Maisonneuve, Bonnet* und in neuerer Zeit *Tillaux* und *Hönigschmied* haben einschlägige Versuche an Leichen gemacht, und verdanken wir denselben eine ziemlich klare Einsicht in die durchaus nicht so einfachen Verhältnisse der Brüche.

Am Lebenden entstehen die Brüche wie gesagt auf dreierlei Weise. Einmal durch eine forcirte Adduction oder Supination oder Tibialflexion des Fusses, zweitens durch eine forcirte Abduction oder Pronation oder Fibularflexion des Fusses und drittens durch eine gewaltsame Drehung der Fussspitze nach ein- und auswärts. Demgemäss können wir auch recht wohl Adductions- oder Supinationsfracturen, Abductions- oder Pronationsfracturen, und schliesslich, wenn wir es so nennen wollen, In- und Eversionsfracturen unterscheiden.


I. Adductions- oder Supinationsfracturen der Malleolen.

Die eigentlich im Talotarsalgelenk sich vollziehende Supination wird auf das Sprunggelenk fortgeleitet, wenn der Körper bei fixirtem Fuss nach der Seite der Tibia fällt oder wenn bei einem Fehltritt der Fuss stark nach innen umkippt oder endlich, wenn bei fixirtem Unterschenkel eine Gewalt den inneren Fussrand übermässig hebt, den äusseren dagegen senkt.

In solchen Fällen kommt die äussere Kante des Talus gegen den Malleolus externus zu liegen, zugleich aber werden die Lig. talofibularia und das Lig. calcaneofibulare stark gespannt. Es kann nun wohl gelegentlich, wie dies *Boyer* und *Dupuytren* lehrten, der Malleolus externus über dem Hypomochlion der Taluskante, also etwa in der Höhe der Gelenklinie abgebrochen werden, in der Regel aber entstehen andere Verletzungen. Es zerreissen nämlich die obengenannten Seitenbänder selbst, oder sie reissen noch häufiger die Spitze des Malleolus externus quer oder leicht schräg ab (Fig. 372). Dieser Bruch aber, also ein wahrer Rissbruch, sitzt meistens etwa 1 cm über der

Spitze des Malleolus externus, ist gewöhnlich subperiostal und geht auch bei vollständiger Zerstörung des Periostes fast nie mit Dislocation einher. Besteht eine solche, so stellt sich der Fuss in Varusstellung.

Fig. 372.



Gleichzeitig mit dem Malleolus externus kann auch noch der Malleolus internus quer, und zwar vollständig oder unvollständig, durch den Druck des schräg gestellten Talus abgeknickt werden.

Die **Symptome** dieser Supinationsbrüche sind wenig ausgesprochen, so dass die Verletzung meist für eine einfache Distorsion gehalten wird.

Ist die Fractur des Malleolus externus subperiostal, so tritt am meisten hervor der fixe Bruchschmerz in der bezeichneten Höhe des Knöchels, während man abnorme Beweglichkeit kaum fühlen kann, wenn man die abgebrochene Spitze mit dem Finger einwärts zu drängen sucht. Crepitation fehlt meistens, dagegen ist stets ein Bluterguss im Gelenk vorhanden. Die Patienten vermögen meist noch zu gehen.

Leichter ist der Bruch zu erkennen, wenn das Periost vollständig zerrissen ist. Wenn man dann den Fuss etwas um seine sagittale Achse nach innen dreht, so sieht und fühlt man bei nicht zu starker Schwellung über dem äusseren Knöchel die scharfen Bruchkanten und zwischen diesen eine quer verlaufende, rinnenartige Vertiefung. Ausserdem sind dann auch stets Crepitation und abnorme Beweglichkeit nachzuweisen.

Zur Erläuterung des Gesagten ist es wohl zweckmässig, kurz einige klinische Fälle anzuführen. Wir wählen dazu zwei Beobachtungen *Heyfelder*'s. Der erste Fall betraf eine 40jährige Frau, welche beim Herabsteigen von einer Treppe ihren Fuss nach innen umknickte. Eine auffällige Deformität war nicht zugegen, wohl aber eine Anschwellung entsprechend dem äusseren Knöchel und Schmerz $1^1/_2$ Centimeter über dem unteren Ende desselben, der

längere Zeit hier fixirt blieb. An derselben Stelle war eine Querfurche bemerkbar und dumpfe Crepitation zu fühlen. — Der zweite Fall ereignete sich bei einer 26jährigen Dame, welche die Umknickung des Fusses nach innen beim Schlittschuhlaufen erlitt. Hier fand sich unter dem unteren Rand des äusseren Knöchels eine starke Geschwulst und bei Berührung heftiger Schmerz, welcher auf eine bestimmte Stelle beschränkt blieb. Eine Querfurche war bald zu fühlen. Crepitation aber selbst bei Rotation des Fusses nicht nachweisbar.


2. Abductions- oder Pronationsfracturen, In- und Eversionsfracturen der Malleolen.

Die **Abductions-** oder **Pronationsfracturen** sind die häufigsten der Knöchelbrüche. Sie entstehen durch das Umkippen des Fusses nach aussen, wie es ja auf so zahlreichen Wegen zu Stande kommen kann, und enden in der Hauptsache mit einem Bruche der Fibula. Ihr Mechanismus ist folgender.

Bei der Abduction oder Pronation oder Fibularflexion des Fusses spannt sich zunächst das innere Seitenband, das Lig. deltoides, und zwar hauptsächlich in seinem mittleren Antheil, dem Lig. calcaneo-tibiale. Wird nun die Pronation übertrieben, so reisst entweder dieses starke Band durch, oder es reisst ungleich viel häufiger seine Ursprungsstelle, den Malleolus internus ab. Damit findet aber die Gewalt einen mächtigen Widerstand in der Weise, dass sich jetzt die Spitze des Malleolus externus gegen die äussere Seite des Calcaneus anzustemmen vermag. Es kann damit die Gewalt erschöpft sein, und es kommt nur zu einer Zermalmung der Malleolenspitze *(Hönigschmied)*. In der Regel aber wirkt die Gewalt jetzt erst recht weiter und drängt, das Anstemmen der Malleolenspitze gegen den Calcaneus als Unterstützungspunkt benützend, die Tibia nach innen. Damit wird aber die ganze Körperlast auf die Fibula übertragen und diese dadurch dort gebrochen, wo sie am dünnsten ist d. h. 5—6 Centimeter oberhalb ihrer Knöchelspitze. So endet also die gewaltsame Abduction in der Regel mit dem Bruch der Fibula, der hier wohl ebenso typisch mit seinem leicht schrägen Verlaufe ist, wie die Fractura radii loco classico. (Tafel XXIX).

Aber auch die **In- und Eversionsfracturen** erzeugen im Wesentlichen Brüche der Fibula. Wird der Fuss gewaltsam nach einwärts um eine verticale, durch den verlängert gedachten

Taf. 29.



Hoffa, Lehrbuch der Fracturen u. Luxationen.

Unterschenkel ziehende Achse gedreht, so zerreissen meistens die Bänder im *Chopart*'schen Gelenk, oder es kommt zu einer Ruptur des Lig. talofibulare ant. Es kann aber auch eine Fractur des Malleolus externus oberhalb oder unterhalb dieses letzteren Bandes entstehen, und schliesslich kann es zu einer vollständigen Torsionsfractur beider Unterschenkelknochen kommen. Die Entstehungsart dieser Verletzungen ist die, dass sich der vordere Rand der inneren Gelenkfläche des Talus gegen den inneren Knöchel anlegt, und dass über diesem als Hypomochlion die Absprengung des äussern Knöchels von der hintern Seite erfolgt. Ein solcher Mechanismus findet sich im Ganzen selten am Lebenden.

Ungleich häufiger erfolgt bei demselben eine gewaltsame Auswärtsdrehung der Fussspitze. So z. B. dann, wenn der Körper nach vorn und innen fällt, während der Fuss zwischen zwei festen Punkten eingeklemmt ist — auf diese Weise erlitt der berühmte *A. Cooper* selbst einen Fibularbruch, indem er mit dem Fuss zwischen Eisstücken stecken blieb — oder, wenn der Fuss bei einem Fehltritt auf seinen inneren Rand nach aussen und hinten weicht, während der Unterschenkel durch das Körpergewicht fixirt oder in umgekehrter Richtung fortgezogen wird, oder wenn ein Pferd den Reiter abwirft und ihn, im Steigbügel hängend, nachschleift oder noch im Sattel an einen Baum oder eine Mauer drängt, so dass die nach aussen stehende Fussspitze gewaltsam nach hinten gedrückt wird.

Was geschieht nun bei einer solchen forcirten Auswärtsdrehung des Fusses? Wir können keine bessere Auskunft hierüber verlangen, als folgende uns von *Maisonneuve* zuerst gegebene und später von *Hönigschmied* bestätigte Schilderung des Vorganges. Im Moment der Auswärtsdrehung stellt der Fuss, da seine Biegsamkeit durch die Fixation der Tarsalgelenke verschwunden ist, einen Hebel dar, der zu den Knöcheln, die er auseinander zu treiben sucht, senkrecht steht. Der Malleolus internus wird dann beim Fortschreiten der abnormen Bewegung durch die innere Fläche des Talus von hinten nach vorn und von aussen nach innen gedrückt, während die äussere Fläche des Talus den Malleolus externus von innen und vorn nach aussen und hinten treibt. Der weitere Verlauf der Verletzung hängt nun von dem Verhalten der Lig. tibio-fibularia ab. Halten dieselben Stand, so drückt die äussere Fläche des Talus den Malleolus externus ab. Diese Fractur beginnt dann zuerst mit dem Losreissen

eines dreieckigen Stückes vom untern Ende der Tibia, entsprechend der Insertion des Lig. tibio-fibulare ant., durchsetzt die Fibula schräg von vorn unten und innen nach oben und aussen, und wendet sich schliesslich nach hinten und innen, um hier in eine scharf. Spitze auszulaufen (Fig. 373) (*Hönigschmied*). Das abgelöste Stück der Tibia kann aber mitsammt dem oberen Bruchstück der Fibula nach innen und unten dislocirt werden, so dass die Bruchfläche der Fibula auf die obere Fläche des Talus zu stehen kommt (*A. Cooper*) (Fig. 374).

Fig. 373.




Fig. 374.



Zerreissen dagegen die Lig. tibio-fibularia, so drängt der Talus die Tibia und Fibula auseinander, und die noch fortwirkende Gewalt erzeugt einen Bruch der letzteren, wieder dort, wo sie am dünnsten ist, 5—6 cm über ihrem unteren Ende, gelegentlich aber wohl auch noch höher oben gegen ihre Mitte (Fracture par diastase). Wie *v. Volkmann* bemerkt, kommt es auch hier manchmal statt zur Diastase zum Abreissen einer dreieckigen Spange aus dem unteren Ende der Tibia. Besteht aber die Diastase, so verschiebt sich der Talus meist gegen das Spatium interosseum hin, so dass gewissermassen eine Luxation des Fusses nach oben entsteht.

Nach dem Gesagten werden die

Symptome der eben besprochenen Fracturen vielfach wechseln können. Ein charakteristisches Bild lässt sich nur für die typischen, durch Abduction oder Auswärtsdrehung entstandenen Fibularbrüche geben. Ehe wir dieses Bild zeichnen, wollen wir nochmals darauf hinweisen, dass die richtige Diagnose auch der weniger hervortretenden Knöchelbrüche nur durch eine genaue Untersuchung zu stellen ist, und dass man in allen irgendwie zweifelhaften Fällen die Narcose zu Hülfe nehmen muss. Dann aber wird man die Verletzung meist erkennen, selbst wenn man anfangs nur den fixen Schmerz, die gestörte Function, die locale Schwellung, eine beschränkte Ecchymose vorfand, indem es in der Narcose stets möglich wird, die Vorsprünge der Bruchkanten, die Vertiefung durch ihre Diastase, Crepitation und abnorme Beweglichkeit zu entdecken.

Den Gang der Untersuchung in einem vorliegenden Fall wollen wir an dem typischen Abductions-Fibularbruch erläutern. (Tafel XXIX).

Nachdem man sich durch die Aufnahme der Anamnese über den Hergang der Verletzung unterrichtet und die subjektiven Beschwerden des Kranken, seine Schmerzempfindung und die Gebrauchsstörung seines Gliedes ermittelt hat, legt man denselben auf eine horizontale Unterlage, weil man auf dieser am bequemsten jede Abweichung von den normalen Verhältnissen erkennen und den kranken Fuss am besten mit dem gesunden vergleichen kann. Das geschieht zunächst durch die Inspection. Dieselbe ergiebt bei der Abductionsfractur sofort eine charakteristische Deformität. Der Fuss steht nämlich, da er durch die verletzende Gewalt in Abductionsstellung getrieben wurde, auch nach Aufhören der Gewalt, abducirt und pronirt, indem er durch die elastische Retraction der Peronealmuskeln in dieser Stellung fixirt wird. Er hat also eine Art Plattfuss- oder Valgusstellung angenommen. Zuweilen steht er dabei gleichzeitig auch etwas nach hinten, wohin ihn nach Zerreissung des inneren Seitenbandes die Wadenmuskulatur dislocirt. Durch die Abductionsstellung des Fusses aber wird der Malleolus externus nach aussen dislocirt, und es erscheint daher der ganze Fuss wie nach aussen abgeknickt. Den Grad dieser Abweichung erkennt man am besten dadurch, dass man durch die Mitte des Unterschenkels die Längsachse zieht. Während diese an der un-

verletzten Seite durch die zweite Zehe hindurch geht, fällt sie an der Seite der Fractur mehr weniger nach einwärts vom inneren Fussrand (Fig. 375). Zuweilen ist die Abweichung des Fusses nur an seiner Spitze als Auswärtsdrehung zu erkennen, während die Ferse ihre gewöhnliche Richtung beibehalten hat.

Fig. 375.





Fig. 376.



Ausser dieser zunächst in die Augen fallenden Dislocation des Fusses ergiebt die Inspection aber noch andere abnorme Erscheinungen, die ebenfalls stets ausgesprochen sind, selbst wenn sich sofort eine stärkere Anschwellung ausgebildet hat. Der innere Knöchel springt nämlich unter der Haut hervor, besonders mit seinem vorderen Rande. Die beiden Knöchel stehen weiter als auf der gesunden Seite auseinander. Oberhalb des äusseren Knöchels befindet sich eine Vertiefung in

Gestalt eines einwärts gerichteten Winkels, eine Einbiegung, der *Dupuytren* den wenig passenden Namen Coup de hâche, Axthieb gegeben hat. Diese Deformität, anfangs zuweilen unbedeutend, nimmt, sich selbst überlassen, immer mehr zu und erreicht den höchsten Grad, wenn der Kranke auf dem fracturirten Bein zu gehen versucht. Alsdann kann es soweit kommen, dass die Tibia mit ihrer Bruchfläche den Boden berührt und dabei die entgegenstehenden Weichtheile von innen nach aussen durchbohrt (Fig. 376).

Durch die Inspection wird man schliesslich an der Verfärbung der Haut auch noch die Sugillationen und Ecchymosen in Folge des Blutergusses an der Fracturstelle erkennen. Diese Sugillationen sind besonders wichtig, wenn die Deformität des Fusses nicht so stark ausgeprägt ist. Die einfache Distorsion setzt ja auch ein Blutextravasat, dasselbe stammt aber aus dem gefässarmen Bandapparat und kann daher niemals sehr bedeutend werden. Wohl aber kann dies der Fall sein bei dem aus den zerrissenen Knochengefässen stammenden Blutextravasat einer Fractur. Findet man also bei einer sogenannten „Fussverstauchung" grössere Blutergüsse an beiden Knöcheln, so kann man schon hieraus mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Fractur annehmen.

Nach der Inspection geht man über zur Palpation. Um sich zunächst eine muthmassliche Vorstellung über den Sitz weniger dislocirter Fracturen zu verschaffen, ist es zweckmässig, zuerst die bestehende Deformität noch etwas zu steigern. Man ruft dann an der Bruchstelle sofort heftigen Schmerz hervor, und zwar ist dieser Schmerz im Gegensatz zu dem mehr diffusen der Distorsion ein streng localisirter. Charakteristisch ist auch der Schmerz, der bei sog. indirecter Palpation oder, wie sich *Rotter* ausdrückt, bei Druck in der Continuität des Unterschenkels an der Bruchstelle entsteht. Uebt man nämlich mit den flach umgelegten Händen etwa in der Mitte des Unterschenkels einen Druck in der Weise aus, als ob man Tibia und Fibula gegeneinander drängen wolle, so klagt der Patient sofort über einen lebhaften Schmerz an der Bruchstelle, indem der Druck, der oben auf die Fibula ausgeübt wird, sich bis zur Bruchstelle fortpflanzt. Auch durch stärkere Dorsalflexion des Fusses wird der Schmerz in der Regel gesteigert, indem bei derselben die breitere vordere Fläche des Talus zwischen die Knöchel zu stehen kommt und dieselben daher auseinanderzudrängen vermag (*Hueter*). Ein weiterer Kunstgriff, der die Malleolarfractur sofort erkennen lässt, ist das kräftige

Gegeneinanderdrücken der beiden Knöchel. Der Fuss wird dadurch unter lebhaften Schmerzen in seine normale Lage gebracht und die Diagnose so bei bestehendem Zweifel gesichert. Man geht nun dazu über, das untere Ende des Unterschenkels abzutasten. Zu dem Zweck gleitet man mit den Fingern von den Spitzen der Malleolen ab an der Tibia und Fibula in die Höhe. Man kommt dann auf die Bruchflächen und kann besonders an der Fibula den spitzigen Vorsprung des oberen Fragmentes fühlen. Auch wird man zwischen den Bruchstücken eine rinnenartige Vertiefung oder Furche erkennen und diese durch Auswärtsdrehen der Fussspitze vergrössern, durch die entgegengesetzte Bewegung aber verkleinern können. Bei solchen Versuchen wird man meist auch Crepitation und abnorme Beweglichkeit wahrnehmen. Zum Nachweis dieser letzteren Zeichen kann man auch in der Art vorgehen, dass man durch Druck mit dem Finger auf die Spitze des Knöchels eine Art Schaukelbewegung erzeugt und damit das obere Ende des unteren Fragmentes zum Hervortreten zwingt. Dieser sehr zweckmässige, schon von *Nélaton* empfohlene Handgriff setzt aber voraus, dass das untere Fragment nicht zu lang ist.

Wollen wir noch ein Wort sagen über die Diagnose dieser Brüche, so ist dieselbe wohl stets zu stellen, wenn man sorgfältig alle Symptome aufzufinden und dieselben in Einklang mit dem bekannten Hergang der Verletzung zu bringen sucht. Bei stärkerer Schwellung nimmt man die Narcose zu Hülfe und massirt in derselben die Blutextravasate weg, so dass man die Palpation der Knochen vornehmen kann. Ist man zweifelhaft, so behandelt man die Verletzung wie eine Fractur, da man dem Patienten sonst ernstlich schaden kann.

Wir wollen hier noch erwähnen, dass nach *Le Fort* durch forcirte Ein- und Auswärtsdrehung des Fusses das Lig. tibiofibulare anticum angespannt werden und daraus eine Abreissung einer verticalen Knochenlamelle am vorderen Rande des Malleolus externus resultiren kann.

Die Diagnose gründete *Le Fort* auf einen streng begrenzten, dem vorderen Rande des Malleolus externus entsprechenden Bruchschmerz, wie er am besten durch Druck mittelst des stumpfen Endes eines Bleistiftes hervorgerufen werden kann. Dazu kommen dann noch Ecchymosen, die im Gegensatz zu den Abreissungsfracturen des unteren Endes des Malleolus nur wenig ausgedehnt sind.

Die **Prognose aller Knöchelbrüche** ist wesentlich von der Behandlung abhängig. Ist die Behandlung eine richtige, so kann sich, selbst bei schweren Fracturen älterer Leute, die volle Gebrauchsfähigkeit des Fusses im Laufe der Zeit wieder einstellen. Von den 40 Unfallspatienten *Haenel's* wurden 28 geheilt; 12 blieben invalide. Von 40 Fällen von *Jottkowitz* wurden 31 völlig geheilt Es handelte sich bei diesen Fällen aber meist um Brüche eines Malleolus. Die Heilungsdauer ist eine ungleich längere, als man bisher immer anzunehmen gewöhnt war. Darüber ist man sich jetzt klar geworden.

Bis leichtere Arbeit verrichtet werden kann, vergehen bei Brüchen ohne erhebliche Dislocation in der Regel etwa 9 Wochen. Die volle Arbeitsfähigkeit wird aber bei Patienten, die sich bei ihrer Arbeit fest auf ihre Füsse stemmen müssen, selten vor Ende

Fig. 377.





Fig. 378.




des 5. Monats erreicht. Für schwerere Fälle schieben sich diese Termine noch viel weiter hinaus. Bis zur Aufnahme leichterer Arbeit kann man da etwa 3—4 Monate rechnen, während die volle Erwerbsfähigkeit noch weitere 3—8 Monate, ja nicht selten noch länger auf sich warten lassen kann.

Die durchschnittliche Erwerbsunfähigkeit bei den dauernd geschädigten Patienten betrug nach *Haenel* 50%. Was die Patienten nach vollendeter Heilung des Knochenbruches an sich auch bei richtiger Stellung des Fusses noch so lange belästigt, sind vor allem mehr oder weniger hartnäckige Ödeme und Schmerzen an der Bruchstelle und im Fusse selbst. Diese Schmerzen gleichen ganz den Schmerzen, wie sie dem entzündlichen, contracten Plattfuss eigenthümlich sind, und sind unzweifelhaft eine Folge der Muskelatrophie der Fussmuskeln. Je kräftiger diese durch die Massage und Gymnastik werden, desto mehr verlieren sich auch diese Schmerzen.

Sehr erheblich werden die Beschwerden der Patienten, wenn die Heilung mit Dislocation der Fragmente erfolgte. Objectiv findet man dann eine Auftreibung der Knöchel, Steifigkeit der Gelenke, sowie Muskelatrophie und bei den typischen Pronationsbrüchen, eine starke Valgusstellung des Fusses.

Diese Valgusstellung äussert sich im Bilde sehr auffällig, wie dies die beistehenden Figuren (377 u. 378) ohne Weiteres erläutern. Der Russabdruck des Fusses kann dabei eine ganz normale Gewölbebildung zeigen. Es ist also nicht sowohl der Pes planus, als der Pes valgus, der die Ursache der Beschwerden ist. Die Betroffenen können überhaupt nur am Stocke gehen und klagen bei jeder stärkeren Anstrengung, beim festen Auftreten im Stehen und Gehen über Schmerzen. Auf unebenem Boden können sie erst recht nicht gehen. Recht erschwert ist auch das Treppensteigen. Ferner klagen die Patienten, dass sie ausser Stande sind, schwere Lasten zu tragen.

Fig. 379.



Selten bleibt die knöcherne Heilung ganz aus. Es kommt dann nur zu einer ligamentösen Vereinigung der Fragmente. Diese Pseudarthrosen geben aber allmählich unter der Körperlast nach, sodass die Deformität des Fusses erst später eintritt. Wieder in anderen Fällen kommt es zu einer Ankylose des Fussgelenkes, indem alle Fragmente durch den Callus mit einander verschmelzen (Fig. 379) oder sich im Anschluss an den intraarticulären Bluterguss eine hyperplasirende Entzündung der Synovialis und

damit eine fibröse Verschmelzung der Gelenkenden heranbildet. Schliesslich entwickeln sich bei disponirten Patienten ziemlich häufig Tuberculosen des Gelenkes, und ebenso kann es bei nicht aseptischen, complicirten Fracturen zur Vereiterung des Gelenkes mit allen üblen Folgen kommen.

Somit liegen also Gründe genug vor, recht vorsichtig in der Behandlung zu sein und auch die anscheinend leichten Verletzungen als schwere zu betrachten und demgemäss zu verfahren.

Die **Therapie** bewirkt zunächst die Reposition der Fragmente. Bei Ausführung der Reposition ist es am wichtigsten, die Verschiebung des Fusses nach aussen zu beseitigen. Es geschieht dies in der Weise, dass ein Gehülfe den Unterschenkel fest fixirt; der Arzt selbst aber fasst zunächst den Fuss, indem er ihn mit der einen Hand von der Ferse her, mit der andern Hand um den Fussrücken angreift; dann zieht er kräftig an und drängt nun den Fuss kräftig nach innen, bis der Knickungswinkel an der Bruchstelle völlig beseitigt ist. Ist die seitliche Verschiebung des Fusses corrigirt, so folgt dann die Correction einer etwaigen Verschiebung des Fusses nach hinten, indem man an dem Unterschenkel einen Zug nach hinten, am Fuss aber einen Zug nach vorne ausführen lässt. Schliesslich kommt die Correctur der Rotatio ad peripheriam an die Reihe. Der Fuss steht dann richtig, wenn er mit dem Unterschenkel einen rechten Winkel bildet, die Fusssohle des liegenden Patienten gerade nach vorn schaut und der Innenrand der grossen Zehe in einer Linie mit dem Innenrand der horizontal stehenden Patella steht. Es gilt übrigens hier bezüglich des Ausgleiches der Rotatio ad peripheriam dasselbe wie bei den Diaphysenfracturen des Unterschenkels, und verweisen wir nochmals ganz besonders auf die betreffende Stelle.


In der normalen Stellung des Fusses bandagirt man nun den Fuss in einer *v. Volkmann*'schen T-Schiene oder irgend einer anderen zweckmässigen Hohlrinne von Blech oder Draht, wenn eine bedeutende Schwellung am Fussgelenk besteht. Man legt dann über den Verband noch eine elastische Binde, um durch die elastische Compression möglichst bald die Resorption des Blutergusses zu erreichen und legt den Fuss dazu noch hoch. Man verbindet also am zweckmässigsten die passende Lagerung mit der Elevation und der elastischen Compression.

Ist die Schwellung von vorneherein geringer und besteht ausserdem auch keine oder nur eine ganz geringe Dislocation, so kann man der elastischen Compression sofort auch noch die Massage hinzufügen, indem man das Glied täglich aus seinem Verbande herausnimmt und es nach der Massage wieder kunstgerecht verbindet.

Man kann die Massage und elastische Compression auch wohl verbinden mit der *Pott*'schen Seitenlage, die *Pott* gerade für diese Fracturen empfohlen hat.

Die bisherige Behandlungsweise war nur eine provisorische. Sie hatte den Zweck, die Schwellung des Gelenkes zu beseitigen. Sie dauert je nach der Schwere des Falles 2—7 Tage. Ist diese Zeit abgelaufen und hat die Schwellung so nachgelassen, dass die Knochen gut durchgefühlt werden können, so folgt jetzt am besten in Narcose die definitive genaue Richtigstellung der Fragmente nach den oben gegebenen Regeln und die Fixation des Fusses in der erstrebten Stellung.

Fig. 380.



In früheren Jahren glaubte man die Heilung am besten dadurch zu erreichen, dass man dem Fuss in den ersten 14 Tagen bis 3 Wochen nicht gleich die Normalstellung gab, sondern dass man ihn während dieser Zeit in der der Deformität entgegengesetzten Stellung verband. Bei den gewöhnlichen Pronationsbrüchen stellte man also den Fuss anfangs immer erst in Varusstellung.

Dupuytren gab zu dem Zwecke einen besonderen Verband an (Fig. 380). Zur Reduction wird bei demselben das kranke Bein im Knie- und Hüftgelenk rechtwinklig gebeugt. Die Contraextension geschieht am Ende des Oberschenkels, die Extension an dem an der Ferse und am Metatarsus umfassten Fuss und zwar zuerst in der Achse des Unterschenkels, dann aber stark nach innen, wobei ein Gehülfe den untern Theil des Unterschenkels nach aussen drückt. Der zur Retention bestimmte Verband besteht nun aus einem langen Kissen, einer starken hölzernen Schiene und zwei Binden. Kissen und Schienen müssen länger sein, als der Unterschenkel. Das Kissen wird auf die innere Seite des Unterschenkels gelegt und in der Gegend über dem Malleolus internus mehrfach zusammengebogen, so dass hier ein Wulst von 8—10 Centi-

meter Dicke entsteht. Auf dieses Kissen legt man die den Unterschenkel weit überragende Schiene und befestigt diese sammt dem Kissen mit einer Binde am Unterschenkel. Durch die zweite Binde wird dann der Fuss in Varusstellung gegen das untere Ende der Schiene befestigt, und nachher der Unterschenkel, im Knie halb gebeugt, auf seine äussere Seite gelegt.

Unseren Erfahrungen nach ist eine solche vorläufige Fixation des Fusses in Varusstellung nicht nothwendig. Wir haben oft den Fehler beobachtet, dass die Collegen Alles gethan zu haben glaubten, wenn sie am Fuss gezogen hatten und ihn dann in Varusstellung brachten. Sie gypsten dann den Fuss ein und dachten nun ihre Schuldigkeit gethan zu haben. Dann heilten die Brüche, und schliesslich bestand doch noch die Abknickung des Fusses über den Malleolen nach aussen. Es ist wichtiger für die spätere Function die Nachaussenverschiebung des Fusses auszugleichen. Hat man dies gethan, dann kann man, wenn man es mit besonders schweren Fällen zu thun hat, den Fuss immerhin noch in Varusstellung bringen, nöthig ist dies aber nicht. Also erst kräftige Extension am Fuss, dann Ausgleichung der seitlichen Verschiebung desselben und dann eventuell Ueberführung desselben in Varusstellung, aber nicht Extension und Ueberführung des Fusses in Varusstellung, ohne die seitliche Verschiebung desselben völlig behoben zu haben!

Das beste Mittel, um den Fuss in seiner richtigen Stellung zu erhalten, ist ein gut angelegter circulärer Gypsverband. Derselbe lässt die Zehen frei, umschliesst die Ferse und reicht bis ans Kniegelenk heran.


Bei Anlegung des Gypsverbandes muss man sehr sorfältig verfahren und die Fragmente zuverlässig coaptiren lassen. Zu dem Zweck wickelt man die Ferse ein, während der extendirende Gehülfe am Metatarsus zieht, und lässt dann an der Ferse halten, während man den Metatarsus vornimmt. Der extendirende Gehülfe wirkt wieder mit seiner Körperschwere, wie wir das bei den Unterschenkelbrüchen gesehen haben, da er so am wenigsten ermüdet. Vielfach empfiehlt es sich, den Gypsverband zuerst am Unterschenkel und am Fuss anzulegen mit Freilassung des Gelenkes und dieses erst zuletzt nach nochmaliger Kontrolle der Bruchstelle einzuschliessen.

Es ist nun dringend anzurathen, dass man den Gypsverband alle 8 Tage wechselt. Einmal, weil zunächst eine Abschwellung

der Theile erfolgt, dann aber weil es wichtig ist, schon frühzeitig mit der Massage sowie activen und passiven Bewegungen zu beginnen. Man nimmt nun den Gypsverband ab, massirt das Gelenk und den Unterschenkel, macht im Fussgelenk vorsichtige Plantar- und Dorsalflexionen und legt dann wieder einen neuen circulären Gypsverband an, der dann wiederum 7–8 Tage liegen bleibt, um dann wieder gewechselt zu werden.

Anstatt des circulären Gypsverbandes kann man natürlich auch eine *Beely*'sche Gypshanfschiene anlegen, deren Form und Anlegung aus der beistehenden Fig. 381 erhellt.

Fig. 381.



Hatte ein leichterer Bruch vorgelegen, bei dem keine Neigung zur Wiederkehr der Dislocation bestand, so kann man nach dem zweiten Gypsverband einen leichteren Schienenverband anlegen, um jetzt leichter massiren zu können. Bei allen schwereren Brüchen empfiehlt sich aber noch ein dritter Gypsverband. Derselbe bleibt dann noch eine Woche liegen, dann aber beginnt man auch hier mit energischer Massage und Gymnastik. Nach jeder Sitzung wird aber der Fuss wieder gut eingeschient, bis etwa 7—8 Wochen vergangen sind und eine absolut feste Consolidation eingetreten ist.

Man hat nun auch bei den Knöchelbrüchen vielfach die ambulante Behandlung empfohlen und den Patienten schon frühzeitig das Gehen im Gypsverband erlaubt. Ich gebe nun ohne Weiteres zu, dass geübte Chirurgen einen solchen Verband regelrecht machen können, möchte aber doch gerade bei den Knöchelbrüchen die in

der Praxis stehenden Collegen vor einem solchen Vorgehen warnen. Die Gefahr, dass durch die Belastung des Beines der Verband nachgiebt und die Valgusstellung des Fusses an der Fracturstelle wiedereintritt. ist doch eine zu grosse. Ich rathe mit *v. Burckhardt*, die Patienten nicht vor Ablauf der 7. Woche auf den Fuss auftreten zu lassen. Je älter die Patienten sind und je platter der Fuss schon von Natur aus ist, desto vorsichtiger muss man mit der Gestattung des Gehenlassens sein. Die Patienten brauchen deshalb aber doch nicht im Bett zu liegen, können vielmehr an Krücken ganz gut schon früher umhergehen. Dabei erhöht man zweckmässig die Sohle des gesunden Fusses.

Recht vorsichtig muss man bei den ersten Gehversuchen sein, dieselben sind ganz allmählich zu betreiben. Ebenso ist auch das Herunterhängenlassen der Beine beim Sitzen nur allmählich zu erlauben.


Die Quintessenz der ganzen geschilderten Behandlungsweise ist die exacte Reposition der Fragmente nach erreichter Abschwellung des Gelenkes und die Combination nachheriger exacter Fixation mit möglichst frühzeitiger und länger fortgesetzter Massage und Gymnastik. Wer sich genau an die gegebenen Vorschriften hält, wird keine Misserfolge erleben. Er wird namentlich stets eine Heilung ohne Dislocation erreichen, und das ist die Hauptsache. Von Wichtigkeit ist noch die längere Zeit fortgesetzte Massage- und Gymnastik-Behandlung, um die Muskeln recht zu kräftigen. Namentlich die Muskeln an der Innenseite des Unterschenkels und die Wadenmuskeln bedürfen einer sorgfältigen Regeneration.

Die bisher geschilderte Behandlungsweise halten wir für weitaus die beste und einfachste. Der Vollständigkeit wegen müssen wir auch der Methode gedenken, die eine permanente Distraction des Fusses zu erreichen strebt. *Hansmann* hat zu diesem Zweck eine Vorrichtung beschrieben, welche relativ bequem anzuordnen ist. Diesen *Hansmann*'schen Apparat, mit dem der Fuss in jeder beliebigen Stellung, also sowohl in Pro- wie Supination kräftig extendirt werden kann, haben wir umstehend abgebildet (Fig. 382). Die Kraft greift an einem Brettchen an, das mittelst Heftpflaster an der Fusssohle befestigt wird und zu beiden Seiten Häkchen zum Einhaken von Ketten trägt. Der Unterschenkel kommt in eine viereckige mit Fussbrett versehene hölzerne Schiene, wird an dieser mit Binden fixirt und nun die Extension mittelst Ketten ausgeführt, die in der aus der Figur

ersichtlichen Weise an die vorhergenannten Häkchen angehängt und an der hölzernen Schiene festgeschraubt werden.

Ist die Heilung in schlechter Stellung des Fusses erfolgt, so gelingt es bei jugendlichen Individuen mit grosser Willenskraft des öfteren durch gut gearbeitete Schienenhülsenapparate allmählich eine Redression zu erreichen und den Fuss wieder völlig funktionsfähig zu machen.

Fig. 382.



Solche Schienenhülsenapparate haben sich mir in Combination mit der Massage und Gymnastik auch am besten dann bewährt, wenn sich am unteren Ende des Unterschenkels nach Abbruch des Malleolus externus der Tibia eine Diastase zwischen Tibia und Fibula und damit eine starke Lockerung des Fussgelenkes entwickelt hatte.

Ist einmal die Heilung mit starker Valgusstellung erfolgt und ist es nicht mehr möglich, in der Narkose die Fractur wiederherzustellen, um dann die richtige Stellung des Fusses zu erstreben, so macht man, wenn sich die Patienten darauf einlassen, was bei den Unfallspatienten leider oft nicht der Fall ist, nach dem Vorschlage *Trendelenburg's* am besten die supramalleoläre Osteotomie. Selten wird es nothwendig werden die Resection des Fussgelenkes vorzunehmen.

Luxationen des Talocruralgelenkes.

Wegen der grossen Festigkeit des Talocruralgelenkes, dessen Anatomie wir bereits kennen gelernt haben, sind Luxationen desselben ausserordentlich selten. Sie betragen nach der Statistik von *Krönlein* kaum $^1/_2{}^0/_0$ aller Verrenkungen. Nach der

Richtung, in welcher der Talus gegen die Tibia und Fibula verschoben wird, unterscheidet man

1. Luxationen des Fusses nach vorn 2. Luxationen des Fusses nach hinten	in sagittaler Richtung.
3. Luxationen des Fusses nach aussen 4. Luxationen des Fusses nach innen	in seitlicher Richtung.

Alle diese Luxationen können vollständige oder unvollständige sein. Die letzteren sind nach *Hueter* die häufigeren.

A. Luxationen des Fusses in sagittaler Richtung.

I. Luxationen des Fusses nach vorn.

Die seltenen Luxationen des Fusses nach vorn entstehen durch eine gewaltsame Dorsalflexion des Fusses *(Henke)*. Drückt man die Fussspitze gegen den Unterschenkel oder diesen letzteren gegen die fixirte Fussspitze, so findet diese Bewegung bald ihre Hemmung in der Spannung der Achillessehne und der Seitenbänder des Fussgelenkes. Wendet man nun grosse Kraft an, so können diese hemmenden Elemente einreissen. Dann aber stemmt sich der vordere Rand der Tibia in die kleine Knochengrube am vorderen Rande der Talusrolle ein, und es bildet sich hier ein Hypomochlion, über dem die Gelenkflächen der Tibia und des Talus hinten von einander abgehebelt werden. Die Tibia stemmt sich gegen die hintere Kapselwand an, spannt diese zuerst aufs äusserste an, zerreisst sie dann, und nunmehr gleiten Tibia und Fibula nach hinten über die Talusrolle hinweg und werden hinter dieser fixiert, sobald der Fuss durch die naturgemäss jetzt folgende Plantarflexion wieder in die rechtwinklige Stellung geführt wird. Somit ist der Fuss nach vorn luxirt. Es kann dabei im Moment der Luxation, wenn auch selten, zu begleitenden Fracturen kommen. Die Fibula ist gewöhnlich intact, dagegen wurde die Tibia an ihrem vorderen Rande oder an der Knöchelspitze abgebrochen gefunden, *Hönigschmied* sah diese letztere Fractur auch meist bei seinen Leichenversuchen eintreten, indem die Seitenwand des Talus den Malleolus internus abknickte. Seltener erfolgt ein Rissbruch des Malleolus externus durch Zug des Lig. talofibulare posticum. Auf dem Knorpel der Talusrolle finden sich zuweilen


Furchen, welche der sich hier aufstemmende vordere Rand der Tibia erzeugt.

Bei der unvollständigen Luxation berührt der vordere Rand der Tibia noch den inneren Theil der Talusrolle, bei der vollständigen ist die Tibia ganz ausser Contact mit der letzteren. Die Gelenkflächen stehen sich also bei der unvollständigen Luxation noch gegenüber. Sie sind von einander getrennt durch das ergossene Blut und durch die zwischen sie gelagerten Weichtheile.

Nicht selten ist die Luxation mit Hautverletzung complicirt, sei es, dass die Tibia die Haut durchstösst oder dass die letztere nachträglich durch den übermässigen Druck gangränös wird.

Die **Symptome** der **vollständigen** Luxation sind sehr charakteristisch (Fig. 383). Der ganze Fuss erscheint dem Auge

Fig. 383.



verlängert. Der Fersenvorsprung ist verschwunden. Die Achillessehne zieht in senkrechter Linie nach aufwärts. Zu ihren beiden Seiten fühlt man die Knöchel, die

der Fusssohle genähert sind, da ja die Gabel des Unterschenkels auf dem niedrigen hinteren Fersenfortsatze aufruht. Vorn ragt die Talusrolle heraus. Man kann ihre Gelenkfläche durch die stark gespannten Weichtheile mehr oder weniger deutlich vor der Tibia hindurchfühlen Der Fuss kann in leichter Dorsalflexion fixirt sein, ist aber auch ebenso oft plantarwärts flectirt, indem er seiner eigenen Schwere folgt.

Ist die Luxation eine **unvollständige**, so sind die Symptome weniger deutlich ausgesprochen, besonders, wenn bereits eine erhebliche Schwellung eingetreten ist. Dann ist wohl eine Verwechslung der Luxation mit einer Fractura supramalleolaris denkbar, bei der die beiden oberen Fragmente nach hinten getreten sind. In solchem Falle wird die genaue Untersuchung in der Narcose die Zweifel lösen, indem in dieser sicher nachweisbar sein wird, dass die Malleolen bei der Fractur mit dem Fuss nach vorn, bei der Luxation aber mit dem Unterschenkel nach hinten gerückt sind. Natürlich spricht auch der Mangel des fixen Bruchschmerzes und der Crepitation für das Vorhandensein einer Luxation.

Die **Prognose** der nicht eingerichteten Luxation ist nicht zu ungünstig zu stellen. Anfangs bestehen zwar heftige Schmerzen bei Gehversuchen, später aber giebt der dorsalflectirte Fuss doch eine Stütze ab, so dass die Patienten mit ihrem Hackenfuss sich leidlich fortbewegen können. Bei eingerichteter Luxation könnten die gleichzeitigen Fracturen eine Steifigkeit des Gelenkes hervorrufen, falls sie nicht berücksichtigt würden.

Die **Therapie** bewirkt die Einrichtung leicht, indem man die Tibia auf demselben Wege zurückführt, auf dem sie luxirte. Zu dem Zweck macht man zunächst eine starke Dorsalflexion und drückt dann das untere Ende der Tibia nach vorn, während man den Fuss gleichzeitig nach hinten und unten schiebt. Eine Schlussplantarflexion vollendet dann die Reposition. *C. Hueter* hat auf diese Weise die Luxation noch nach $^1/_2$jährigem Bestehen reponirt.

In ganz frischen Fällen von Subluxation genügt zuweilen schon das einfache Anziehen des Fusses nach hinten, des Unterschenkels nach vorn zur völligen Einrichtung. Nach derselben wird das Gelenk für 2—3 Wochen in einem Contentivverband

festgestellt und später vorsichtig mit passiven Bewegungen begonnen und massirt.

Bei complicirter Luxation könnte man etwaige der Reposition im Wege stehende Knochentheile reseciren *(Roser-Krause)*.

2. Luxationen des Fusses nach hinten.

Die Luxationen des Fusses nach hinten kommen etwas häufiger vor als die nach vorn. Sie entstehen stets in der Weise, dass bei einem Fall die Körperschwere den Unterschenkel nach hinten reisst, während der Fuss am Boden fixirt ist oder auf eine nach vorn abschüssige Ebene auffällt. Dadurch kommt der Fuss in eine forcirte Plantarflexion. Es bildet sich durch das Anstemmen des hinteren Randes der Tibia an dem hintern Rand der Talusrolle ein Hypomochlion, die fortwirkende Gewalt zerreisst über diesem die Seitenbänder, das Gelenk kommt vorn zum Klaffen, die Tibia sprengt die vordere Kapselwand und gleitet nun über die glatte Fläche der Talusrolle nach vorn. Damit ist aber die Luxation des Fusses nach hinten gegeben.

Fixirt wird diese falsche Stellung dann wiederum dadurch, dass der Fuss durch eine secundäre Bewegung seine rechtwinklige Lage zum Unterschenkel einzunehmen sucht.

Im Moment der Luxation kommt es zu ausgedehnten Bänderzerreissungen. *Hönigschmied* sah bei seinen Versuchen Zerstörung der Lig. talofibularia, des Lig. calcaneo-fibulare und des Lig. deltoideum. In einzelnen Fällen wurden auch der Malleolus externus oder beide Knöchel abgerissen.

In der Mehrzahl der Fälle ist dann weiterhin noch die Fibula im unteren Drittel gebrochen. Das obere Bruchende folgt der Tibia nach vorn, das untere dem Talus nach hinten. Auch hier ist die Luxation öfters eine complicirte.


Die **Symptome** sind äusserst deutlich ausgeprägt (Fig. 384). Der vordere Theil des Fusses ist verkürzt, der Fersentheil um ebensoviel verlängert. Vorn springt auf dem Fussrücken die Tibia hervor. Ihre scharfrandige Gelenkfläche lässt sich unter der in einer gespannten Falte herüberziehenden Haut zum Theil durchfühlen und zwar um so mehr, je tiefer die Fussspitze steht. An mageren Füssen sieht man die Strecksehnen als gespannte Stränge über den Fussrücken verlaufen. Die Achillessehne zieht in einem stärkeren, nach hinten concaven Bogen zum Fersenhöcker.

Zwischen ihr und den Unterschenkelknochen besteht eine tiefe Rinne.

Für die unvollständige Luxation gilt dasselbe wie bei der Luxation nach vorn, hier ist aber kaum eine Verwechslung mit einer Fractur möglich. Nur ein starker Bluterguss und eine frische reactive Schwellung könnten die eben gezeichneten Contouren etwas verwischen.

Die **Prognose** ist insofern schlechter als bei der Luxation nach vorn, als der Gebrauch des Fusses bei nicht geschehener Ein-

Fig. 384.



richtung sehr beeinträchtigt ist, indem er in Spitzfussstellung verbleibt. *Vidal* beobachtete eine grosse Neigung der eingerichteten Luxation zu Recidiven, wie er glaubt, in Folge des Zuges von Seiten der Wadenmuskeln.

Die **Therapie** vollzieht die Einrichtung durch forcirte Plantarflexion, Zug am Fuss nach vorn bei gleichzeitigem Druck gegen das untere Ende des Unterschenkels nach hinten und Schlussdorsalflexion.

Die Nachbehandlung gleicht der bei der Luxation des Fusses nach vorn.

B. Luxationen des Fusses in seitlicher Richtung.

Die Luxationen des Fusses in seitlicher Richtung können, wie wir bei den Knöchelbrüchen schon gesehen haben, nicht ohne diese letzteren vorkommen, weil der Talus durch dieselben in seiner Lage fixirt ist. Wir haben auch schon hervorgehoben, dass der Mechanismus der Knöchelbrüche, dieser ja auch Verrenkungsbrüche genannnten Verletzungen, identisch ist mit denen der Luxationen, indem diese letzteren nur durch eine Fortwirkung der als forcirte Ab- oder Adduction statthabenden Gewalt entstehen und gewissermassen einen höheren Grad der Fracturen darstellen.

Die Luxationen des Fusses nach aussen oder innen zeichnen sich demgemäss vor den durch Ab- oder Adduction entstehenden Knöchelbrüchen nur durch ihre äussere Erscheinung aus. Die pathologische Anatomie beider Verletzungen ist die gleiche, nur dass bei der Luxation eine stärkere Dislocation der gebrochenen Knochen stattgefunden hat.

I. Luxationen des Fusses nach aussen.

Diese häufigste Luxation des Fussgelenkes entsteht durch eine gewaltsame Abduction des Fusses. Durch dieselbe zerbricht die Fibula, werden die inneren Seitenbänder zerrissen oder reissen diese den Malleolus internus in der früher beschriebenen Weise ab, und wird dann der Fuss durch das Gewicht des Körpers, sei es bei einem Versuch des Patienten aufzutreten oder beim Hinfallen desselben, wobei das gebrochene Glied unter den Körper zu liegen kommt, nach aussen abgelenkt. Dann dreht sich der Talus um seine sagittale Achse, so dass seine convexe Rolle gegen den Malleolus internus, seine untere Fläche aber mehr oder weniger nach aussen zu stehen kommt. Selten ist er dabei auch gleichzeitig noch in horizontaler Richtung nach aussen hin verschoben.


Das ist die gewöhnliche Form der Luxation. Es kommt aber noch eine Abart derselben vor, bei welcher der Talus sich nicht um seine sagittale Achse gedreht hat, sondern bei der die Drehung um eine verticale Achse erfolgte, so dass der ganze Fuss vollständig nach aussen umgedreht liegt. Diese Abart der äusseren Luxation kann man nach *G. Fischer* recht wohl als Rotations-

luxation des Fusses nach aussen bezeichnen. Sie wurde zuerst von *Huguier*, dann von *Thomas* und *G. Fischer* beschrieben.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen von Luxationen wird sofort klar werden, wenn wir ihre Erscheinungen betrachten.

Die **Symptome der gewöhnlichen äusseren Luxation** mit Drehung des Talus um seine sagittale Achse sind im Grossen und Ganzen die der Abductionsfracturen (Fig. 385). Der Fuss ist nur noch bedeutend mehr abducirt, so dass sein innerer Rand vollständig gesenkt, sein äusserer dagegen fast

Fig, 385.




senkrecht nach oben gerichtet ist, der Fussrücken also nach innen, die Sohle nach aussen schaut. Der Talus ragt mit seinem Kopfe unter dem Malleolus internus hervor, oft so stark, dass er die Haut zu durchbrechen droht oder wirklich durchbricht. Dazu kommen dann noch die uns schon bekannten Zeichen der begleitenden Fracturen der Knöchel, insbesondere der Fibula.

Die **Symptome der Rotationsluxationen** des Fusses nach aussen sind dagegen nach dem Falle *G. Fischer*'s geschildert,

folgende (Fig. 386). Am hervorstechendsten ist die hochgradige Auswärtsdrehung des Fusses. Dieselbe ist so stark, dass der ganze äussere Fussrand auf der Unterlage aufliegt, wenn der Kranke mit gerade nach vorn gerichteter Kniescheibe auf dem Rücken liegt. Der Fuss ist also um etwa 90⁰ um seine verticale Achse gedreht. Der

Fig. 386.



Fuss steht fernerhin in Plantarflexion, während der äussere oder innere Fussrand weder gesenkt noch gehoben ist. Die Achillessehne verläuft sehr gespannt, die Ferse tritt

auffallend hervor, desgleichen der Malleolus internus. Ebenso befindet sich auf der äusseren Seite ein starker Vorsprung, der jedoch nicht vom Malleolus externus herrührt, sondern von der für die Fibula bestimmten Gelenkfläche der Tibia. Erst wenn man mit dem Finger auf die Rückseite des Unterschenkels gleitet, fühlt man den Malleolus externus als harten Körper. Derselbe wird also nach hinten verschoben. Schliesslich fällt bei Seitenlage des Patienten, bei welcher der gesenkte Fuss gerade nach vorn steht, am Unterschenkel sehr deutlich eine schmale Längsfurche auf, welche etwa handbreit unter dem Fibulaköpfchen beginnt und schräg nach unten verläuft, um sich an der Rückfläche des Unterschenkels zu verlieren (Fig. 386). Diese Furche entspricht dem Verlauf des M. peroneus longus, der sich nach *G. Fischer* durch den Reiz des gebrochenen und nach hinten verschobenen Malleolus externus contrahirt.

2. Luxationen des Fusses nach innen.

Wir haben früher gesehen, dass die Adductionsfracturen der Knöchel selten mit Dislocation einhergehen, dass aber, wenn eine solche vorhanden ist, der Fuss eine Adductionsstellung einnimmt. Wenn wir annehmen müssen, dass die Luxation des Fusses nach innen einfach eine stark dislocirte Adductionsfractur ist, so ist es klar, dass die adducirende Gewalt eine recht bedeutende sein muss, um eine innere Luxation zu erzeugen.


In der That beobachtete man dieselbe nur äusserst selten. Die veranlassende Ursache war auch niemals ein einfaches Umkippen des Fusses nach innen, sondern es kam dazu noch ein Fall, bei dem der Fuss unter den Körper zu liegen kam, oder eine starke Einwärtsknickung des Unterschenkels, während der Fuss in adducirter Stellung, z. B. zwischen zwei Balken fixirt wurde. Andere Male waren die Patienten in einem Wagenrad hängen geblieben und geschleift worden.

Nach eingetretener Luxation bietet die Stellung des Fusses das umgekehrte Bild der Luxation nach aussen dar. Die convexe Rolle des Talus schaut gegen den Malleolus externus, seine untere Fläche nach innen. Der innere obere Rand der Rolle stemmt sich auch wohl am inneren Rand der tibialen Gelenkfläche an, wenn der Malleolus internus abgeknickt ist.

Die Luxation ist ausserordentlich häufig durch Weichtheilverletzungen complicirt, indem die gebrochenen Knochen von innen

nach aussen die entgegenstehenden Gewebe perforiren. *Malgaigne* fand unter 22 derartigen Luxationen 19 mit Eröffnung des Gelenkes. Von begleitenden Fracturen waren dabei verzeichnet solche des Talus, der Tibia, der Fibula allein und solche der Tibia und Fibula zusammen. In einem Falle waren Tibia, Talus und Calcaneus gebrochen, die Fibula aber intact.

Fig. 387.



Die **Symptome** der Luxation sind unverkennbar (Fig. 388). Der Fuss hat eine Klumpfussstellung und meistens auch etwas Spitzfussstellung angenommen. Sein innerer Rand ist erhoben, der äussere gesenkt. Die ganze innere Seite erscheint concav, die äussere convex und halbkreisförmig abgerundet. Gegen die Spitze des äusseren Knöchels fühlt man Crepitation, vor dem Malleolus externus einen von dem Talus gebildeten Vorsprung.


Als Beispiel einer uncomplicirten Luxation des Fusses nach innen, bei der auch keine Knöchelbrüche vorhanden gewesen sein sollen, führen wir eine Beobachtung von *Spaeth* an.

Ein 37 Jahre alter Mann blieb beim Abspringen vom Wagen mit dem linken Fuss in den Speichen eines Rades hängen und stürzte im gleichen Moment zu Boden.

Bei der Untersuchung, 2 Stunden nach der Verletzung zeigte es sich, dass der linke Fuss eine Drehung von 90° um seine Längsachse erlitten hatte, so dass er also in extremster Varusstellung, mit seinem innern Rand ganz nach oben, mit dem äussern ganz nach unten stand. Der Malleolus internus ruhte auf der inneren muldenförmigen Fläche des Calcaneus, indess der äussere Knöchel auf der Gelenkfläche des Talus lag. Die Contouren des Talus und Os naviculare sind durch die prall gespannte Haut leicht zu erkennen. Keine Zeichen einer begleitenden Fractur.

Wegen drohender Hautgangrän wurde die Reposition sofort in Narcose vorgenommen. Dieselbe gelang nach Entspannung der Achillessehne durch Beugung im Kniegelenk leicht vermittelst einer gelinden Dorsalflexion und energischen Rotation nach innen. Der Talus schnappte dabei mit einem deutlich fühlbaren Ruck ein. Die Heilung erfolgte mit gut beweglichem Gelenk.

Fig. 388.



Bezüglich der **Prognose** und **Therapie** der seitlichen Fussgelenksluxationen können wir uns kurz fassen. Es gilt hier ganz dasselbe wie von den Knöchelbrüchen, nur muss man, in Anbetracht der grösseren Verletzung die Behandlung, wenn möglich, mit noch grösserer Vorsicht leiten.

Luxationen im Talotarsalgelenk.

Im Talotarsalgelenk, dessen Anatomie und Physiologie uns schon geläufig ist, beobachtet man zwei Arten von Luxationen. Einmal bleibt der Talus in seiner normalen Verbindung mit der Tibia und Fibula, dagegen verschiebt sich der ganze übrige Fuss gegen ihn selbst — Luxatio pedis sub talo, das andere Mal luxirt der Talus allein, indem er sowohl seine Gelenkverbindung mit dem Tarsus als die mit der Tibia und Fibula sprengt — Isolirte Luxation des Talus.

Wir betrachten zuerst die

Luxatio pedis sub talo.

Die Kenntniss der Luxatio pedis sub talo, Luxatio subtalica, Luxation sous-astragalienne (*Broca*) verdanken wir wesentlich den genauen Untersuchungen von *Broca* und *Henke.*

Diese Luxationen sind sehr selten, da sie im Allgemeinen durch die gleiche Uebertreibung der physiologischen Bewegungen des Talotarsalgelenkes entstehen wie die Luxationen des Talocruralgelenkes. Wir haben aber bei diesen letzteren gesehen, dass der Fuss im Moment der Luxation durch Feststellung im Talotarsalgelenke gewissermassen in einen starren Hebel verwandelt wird, der dann seine Kraft an der Gelenkverbindung des Talus mit den Unterschenkelknochen ansetzt.


Nun kommt es gelegentlich vor, dass das Talotarsalgelenk selbst zum ersten Angriffspunkt der Gewalt wird. Dieselbe zerreisst dann den starken Apparatus ligamentosus im Sinus tarsi, hebelt Talus und Calcaneus von einander ab, löst ferner den Taluskopf vom Os naviculare, das ja durch feste Bandmassen und durch das Os cuboides innig mit dem Calcaneus verbunden ist, und gestattet nun dem ganzen Fuss von den Gelenkflächen des Talus herunterzugleiten. Die Richtung, die der Fuss bei dieser Verschiebung erhält, ist eine verschiedene. Im Allgemeinen kann er nach innen, nach aussen, nach hinten und nach vorn vom Talus zu stehen kommen, und demgemäss unterscheidet man auch

1) die Luxatio pedis sub talo nach innen,
2) die Luxatio pedis sub talo nach aussen,
3) die Luxatio pedis sub talo nach hinten,
4) die Luxatio pedis sub talo nach vorn.

I. Luxatio pedis sub talo nach innen.

Die Luxatio pedis sub talo nach innen entsteht sowohl am Lebenden als an der Leiche durch eine forcirte Adduction des Fusses. Den dabei stattfindenden Mechanismus schildern *Henke* und *Lossen* folgendermassen. Hypomochlion der luxirenden Gewalt wird die hintere Ecke des Sustentaculum tali des Calcaneus. Die Gelenkspalten zwischen Talus und Calcaneus kommen zum Klaffen, der Kopf des Talus tritt aus der Pfanne des Os naviculare, das Lig. interosseum im Sinus tarsi zerreisst, und der Talus wird von dem vorwärts stossenden Unterschenkel über den Calcaneus hinweggeschoben. Er kann sich nun gegen den Proc. anterior calcanei anstemmen oder ihn nach vorn überragen oder ganz über die obere Gelenkfacette hinweg nach aussen gleiten.

Fig. 389.



Die **Symptome** dieser Luxation sind wohl ausgesprochen (Fig. 389). Der Fuss steht supinirt und einwärts rotirt, hat also das Aussehen eines Klumpfusses. Die Fusssohle schaut nach innen und ist zuweilen nahezu vertical gerichtet.

Der innere Fussrand erscheint etwas verkürzt und mehr concav, der äussere mehr verlängert (*Mac Cormac*). Der Malleolus externus prominirt stark. Unter ihm fehlt die Resistenz des Calcaneus, der ja nach innen gewichen ist. Der Malleolus internus ist kaum zu fühlen, dagegen stösst man unter ihm auf einen länglichen Vorsprung, den Innenrand des Calcaneus, dessen Sustentaculum tali man besonders deutlich fühlt. Der runde Kopf des Talus ruht dicht unter der Haut, etwa über dem Gelenk zwischen Calcaneus und Os cuboides, und ist hier fühlbar und sogar zu sehen, wenn keine zu starke Weichtheilschwellung besteht. Die ihn bedeckende Haut ist dabei sehr straff gespannt, wenn sie nicht schon perforirt ist. Die Tuberositas ossis navicularis springt ebenfalls stark hervor, während hinter ihr sich eine unregelmässige tiefe Furche bis zum Sustentaculum tali erstreckt. Die activen Bewegungen des Fusses sind aufgehoben. Passiv kann man den Fuss beugen, strecken, adduciren, aber nicht abduciren.

Dieses eben geschilderte Bild kann zuweilen verwischt sein durch eine beträchtliche Schwellung der Weichtheile. Aber auch dann wird die Diagnose, besonders in der Narcose, stets zu stellen sein, nachdem man vielleicht die Schwellung etwas wegmassirt hat. Eine Luxation des Talocruralgelenkes ist leicht auszuschliessen, da ja der Talus seine normale Stellung zu den beiden Malleolen beibehält und demgemäss Beugung und Streckung des Fusses frei von Statten gehen. Sollte man je über die vorliegende Verletzung im Zweifel sein, so ist ein Wink *Roser*'s wohl zu beachten. *Roser* macht nämlich darauf aufmerksam, dass man immer an die Luxatio sub talo denken müsse, wenn die vorhandene Adductionsstellung des Fusses nicht zu corrigiren ist und sich im Sprunggelenk keine Erklärung für dieselbe findet.

Die **Prognose** der Luxatio sub talo nach innen ist wie die der übrigen Luxationen sub talo eine im Ganzen günstige, wenn die Einrichtung gelingt. Dann lernen die Patienten nach längerer Zeit wieder gut gehen. Die Einrichtung ist aber des öfteren misslungen — wahrscheinlich weil man den Mechanismus der Luxation nicht kannte. Dann war das functionelle Resultat ein schlechtes, so dass man später zu operativen Eingriffen, wie Resection des Taluskopfes oder Exstirpation des ganzen Talus greifen musste. Solche Operationen hat man wohl auch gleich anfangs gemacht,

wenn die frische Luxation eine complicirte, und schwierig einzurenkende war.

Die **Therapie** vollzieht die Reposition, während Knie- und Hüftgelenk zur Erreichung einer völligen Muskelerschlaffung rechtwinklig gebeugt sind (*Mac Cormac*), in der Weise, dass man den Fuss dieselben Bewegungen rückwärts machen lässt, die er machen musste, um in die abnorme Stellung hereinzukommen. Diese Sätze gelten ebenso auch für die übrigen Luxationen sub talo. Man wird also die bestehende Adduction zuerst noch etwas mehr forciren, dabei von innen gegen den Fuss, von aussen gegen den Talus drängen lassen, etwas extendiren und dann in starke Abductionsstellung übergehen. Der Fuss schnappt dann in seine richtige Stellung zurück und wird in dieser durch einen leichten Gypsverband für 2—3 Wochen fixirt. Später folgt dann die Massage und Gymnastik, während der Fuss in einem festen Schnürstiefel den nöthigen Halt bekommt.

Besondere Vorsicht ist nöthig, wenn eine Drucknekrose der Haut zu erwarten ist. Dann wird der Verband bald gewechselt und von vornherein aseptisch verfahren. Dieses letztere versteht sich von selbst für complicirte Luxationen.

2. Luxatio pedis sub talo nach aussen.

Die zweite Gruppe der Luxationen sub talo umfasst diejenigen, bei welchen der Fuss nach aussen vom Talus luxirt wird. Sie sind die häufigsten der hieher gehörigen Verrenkungen. Unter 20 Fällen derselben kamen sie 13mal zur Beobachtung.

Diese Luxationen kommen zu Stande durch forcirte Abduction des Fusses und zwar durch ein heftiges Auffallen auf die Ferse, während der Fuss in dieser hyperabducirten Stellung steht, oder durch einen Stoss gegen die äussere Seite des Unterschenkels, während der Fuss fixirt ist.


Als Hypomochlion für die luxirende Gewalt dient wiederum der Calcaneus, jetzt aber die Dorsalfläche seines Processus anterior. Das Gelenk zwischen Talus und Calcaneus kommt zum Klaffen nach innen, so dass hier der Apparatus ligamentosus zerreisst, der Talus verschiebt sich auf den Gelenkflächen des Calcaneus und an dem Os naviculare vorbei nach innen, womit der Fuss nach aussen von ihm zu liegen kommt.

Die grosse Gelenkfacette des Talus ruht nunmehr auf dem Sustentaculum tali des Calcaneus, während der Kopf nach innen

von dem Os naviculare steht. Verlassen sich Talus und Calcaneus vollständig, so liegt der Fuss ganz auf der äusseren Seite des Malleolus externus. In einem von *Bryant* beschriebenen, von *Key* beobachteten und secirten Fall wurde der Musculus tibialis posticus vor der Tibia gefunden. Er drückte den Talus herab. Der Nervus tibialis verlief gewaltsam gespannt über den Talus.

Die **Symptome** verhalten sich umgekehrt wie die der Luxatio sub talo nach innen (Fig. 390). Der Fuss hat eine vollständige Plattfussstellung eingenommen, sein innerer Rand ist gesenkt, sein äusserer erhoben. An seinem äusseren Rande springen stärker hervor der Calcaneus und das Os cuboides. Ueber diesen beiden Knochen findet sich dagegen eine Vertiefung und zwar dort, wo normaler Weise der Malleolus

Fig. 390.



externus und das Caput tali die Haut hervorwölben. Der Malleolus internus ist der Fusssohle näher gerückt und buchtet hier die Weichtheile hervor. Vor ihm bildet der Kopf des Talus einen Vorsprung. Das Os naviculare ist auf dem Fussrücken deutlich zu fühlen. Die Beuge-

und Streckbewegungen sind erhalten, Abduction aber und besonders die Adduction behindert. Dagegen ist die Beweglichkeit im Calcaneo-cuboidalgelenk freier als sonst.

In der Regel ist der Malleolus externus über seiner Spitze abgeknickt. Sehr oft ist auch hier eine Zerreissung der bedeckenden Weichtheile vorhanden, so dass der Talus frei aus der Wunde herausschaut.

Bezüglich der **Prognose** gilt dasselbe wie bei der Luxatio pedis sub talo nach innen.

Zur **Reposition** empfiehlt man gewöhnlich, den Fuss zuerst noch stärker zu abduciren und ihn dann, während man etwas extendirt und die luxirten Knochen direct an ihre richtige Stelle drückt, in Adductionsstellung überzuführen.

Pick kam in einem Falle mit dieser Methode nicht zum Ziel, selbst nachdem er die Achillessehne durchschnitten hatte. Vor der geplanten Excision des Talus glückte dann die Reposition noch auf folgende Weise. Eine feste Schlinge wurde um den Fuss hinter der Basis der Metatarsalknochen angelegt. Die zwei Enden derselben wurden angespannt und über die Schultern des Operateurs gezogen, welcher sein Knie vor den unteren Theil der Tibia stemmte. Unter seitlichen Bewegungen des Fusses wurde nun kräftig gezogen. Dabei schnappte der Fuss alsbald in seine richtige Stellung ein. *Pick* glaubt, dass das Repositionshinderniss in diesem Falle durch den hinteren Rand des Talus gebildet wurde, der in die Grube zwischen den Gelenkfacetten der obern Calcaneusfläche eingekeilt war, während zu gleicher Zeit sein von Weichtheilen umspannter Hals durch den scharfen hintern Rand des Kahnbeines festgehalten wurde.

3. Luxatio pedis sub talo nach hinten.


Die Luxatio pedis sub talo nach hinten ist eine der seltensten Verrenkungen. Sie entsteht durch eine forcirte Plantarflexion des Fusses, zu der weder eine Abduction, noch Adduction hinzukommen darf. Die luxirende Gewalt muss also genau in der gleichen Ebene mit der Achse des Talocruralgelenkes wirken. Als Hypomochlion dient dann der hintere Rand der Calcaneusfacette. Der Talus stützt sich hier auf, zerreisst die hemmenden Kapseln und Bänder und tritt nun mit dem

Unterschenkel über das Os naviculare hinweg nach vorn auf den Fussrücken.

Als Beispiel der Luxation nach hinten wird gewöhnlich die Verletzung des Dubliner Professors der Medicin *Carmichael* angeführt, die Macdonnel beschrieben hat. *Carmichael* ritt in starkem Trabe, als sein Pferd stürzte. Um nicht vornüber geworfen zu werden, bog er sich auf dem Sattel nach hinten und stiess mit ausgestrecktem Unterschenkel und Fuss auf den Boden auf.

Die **Symptome** der Verrenkung traten sehr deutlich hervor. Der Kopf des Talus lag auf der oberen Seite des Os naviculare und der Keilbeine (Fig. 391). Hier hob er die Haut bis zum Bersten empor. Seinen Hals fühlte man dicht vor der Tibia, die sammt der Fibula mit dem Talus in Verbindung geblieben und nach vorn gerückt war. Die Ferse war in Folge dessen verlängert, während der Vorderfuss verkürzt erschien. Die Achillessehne prominirte stärker als normal. Der Fuss konnte, allerdings unter Schmerzen, gebeugt und gestreckt werden.

Fig. 391.



Einen ähnlichen Fall beobachtete *Bryant*, bei dem er die Amputation ausführte. Es handelte sich um eine complicirte Luxation und gleichzeitige Fractur des Calcaneus. Die Verletzung war entstanden, indem der Fuss des Patienten von einer Locomotive erfasst wurde, während der Körper angeblich nach aussen umfiel. Als *Bryant* den Patienten sah, war der Fuss nach einwärts gedreht und verkürzt. Vor dem Malleolus externus befand sich ein Knochenvorsprung, der sich als das dislocirte vordere Drittel des Calcaneus erwies. Bei der Section des Fusses befand sich der Talus in seiner normalen Stellung zur Gabel der Malleolen, während die Spitze des Malleolus externus abgebrochen war. Der Taluskopf ruhte auf dem Os naviculare, zwischen der Sehne des Tibialis anticus an seiner Innen-, und den Sehnen des Extensor digitorum communis longus auf seiner Aussenseite. An der Aussenseite des

Fusses lag der dislocirte Theil des Calcaneus auf der Dorsalfläche des Os cuboides. Die Peronealsehnen hatten ihre Lage beibehalten, verliefen aber sehr gespannt.

Nach dem Gesagten zeigt diese Luxation eine gewisse Aehnlichkeit mit der Luxation des Fusses im Talocruralgelenk nach hinten.

Die Differentialdiagnose wird hier dadurch gestellt, dass bei dieser Beugung und Streckung des Fusses behindert, bei der Luxatio sub talo aber frei sind.

Knöchelfracturen erkennt man durch die Möglichkeit, Crepitation hervorzurufen.

Etwas Typisches scheinen einige seltene Fälle zu haben, in denen bei der Luxatio sub talo nach hinten aussen das Os naviculare in Verbindung mit dem Talus bleibt. Solche Fälle sind von *Burnett*, *Malgaigne* und neuerdings von *Kaufmann* beschrieben worden. Wir führen hier den gut beschriebenen Fall des letzteren Autors an:

Ein 20jähriger Mann war in stehender Stellung von Erdmassen verschüttet worden. Als ihn *Kaufmann* nach 9 Monaten sah, war der rechte Fuss sehr difform. Derselbe war pronirt und stark abducirt, in einem Winkel von 110°. Die Ferse war verlängert; die Achillessehne sprang stärker hervor als auf der anderen Seite. Vor dem Fussgelenk befand sich ein von normaler Haut bedeckter starker Knochenvorsprung. Der innere Fussrand bot ganz das Bild einer Luxatio sub talo nach aussen. Der Calcaneus stand in normaler Beziehung zum Os cuboideum, dagegen liessen sich die auf dem Fussrücken vorspringenden Knochenmassen nicht sicher deuten. Vor allem fehlte, um eine Luxatio sub talo nach hinten aussen sicher anzunehmen, der für diese Luxation so charakteristische Vorsprung des Taluskopfes.

Die Gehfähigkeit war verschwunden. Um dieselbe wieder herzustellen, incidirte *Kaufmann* auf die luxirten Knochen und fand nun dabei, dass das Os naviculare bei der Luxatio sub talo nach hinten und aussen mit dem Talus in Verbindung geblieben war. *Kaufmann* exstirpirte das Os naviculare und meisselte noch die Gelenkfläche des Talus ab, um den Fuss rechtwinklig stellen zu können. Eine Reposition war trotz ausgiebiger Durchtrennung der Verbindung zwischen Talus und Calcaneus in Folge der bedeutenden Spannung der Flexorensehnen nicht möglich. Die Heilung erfolgte so, dass Patient später gut ohne Stock gehen konnte.

Die **Reposition** geschieht wieder dadurch, dass man zuerst die falsche Stellung des Fusses noch etwas übertreibt und dann in die entgegengesetzte übergeht. Sie wollte auf diese Weise in dem Falle *Carmichael's* trotz der Anwendung von Flaschenzügen nicht gelingen, bis sie ganz plötzlich durch eine krampfhafte Bewegung des Patienten zu Stande kam. *Henke* bemerkt hierzu, dass vielleicht ein Ruck der Wade die Bewegung im Sinne der Plantarflexion momentan vermehrt und so das Hinderniss beseitigt habe. Er empfiehlt auch, dieses Hilfsmittel vorkommenden Falles anzuwenden.


Als eine **Mittelform zwischen der Luxatio sub talo nach hinten und der nach innen** beschreibt *Quénu* folgenden veralteten Fall, den er an der Leiche eines etwa 50jährigen Mannes fand. Der Fuss erschien deform und in Varusstellung. An seinem Dorsum war etwas nach aussen vom Os naviculare ein runder harter Vorsprung zu fühlen. Die Beweglichkeit im Vorsprunggelenk war normal. Die Ferse schien verlängert. Die Achillessehneninsertion lag 4 cm hinter der Tibia. Die Section des Fusses ergab nun Folgendes: Während sich die übrigen Fussknochen in normaler Lage zu einander befanden, war die Lage des Talus zu ihnen verändert, indem seine Achse die des Fusses schräg von hinten innen nach vorn aussen kreuzte. Der Mittelpunkt des Caput Tali entsprach ziemlich genau dem Kreuzungspunkt der Linie Calcaneus und Cuboideum einerseits und Cuboideum-Naviculare andererseits Das Caput tali ritt also auf dem Gelenk zwischen Calcaneus und Cuboideum, überragte dasselbe um etwa $1^1/_2$ cm und stützte sich auf das Cuboideum und den äusseren Theil des Naviculare. Calcaneus und Talus waren durch fibröse Bänder fest miteinander verbunden. Das Caput tali hatte seinen Knorpelüberzug verloren und war statt dessen von einer Schicht Bindegewebe bedeckt. Ebenso war die Innenfläche des Talus von einer fibrösen Schicht überzogen, die sich von hier zum Os naviculare erstreckte. Vom hintern Ende des Calcaneus war ein kleines Fragment abgebrochen.

Auf Grund dieses Falles sieht *Quénu* die Luxation nach hinten überhaupt nur als Spielart derjenigen nach innen an. Er fasst diese beiden als Dorsalluxationen zusammen und stellt ihnen dann die Luxation nach aussen und die nach vorn gegenüber.

4. Luxatio pedis sub talo nach vorn.

Die Luxatio pedis sub talo nach vorn entsteht durch eine reine Dorsalflexion des Fusses, indem die Gewalt von oben her den Unterschenkel auf den Fuss niederdrückt und als Hypomochlion den vorderen Rand der Gelenkfläche zwischen Talus und Calcaneus benützt, wodurch das Gelenk nach hinten zum Klaffen gebracht wird. Durch die Hebelwirkung wird dann der Fuss nach vorn getrieben, während Talus und Tibia nach hinten rutschen (Fig. 392).

Fig. 392.



Parise beobachtete so die Luxation bei einem Arbeiter, der verschüttet wurde.

Die **Symptome** waren folgende: Der Fersenvorsprung war verschwunden, der vordere Abschnitt des Fusses verlängert. Die Achse der Unterschenkelknochen fiel auf den hinteren Theil des Fersenbeines. Beugung und Streckung des Fusses waren möglich.

Gleiche Fälle beschrieben dann noch *L. Petit* und kürzlich *Planteau.* In denselben war die Luxation durch einen Sprung von einer Leiter herab auf die Ferse des dorsalflectirten Fusses entstanden. Nach der Luxation fiel sofort die Verlängerung des Fusses — um $1^1/_2$ cm — auf.

Die **Reposition** gelang leicht durch starkes Drängen des Fusses nach hinten unter Flexions- und Extensionsbewegungen, namentlich aber durch forcirte Flexion. Die Heilung erfolgte stets vollkommen.

Isolirte Luxationen des Talus.

Wenn der Fuss in seinem Talocrural- und Talotarsalgelenk allein luxirt werden kann, wie wir soeben besprochen haben, so kommt es gelegentlich auch vor, dass sich diese beiden Verrenkungen combiniren. Der Talus tritt dann aus allen Verbindungen mit den ihm anliegenden Knochen heraus, er ist isolirt verrenkt.

Es ist das im Allgemeinen ein seltenes Ereigniss. *Krönlein* beobachtete unter 400 traumatischen Luxationen keine einzige des Talus. *Malgaigne* stellte bis zum Jahre 1855 54 Fälle zusammen, *Jversen* fand dazu bis 1876 weitere 15; *Gross* zählte 1894 43 Fälle.

Die Luxationen des Talus können dabei nach verschiedenen Richtungen hin und zwar nach vorn, hinten, aussen und innen erfolgen. Dabei kann sich der luxirte Knochen zugleich noch um seine Achse drehen, sodass er sich schräg gegen die Achse des Fusses stellt, und schliesslich kann er, wenn auch äusserst selten, eine vollständige Umdrehung in seiner Pfanne zwischen den Malleolen erfahren, so dass seine Gelenkrolle gegen die Fusssohle sieht. Am häufigsten erfolgen die Luxationen nach vorn, dann kommen die nach vorn aussen und vorn innen, dann die nach aussen oder innen und am seltensten die nach hinten, hinten innen oder hinten aussen.

Der Mechanismus dieser Verletzungen ist ein complicirter. Der Talus bildet gewissermassen den Schlussstein des Fussgewölbes. Er wird daher am leichtesten von allen Fusswurzelknochen herausgeschleudert werden, wenn das Gewölbe zusammengedrückt wird, in gleicher Weise wie ein Kirschstein aus den Fingern fortfliegt, wenn man diese gegen einander presst. Frühere Autoren, vor Allem *Henke*, nahmen nun an, dass der Talus im Moment der Luxation zunächst durch eine forcirte Plantar- oder Dorsalflexion aus seiner Verbindung mit Tibia und Fibula gelöst und unmittelbar darauf durch eine gewaltsame Adduction oder Abduction aus dem Talotarsalgelenk gehebelt würde.

Diese Erklärung ist soweit ganz einleuchtend, dass die genannten übermässigen Bewegungen mit einander combinirt werden müssen, um eine Talusluxation zu erzeugen, fraglich ist jedoch, ob die Reihenfolge der Bewegungen, wie sie *Henke* annimmt, die

richtige ist. *Stetter* glaubt dies nicht. Er ist der Ansicht, dass durch die Uebertreibung der Bewegungen in der Reihenfolge, wie sie *Henke* annimmt, eher Luxationen des Fussgelenkes nach vorn, hinten oder nach der Seite, mit oder ohne Malleolenfracturen erfolgen. Solle eine isolirte Talusluxation entstehen, so müsse die Gewalt zunächst den starken Apparatus ligamentosus im Sinus tarsi zerreissen. Dies geschehe aber durch forcirte Ab- oder Adduction des Fusses. Erst nachdem dieser Bandapparat nachgegeben, könne durch Plantar- oder Dorsalflexion das Austreten des Talus im Talocruralgelenk erfolgen, mit oder ohne vollständige Zerreissung der Seitenligamente.

Demnach präcisirt *Stetter*, und wohl auch mit Recht, den Mechanismus der isolirten Luxatio tali dahin, dass zuerst durch forcirte Ab- oder Adduction des Fusses die Verbindungen des Talus mit dem Calcaneus und Os naviculare gelöst werden und dass dann durch eine unmittelbar folgende Dorsal- oder Plantarflexion auch diejenigen des Talocruralgelenkes zerreissen. Die Reihenfolge der Bewegungen ist daher umgekehrt, als sie *Henke* angenommen. Direct bewiesen wurde die *Stetter*'sche Ansicht kürzlich durch eine von *Schlatter* mitgetheilte Beobachtung.

Wenn so der Mechanismus im Allgemeinen feststeht, ist derselbe doch für die Luxationen nach den verschiedenen Richtungen hin noch nicht ganz aufgeklärt. Die Luxation nach hinten kommt wohl zu Stande durch Combination der Ab- oder Adduction mit einer Plantarflexion des Fusses *(Henke)*, die nach innen vorzugsweise durch gewaltsame Abduction, die nach aussen besonders durch gewaltsame Adduction, zweifelhaft blieb jedoch bis in die neueste Zeit das Zustandekommen der Luxation nach vorn.

Die früheren Chirurgen liessen die Luxation nach vorn nach *Rognetta*'s Leichenexperimenten durch eine forcirte Plantarflexion entstehen, während gleichzeitig der Unterschenkel unter dem Drucke des Körpergewichtes stark nach hinten gedrängt würde, wie dies z. B. zutrifft für einen Fall aus beträchtlicher Höhe mit der Plantarfläche des Fusses auf eine von hinten oben nach vorn unten geneigte Ebene oder bei einem Fall vom Pferde und Hängenbleiben des Fusses im Steigbügel.

In neuerer Zeit ist diese Ansicht *Rognetta*'s wieder durch *Dauvé* aufgenommen und durch Versuche gestützt worden. *Dauvé*


erhielt nach Durchschneidung aller Bandverbindungen des Talus eine Luxation desselben nach vorn und aussen durch Combination der Plantarflexion mit Adduction, eine Luxation nach vorn und innen aber durch Plantarflexion mit Abduction.

Dem gegenüber behauptet *Henke* gerade das Gegentheil. Nach ihm ist zur Erzeugung der isolirten Talusluxation nach vorn neben der Ab- und Adduction nicht eine Plantar-, sondern eine Dorsalflexion nothwendig. *Henke* führt zum Beweis seiner Ansicht Beobachtungen an Lebenden und Leichenversuche an. Diese letzteren wurden in der Art ausgeführt, dass zuerst eine Luxation des Talus im Talocruralgelenke, dann eine solche im Talotarsalgelenke hergestellt, beide wieder reponirt und dann eine schnelle Dorsalflexion gemacht wurde. Dadurch trat der Talus nach vorn, und zwar gleichzeitig nach innen, wenn noch eine Abduction, nach aussen, wenn noch eine Adduction des Fusses hinzugefügt wurde.

So steht sich Behauptung gegen Behauptung gegenüber und noch dazu die Angabe, dass beide Ansichten am Lebenden bestätigt worden seien.

Nun sind aber die Angaben der Patienten über den Stand und die Bewegungen des Fusses im Augenblick der Verletzung in den seltensten Fällen so genau, dass man daraus den Mechanismus herleiten könnte. Wir würden also wohl nie über die Schwierigkeiten hinwegkommen, wenn wir nicht noch auf einem anderen Wege einen objectiven Aufschluss erhalten könnten. Ein solcher aber wird uns durch die Veränderungen gewiesen, die der dislocirte Talus bei der Luxation erleiden kann. Der Talus zeigt nämlich mannigfache Läsionen seines Knorpelüberzuges oder mehr oder weniger vollständige Fracturen, und der Sitz dieser Verletzungen giebt durchaus einwandsfrei den Hergang der Hebelwirkung an.

Fig 393.



Derartige Knochenpräparate verdanken wir *Riedinger*, *Löbker* und *G. Middeldorpf*. Sie wurden durch Exstirpation des verrenkten Talus gewonnen.

Das Präparat *Riedinger*'s (Fig. 393) entstammt einer Luxation nach aussen und

vorn. Der Talus hat hier eine Fractur an der medialen Seite erlitten. Der Bruch beginnt in der Mitte des unteren Randes der Gelenkverbindung zwischen Tibia und Talus und erstreckt sich nach oben bis fast in die Mitte der Talusrolle. Dieser Bruch ist zweifellos durch eine forcirte Adductionsbewegung entstanden. Weiterhin ist der ganze hintere Abschnitt der Talusrolle zerquetscht. Diese Zermalmung hat die Form eines Keiles, dessen Spitze nach vorn schaut. Sie spricht augenscheinlich dafür, dass hier eine forcirte Plantarflexion im Moment der Verrenkung vorgelegen hat.

In der Beobachtung *Löbker*'s (Fig. 394) lag eine unvollständige Luxation des Talus nach vorn und aussen vor. Hier war der ganze innere Rand des Talus zusammengepresst und einzelne Splitter von der unteren Fläche abgesprengt, während der äussere Rand und die Mitte des Knochens vollständig intact waren. Das spricht wieder für eine forcirte Adduction des Fusses. Fernerhin war an dem Talus aber noch ein ähnlicher, wenn auch nicht so grosser Defect am Knorpel des vorderen Randes der Rolle vorhanden. Ein solcher konnte aber nur durch eine forcirte Dorsalflexion entstehen, indem sich bei einer solchen die vordere Kante der Tibia gerade auf die betroffene Stelle aufstemmt.

Fig. 394.





Fig. 395.




G. Middeldorpf beschreibt zwei Knochenpräparate, beide abermals von Luxationen nach vorn und aussen stammend.

Im ersteren Fall (Fig. 395) zeigt der Talus an der vorderen unteren Peripherie der medialen Gelenkverbindung zwischen Talus und Tibia eine deutliche Abblätterung des Knorpels, welcher von dem darunter liegenden Knochen in $^1/_2$ cm Breite und $^1/_4$ cm Höhe

abgehoben ist. An der entsprechenden medialen Knorpelpartie der Verbindung zwischen Taluskopf und Os naviculare findet sich ebenfalls eine Absprengung von Knorpeltheilen. Alle anderen Theile der Rolle sind intact. Nur am hinteren Ende der horizontalen Talusgelenkfläche, dort, wo dieselbe allmählich in die seitliche Gelenkfläche zwischen Talus und Fibula übergeht, befindet sich noch eine ca. 2 cm im Durchmesser haltende deutliche Depression des Knorpels in den Knochen hinein. Auch an der vorderen Peripherie der Gelenkfläche zwischen Talushals und Sustentaculum tali des Calcaneus ist eine deutliche Knorpelabsprengung zu erkennen, wenn man das Präparat von unten her betrachtet.

Fig. 396.



Im zweiten Fall (Fig. 396) war am medialen Rand der Gelenkverbindung zwischen Talus und Calcaneus ein breiter, dreieckiger, mit der Spitze nach vorn sehender Spalt in der Gelenkfläche vorhanden, dadurch entstanden, dass ein 1 cm. langes, nicht ganz $^1/_2$ cm breites Stück der Gelenkfläche abgebrochen und medialwärts verschoben war. Am hinteren Umfang dieser Fracturstelle finden sich noch eine Reihe weiterer kleinerer Knochenabsprengungen. Das Aussehen des beschriebenen Keiles, mit seiner Spitze nach vorn schauend, wie im Falle *Riedinger*'s, spricht offenbar wieder für eine forcirte Plantarflexion. Ferner fanden sich an dem vorderen, unteren Ende der medialen seitlichen Gelenkfläche ähnliche Knorpelabhebungen wie im ersten Falle, hervorgerufen durch eine forcirte Adduction.

Wir haben hier also 4 Präparate. Drei derselben sprechen durchaus objectiv für eine Entstehung der Luxation durch Adduction und Plantarflexion, eines für eine solche durch Adduction und Dorsalflexion *(Löbker)*. Das Ergebniss derselben ist also das, dass die isolirte Luxation nach vorn und aussen sowohl nach der Erklärung *Rognetta*'s als der *Henke*'s entstehen kann, durch Dorsalflexion — nach den wenigen Präparaten zu urtheilen — vielleicht seltener als durch Plantarflexion. Auch

Verebély sah eine Luxation, wohl entstanden durch Plantarflexion, indem bei derselben das innere hintere Viertel der Gelenkoberfläche des Talus abgebrochen war.

Wir haben schon früher erwähnt, dass auch die Luxation nach hinten durch forcirte Plantarflexion entsteht. Dieselbe ist aber ungleich viel seltener als die nach vorn. Der Grund hierfür kann in zwei Momenten gegeben sein. Erstlich wird die eigenthümliche Beschaffenheit der Talusrolle, welche ja vorn breiter ist als hinten und nach hinten convergirende Gelenkflächen besitzt, dem Talus durch jede Bewegung um seine Querachse einen leichteren Austritt nach vorn ermöglichen. Zweitens aber kommt die Configuration der dorsalen Oberfläche des Calcaneus in Betracht, indem dessen wie schiefe Ebenen nach vorn und aussen gerichteten Gelenkflächen für Taluskörper und -Hals ein Abgleiten des Talus nach vorn und aussen erleichtern werden.

Die zuweilen beobachtete Umdrehung des Talus um seine horizontale oder die vollständige Umdrehung desselben um seine verticale Achse lässt sich nicht anders erklären als durch den Widerstand, den der dislocirte Knochen an den entgegenstehenden elastischen Sehnen und den gespannten Weichtheilen findet. *Stetter* macht daneben noch den Umstand verantwortlich, dass die Tibia im Moment des Austretens des Talus einmal mehr auf seine innere, ein anderes Mal mehr auf seine äussere Kante drückt und so beim Hinausdrängen zugleich in einer der sagittalen Achse entsprechenden Rotation wirkt.

Der Vollständigkeit halber wollen wir zum Schluss noch einige Leichenversuche erwähnen, die kürzlich von *Heineke* und *Dorsch* und von *Rochet* ausgeführt wurden. Die Versuche der ersteren Autoren hatten das folgende Ergebniss: Die Luxation des Talus nach vorn wird durch eine Combination von forcirter Pro- und Supination mit einer forcirten Plantar- oder Dorsalflexion hervorgerufen. Die supinirende oder pronirende Bewegung muss dabei der Plantar- oder Dorsalflexion vorausgehen. Die erstere Bewegung löst den Talus aus seinen vorderen und unteren, die letztere aus seinen oberen Verbindungen. Durch vorausgehende Supination wird der Talus nach vorn und aussen, durch vorausgehende Pronation nach oben und nach innen verschoben. Die Luxation nach vorn und aussen wird besonders durch eine der Supination folgende Dorsalflexion erzeugt. Bei dieser Luxation dreht sich der Talus um seine senkrechte Achse, so dass seine innere Fläche nach vorn sieht.

Die Versuche *Rochet's* erweitern unsere Kenntnisse über den Mechanismus der Talusverrenkung insofern, als *Rochet* besonders die Stellung des Fusses zum Unterschenkel berücksichtigte. Danach muss sich der Fuss beim Zustandekommen der Luxation nach vorn in extremer Streckung und Einwärtsrotation, beim Entstehen der Luxation nach hinten in starker Beugung, beim Entstehen der Luxation nach innen in forcirter Valgusstellung und beim Entstehen der Luxation nach aussen in forcirter Varusstellung befinden. Die Luxation nach vorn und aussen kommt zu Stande durch Combination der Varus- und Extensionsstellung, die nach innen durch forcirte Beugung und Valgusstellung.

Schlatter erzielte an der Leiche eine Luxation des Talus, wenn er bei plantarflectirtem Fuss einen starken Schlag von innen her auf den Talus einwirken liess. Er wies damit nach, dass die Luxation bei leichter Plantarflexion des Fusses, auch durch eine starke seitliche Gewalteinwirkung zu Stande kommen kann.

Die Luxationen des Talus sind vollständige und unvollständige. Im ersteren Falle hat er alle seine Gelenkverbindungen gesprengt und ist vollständig ausser Berührung mit denselben getreten, im letzteren ist noch ein geringer Contact der Gelenkflächen vorhanden, während der Talus zumeist zwischen dem Calcaneus, Os naviculare und cuboides eingeklemmt ist, so dass er vollständig unbeweglich festsitzt.

Bei der vollständigen Luxation sind in der Regel alle Bandverbindungen zerrissen und der Talus jeder Ernährung beraubt, indem die Blutgefässe, die hauptsächlich von unten in ihn hineindringen, zerstört sind. Der Talus liegt ganz lose oder hängt höchstens noch an kleinen, gequetschten Weichtheilbrücken. Diese letzteren sind in grösserem Maasse vorhanden bei den unvollständigen Luxationen. Namentlich das im Sinus tarsi gelegene Lig. talo-calcaneum interosseum ist häufig noch ganz oder wenigstens theilweise erhalten. Zuweilen wird der vollständig luxirte Talus durch eine complicirte Wunde herausgeschleudert, so dass er am Boden liegend gefunden wird (*Malgaigne, Norris*).

In einzelnen Fällen beobachtete man, dass sich nicht der ganze Talus dislocirt hatte, sondern dass er gebrochen und nur ein Fragment verschoben war. So sah *Küster* einmal, dass Kopf und Hals an ihrer Stelle geblieben, der übrige Theil aber nach vorn und aussen verschoben war. *Dumont* berichtet ebenfalls von einer Fractur durch das Collum tali, Sitzenbleiben des Kopfes

an normaler Stelle und Dislocation des anderen Fragmentes nach hinten. Ein anderes Mal war das Caput tali nach vorn und aussen luxirt und hatte sich mit seiner Gelenkfläche für die Tibia gerade nach unten gedreht, während der übrige Theil an normaler Stelle sass, nochmals gebrochen war und die Bewegungen des Fusses sehr hinderte, so dass er extrahirt werden musste. *v. Bergmann* sah, dass der obere Theil des Talus luxirt war, während der untere Theil abgebrochen und mit dem Calcaneus in Verbindung geblieben war.


Bei der Beobachtung von *Seiler* bestand neben der völligen Luxation des Talus noch eine Fractur des Malleolus externus und des Sustentaculum tali.

In einem Falle *Schlatter*'s war ein kleines Fragment von dem hinteren Rande der Calcaneusgelenkfläche des Talus abgebrochen.

Schliesslich kommen auch noch Rissfracturen des Talus neben der Luxation vor, indem der Bandapparat selbst gehalten und lieber kleine Knochenstückchen an seiner Insertion abgerissen hat.

Was die **Symptome** betrifft, so bildet der Talus bei der **Luxation nach vorn** einen dicht unter der straff gespannten Haut liegenden, deutlich sicht- und fühlbaren, harten Vorsprung, der dem Os naviculare aufliegt (Fig. 397). Er lässt sich gewöhnlich völlig abgrenzen und ist aus seiner Lage schwer zu verdrängen. Recht häufig ist, wenn die Luxation, wie das so oft der Fall ist, nach vorn und aussen erfolgt war der Befund der, dass sich unter der straffgespannten, völlig anämischen Haut, drei Knochenvorsprünge besonders markiren. Der äusserste derselben ist dann in der Regel der Malleolus externus, der mittlere die Talusrolle, der am weitesten nach vorn gelegene der Taluskopf resp. die Gelenkfläche des Talus gegen das Os naviculare. Die Tibia ist etwas nach hinten gerückt und steht auf dem Calcaneus. Dadurch sind die Malleolen der Fusssohle genähert, während das Bein etwas verkürzt ist. Die Achillessehne zieht in fast gerader Linie vom Fersen-


Fig. 397.



höcker nach aufwärts. Der Fussrücken erscheint etwas verlängert. Der Fuss steht in Plantarflexion und ist nur wenig oder schwer beweglich. Je nachdem der Talus ausser nach vorn noch etwas nach aussen oder innen abweicht, steht auch der Fuss mehr in Adduction — die Spitze nach innen, die Ferse nach aussen (Fig. 398 a) — oder in Abduction, die Spitze nach aussen, die Ferse nach innen (Fig. 398 b). In der Regel stellt sich bald eine erhebliche Schwellung des ganzen Fusses ein.

Bei der **Luxation nach hinten** ist die Dorsalseite des Fusses verkürzt, die Ferse normal, über derselben

Fig. 398.



a b

jedoch zwischen Tibia und Achillessehne ein dicker, harter Körper fühlbar. Vor der Tibia befindet sich eine Vertiefung. Die Beweglichkeit des Fusses ist etwas grösser als bei der Luxation nach vorn.

Ist die Dislocation des Talus nach hinten aussen oder hinten innen erfolgt, so steht er zwischen dem Knöchel der betreffenden Seite und der Achillessehne. Bei der letzteren Form sind zuweilen die Zehen flectirt, in Folge der Spannung ihrer Flexoren durch den Talus.


Bei der **Luxation nach aussen** ist der Fuss stark nach innen gedreht, er steht in Varusstellung. Der äussere Knöchel springt stark unter der gespannten Bedeckung hervor. Unter ihm fühlt man einen unebenen, eckigen Knochen, den luxirten Talus. Der Malleolus internus ist in der Regel

nicht fühlbar, der Fuss bildet vielmehr an dieser Stelle einen Winkel mit dem Unterschenkel. Die activen Bewegungen sind meist aufgehoben, die passiven nur in geringem Grade möglich.

Bei der **Luxation nach hinten** steht der Fuss in Plattfussstellung, und es finden sich genau die gleichen Symptome wie bei der äusseren Luxation vor, nur in umgekehrter Weise.

Ich führe als Beispiel die Beobachtung *Seiler*'s an. Der Patient, ein Bauschlosser war 3 Meter hoch von einem Gerüst herabgefallen. Der linke Fuss stand um etwa 4 cm nach aussen verschoben und war gleichzeitig um etwa 2 cm von hinten nach vorn verschoben (Fig. 399). Auf der innern Seite konnte man unter der bis aufs äusserste gespannten Haut den Kopf des Talus, ein Theil des Corpus

Fig. 399.



Tali und die untere Gelenkfläche des Talus abtasten. Die Zehen, besonders die grosse Zehe standen flectirt. Die Beweglichkeit des Fusses war völlig aufgehoben. Die Reposition des völlig um seine Achse gedrehten Talus gelang mit bestem Erfolg nach Incision der Haut und Blosslegung der verletzten Stelle.

Die Zeichen der **vollständigen Umdrehung** des Talus sind die einer schweren Distorsion. Ohne begleitende Wunde ist die Luxation am Lebenden kaum nachweisbar.

Bei allen Luxationen des Talus können die bedeckenden Weichtheile zerrissen sein. Die Wunde ist in der Regel eine unregelmässige. Ihre Ränder sind stets geschwollen und blutig verfärbt. Sehr oft sieht der dislocirte und um seine Achse gedrehte Talus mit irgend einem seiner Theile aus der Wunde heraus (Fig. 400 u. 401).


Die **Diagnose** der Talusluxationen lässt sich aus den angegebenen Symptomen leicht und sicher stellen. Nur bei sehr

starker Schwellung der Weichtheile können Zweifel bestehen. So erzählt *Malgaigne* von einem Fall, in dem er zuerst nur eine Fractur der Fibula und erst am 12. Tage die Luxation des Sprungbeines diagnosticiren konnte. Einfache Luxationen im Talocrural- und Talotarsalgelenk lassen sich ausschliessen, wenn man genau die Localität der Verletzung berücksichtigt. Ausserdem lässt sich auch meist durch Palpation der Nachweis erbringen, dass der Talus beide Gelenkverbindungen gelöst hat.

Fig. 400.



Fig. 401.



Die **Prognose** der isolirten Talusluxationen ist eine zweifelhafte, denn die Verletzung ist viel schwerer, als man dies nach der geringen Grösse des dislocirten Knochens erwarten sollte.

Gelingt die Einrichtung bald nach der Verletzung, so können wieder absolut normale Verhältnisse eintreten *(Stetter)*. Die Reposition gelingt aber nach den in der Litteratur vorhandenen Angaben nur in dem vierten Theil der Fälle. In den übrigen ist der Talus so fest durch gespannte Bänder, Sehnen — namentlich durch die Sehne des Tibialis posticus, welche den Kopf des Talus fest umschlungen hält oder die des Flexor digitorum pedis longus und Tibialis posticus, welche das Collum Tali fest eingeklemmt halten — und durch Knochenvorsprünge fixirt oder derart zwischen dem Os naviculare und dem Unterschenkel eingekeilt, dass man ihn absolut

nicht wieder an seine richtige Stelle bringt. Ueberlässt man dann die Verletzung sich selbst, so bleibt im günstigsten Fall der Gang dauernd mühsam und schmerzhaft, während die Bewegungen des Fusses selbst, namentlich die Dorsalflexion stark gehemmt sind. In den ungünstigeren Fällen kommt es an der verletzten Stelle zur Eiterung, sei es dass die gespannte Haut über dem Talus gangränös und so das Gelenk von aussen her blossgelegt oder dass der vollständig ausser Circulation gesetzte Talus selbst necrotisch wird. Dann kommt es nach monatelanger Eiterung zu einer Ausstossung des Talus und Heilung mit geringer Beweglichkeit oder Ankylose. Aber auch Todesfälle durch Pyämie sind bekannt, wenn nicht schnell noch die Amputation des Unterschenkels vorher den Patienten rettete.

Die **Therapie** hat wie bei allen anderen Luxationen, zunächst die Reposition zu erstreben. Diese soll möglichst frühzeitig vorgenommen werden, und zwar in Narcose. Zunächst beugt man Hüft- und Kniegelenk des Patienten und lässt ihn am besten zur vollständigen Erschlaffung der Muskeln die *Pott*'sche Seitenlage einnehmen. Dann fixirt ein Gehülfe den Unterschenkel über den Malleolen. Ein anderer Gehülfe übernimmt den Fuss, fasst ihn mit einer Hand an der Ferse, mit der andern um den vordern Theil des Rückens herum, extendirt kräftig und drängt dann den Fuss noch mehr in seine pathologische Stellung hinein. Während aber dieses letztere geschieht, setzt der Arzt seine Finger auf den luxirten Talus und sucht ihn an seine richtige Stelle zu drängen. Dies erfolgt bei gelingender Reposition mit einem schnappenden Geräusch. Fühlt man, dass die Reposition gelingt, dass der Talus flott wird, so geht man aus der pathologischen Stellung in die umgekehrte über. So reponirte *Schede* eine Luxation des Talus nach vorne und innen durch starken Zug am Fusse in der pathologischen Stellung und vermehrte Supination, dann Druck auf den Talus, Dorsalflexion und Pronation des Fusses. Die Reposition einer Luxation des Talus nach vorne und aussen gelang *Schede* dagegen durch starken Zug in der pathologischen Stellung, Druck auf den Talus, leichte Dorsalflexion und Supination des Fusses.

Bei einer mit Hautwunde complicirten Luxation des Talus nach aussen gelang *Krönlein* und *Schlatter* die Reposition erst dadurch, dass zwei Elevatorien zwischen die abgewichenen Gelenkflächen eingeführt wurden, und dass beide auf die Elevatorien

aufgesetzten Daumen den mobilen Talus fixirten, während der Fuss stark extendirt und abducirt wurde.

Gelingt die Reposition des Talus, so stellt sich die normale Function des Fusses bald wieder in vollem Umfange her.

Leider misslingen nun aber öfters alle Repositionsversuche. Was ist dann zu thun? Die Antwort lautet: Zunächst schneide man auf den Talus ein und suche von der Schnittwunde aus durch unmittelbares Anfassen des Knochens die Reposition zu erreichen, nachdem man die entgegenstehenden Hindernisse von Seiten der Weichtheile durch Beiseiteschiebung, Spaltung oder Exstirpation derselben beseitigt hat. Gelingt diese offene Reposition des Talus nicht, dann schreite man zur Exstirpation desselben.

Die offene Reposition des Talus ist zuerst von *v. Bergmann* mit gutem Erfolge ausgeführt und deshalb warm empfohlen worden. *v. Bergmann* führte die Operation bei einem Studenten aus, der sich durch Fall beim Turnen eine mit Verdrehung des Talus und Abriss der Cavitas glenoidea an der unteren Talusfläche complicirte Luxation des Talus nach vorn und aussen zugezogen hatte. Eine Necrose des Talus war in diesem Falle nicht zu befürchten, da das im Sinus Tarsi gelegene starke Lig. talo-calcaneum interosseum erhalten war. In diesem Bande aber verläuft eine Arterie aus der Plantaris medialis bis an und in den Talus, welche nahezu die Bedeutung einer Arteria nutritia für den Talus zu haben scheint. In gleicher Weise wie *v. Bergmann* hat auch *Seiler* einen völlig luxirten und verdrehten Talus offen reponirt. In diesem letzteren Fall bildete die stark gespannte Sehne des Tibialis posticus das Repositionshinderniss, indem sie den Taluskopf fest umschlungen hielt.

Ebenso wurde von *Krönlein* und *Schlatter* die offene Reposition mit Erfolg ausgeführt. Man hatte sich in früheren Jahren vor der Reposition des Talus gefürchtet, da man meinte, dass der aus seinen Verbindungen gelöste Talus necrotisch werden würde in Folge mangelnder Ernährungszufuhr. Die mitgetheilten Beobachtungen widerlegen diese Befürchtungen. Ausserdem hat *Schlatter* direct durch anatomische Untersuchungen nachgewiesen, dass der Talus weit besser ernährt ist (von der Art. Tibialis postica, Dorsalis pedis, Tarsea medialis und lateralis, Peronea posterior) als man bisher angenommen hat.

Kommt man mit der offenen Reposition nicht zum Ziele, so schreitet man wie gesagt, zur primären, aseptischen Exstirpation des Talus. Man nimmt denselben dann einfach heraus, nachdem man etwa noch haftende Bandmassen durchtrennt hat.

Selbstverständlich ist die Exstirpation des Talus auch dann auszuführen, wenn derselbe necrotisch geworden ist und eine schon länger dauernde Eiterung unterhält.

Die Entfernung des Talus hindert die spätere Gebrauchsfähigkeit des Fusses nicht sehr bedeutend. Das zeigen einmal die Erfahrungen, die man an operirten Klumpfüssen gewonnen hat, das beweisen aber auch Nachforschungen, die man nach Jahren über die Patienten anstellte, denen der Talus wegen einer Luxation exstirpirt worden war. Solche Untersuchungen verdanken wir *Dumont*. Das Fussgewölbe bleibt erhalten, ebenso die Beweglichkeit des Fussgelenkes, indem sich Tibia und Fibula auf den Calcaneus aufstützen. Gelegentlich bleibt eine leichte Spitzfussstellung oder auch wohl eine leichte Einwärtsdrehung des Fusses zurück, die dann den Patienten etwas stört. In der ersten Zeit nach der Operation schwillt der Fuss in der Regel noch nach stärkeren Anstrengungen etwas an, und dann besteht auch wohl geringe Schmerzhaftigkeit. Nach Jahren vermögen aber die Patienten weite Strecken ohne Beschwerden zurückzulegen.

Die Fixation des Fusses nach der Exstirpation des Talus geschieht für 3—4 Wochen in einem Contentivverband. Dann folgt Massage und Gymnastik.

Luxationen im Chopart'schen Gelenk.

Ueber das Vorkommen von Luxationen im *Chopart*schen Gelenk haben zwischen Chirurgen und Anatomen lange Streitigkeiten geherrscht. *Cooper* und *Malgaigne* behaupteten, die Luxation gesehen zu haben; *Broca* leugnete ihre Möglichkeit aus anatomischen Gründen, namentlich wegen der starken Bandverbindungen des Gelenkes. *Henke* hielt dagegen letzteren Grund nicht für stichhaltig.

Dass die Luxation sicher vorkommt, dafür hat nun *Fuhr* kürzlich durch zwei klinische und eine anatomische Beobachtung den unwiderleglichen Beweis geliefert. Ein 66 Jahre alter Mann, mit verhältnissmässig kleinem Fuss war beim Fallen nach rückwärts von einer Leiter mit dem linken Fuss in den Sprossen hängen geblieben und mit dem Rumpf nach der linken Seite hin gestürzt. Sofort heftiger Schmerz und Unmöglichkeit aufzustehen. Er hatte

eine Luxation des Fusses im *Chopart*'schen Gelenk erlitten.

Die Untersuchung ergab folgendes: Der Fuss steht einem Plattfuss ähnlich, etwas pronirt, die Partie unmittelbar vor den Knöcheln erscheint stark verbreitert. Auf der innern Seite, dicht vor dem Knöchel, sieht und fühlt man unter der stark gespannten Haut die überknorpelte Rundung des Taluskopfes. Auf der Aussenseite stösst man vor dem Knöchel auf einen mehr als daumenbreiten, knöchernen Vorsprung, die Articulationsfläche des Würfelbeines mit dem Fersenbeine. Das letztere zeigt den Knöcheln gegenüber keine Stellungsveränderung; die Ferse ist weder verlängert, noch verkürzt, der Abstand des Fersenhöckers von den Knöcheln beiderseits der gleiche. Letztere waren nicht gebrochen.

Die Reposition durch Zug und directe Impulsion stiess in diesem Falle zuerst auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Durch Vergleichung mit einem Fussskelett erkannte man, dass das Repositionshinderniss dadurch gebildet wurde, dass der scharfe Rand des Os naviculare festgehakt in dem Spalte stand, der den Proc. anterior calcanei und den Hals des Talus trennt. Da der Taluskopf den Fersenbeinfortsatz um ein Beträchtliches überragt, so wird ein weiteres Hinderniss für das Zurückgehen des Kahnbeines geschaffen. Nachdem man dies erkannt hatte, gelang die Reposition leicht durch eine forcirte Abduction im *Chopart*'schen Gelenk bei fixirtem Fersenbein und Druck auf den vorspringenden Talus. *Fuhr* macht darauf aufmerksam, dass dies erwähnte Hinderniss nur bei relativ kleinen Füssen vorkommen kann. Die beschriebene Verletzuug hat grosse Aehnlichkeit mit der Luxatio pedis sub talo nach aussen. Beide Verrenkungen stimmen sowohl in ihrer Entstehung als in ihrem Ausehen durch den in Pronation fixirten Fuss und namentlich durch die abnorme Prominenz des Caput Tali vor dem innern Knöchel überein. Differentialdiagnostisch entscheidend ist dann für die Verrenkung im *Chopart*'schen Gelenk die unveränderte Stellung des Fersenbeines zu den Knöcheln und das Vortreten der ganzen Breite des Os cuboideum auf der Aussenseite des Fusses.

Betraf die eben geschilderte Verletzung eine Luxation des Fusses im *Chopart*'schen Gelenk nach aussen, so giebt uns die folgende, ebenfalls von *Fuhr* herrührende Beschreibung das Bild und den

Befund bei einer Luxation des *Chopart*'schen Gelenkes nach innen.

Ein 20jähriger Mann war von einer Locomobile überfahren worden. Der Fuss steht einem Klumpfuss ähnlich leicht supinirt (Fig. 402); sein innerer Rand erscheint erhoben, stark concav und vor dem innern Knöchel eingeknickt. Die Haut ist hier stark gefaltet und bis zum Knöchel hinauf hämorrhagisch infiltrirt. Vor dem äussern Knöchel springen unter der stark gespannten Rückenhaut des Fusses die Contouren von Knochentheilen vor, an denen man schon ohne genauere Palpation die vordere Gelenkfläche des Calcaneus und den Taluskopf erkennt. Ueber den inneren Rand des letzteren ziehen die strangförmig zusammengeschobenen Sehnen des langen Zehenstreckers. In Narcose lässt sich ferner vor dem innern Knöchel das durch einen starken Bluterguss verdeckte, vorspringende Os naviculare durchpalpiren.

Fig. 402.



Eine Verwechslung mit der Luxatio sub talo war hiernach sofort auszuschliessen.

Die Reposition gelang sehr leicht durch Zug am Vorderfuss und Druck auf die verrenkten Knochen in entgegengesetzter Richtung, und eben so leicht liess sich die Verrenkung durch Supination des Fusses wieder herstellen.

Bei der anatomischen Untersuchung des seinen übrigen Verletzungen erlegenen Patienten zeigt sich nach Wiederherstellung der Verrenkung der Vorderfuss im *Chopart*'schen Gelenk so nach innen verschoben, dass die ganze Breite des Os naviculare und ein Theil des Os cuneiforme I. auf der Innenseite hervorragt. Der Muskelbauch des Ext. digitor. com. brevis ist zerfetzt. Die plantaren und dorsalen Bänder zwischen Naviculare und Talus sind an letzterem abgerissen und hängen, einen häutigen Limbus bildend, an ersterem fest. Ebenso sind die Bänder zwischen Calcaneus und Cuneiforme völlig getrennt. Der dritte und vierte Metatarsus sind fracturirt. Beide Knöchel und das Fussgelenk sind intact.

Brüche des Talus.

Bei der Besprechung der Talusluxationen haben wir schon vielfach Brüche des Talus erwähnen müssen, die dadurch entstanden, dass im Moment der Hebelwirkung die sich berührenden Knochen gewissermassen in einander gedrückt wurden. Es handelte sich entweder um einfache Abblätterung des Knorpels oder Fissuren und Infractionen des Knochens oder Absprengungen und Abreissungen kleinerer Theile desselben oder vollständige Fracturen, die dann meistens durch den Hals des Talus verliefen. Es können aber auch vollständige Trümmerbrüche die Luxation begleiten.

Die ohne Luxation des Talus selbst einhergehenden Brüche dieses letzteren sind ausserordentlich selten, wobei man allerdings bedenken muss, dass die Diagnose am Lebenden nicht stets gestellt, die Verletzung vielmehr als schwere Distorsion behandelt wird. *Gaupp* konnte im Jahre 1894 nur 60 Fälle zusammenstellen; von diesen waren 43 einfache, 17 complicirte Fracturen.

Ihre Ursache ist in der Regel ein Fall von bedeutender Höhe herab auf die Füsse, bei dem der Talus zwischen Tibia und Calcaneus zusammengepresst wird, und der Fuss in der Regel noch seitlich umkippt. Andere Male genügt auch schon eine forcirte Pronation oder Supination allein, also seitliches Umkippen des Fusses auf ebener Erde oder Umfallen des Körpers bei eingeklemmtem Fuss, um die isolirte Talusfractur zu erzeugen. Schliesslich kann letztere auch durch Auffallen schwerer Lasten auf den Fuss oder durch Ueberfahren eines Wagenrades über denselben entstehen.

Bardeleben beschreibt einen Fall, in welchem der Kopf des Talus durch eine gewaltsame Rotation des Fusses abbrach.


Sehr oft ist die Talusfractur begleitet von einem gleichzeitigen Bruch eines oder beider Malleolen oder von einer Luxation des Talocruralgelenkes.

Die Richtung und Ausdehnung der Bruchlinien ist eine sehr verschiedene. Auch hier kommt es gelegentlich nur zu einfachen Absprengungen des Knorpels, so in einem von *P. Bruns* beschriebenem Fall, der einen 12jährigen Knaben betrifft. Derselbe hatte durch Auffallen eines schweren Steines eine complicirte Luxation des Fussgelenkes erlitten. Der Gelenkknorpel der Talusrolle war in seinem vorderen Umfang scharfrandig durch-

trennt und nach hinten zu grösstentheils von dem unterliegenden, sonst völlig intacten Knochen abgelöst (Fig. 403).

Bei den vollständigen Brüchen ist entweder das Collum Tali quer oder leicht schräg abgetrennt, oder der Bruch betrifft nur den Processus calcanei. Der Talus kann aber auch durch frontale Bruchlinien in eine vordere und hintere oder durch sagittale in zwei seitliche oder durch horizontale in eine obere und untere Hälfte geschieden werden. Schliesslich kann er auch schräg oder in Form eines T gebrochen oder in verschiedene Splitter zersprengt oder vollständig zermalmt sein, wobei die Splitter öfters in einander eingekeilt werden. *Finotti* beobachtete einen derartigen Compressionsbruch, der sogar beide Tali gleichzeitig betraf.

Fig. 403.



Als besondere Fracturform beschreibt *Shepperd* die Abtrennung der sog. „hinteren Apophyse" des Talus; die Trennung verläuft dann in der hinteren Lippe der Rinne, in welcher die Sehne des Flexor hallucis longus verläuft. Nach *Jabouley* ist dieser pyramidenförmige hintere Knochenvorsprung eine echte Epiphyse, und handele es sich demgemäss bei der Abtrennung desselben um eine traumatische Epiphysenlösung. *Ballenghien* erzeugte diese Verletzung experimentell an der Leiche.

Die Fragmente des gebrochenen Talus selbst bleiben entweder an ihre Stelle liegen, oder sie sind dislocirt, wobei sie dieselben Verschiebungen erleiden können, wie der vollständig luxirte Talus. In der Regel wird der Kopf des Talus gegen den Fussrücken, sein Körper aber gegen die Achillessehne verlagert.

Die **Symptome** einer isolirten, **nicht dislocirten** Talusfractur sind wesentlich die einer schweren Distorsion. Unfähigkeit, auf dem Fuss zu stehen, tief liegender Schmerz vermehrt durch irgend welche Bewegungen des Fusses, starke Schwellung und Quetschung in der Gegend des Talus, Bluterguss in und um das Fussgelenk müssen immer an eine Fractur desselben denken lassen. Die Contouren der Malleolen und der Achillessehne sind häufig völlig verwischt, doch ist zuweilen ein Knöchel abnorm prominent. Fast regelmässig sieht man Ecchymosen in der Knöchelgegend, namentlich unter dem innern Knöchel auftreten.

Ist eine **Dislocation der Fragmente vorhanden**, so steht der Fuss fast regelmässig in Plantarflexion und Supination, wenn der Hals des Talus gebrochen ist. Bei anderem Sitz der Fractur kann aber auch ein traumatischer Pes valgus oder plano-valgus vorliegen. Wieder ein anderes Mal — wenn der Talus zertrümmert ist — sind die Malleolen tiefer getreten „das Bein scheint in die Tarsalknochen hineingebohrt zu sein“ (*Ballenghien*).

Zu der Deformität gesellt sich als weiteres wichtiges Symptom der dislocirten Talusfractur das Vorhandensein eines abnormen Knochenvorsprunges. In der Regel liegt dieser, durch das dislocirte Fragment gebildet, vor oder unter einem Malleolus.

Crepitation ist sehr oft nicht zu fühlen. Man überzeugt sich noch am ersten von ihr dadurch, dass man den Fuss abwechselnd von vorn nach hinten und von einer Seite zur andern schiebt. Selbst wenn aber Crepitation vorhanden, ist sie sehr schwer richtig zu localisiren. Vor allen Dingen muss man durch genaue Betastung der Tibia und Fibula eine Verletzung dieser auszuschliessen suchen.

Die Diagnose ist bei der nicht dislocirten Fractur schwierig. Leichter wird sie bei den mit Dislocation einhergehenden Brüchen. Bei diesen findet man im Allgemeinen die Zeichen der Talusluxation, nur dass die Hervorwölbung auf dem Fussrücken oder zu beiden Seiten der Achillessehne nicht so deutlich ausgesprochen ist, wie bei der Verschiebung des ganzen Talus.

Die **Prognose** stimmt wesentlich mit derjenigen der Talusluxationen überein. In günstigen Fällen kann die Gebrauchsfähigkeit des Fusses wieder hergestellt werden, in ungünstigeren kommt es zur Ankylose des Fussgelenkes oder zur Necrose der Fragmente mit deren Folgen. Complicirte Fracturen können durch Vereiterung des Gelenkes das Leben gefährden.

Die **Therapie** nicht dislocirter Brüche besteht in Fixation des rechtwinklig gestellten Fusses für 3 bis 4 Wochen in einem Gypsverband; später folgt Massage und Gymnastik. Bei dislocirten Brüchen muss man die Reposition versuchen, indem man am Fuss extendirt, ihn noch mehr in eine etwa vorhandene falsche Stellung hineindrängt und das Fragment dann direct an seine Stelle drückt. Sollte die Reposition missglücken, so könnte man dem Fusse wohl eine möglichst gute Stellung geben und in dieser die Heilung erstreben, besser wäre es aber jedenfalls

für die spätere Function, wie bei der Talusluxation entweder die offene Reposition oder die aseptische Exstirpation der hindernden Fragmente vorzunehmen. Die Tibia stützt sich dann später auf den zurückgebliebenen Talusrest, die sich berührenden Knochenflächen schleifen sich gegen einander ab, und der Fuss wird wieder ganz brauchbar (*Thierry*). Bei einem Falle von schlecht geheilter Talusfractur hat *P. Bruns* noch durch nachträgliche Exstirpation des Talus ein sehr gutes Resultat erreicht.

Brüche des Calcaneus.

Der Calcaneus, das Fersenbein, besteht fast ausschliesslich aus spongiöser Substanz, dieselbe ist nur von einer ganz dünnen Compacta überzogen. Die Spongiosabälkchen verlaufen genau den Gesetzen der Statik entsprechend. Der ganze Knochen ist sehr elastisch und besitzt eine erhebliche Druckfestigkeit (*A. Schmitt*).

Die Brüche des Calcaneus sind nach den Mittheilungen in der Litteratur seltene Verletzungen, stehen doch die Brüche sämmtlicher Fussknochen zusammengenommen in der Fracturstatistik mit kaum 2 % verzeichnet (*P. Bruns*). Wahrscheinlich sind aber die Fersenbeinbrüche viel häufiger, als sie bisher mitgetheilt worden sind. Sie werden nämlich vielfach verkannt und als einfache Distorsionen oder Contusionen des Fussgelenkes aufgefasst. Namentlich durch die genaue Untersuchung der Unfallverletzten ist man auf die relativ recht bedeutende Häufigkeit der Calcaneusbrüche aufmerksam geworden und haben uns die letzten Jahre eine Reihe von Arbeiten (*F. Bähr*, *Thiem*, *Körte*, *A. Schmitt*, *Golebiewski*) gebracht, welche unsere Kenntniss von den Calcaneusbrüchen wesentlich gefördert haben.

Die Brüche des Calcaneus sind typische Verletzungen, und zwar beobachtet man wesentlich 4 verschiedene Bruchformen:

1. den Rissbruch des Fersenhöckers,
2. den Compressionsbruch des Calcaneuskörpers,
3. den Bruch des Sustentaculum tali und
4. den Bruch des Proc. inframalleolaris.

Man könnte auch wohl, wie es *Golebiewski* vorgeschlagen hat, Brüche des Calcaneuskörpers und Brüche seiner Fortsätze unterscheiden.

I. Der Rissbruch des Fersenhöckers

lässt seine Ursache schon durch seinen Namen erkennen. Es handelt sich um eine gewaltsame Contraction der Wadenmuskeln, die den Fersenhöcker vermittelst der Achillessehne abreissen. Die Veranlassung bildet in der Regel ein Fehltritt, ein Sprung oder Fall auf die Füsse, wobei die Contraction des Gastrocnemius und Soleus das Gleichgewicht des Körpers zu erhalten strebt. Ausser dem Muskelzug sind bei solchem Zustandekommen der Fractur aber auch wohl noch weitere Komponenten im Spiele, nämlich die nach abwärts gerichtete, auf dem Fersenbeinkörper lastende Schwere (*Gussenbauer*) und der Gegenstoss, den der Fersenhöcker bei dem Auftreffen auf den Boden von Seiten dieses letzteren erfährt (*Golebiewski*).

Die Bruchlinie verläuft stets quer. Im Ganzen selten ist bloss die Ansatzstelle der Achillessehne losgerissen. In der Regel liegt die Zusammenhangstrennung vielmehr hinter der Articulatio talo-calcanea. Sie löst also den ganzen hinteren Fortsatz des Calcaneus ab. Das abgebrochene Fragment wird durch die elastische Retraction der Wadenmuskeln nach oben gezogen. Diese Verschiebung nach aufwärts ist jedoch meist unbedeutend, weil die Plantarfascie und die im Zusammenhang mit ihr von der untern Fläche des abgerissenen Fersenhöckers entspringenden Muskeln, oft auch das starke Lig. calcaneo-cuboideum das Fragment fixiren.

Die **Symptome** lassen den Bruch leicht erkennen. Im Augenblick des Bruches fühlt der Kranke ein Krachen an der Ferse und zugleich heftigen Schmerz. Er fällt hin und vermag nicht mehr aufzustehen, viel weniger aufzutreten. Die Fussspitze steht durch den antagonistischen Zug der Dorsalflexoren nach aufwärts gerichtet. Die Dislocation des Fersenhöckers nach oben giebt sich dadurch zu erkennen, dass der Vorsprung der Ferse am kranken Fuss weniger deutlich ist als am gesunden Fuss. Man fühlt auch wohl die Diastase der Fragmente und kann den bestehenden Zwischenraum durch Streckung im Knie und Dorsalflexion des Fusses noch vergrössern. Selten wird man den unteren Rand des vorderen Bruchstückes in der Fusssohle fühlen können. Das nach oben dislocirte Fragment ist frei beweglich, auch lässt sich durch Herabdrängen und Verschiebung desselben am untern Fragment Crepitation erzeugen.

Häufiger als dieser Bruch ist der

2. Compressionsbruch des Calcaneus.

Dieser Compressionsbruch des Calcaneus (*Middeldorpf*) oder auch wohl Zerquetschungsbruch (*König*) oder Sternbruch (*Hueter*) oder Fracture par écrasement (*Malgaigne*) oder Stauchbruch (*Golebiewski*) genannt, kann wohl gelegentlich durch einen Schuss oder das Ueberfahren eines Wagenrades entstehen, kommt in eigentlich typischer Weise aber meistens durch einen Fall auf die Ferse von bedeutender Höhe herab zu Stande. Dabei wird der Calcaneus zwischen dem Boden und dem Talus zusammengepresst, während der letztere noch dazu wie ein Keil wirkt und mehr oder weniger tief zwischen die beiden seitlichen Hälften des Calcaneus eintritt. Der innere Abschnitt des Calcaneus leidet dabei immer mehr als der äussere, da die durch die Tibia ziehende Schwerlinie auf seinen innern Rand fällt.

Fig. 404.



Gemäss dieser Entstehung findet man den Bruch des Calcaneus gelegentlich doppelseitig.


Der comprimirte Calcaneus wird in seiner äusseren Form zuweilen nur wenig verändert. Sein Gewebe ist dabei aber zerquetscht, zertrümmert und verdichtet, auch können sich von der Rindensubstanz wegen ihrer grösseren Sprödigkeit, einzelne Splitter losgelöst haben. In andern Fällen ist der Calcaneus niedriger und platter, aber auch breiter gedrückt worden, gerade so wie der comprimirte Wirbelkörper, indem sich die Splitter in einander einkeilen (Fig. 404).

Analysirt man die Bruchform näher, so setzt sich der typische Compressionsbruch in der überwiegenden Anzahl de Fälle aus zwei gleichzeitig vorhandenen Bruchformen zusammen: einem Querbruch und einem Längsbruch, neben welchen sich dann nicht selten noch mehr oder weniger atypische Splitterungen finden können. Der Querbruch verläuft meist von der Articulatio

talo-calcanea, durch den Sinus tarsi hindurch. Nicht selten zeigt sich eine Abweichung in der Art, dass die Bruchlinie etwas nach innen oben, über das Astragalusgelenk hinwegziehend, das Sustentaculum tali schneidet. In ersterem Falle wird also der Proc. anterior allein, in letzterem gleichzeitig das Sustentaculum Tali ganz oder theilweise vom übrigen Fersenbein abgetrennt.

Der Längsbruch verläuft beinahe stets horizontal und meist etwas näher der Sohlenfläche wie dem oberen Ab-


Fig. 405.



schnitt des Fersenbeines. Häufig hat er die Richtung von hinten unten nach vorn oben. Von dieser schrägen Spalte gehen dann mehr oder weniger zahlreiche seitliche Nebenspalten aus (Fig. 405).

Die **Symptome** des Quetschungsbruches können dadurch leicht verwischt werden, dass sich sehr bald eine bedeutende Schwellung und Verbreiterung der Ferse entwickelt (Fig. 406). Diese Anschwellung setzt sich meist auf die Knöchelgegend fort, sodass man anfangs eher einen Knöchel- oder Fibularbruch vermuthet. Sieht man aber genauer zu, so bemerkt man gewiss, dass die Hauptschwellung an den Seitentheilen des Calcaneus sitzt, die Furchen zu beiden Seiten der Achilles-

Fig. 406.



sehne sind ausgefüllt. Fühlt man genauer zu, so wird man erkennen, dass diese Schwellung eine beträchtliche Resistenz zeigt, wie sie nur von einer Verbreiterung des Knochens herrühren kann. Besonders auffallend ist dies an der innern Seite über dem Talocalcanealgelenk und an der äussern Seite, wo die Vertiefung unterhalb des äusseren Knöchels durch feste Knochenmasse ausgefüllt zu sein pflegt. Fernerhin erscheint das Fussgewölbe zusammengesunken und der Fuss abgeplattet und zwar um so mehr, je mehr die Zertrümmerung den mittleren Theil des Calcaneus getroffen hat. Die Knöchelspitzen sind der Sohle genähert. Bewegungen am Fersenhöcker sind sehr schmerzhaft und lassen zuweilen eine weiche, undeutliche Crepitation fühlen. Ebenso schmerzhaft ist das Auftreten auf den Fuss, daher es unterlassen wird. Wenn keine Complication durch gleichzeitige Verletzung des Talus vorliegt, so können Bewegungen im Talocruralgelenk, also im Wesentlichen Flexionsbewegungen noch ausgeführt werden. Alle anderen Bewegungen aber, Pronation und Supination, Abduction und Adduction sind wegen der excessiven Schmerzhaftigkeit des Talocalcaneonaviculargelenkes ausgeschlossen.

Die eben angeführten Symptome kennzeichnen den mit ausgedehnter Splitterung einhergehenden Fersenbeinbruch. Bei anderen Fällen, in denen die Dislocation der Fragmente fehlt und nur Sprünge im Innern des Calcaneus vorhanden sind, fällt vorzüglich die Deformität weg.

Als constante Symptome, welche für alle Fälle zutreffen, können wir mit *F. Bähr* und *Golebiewski* etwa folgende betrachten: Die Schwellung, welche immer deutlich an die abwärts vom Fussgelenk gelegene Partie gebunden ist, die Druckempfindlichkeit des Fersenbeines, die Behinderung der Fussbewegungen im Sinne der Pronation und Supination, die heftige Schmerzhaftigkeit beim Gehen.

Was den Gehakt betrifft, so pflegen die Patienten mit Bruch des Fersenbeinhöckers meist auf der Fussspitze aufzutreten, während beim Sitz der Fractur vorzugsweise an den unter dem Talus gelegenen Partieen, der Fuss dorsal flectirt gehalten, mit der Ferse aufgesetzt und nicht abgewickelt wird.

Bei Verletzungen des Proc. anterior calcanei werden die Schmerzen, gerade wie beim schmerzhaften Plattfuss, be-

sonders nach vorn und aussen vom Malleolus externus localisirt.

Es bleibt noch zu erwähnen, dass bei vorzugsweiser Verletzung der medialen Hälfte des Calcaneus der Fuss gelegentlich auch einmal eine deutliche Klumpfussstellung beibehalten kann.

3. Brüche des Sustentaculum Tali.

Das Sustentaculum tali, jener Fortsatz an der vorderen inneren Hälfte des Calcaneus, der dem Talus zur Stütze dient und an seiner plantaren Fläche eine Rinne für den M. flexor hallucis longus trägt, bricht zuweilen für sich ab. Die Kenntniss dieses Bruches verdanken wir *Abel*, der ihn auf Grund dreier eigenen Beobachtungen studirte.


Wir führen am besten diese drei Fälle hier an. In dem ersten Fall war ein Soldat von einem durchgehenden Pferde gesprungen und mit dem linken Fuss in forcirter Supinationsstellung umgeknickt. Der Fuss stand nach der Verletzung in Valgusstellung, das Fussgelenk war durch eine scharfrandige Wunde weit eröffnet. Es wurde eine Fractur oder Infraction der Fibula angenommen. Der Patient ging am 15. Tage an Sepsis zu Grunde. Bei der Section zeigte sich das Sustentaculum tali vollständig vom Körper des Calcaneus abgesprengt und etwas nach unten gesenkt.

Im zweiten Fall wurde bei einem Rekruten die Diagnose auf diese Fractur aus folgenden Symptomen gestellt: Er war vor 3 Jahren beim Turnen mit dem Fusse umgeknickt und 7 Wochen zum Gehen unfähig gewesen. Bei der Untersuchung stand der linke Fuss in einer Art Valgusstellung, doch so, dass der Fuss mit dem innern Rand und weit in die Sohle hinein nicht auftrat. Der innere Knöchel war normal, das Sustentaculum tali mindestens von doppelter Dicke als am gesunden Fuss und auf Druck empfindlich.

Der dritte Fall betraf einen Soldaten, der sich so mit dem Pferde überschlagen hatte, dass der linke Fuss unter das Pferd zu liegen kam. Als er sich aufzurichten versuchte, ging der Fuss unter deutlichem Knarren aus der Varusstellung in die Valgusstellung über. Plantar- und Dorsalflexion des Fusses waren möglich, active Ab- und Adduction dagegen völlig aufgehoben. Die Heilung erfolgte eben-

falls in starker Valgusstellung, wie dies die nach der betreffenden Photographie gezeichnete Abbildung (Fig. 407) deutlich erkennen lässt.

Fig. 407.



Nach diesen 3 Fällen und auf Grund von Experimenten glaubt *Abel*, die Diagnose der Fractur aus folgenden Momenten stellen zu können:

1. aus der Art der Entstehung, indem die Veranlassung eine forcirte Adduction des Fusses ist,
2. aus der unmittelbar nach der Verletzung eintretenden Valgusstellung des Fusses,
3. aus einer leichten Verkürzung der Ferse in Folge einer geringen Verschiebung des Calcaneus nach vorn,
4. aus der localisirten Druckempfindlichkeit und der Unbrauchbarkeit des Fusses.

Auszuschliessen hat dabei die Diagnose den Compressionsbruch des Calcaneus, eine Fractur der Fibula oder des Malleolus internus, eine Luxation oder Fractur des Talus und schliesslich eine reine Distorsio pedis.

4. Brüche des Processus inframalleolaris des Calcaneus

scheinen äusserst selten zu sein. Wir kennen nur wenige Fälle, so von *A. Bidder* und neuerdings von *Golebiewski*.

Processus inframalleolaris heisst nach *Hyrtl* ein höckerartiger Vorsprung, der sich zuweilen an der äusseren Fläche des Calcaneus findet, schief nach vorn und unten gerichtet ist und hinter sich eine mit Knorpel überzogene Furche besitzt, in welcher die Sehne des Musculus peroneus longus verläuft. Ausnahmsweise wird dieser Vorsprung so hoch, dass er fast im Niveau des äusseren Knöchels liegt und die ihn bedeckende Haut hügelartig emporhebt.

Eine Fractur dieses Fortsatzes beobachtete *Bidder* und deutete dieselbe als Rissfractur durch das Ligamentum calcaneo-

fibulare. Der Patient war von einer Höhe herabgesprungen und mit dem Fuss nach innen umgeknickt, so dass also die Körperlast auf den adducirten Fuss einwirkte. Dadurch sollte das Lig. calcaneo-fibulare angespannt worden sein und den Fortsatz abgerissen haben. *Golebiewski* und *Bähr* haben neuerdings gegen diese Deutung Einspruch erhoben, indem sie darauf hinwiesen, dass sich das Lig. calcaneo-fibulare nicht an dem Proc. trochlearis, sondern nach hinten von demselben inserirt. *Golebiewski* hält die Fractur für eine directe.

Die **Symptome** waren in dem Falle *Bidder*'s folgende: Patient konnte nicht auf den Fuss auftreten und hatte grosse Schmerzen. Am Fuss und Fussgelenk war Alles normal. Unterhalb des Malleolus externus war die äussere Fläche des Fusses mässig geschwollen, die Haut sugillirt. Beim Abtasten fand sich 2 cm unter der Spitze des Malleolus ein ungefähr 2 cm langes, 1 cm breites Knochenstück, dessen Längsachse ziemlich parallel derjenigen des Fusses lag. Es konnte nach vorn und rückwärts verschoben werden, wobei starke Crepitation entstand. Am gesunden Fuss war ebenfalls ein auffallend starker Proc. inframalleolaris vorhanden.

Die **Prognose der Calcaneusfracturen** ist keine günstige. Die meisten Collegen, die sich mit der Nachuntersuchung der Calcaneusfracturen beschäftigen, klagen über den unsicheren Gang, den ihre Patienten viele Jahre, ja oft zeitlebens behalten. Eine Reposition der Compressionsbrüche ist ja auch fast unmöglich, wenn man nicht darunter vielleicht die Befreiung des Talus aus dem Calcaneus durch Extension an der Ferse und dem Fussrücken verstehen will. Der Fuss bleibt also auch nach der Heilung abgeplattet, und diese Plattfussstellung kann sogar sehr bedeutend werden. Wie neuerdings namentlich *F. Bähr* hervorgehoben hat, ist es aber nicht allein der Plattfuss oder der Klumpfuss, der die Patienten schädigt, oder die in der Regel nicht hochgradige Muskelatrophie, sondern es kann auch die Consolidation des Calcaneus eine mangelhafte sein, der Bruch kann mit Verschiebung der oft zahlreichen Bruchstücke in- und aneinander heilen, und es können dadurch Unebenheiten, selbst spitzige Knochenvorsprünge zurückbleiben, welche einen Reiz auf die benachbarten Gewebe ausüben, kurz die Schmerzen, über welche die Patienten noch lange Zeit nach der Fractur klagen sind wohlberechtigt.

Die knöcherne Heilung selbst erfolgt sehr langsam. *Gurlt* giebt als Durchschnittsdauer 60 Tage an. Jedenfalls bedingen die Brüche

oft eine recht lange Beeinträchtigung der Function des Fusses, in vielen Fällen ganz erheblichen Grades.

Besser ist die Prognose der Rissbrüche. Diese heilen innerhalb 30—40 Tagen und zwar durch knöchernen Callus. Die Angabe, dass die Vereinigung immer nur durch Pseudarthrose erfolgt, ist unrichtig.

Das abgebrochene Sustentaculum Tali heilt rasch knöchern an. Es kann aber auch hier, wie wir gesehen haben, eine Deformität und Unbrauchbarkeit des Fusses zurückbleiben.

In dem *Bidder*'schen Fall von Bruch des Proc. inframalleolaris erfolgte das Zusammenwachsen der getrennten Knochenflächen rasch und ohne Hinderniss, und es stellte sich die normale Gehfähigkeit viel eher ein, als nach den Brüchen des Malleolus externus.

Für die **Therapie** genügt bei den einfacheren Calcaneusbrüchen, der Fractur des Sustentaculum tali und des Proc. inframalleolaris, ein gut sitzender Gypsverband, der den rechtwinklig stehenden Fuss und den Unterschenkel umfasst.

Bei den Rissbrüchen hat man bisher auch meistens einen Gypsverband oder eine Gypsschiene oder eine vordere Drahtschiene angelegt und zwar, nachdem man das Knie stark gebeugt, den Fuss plantarflectirt und den Patienten auf die Seite gelegt hatte, um seine Wadenmuskulatur zu erschlaffen und die beiden Fragmente einander entgegenzuführen. Diese hielt man dadurch zusammen, dass man einen Heftpflasterstreifen auf die Mitte der Wade aufklebte, ihn über den Fersenhöcker der Länge nach herüberführte und wieder auf der Fusssohle befestigte. Darüber kam dann der Contentivverband.

Ein einfacheres und sichereres Verfahren hat sich *Gussenbauer* bewährt. Da die Reposition der Fragmente in seinem Falle auch in der Narcose nicht gelang, so setzte er einen *Langenbeck*'schen Knochenhaken in das hinaufgezogene Fragment ein, zog dieses dann mit dem Haken herunter und schlug dann durch beide Bruchstücke einen dreikantigen Nagel in horizontaler Richtung ein. Jodoformgazeverband. *Petit*'sche Schiene. Reactionsloser Verlauf. Entfernung des Nagels nach 6 Wochen. Vollständige Konsolidation und Heilung.

Auf Grund dieses Falles empfiehlt *Gussenbauer* die Nagelung des abgerissenen Fragmentes als das zweckmässigste Verfahren zur Behandlung der Rissbrüche.

Bei den Compressionsbrüchen legt man das Glied zunächst in eine *v. Volkmann*'sche T-Schiene oder in eine Sus-

pensionsvorrichtung (*Beely*'sche Gypshanfschiene) und legt den Gypsverband erst nach 8—14 Tagen an, nachdem die Abschwellung erfolgt ist. Man lässt diesen Gypsverband dann recht lange liegen, etwa bis zum Ende des 2. Monats nach der Fractur, denn die Fractur heilt um so besser und fester, je länger die Belastung der Fersenbeine unterbleibt. Namentlich ist vor zu frühzeitigen Gehversuchen zu warnen, denn gerade diese befördern das Zustandekommen der abnormen Stellungen des Fusses, der Oedoeme und der heftigen Druckschmerzen unter der Ferse.

Nach Abnahme des Verbandes gibt man den Patienten für die ersten Jahre am besten noch passende Schuhe mit entsprechenden Einlagen oder lässt ihnen auch wohl zweckmässige Schienenhülsenapparate anfertigen.

Gegen die Muskelatrophie, die Steifigkeiten der Gelenke, die Schrumpfungen der Weichtheile geht man dann energisch mit Bädern, Massage, Gymnastik und Elektrotherapie vor und kann dadurch die Erwerbsfähigkeit der Patienten doch oft noch erheblich bessern. Die Behandlungsdauer soll auf jeden Fall nicht zu kurz bemessen werden. Es dauert gelegentlich mehrere Jahre, bis die Patienten wieder leidlich im Stande sind zu arbeiten.

Brüche des Os naviculare, cuboides, der Ossa cuneiformia sowie der Metatarsalknochen und der Phalangen.

Die Brüche aller dieser Knochen haben nichts Charakteristisches. Wir können hier wesentlich auf die gleichen Verletzungen an der Hand hinweissen.

Sie entstehen in der Regel nur durch schwere directe Gewalteinwirkungen, wie Auftreffen schwerer Lasten oder eines Projectiles oder Ueberfahrenwerden. Selten ist ein Fall auf die Fussspitze die Veranlassung.

In den Vordergrund tritt wieder die durch die starke Quetschung bedingte Anschwellung der Weichtheile. Oft ist auch die Fractur eine complicirte, so dass die zertrümmerten Knochen blossgelegt sind.

Die kleinen spongiösen Knochen der Fusswurzel erleiden meist Compressionsfracturen, ähnlich wie die Wirbelkörper und der Calcaneus.

Die Metatarsalknochen sind in einfacheren Fällen leicht schief gebrochen und leicht dislocirt. Nur, wenn mehrere derselben frac-

turirt sind, können sich die Fragmente nach dem Dorsum oder der Planta des Fusses verschieben. An den Zehenphalangen kommen gelegentlich Längsfracturen vor.

Die **Symptome** treten uns entgegen als heftiger Schmerz, Anschwellung, Functionsstörung, Deformität und schliesslich als abnorme Beweglichkeit und Crepitation.

Die **Prognose** dieser Verletzungen ist im Ganzen günstig bei einfacheren Verhältnissen. Die complicirten Fracturen waren früher wegen der Gefahr der Eiterung in den Sehnenscheiden und Gelenken sehr gefürchtet. Sie verlaufen aber unter dem Schutze der Antiseptik gut.

Die knöcherne Heilung erfolgt in 3- 5 Wochen.

Die **Therapie** besteht in der Ausgleichung etwa bestehender Dislocationen, Stellung des Fusses in einen rechten Winkel zum Unterschenkel und Fixation desselben auf einer T-Schiene bis zur erfolgten Abschwellung. Dann kann man den Gypsverband anlegen.

Bei complicirten Fracturen und beträchtlicher Zertrümmerung der Knochen sucht man möglichst conservativ vorzugehen.

Luxationen des Calcaneus.

Eine isolirte Luxation des Calcaneus, d. h. eine Trennung desselben vom Talus und Os cuboides, hält *Lossen* trotz der Bedenken *Broca*'s doch für möglich, da einige unzweifelhafte Fälle in der Litteratur verzeichnet sind. So berichtet *Dumas* über zwei Beobachtungen, in denen der Calcaneus nach aussen verrenkt war. In beiden Fällen fühlte man unter dem tief in die Weichtheile versenkten Malleolus externus die äussere und obere Fläche des Calcaneus, dessen vorderer, mit dem Os cuboides articulirender Fortsatz über diesem einen deutlichen Vorsprung bildete. Der normal stehende Talus sprang nach innen vor. Unter ihm fehlte die Resistenz des Calcaneus. Im zweiten Fall war das Os cuboides noch für sich von den Metatarsalknochen nach aussen gewichen, während der Vorsprung des Os metatarsi V. in den Weichtheilen verschwunden war.

Eine Verwechslung mit einer Luxatio pedis sub talo kann hier wohl nicht angenommen werden. Der über dem Os cuboides hervorragende Knochen konnte nicht der Kopf des Talus gewesen

sein, da bei der Luxatio sub talo nach aussen das Caput tali am inneren Rande des Fusses hervorspringt (*Lossen*).

Im ersten Fall entstand die Luxation durch Auffallen eines Balkens auf die Innenseite des Fusses und des Unterschenkels, so dass der Calcaneus gewissermassen direct nach aussen verschoben wurde.

Der zweite Fall war klarer. Der rechte Fuss war mit der Ferse eingeklemmt, und der Stamm wurde in diesem Moment gewaltsam nach links umgeworfen.

Die **Reposition** gelang beide Male durch Zug am Unterschenkel in der Richtung nach aussen und Druck gegen den Calcaneus nach innen.

Luxationen des Os cuboides.

Luxationen des Würfelbeines sind sehr selten. *Bähr* beobachtete dreimal Subluxationen desselben gegen den Calcaneus nach oben.

Luxationen des Os naviculare.

Das Os naviculare bleibt bei der Luxatio sub talo zuweilen an dem Talus haften und tritt aus der Verbindung mit den drei Keilbeinen heraus (*Malgaigne*, *Burnett*).

Die eigentliche Luxation des Os naviculare, bei der auch seine Verbindung mit dem Talus gelöst wird, ist äusserst selten. Jedenfalls entsteht sie nur durch sehr complicirte und drehend wirkende Gewalten. Der luxirte Knochen tritt entweder am inneren Fussrande oder am Fussrücken hervor. Nach *Bähr* existiren nur 5 sichere Beobachtungen in der Litteratur.

Die **Symptome** der vollständigen Kahnbeinverrenkung waren sehr deutlich. Der innere Fussrand war verkürzt und zeigte 1 cm unter der Tibia einen scharfen Vorsprung der offenbar dem Os naviculare angehörte. Ausserdem fehlte die Tuberositas ossis navicularis an der normalen

Stelle. Bei der Section stand das verrenkte Os naviculare auf dem Halse des Talus. Die 3 Keilbeine und der I. und II. Metatarsalknochen waren mit ihm nach oben geschoben.

Luxationen der Keilbeine.

Nach *Bähr* sind bisher folgende Varietäten der Keilbeinluxationen beobachtet worden. Man hat Luxationen des ersten Keilbeines allein, Luxationen des ersten und zweiten Keilbeines, Luxationen des zweiten Keilbeines allein, Luxationen des zweiten und dritten Keilbeines allein, Luxationen des dritten Keilbeines allein, Luxationen des ersten Keilbeines mit dem zugehörigen Metatarsus, Luxationen des zweiten und dritten Keilbeines mit Metatarsus II und III, und schliesslich Luxationen der drei Keilbeine mit den drei Metatarsen beobachtet.

Die Ursache war bald ein Fall auf die Fussspitze, bald der Druck eines Wagenrades. Bei der Luxation des Os cuneiforme primum war entweder der Knochen aus allen Verbindungen gelöst und nach oben oder innen verschoben, oder er hing noch mit seinem Metatarsalknochen zusammen.

R. Smith hatte Gelegenheit, zwei veraltete Fälle der letzteren Art zu seciren.

Die **Symptome** waren folgende: Der vordere Abschnitt des Fusses war verkürzt, obwohl Talus und Unterschenkel sich ganz normal verhielten. Auf dem Fussrücken bildete das luxirte Keilbein einen Vorsprung. Die Planta pedis war nach einwärts gedreht und sowohl von vorn nach hinten, als von einer Seite zur anderen convex.

Die Luxation aller 3 Keilbeine auf das Os naviculare wurde nach Fall auf die Füsse (*Monteggia*) und nach Ueberfahren eines Wagenrades (*Key*) beobachtet.

In einem veralteten Fall, welcher der letztgenannten der obigen Varietäten angehört, fand *Bertherand* den inneren Fussrand verkürzt, die Wölbung des Fussrückens vergrössert. Auf ihm bildete der hintere Rand der Ossa cuneiformia einen queren Vorsprung, über welchem die Strecksehnen deutlich zu palpiren waren.

Die **Reposition** aller Luxationen des Os naviculare und der Keilbeine gelingt am besten, wenn man die Fusspitze stark nach abwärts drängt und dann einen directen Druck auf die verrenkten Knochen ausübt.

Im Allgemeinen soll man bei der Reposition mit allen Mitteln eine Vergrösserung der Lücke anstreben, aus welcher der Knochen herausgetreten ist (*Bähr*).

Nach geschehener Reposition wird das erreichte Resultat durch Aufkleben von Heftpflasterstreifen und Fixation des Fusses gegen eine passende Schiene zu erhalten gesucht.

Bei veralteten Subluxationen muss geeignetes Schuhwerk beschafft werden. *Bähr* empfiehlt der Sohle des Schuhes eine solche Form zu geben, dass beim Gehen möglichst eine Veränderung des Fussgewölbes vermieden wird.

Nélaton exstirpirte in einem Fall das I. Keilbein, das sich quer über das II. gelagert hatte.

Luxationen der Metatarsalknochen.

Die Verrenkung des *Lisfranc*'schen Gelenkes kann entweder alle Metatarsalknochen oder nur einen Theil oder selbst nur einen derselben betreffen. Ferner kann die Luxation eine vollkommene oder unvollkommene sein.

Die Verletzung selbst ist eine seltene. *Hitzig* stellte 1865 29 Fälle zusammen.

Seitdem finde ich nur noch 11 weitere Veröffentlichungen.

I. Die Luxation aller Metatarsalknochen

kann nach oben (dorsal), nach unten (plantar), nach aussen und innen stattfinden.

Am häufigsten ist die **Luxation nach oben.** Als Ursachen derselben fand man das Ueberfahren eines Wagenrades über den Fuss, das Auffallen einer schweren Last, also Gewalten, welche das Fussgewölbe von oben nach unten plattdrücken, so zwar, dass die Reihe der Keilbeine und das Os cuboides hinter den Metatarsalknochen nach abwärts gedrängt werden. Die Köpfchen der Mittelfussknochen erscheinen dann auf dem Fussrücken.

Auch durch Sturz aus der Höhe sind derartige Luxationen veranlasst worden. Vielleicht trafen dabei die Köpfchen der Metatarsalknochen auf eine Bodenunebenheit auf, während die Ossa cuneiformia und das Os cuboides durch die Last des Körpers nach abwärts gedrückt wurden.

Die **Symptome** der Luxation sind unmittelbar nach der Verletzung sehr bezeichnend. Der Fussrücken ist gewölbt, die Fusssohle abgeplattet. Auf dem Dorsum sieht und fühlt man die Reihe der vorspringenden Metatarsalköpfchen. Ueber diese verlaufen die Strecksehnen und halten durch ihre Spannung die Zehen in Dorsalflexion. Der Fuss ist verkürzt, bei den vollständigen Luxationen mehr als bei den Subluxationen. Die Fussspitze oder auch wohl der ganze vordere Abschnitt des Fusses ist nach innen gewendet, indem das Os metatarsi I. am stärksten nach oben und innen gedrängt wird. Die Haut ist im Ganzen selten verletzt.

Die **Luxation nach unten** ist sehr viel seltener. Sie entsteht durch forcirte Dorsalflexion (*Smyly*). Auf dem Fussrücken zeigt sich ein querer, von der Fusswurzel gebildeter Vorsprung. Vor diesem befindet sich eine tiefe Rinne. Der ganze Metatarsus drängt sich in der Planta pedis vor. Der Fuss ist verkürzt.

Die **Luxationen nach aussen und innen** sind wegen der Einfalzung des Os metatarsi II. zwischen das I. und III. Keilbein direct nicht möglich. Entweder bricht dieser Knochen, oder was das Gewöhnlichere ist, die Luxation entsteht secundär aus einer Verrenkung nach oben.

Als Beispiel der Luxation nach aussen führen wir den Fall von *Lacombe* an, der diesen selbst betrifft. *Lacombe* war mit dem Pferd gestürzt und unter dasselbe zu liegen gekommen. Sein Fuss lag mit dem äusseren Rand auf, die Fussspitze aber gerieth über eine Bodenvertiefung, als das Pferd nochmals auf die Seite fiel und mit seiner Last den vorderen Abschnitt des Fusses derart krümmte, dass er mit dem Os cuboides und dem Calcaneus einen stumpfen Winkel bildete. Der Metatarsus wich nach aussen, und man konnte deutlich am äusseren Fussrand den Fortsatz des V. Metatarsalknochens, am inneren das I. Keilbein vorragen sehen. Der Fuss war verkürzt und abgeplattet.

Von der Verrenkung nach innen giebt es nur ein Beispiel von *Kirk*. Der Metatarsus bildete an der innern

Seite einen beträchtlichen Vorsprung, an der äussern Seite befand sich die entsprechende Vertiefung.

Die **Prognose** der angeführten Luxationen der Metatarsalknochen ist im Ganzen eine günstige. Die Einrichtung gelang in allen frischen Fällen, und die veralteten zeigten eine leidliche Brauchbarkeit des Fusses zum Gehen.

Die **Reposition** geschieht durch kräftige Extension am Metatarsus, während der Tarsus gut fixirt ist, und directe Impulsion der Metatarsalköpfchen.

Der reponirte Fuss muss für 8 – 14 Tage in einem Verband festgestellt werden.

2. Die Verrenkungen einzelner Metatarsalknochen

entstehen durch dieselben, jedoch mit kleinerem Angriffspunkt wirkenden Gewalten wie die aller Metatarsalknochen. Die Gewalt drückte auch wohl den einzelnen Metatarsus gegen eine unebene, steinige Unterlage.

Die Verschiebung der mittleren Knochen findet nach oben und unten, die des I. und V. auch nach innen, beziehungsweise aussen statt.

Die **Symptome** lassen sich leicht erschliessen, wenn man das über die Luxation aller Metatarsalknochen Gesagte durchliest.

Die **Reposition** stiess zuweilen auf Schwierigkeiten, da der Zug am ganzen Metatarsus auf den einzelnen Knochen wenig Einfluss hat. Im Nothfalle wird man unter aseptischen Cautelen die Gelenkspalte blosslegen und den Knochen hineinhebeln oder sein Köpfchen reseciren.

Luxationen der Zehen.

I. Luxationen der Metatarsophalangealgelenke

ereignen sich vorzugsweise an dem betreffenden Gelenk der grossen Zehe. Unter 22 von *Malgaigne* angeführten Fällen finden sich 19 des Hallux. Wir nehmen daher diese letztere Luxation als Beispiel. Nach *Bartholomai*'s, unter *Roser*'s Leitung ausgeführten Leichenversuchen kann sie auf die Dorsalfläche des Metatarsus und nach innen erfolgen.


a. Von **der Verrenkung der grossen Zehe auf die Dorsalfläche des Metatarsus** liegen nach einer neueren Zusammenstellung von *Baermann* augenblicklich 29 bekannte Fälle vor. Dieselben ereigneten sich vorzugsweise bei Reitern und Fuhrleuten im Alter von 20—30 Jahren. *Garnier* sammelte 1893 40 Fälle, von denen 21 einfache, 19 complicirte Luxationen waren. 38 Fälle betrafen Männer und $^{4}/_{5}$ der Fälle entstanden durch Fall vom Pferde.

Die Luxation entsteht gerade wie die analoge Verletzung am Daumen durch eine forcirte Dorsalflexion der Zehe. Dabei stemmt sich das Capitulum des Metatarsalknochens gegen die untere Kapselwand an, zerreisst dieselbe und tritt nun nach unten aus, so dass die erste Phalanx auf seinen Rücken zu stehen kommt.

Die forcirte Dorsalflexion selbst kann in verschiedener Weise veranlasst sein. Einmal ist es ein Sprung auf die Zehen, öfter aber eine Gewalt, welche den Fuss von vorn und hinten her in irgend einer Weise einklemmt, so ein Sturz mit dem Pferd, wobei der Fuss des Reiters unter das Pferd zu liegen kommt, oder das Hängenbleiben im Steigbügel beim Herunterfallen vom Pferde oder ein zu kurzes Auftreten des Reiters in den Bügel beim Aufschwingen in den Sattel.

Die Verrenkung ist bald eine vollständige, bald eine unvollständige. Bei der vollständigen Luxation springt die Basis der I. Phalanx auf dem Dorsum des Metatarsus

Fig. 408.



hervor, sodass man zuweilen ihre Facette fühlen kann. In die Planta ragt an entsprechender Stelle der Kopf des Metatarsus vor. Die Zehe steht mit ihrer ersten Phalanx in Dorsal-, mit ihrer zweiten Phalanx in Plantarflexion (Fig. 408). In einzelnen Fällen war sie fast senkrecht aufgerichtet. Stets ist sie etwas verkürzt. Ihre activen Bewegungen sind

aufgehoben. Relativ häufig — 10mal unter 19 Fällen — hatte das Metatarsusköpfchen die Haut der Sohle perforirt.

Bei der unvollständigen Luxation sind die gleichen Zeichen vorhanden, nur minder ausgesprochen.

Die **Prognose** ist gut. Die Reposition macht aber zuweilen Schwierigkeiten. Die Repositionshindernisse sind die gleichen wie am Daumen *(Bartholomai)* und müssen auf dieselbe Weise überwunden werden.

Die **Reposition** geschieht nach *Faraboeuf*'s rationeller Methode dadurch, dass man die bestehende Dorsalflexion noch mehr forcirt und die Phalanx dann mit dem Finger nach vorn drückt.

Bei irreponibler Luxation gilt das bei der Daumenluxation Gesagte. Im Allgemeinen wird man bei frischer, irreponibler Luxation die Arthrotomie, bei veralteter Luxation die Resection des Metatarsuskopfes ausführen.

b. Die **Verrenkung der grossen Zehe nach innen** entsteht durch forcirte Abduction, besonders in rechtwinkeliger Dorsalflexion *(Bartholomai)*.

Es sind nur wenige Fälle bekannt *(Notta, Gold)*. Hier eine Beobachtung *Notta*'s, die die Verletzung erläutern mag. Dem Patienten war ein Wagenrad über den Innenrand des rechten Fusses hinweggefahren. Man fand ausser einer Anschwellung am Fussrücken einen Vorsprung am Innenrande des Fusses, der dem hinteren Ende der Phalanx entsprach. In der Planta bestand keine besondere Deformität. Die Streckbewegung war frei und zeigte deutlich, dass die Excursionen oberhalb des Metatarsusköpfchens stattfanden. Die Beugung war behindert. Bei seinen Versuchen fand *Bartholomai* stets die Phalanx etwas nach innen rotirt, den Kopf des Os metatarsi aber im I. Zwischenknochenraum.

Die **Reposition** gelingt leicht durch Zug an der Zehe und directen Druck auf das Phalangenende. Rationeller wäre eine Abduction, verbunden mit Impulsion der Phalanxbasis.

2. Luxationen der Interphalangealgelenke.

Die Luxationen in den Interphalangealgelenken der Zehen sind die vollständigen Analoga der gleichen Verletzungen an den Fingern. Sie sind aber sehr selten. *Broca* beobachtete eine Luxa-

tion der II. Phalanx der grossen Zehe nach oben, welche durch einen Fusstritt gegen einen Hund entstanden war. Die Einrichtung gelang durch Vorschieben der dorsalflectirten Phalanx. *Pinel* fand eine Luxation der II. Phalanx der grossen Zehe nach innen durch Sturz vom Pferde. Die II. Phalanx war ganz nach innen umgelegt, die I. aber ragte durch einen Hautriss hervor. *J. Riedinger* reponirte eine complete Luxation der zweiten Phalanx der zweiten rechten Zehe auf das Dorsum, die durch Sprung von einer Treppe herab und Auftreffen der Zehe gegen einen Stein entstanden war. Die Zehe erschien in der Gegend des Interphalangealgelenks nach hinten eingeknickt und verkürzt. Das Capitulum der ersten Phalanx lag dicht unter der Epidermis, so dass die Haut beinahe perforirt war.

Die **Reposition** geschieht durch Extension an der Zehe, eventuell vermittelst einer Schlinge, und directe Impulsion der verschobenen Phalanxbasis.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

Druckfehlerverzeichniss.

Seite	16	Zeile	11	von	unten	Motilität statt Mobilität.	
„	28	„	17	„	oben	transversus statt traversus.	
„	66	„	13	„	„	Weichtheilbrücken statt Weichtheilbrüchen.	
„	85	„	16	„	„	Ponfick statt Ponfic.	
„	299	„	12	„	unten	Dumreicher statt Dummreicher.	
„	344	„	1	„	oben	Alcock'sche statt Alkook'sche.	

Register.

(Die Ziffern bedeuten die **Seitenzahlen**.)

A.

Abduction, physiologische, des Kopfes 113.
— — des Vorderarmes 290.
Abductionsfracturen der Malleolen 636.
Acromion, Fracturen 191. 256.
Adam'scher Bogen 465.
Adductionsfracturen der Malleolen 634.
Aequilibrialmethode von *Mojsisovics* 509.
Akidopeirastik, *Middeldorpf*'sche 13. 535.
Alcock'scher Heftpflasterverband 334.
Ambulante Fracturbehandlung 491. 517. 607.
Aran'sches Irradiationsgesetz 36.
Articulatio sacro-iliaca, Anatomie 408.
— — Diastase 414.
— — Luxation 425.
Atlas, Fracturen 86.
— Luxationen 118.

B.

Bändernaht, subcutane, bei Clavicularluxationen 180.
Bardenheuer'sche Feder-Extensionsschiene 167. 192. 236. 251. 269. 288. 329. 365.
Basis cranii, Fracturen s. Schädelbasis.
Becken, Anatomie 407.
— Fracturen 407.
— — Complicationen der 417.
— — Diagnose 421.
— — Frequenz 410.
— — pathologische Anatomie 410.
— — Prognose 421.
— — Symptome 418.
— — Therapie 423.
— Luxationen 424.
— Verticalfractur doppelte 415. 494.
Beckenring 409.
— Fracturen 411.
Beckenstütze 513.
Beely'sche Gypshanfschiene s. Gypshanfschiene.
Beinlade, *Scheuer*'sche 604.
Bigelow'sches Septum 465.
Blase, Lähmung der, bei Wirbelfracturen 94. 102. 106.
— Verletzung der, bei Beckenfracturen 418. 420. 422.
Bonnet'sche Drahthose 487. 510.
Bonnet-Roser'scher Drahtstiefel 605.
Braatz'sche Gypstricotschiene 217.
Bramann'scher Schmetterlings-Verband 544.
Brown-Séquard'sche Halbseitenläsion 96.
Bruns'sche Geh- und Lagerungsschiene 518.
Brustbein, Diastasen 130.
— Fracturen 129.
— Infractionen 131.
Brustwirbel, Fracturen 87.
— Luxationen 127.
Büngner'scher Verband für Clavicularfracturen 165.

C.

Calcaneus, Compressionsfractur 693.
— Fracturen 691.
— Fracturen des Processus inframalleolaris 697.
— Fracturen des Sustentaculum tali 696.
— Luxation 701.
— Rissfractur des Fersenhöckers 692.
— Stauchbruch 693.
Carpalknochen s. Handwurzel.
Carpo-metacarpalgelenke, Luxationen 386.
Carr'sche Vorderarmschiene 363.
Cheyne-Stockes'sches Atmen 19.
Chopart'sches Gelenk, Luxationen 685.
Clavicula, Anatomie 150. 168.
— Doppelfracturen 155.

Clavicula, Doppelluxationen 183.
— Fracturen 150.
— Fracturen des äusseren Drittels 156.
— — — inneren Drittels 158.
— — — mittleren Drittels 153.
— — Prognose 159.
— — Therapie 160.
— Infractionen 153.
— Luxationen 168.
— — am acromialen Ende 177. 254.
— — am sternalen Ende 170.
Colles' Fracture 350. 374.
Collin'sche Zange 396.
Collum femoris s. Femur.
— humeri s. Humerus.
— scapulae s. Scapula.
Comminutivfracturen des Schädels 5.
Commotio cerebri 15.
Compressio cerebri 17.
— medullae spinalis 92.
Condyli femoris s Femur.
— humeri s. Humerus.
Contrafissuren des Schädels 9.
Contrecoup bei Schädelbasisfracturen 35.
Contusio cerebri 20.
— medullae spinalis 92.
Costosternalgelenke, Luxationen der s. Rippen-Luxationen.
Costovertebralgelenke, Luxationen der s. Rippen-Luxationen.
Coup de hâche 641.
Cubitus varus traumaticus. 286.
Cystitis, septische 103.

D.

Darmbein, Fracturen 417.
— Luxationen 425.
Darmlähmung bei Wirbelfracturen 94. 102. 107.
Daumen, Bajonettstellung 392.
— Luxationen 386.
— — complexe 392.
— — im Carpometacarpalgelenk 386.
— — — Interphalangealgelenk 405.
— — — Metacarpophalangealgelenk 387.
Decubitus, acuter 98. 103.
Dentalschienen 56. 65.
Dérangement interne des Kniegelenkes 585.
Diabetes insipidus bei Commotio cerebri 17.
— — — Wirbelfracturen 99.
Diastase des Brustbeines 130.
— der Wirbel 113.
Diploë 1.
Distractionsmethode, *v. Dumreicher*'sche bei Ellenbogenluxationen 299.
Dornfortsätze s. Processus spinosi.
Drahthose, *Bonnet*'sche 487. 510.
Drahtstiefel, *Bonnet-Roser*'scher 605.
Drahtschiene, *Smith*'sche 511. 605.
Druckpuls bei Hirndruck 19.
v. Dumreicher'sche Distractionsmethode 299.
— 'scher Eisenbahnapparat 490.
Dupuytren'scher Schienenverband für Malleolarfracturen 646.
Dysphagia *Valsalvae* 76.

E.

Eisenbahnapparat, *v. Dumreicher*'scher 490.
Ellenbogengelenk, Anatomie 288.
— Differential-Diagnose der Verletzungen 318.
— Luxationen 288.
— — beider Vorderarmknochen 293.
— — — — divergirende 309.
— — — — nach hinten 293. 321.
— — — — nach vorn 301.
— — — — zur Seite 303. 321.
— — eines Knochens s. Radius und Ulna.
— — Nachbehandlung 318.
— Umdrehungsluxation 303.
Epicondyli s. Femur und Humerus.
Epilepsie infolge von Schädelfracturen 25.
Epiphysenlösungen, traumatische am Femur 498. 521.
— — am Humerus 240. 263. 276. 320.
— — an der Tibia 613. 622.
Epistropheus, Fracturen des Processus odontoideus 86.
Extension, permanente 108.
Extensionsschiene, *Bardenheuer*'sche s. *Bardenheuer*.

F.

Femur, Anatomie 463.
— Epiphysenlösungen am obern Ende 498.
— — am untern Ende 521.
— Fracturen 463.
— — ambulante Behandlung 517.
— — der Condylen 523.
— — der Diaphyse 499.
— — des Halses 468.
— — — — extracapsuläre 473. 496.
— — — — intracapsuläre 471. 495.
— des Kopfes 467.
— — des Trochanter major 497.
— — des untern Endes 520.
— Luxationen s. Hüftgelenk.
— Spiralfracturen 501.
Fersenbein s. Calcaneus.
Fersenhöcker, Rissfractur 692.
Fibula, Fracturen 623.
— — des Köpfchens 623.

Fibula, Fracturen des Schaftes 625.
— Luxation im obern Gelenk 589.
— — im untern Gelenk 593.
— — totale 592.
Finger, Fracturen 380.
— Luxationen in den Interphalangealgelenken 405.
— — im Metacarpophalangealgelenk 402.
Fossa tympano-stylo-mastoidea 68.
Fourchette-Stellung der Hand bei Radiusfracturen 356.
Fracturen, ambulante Behandlung 491. 517. 607.
Fuss, Luxationen s. Talocrural- und Talotarsalgelenk.

G.

Gehirndruck 17. 22.
Gehirnerschütterung 15. 22.
Gehirn, Pulsation 14.
— Quetschung 20. 22.
— Shoc 15. 22.
— Vorfall 15. 20.
Gehverbände 491. 517. 607.
Genu valgum bei Patellarluxationen 559.
Gesichtsknochen, Fracturen 46.
*Glisson's*che Schlinge 108.
*Goeschel's*cher Verband für Clavicularfracturen 164.
Guttaperchaschienen 56 64.
Gypshanfschiene, *Beely's*che 250. 267. 286. 287. 328. 363. 490. 516. 525. 605. 648.
Gypskorsett, *Sayre's*ches 109.
Gypstricotschiene, *Braatz's*che 267.

H.

Haemoptoë bei Rippenfracturen 141.
Haemothorax bei Rippenfracturen 141.
Halbseitenläsion, *Brown-Séquard's*che 96.
Halswirbel, Beugungsluxationen 124.
— Fracturen 86.
— Luxationen 120.
— Rotationsluxationen 120.
Hand, Anatomie 369. 375. 381.
— Fracturen 375.
— Luxationen 369.
— — dorsale 370. 374.
— — volare 372.
Handwurzelknochen, Fracturen 376.
— Luxationen 381.
— — im Carpometacarpalgelenk 386.
— — im Intercarpalgelenk 383.
— — isolirte, einzelner Knochen 385.
Hautemphysem bei Kehlkopffracturen 78.
— — Nasenfracturen 49.
— — Oberkieferfracturen 55.
— — Rippenfracturen 141.
Heberahmen, *Volkmann-Hamilton's*cher 105. 486.
Heftpflaster-Extensionsverband, *v. Volkmann's*cher 487.
Heftpflaster-Verband, *Alcock's*cher 334.
— *Landerer's*cher 63.
— *Sayre's*cher 162.
— *Schönborn's*cher 163.
Herdsymptome bei Gehirnquetschung 20.
*Hessing's*cher Schienenhülsenapparat für Femurfracturen 518.
*Heusner's*cher Verband für Patellarfracturen 545.
Hirndruck s. Compressio cerebri.
Hüftgelenk, Anatomie 427.
— Contusion 482. 494.
— Differentialdiagnose der Verletzungen 494.
— Doppelluxationen 461.
— Fracturen der Pfanne 416. 437. 440.
— Luxationen 427.
— — Aetiologie 431.
— — doppelte 461.
— — Eintheilung und Frequenz 431.
— — nach hinten 433.
— — nach oben 460.
— — nach unten 458.
— — nach vorn 447.
— — Luxationen, Reposition blutige 446.
— — Repositionsmethoden 443. 451. 457.
— Luxatio ileo-ischiadica 436.
— — ileo-pectinea 448.
— — iliaca 433. 438.
— infracotyloidea 458.
— — infrapubica 452.
— — intrapelvica 461.
— — ischiadica 436. 439.
— — obturatoria 453.
— — perinealis 453. 456.
— — praecotyloidea 447.
— — pubica 448.
— — retrocotyloidea 433.
— — subspinosa 448.
— — supracotyloidea 460.
— — suprapubica 447. 495.
— Verletzungen, Differential-Diagnose 494.
Humerus, Anatomie 194. 230.
— Epiphysenlösungen, traumatische am obern Ende 240. 263.
— — — am untern Ende 276. 320.
— Fracturen 230.
— — des Caput humeri 232. 258.
— — des Collum anatomicum 233. 261.
— — des Collum chirurgicum 243. 262.
— — des Condylus externus 282
— — des Condylus internus 280.

Humerus, Fracturen der Diaphyse 264.
— — des Epicondylus externus 282.
— — des Epicondylus internus 279.
— — der Epiphysenlinien 240. 263. 276. 320.
— — des obern Endes 232.
— — des Processus cubitalis 277. 320.
— — supracondyläre 271. 247. 319. 320.
— — der Tubercula 236. 258. 259. 260.
— — des untern Endes 270. 284.
— Luxationen s. Schultergelenk.

I.

Iliosacralgelenk, Anatomie 408.
— Diastase 414.
— Luxationen 425.
Impressionen des Schädels 10.
Intercarpalgelenk Anatomie 381.
— Luxationen 383.
Interdentalschienen 56. 64. 65.
Irradiationsgesetz *Aran*'sches 36.
Jochbein, Fracturen 51.

K.

Kahnbein s. Os naviculare.
Kehlkopf, Fracturen 77.
Keilbeine s. Ossa cuneiformia.
Keilfractur, hintere obere der Wirbelkörper 85.
Kephalhämatom 13.
Kiefergelenk, Anatomie 67.
— Luxationen s. Unterkiefer.
Kniegelenk, Anatomie 570.
— Dérangement interne 585.
— Luxationen 570.
— — der Tibia nach hinten 577.
— — — — nach der Seite 581.
— — — — nach vorn 573.
— — der Zwischenknorpel 585.
— Rotationsluxationen 583.
Kniescheibe s. Patella.
Knöchel s. Malleolen.
Koelliker'sche Vorderarmschiene 363.
Kopf, Luxationen 117.
Kopfgeschwulst, *Pott*'sche 10.
Kragenschiene, *Albers*'sche 250. 286.
Kreuzbein, Fracturen 417.
— Luxationen 426.
Kyphose, traumatische 90.

L.

Lamina vitrea 6. 7.
— — Fracturen isolirte 7. 13.
Laminektomie 109.
Landerer'scher Heftpflasterverband 163.
Larynx, Fracturen 77.
Lendenwirbel, Fracturen 87.
— Luxationen 127.
Levis'sche Schiene 287.
Ligamentum *Bertini* 428.
— coraco-humerale 200.
Liquor cerebrospinalis, Ausfluss bei Schädelbasisfracturen 41.
— — Druckwirkung bei Schädelfracturen 9.
— — Verhalten bei Hirndruck 17.
Lochbrüche des Schädels 6.
Luftröhre, Fracturen 79.
Luxatio pedis sub talo s. Talotarsalgelenk.

M.

Malgaigne'sche Dislocationsform bei Humerusfracturen 233.
— Klammer 333. 548.
— Stachel 609.
Malleolen, Abductionsfracturen 636.
— Adductionsfracturen 634.
— Eversionsfracturen 636.
— Fracturen 626. 632.
— Inversionsfracturen 636.
— Pronationsfracturen 636.
— Supinationsfracturen 634.
— Verrenkungsbrüche 633.
Mastdarmlähmung bei Wirbelfracturen 94. 102. 107.
Meisselfractur des Radius 346.
Meningitis, septische 25.
Menisci des Kniegelenkes, Luxation 585.
Merkel'scher Sporn 465.
Messner'sches drehbares Bett 486.
Metacarpalknochen, Fracturen 377.
— Luxationen 386.
Metacarpophalangealgelenke, Luxationen 387.
Metatarsalknochen, Fracturen 700.
— Luxation aller 704.
— — einzelner 706.
Middeldorpf'sche Akidopeirastik 13. 535.
— Pressschienenverband 328. 365.
— Triangel 191. 251. 268.
Mitella, Anlegung der, bei Clavicularfracturen 161.
Mittelfussknochen s. Metatarsalknochen.
Mittelhandknochen s. Metacarpalknochen.
Muskelentzündung, ischämische, des Vorderarms 328.
Myelitis in Folge von Wirbelfracturen 102.

N.

Nase, Fracturen des knöchernen Gerüstes 47.
Nélaton'sche Pistolenschiene 363.
Nervus axillaris, Lähmung bei Schultergelenksluxationen 203. 210.
— peroneus, Verletzung bei Fibulafracturen 624.

Nervus radialis, Lähmung bei Humerusfracturen 266.
— — — bei Radiusfracturen 346.
— — — bei Radiusluxationen 315.
— ulnaris, Lähmung bei Humerusfracturen 275.
Neurose traumatische 92.

O.

Oberarm, Fracturen s. Humerus.
— Luxationen s. Schultergelenk.
Oberkiefer, Fracturen 53.
Oberschenkel, Fracturen s. Femur.
— Luxationen, s. Hüftgelenk.
Olecranon, Fractur 329.
— — b. gleichzeitig. Luxation 301. 302.
— Osteoklase bei veralteter Luxation 301.
Os cuboides, Fracturen 700.
— — Luxationen 702.
Ossa cuneiformia, Fracturen 700.
— — Luxationen 703.
Os naviculare manus, Fractur 377.
— — pedis, Fractur 700.
— — — Luxation 702.
Ozaena traumatica 50.

P.

Parirfractur der Ulna 341.
Patella, Anatomie 525. 553.
— Fracturen 525.
— — Behandlung durch Massage 546.
— — Behandlung operative 551.
— — subligamentöse 532.
— Inversion 567.
— Luxationen 553.
— — habituelle 569.
— — horizontale 564.
— — durch Torsion 561.
— — durch Verschiebung 556.
— — verticale 561.
— Refracturen 541.
— Secundärfracturen 528.
Peripatellarnaht 550.
Pes valgus in Folge von Malleolarfracturen 644.
Phrenicuslähmung bei Halswirbelfracturen 95.
Pistolenschiene, *Nélaton*'sche 363.
Planum inclinatum duplex 487. 509.
— — simplex 513.
Pneumothorax durch Rippenfracturen 141.
Popliteal-Schiene, *Volkmann*'sche 543.
Pott'sche Kopfgeschwulst 12.
— Seitenlage 509. 604. 646.
Pressschienen-Verband, *Middeldorpf*'scher 328 365.
Priapismus infolge von Wirbelfracturen 97.
Processus alveolaris mandibulae, Fracturen 58.
— — maxillae sup. Fracturen 53.
— condyloideus mandibulae, Fracturen 60.
— coracoideus scapulae, Fracturen 193.
— coronoideus mandibulae, Fracturen 60.
— — ulnae, Fracturen 297. 334.
— cubitalis humeri, Fracturen 277. 320.
— inframalleolaris calcanei, Fracturen 697.
— obliqui vertebrarum, Fracturen 82.
— odontoideus epistrophei, Fractur 86.
— spinosi vertebrarum, Fracturen 81.
— styloideus ulnae, Fractur 342. 353.
— transversi vertebrarum, Fracturen 82.
Prolapsus cerebri 15. 20.
Psychosen infolge von Schädelbrüchen 25.

Q.

Quadriceps-Atrophie 539, 546.
Querfortsätze s. Processus transversi.

R.

Radio-Carpalgelenk, Luxationen s. Hand.
Radio-Ulnargelenk unteres, Luxationen 367.
Radius, Fracturen 344.
— — des Halses 347.
— — des Köpfchens 344.
— — loco classico 350 374.
— — des Schaftes 348.
— — des unteren Endes 350. 374.
— Luxation 311.
— — mit Fractur der Ulna 314. 339.
— Meisselfractur 346.
— Subluxation bei Kindern 315.
Railway spine 92.
Rauchfuss'sche Schwebe 108.
Refracturen der Patella 541.
Rippen, Anatomie 137.
— Fracturen 135.
— Infractionen 139.
— Luxationen 148.
Rippenknorpel, Fracturen 146.
Roser'sche Dorsalschiene 363.
Roser-Nélaton'sche Linie 430.
Rückenmark, Verletzungen durch Fracturen 87. 92. 102.

S.

Sayre'scher Heftpflasterverband 162. 191.
— 'sches Gypskorsett 109.
Scapula, Anatomie 185.
— Fracturen 185.
— — des Acromion 191. 256.
— — des Collum chirurgicum 188. 256.
— — des Processus coracoideus 193.

Schädel, Anatomie 1.
— Elasticität 2. 36.
— Fracturen 1.
— Impressionen 10.
Schädelbasis, Fracturen 32.
Schädeldach, Contrafissuren 9.
— Depressionen 10.
— Fissuren 3.
— Fracturen 3.
— — complicirte 10. 13.
— — indirekte 9.
— - irradiirte 3.
Schaltknochen 1.
Schede'sche Vorderarmschiene 363.
Schenkelhalsbrüche s. Femur.
Schenkelsporn, *Merkel*'scher 465.
Scheuer'sche Beinlade 604.
Schiene, *Bardenheuer*'sche s. *Bardenheuer*
— *Braatz*'sche Spiralgypshanfschiene 365.
— *Bruns*'sche 515. 518.
— *Carr*'sche 363.
— Dentalschienen 56. 65.
— Drahtschiene *Smith*'sche 511. 605.
— — *Bonnet*'sche 481. 510. 605.
— *v. Dumreicher*'sche 440.
— *Dupuytren*'sche 646.
— Guttapercha-Schienen 56. 64.
— Gypshanfschiene *Beely*'sche s. Gypshanfschiene.
— Gypstricotschiene s. diese.
— *Hessing*'sche 518.
— Interdentalschienen 56. 64. 65.
— *Koelliker*'sche 363.
— Kragenschiene, *Albers*'sche 250. 286.
— *Levis*'sche 287.
— *Nélaton*'sche Pistolenschiene 363.
— Poplitealschiene. *Volkmann*'sche543.
— Pressschiene, *Middeldorpf*'sche 328. 365.
— *Roser*'sche 363.
— *Schede*'sche 363.
— *Senn*'sche 493.
— *Sharp*'sche 606.
— Spiralgypshanfschiene 365.
— *Volkmann*'sche T-Schiene 515.
— *Watson*'sche 543.
Schlinge, *Glisson*'sche 108.
Schlüsselbein s. Clavicula.
Schmetterlingsverband, *Bramann*'scher 544.
Schönborn'scher Heftpflasterverband 163.
Schulter, Contusion 253.
Schulterblatt s. Scapula.
Schultergelenk, Anatomie 194.
— Differential - Diagnose der Verletzungen 253.
— Luxatio axillaris 207.
— — erecta (*Middeldorpf*) 198. 207.
— — horizontalis 208.
— — infraspinata 225.
Schultergelenk, Luxatio praeglenoidalis 198.
— — retroglenoidalis 225.
— — subacromialis 225.
— — subclavicularis 207.
— — subcoracoidea 204. 257. 260.
— — supracoracoidea 209.
— Luxationen 194.
— — Complication mit Humerusfractur 224. 262.
— — doppelseitige 225.
— — habituelle 211. 228.
— — Nachbehandlung 227.
— — Reposition, blutige 224.
— — Repositionshindernisse 213.
— — Repositionsmethoden 215.
— — veraltete 222.
— Resection 224.
— Verletzungen, Differential-Diagnose 253.
Schwebe, *Rauchfuss*'sche 108.
Scoliose, traumatische 91.
Secundärfracturen der Patella 528.
Seitenlage, *Pott*'sche 509. 604. 646.
Senn'sche Schiene 493.
Septum, *Bigelow*'sches 465.
Sharp'sche Schiene 606.
Shoc 89.
Smith'sche Drahtschiene 511. 605.
Spina tibiae, Fractur 618.
Spiralgypshanfschiene *Braatz*'sche 365.
Spondylolisthesis infolge von Wirbelfracturen 104.
Sprunggelenk s. Talocruralgelenk.
Stauungspapille bei Hirndruck 19.
Steissbein, Fracturen 417.
— Luxationen 427.
Sternbrüche des Schädeldaches 5.
Sternocostalgelenke, Luxationen s. Rippen.
Sternum, Diastasen 130.
— Fracturen 129.
— Infractionen 131.
Stirnhöhle, Fractur der vordern Wand 44.
Stückbrüche des Schädeldaches 4.
Sustentaculum tali, Fracturen 696.
Symphysis ossium pubis, Anatomie 408.
— — — Luxationen 424.
— sacro-iliaca s. Articulatio sacroiliaca.

T.

Talocruralgelenk, Anatomie 626.
— Luxationen 650.
— — nach aussen 656.
— — nach hinten 654.
— — nach innen 659.
— — nach vorn 651.
— Rotationsluxationen 657.
Talotarsalgelenk Anatomie 629.
— Luxationen 662.

Talotarsalgelenk, Luxatio pedis sub talo nach aussen 665.
— — — — — nach hinten 667.
— — — — — nach innen 663.
— — — — — nach vorn 671.
Talus, Exstirpation 684.
— Fracturen 688.
— — der hintern Apophyse 689.
— Luxation, isolirte 672.
— — offene Reposition 684.
— Umdrehungsluxation 677.
Thränenwege, Verletzungen durch Nasenfracturen 49.
Tibia, Compressionsfracturen 614.
— Epiphysen-Lösungen traumatische 613. 622.
— Fracturen 612.
— — sog. intrauterine 623.
— — am oberen Ende 612.
— — des Schaftes 621.
— Luxationen s. Kniegelenk.
— Rissfracturen der Spina 618.
Tibio-Fibulargelenk, oberes, Luxationen 589.
— unteres, Luxationen 593.
Trachea, Fracturen 79.
Trepanation der Schädelhöhle 26. 30.
— des Wirbelkanals 109.
Triangel, *Middeldorpf*'scher 191. 251. 268.
Trochanter major, Fracturen 497.
Tubercula humeri, Absprengung bei Luxationen 202. 208.
— — Fracturen 236. 258.
Tuber ischii, Fracturen 417.

U.

Ulna, Fracturen 329.
— — des oberen Drittels mit Luxation des Radius 339.
— — des Olecranon 329.
— — — Processus coronoideus 334.
— — — Processus styloideus 342. 353.
— Luxationen 309.
— Parirfractur 341.
Unterkiefer, Fracturen 57.
— — des Alveolarfortsatzes 58.
— — des Processus condyloideus 60.
— — des Processus coronoideus 60.
— Luxationen 67.
— — habituelle 75.
Unterschenkel, Anatomie 593. 626.
— Fracturen 593.
— — ambulante Behandlung 607.
— — beider Knochen 594.
— — complicirte 599.
— — der Fibula s. diese.
— — intra partum entstehende 610.
— — der Malleolen 632.
Unterschenkel, Fracturen supramalleoläre 630.
— — der Tibia s. diese.
— Splitterfracturen 599.
— Torsionsfracturen 598.
Urin-Infiltration 420.
Urobilinurie bei Contusio cerebri 22.

V.

Vasomotorische Lähmungen infolge von Wirbelfracturen 97.
Verrenkungsbrüche des Unterschenkels 633.
Verticalfractur, *Malgaigne*'sche doppelte, des Beckens 415. 494.
Volkmann-Hamilton'scher Heberahmen 105. 486.
Volkmann'scher Heftpflaster-Extensionsverband 487.
— 'sche Poplitealschiene 543.
— — T-Schiene 515.
Vorderarm, Fractur beider Knochen 321.
— Luxation s. Ellenbogengelenk.

W.

Watson'sche Schiene 543.
Wirbel, Compressionsfracturen 83.
— Diastasen 113.
— Distorsionen 100.
— Fracturen 79.
— — Complicationen durch Rückenmarksverletzungen 87. 92. 102.
— — im Brusttheil 87.
— — im Halstheil 86.
— — der Körper 83.
— — im Lendentheil 87.
— — der Processus obliqui 82.
— — — spinosi 81.
— — — — transversi 82.
— hintere obere Keilfractur 85.
— Luxationen 110.
Wirbelkanal, Trepanation 109.
Wirbelsäule, Anatomie 79. 110.
Würfelbein s. Os cuboides.

Z.

Zange, *Collin*'sche 396.
Zehen, Fracturen 700.
— Luxationen 706.
— — in der Interphalangealgelenken 708.
— — im Metatarsophalangealgelenk 708.
Zungenbein, Fracturen 75.
Zwerchfell, Lähmung, bei Halswirbelfracturen 95.

Vor kurzem erschien im **Stahel**'schen Verlage in **Würzburg**:

Anleitung für Krankenpfleger

von

Dr. Albert Hoffa.

Gemeinverständliche Darstellung
der
Krankenpflege und Verbandlehre.

Taschenformat, gebunden **Mk. 1.—**, (franco auswärts Mk. 1.10.)
Briefmarken werden in Zahlung genommen.

Das vorstehende praktische Hilfsbuch, das sich den bisherigen, in allen Fachblättern hervorragend besprochenen Hoffa'schen Elaboraten würdig an die Seite stellt, darf den Anspruch erheben, klar, kurz und bündig, und damit voll und ganz zweckentsprechend geschrieben zu sein — ein Vorzug des Verfassers, in welchem ihm Wenige gleichkommen. Die Anschaffung dieses vorzüglichen Breviers empfiehlt sich allen **Frauenvereinen, Sanitäts-Kolonnen, jeder Hausfrau.**

Die körperliche Erziehung der Jugend.

Populär-wissenschaftlicher Vortrag
gehalten
in Würzburg am 28. November 1895
von

Privatdocent Dr. Albert Hoffa.

Preis 60 ₰.

Stahel's neuer Würzburger Führer.

Zugleich ein Auskunftsbuch für Einheimische. — Mit vielen schönen Abbildungen und einem guten Stadtplan. — ☛ Mit einem Anhang: Anleitung für Fremde, welche Würzburg's Spezial-Aerzte und Kliniken zu besuchen wünschen. ☚ Seitens der Kritik und von Sach- und Fachkennern anerkennend beurtheilt.

Taschenformat. ℳ 1.—

Ferner erschien im gleichen Verlage:

Der

acute Gelenkrheumatismus

und

DESSEN PSYCHISCHE BEHANDLUNG.

Eine Studie

von

Dr. Heinrich Stadelmann

prakt. Arzt in Saal a/S.

Mit einem Vorwort

von

Dr. Freiherrn von Schrenck-Notzing

prakt. Arzt in München.

Preis Mk 1.–.

Neue Auflage vom Brückenauer Führer.

Bad Brückenau und seine Kurmittel.

Neuester illustrirter Führer für Kurgäste u. Touristen.

Bearbeitet vom

königl. Brunnen- und Badearzt Hofrat Dr. Wehner.

Mit 7 malerischen Bade-Ansichten
und 1 Karte von Brückenau und Umgebung.

3. verbesserte Auflage.

Preis *M* **1**.—, (Kreuzband-Porto 10 ₰).

Ein Führer und Ratgeber ist vorliegende erneute und umgearbeitete Auflage in des Wortes vollster Bedeutung, zumal der Verfasser in fast 20jähriger Badepraxis seine Mitteilungen auf eigene Erfahrungen und Beobachtungen stützt und dadurch den Vorzug der Originalität besitzt. Die klimatischen, meteorologischen, medizinisch-statistischen Abschnitte, sowie die Fertigung einer Terrainkarte sind wertvolle Leistungen des um das Emporblühen des Kurortes verdienstvollen Verfassers. Die Schrift verdient die Aufmerksamkeit von Kurgebrauchenden nicht minder als von Aerzten, welche die Heilschätze des beliebten Bades kennen lernen wollen.

Stahel'sche k. Hof- und Universitäts-Buch- und Kunsthandlung in Würzburg.

☞ *Zur Kenntnissnahme: Unsere Verlags-Erscheinungen sind durch alle besseren Buchhandlungen zu erhalten; wo dies nicht der Fall, wende man sich an uns direct.*

In **5.** Auflage erschien bei uns:

Dr. Wilhelm Konrad Röntgen

ö. o. Professor an der k. Universität Würzburg:

Eine neue Art von Strahlen.

I. Mittheilung.

Preis 60 ₰.

Deutsche Briefmarken werden in Zahlung genommen.

In der vorliegenden Schrift, welche die **authentische Darstellung der sensationellen Entdeckung** in klarer und wissenschaftlich exacter Form enthält, äussert sich der Verfasser über die von ihm angestellten Versuche und die hierbei erzielten hochinteressanten Ergebnisse. Die Broschüre, welche in kurzer Zeit 5 Auflagen erlebt hat, haben wir auch in **englischer** (übersetzt von Dr. Albert Hoffa), und **italienischer** Sprache herausgegeben.

II. Mitteilung über eine neue Art von Strahlen.

Diese Publikation bildet die **Fortsetzung** der Anfang Januar erschienenen Arbeit des Verfassers und enthält eine Reihe **neuer Ergebnisse** der im Physikalischen Institut der Universität angestellten Versuche mit den X-Strahlen.

X-Strahlen-Bild

der

Hand Geheimrat v. Kölliker's.

Preis **50** ₰ (incl. Porto 60 ₰).

Deutsche Briefmarken werden in Zahlung genommen.

Diese Aufnahme ist um so interessanter, als sie **von Professor Röntgen selbst** und in jener denkwürdigen Sitzung der Physikalisch-med. Gesellschaft zu Würzburg am 23. Januar 1896 aufgenommen wurde, in welcher derselbe Mitteilung von seiner Entdeckung gemacht hat, und, weil es sich hier um die Hand des **berühmten Anatomen und Nestors der Würzburger Universität v. Kölliker** handelt.

Im Verlage der **Stahel'schen** k. b. Hof- und Universitäts-Buch- und Kunsthandlung in **Würzburg** erscheint und ist allerorts zu beziehen:

VERHANDLUNGEN
DER
PHYSIK.-MEDIZIN.-GESELLSCHAFT
ZU
WÜRZBURG.

HERAUSGEGEBEN
VON DER
REDACTIONS-COMMISSION DER GESELLSCHAFT:
PROF. DR. O. SCHULTZE.
PROF. DR. W. REUBOLD. PRIV.-DOC. DR. RICH. GEIGEL.

Mit lithographischen Tafeln und Text-Abbildungen.
Preis pro Band (Jahrgang) Mk. 14.—.
(Im Abonnement in abgeschlossenen Heften zu beziehen).

Inhalts-Verzeichnis des XXIX. Bandes, 1895.

Boveri, Theodor, Über das Verhalten der Centrosomen bei der Befruchtung des Seeigel-Eies, nebst allgemeinen Bemerkungen über Centrosomen und Verwandtes. Mit einer Textabbildung. — **Brandt, Karl**, Über die Bacterien des Lidrandes und Bindehautsackes, sowie über deren Beeinflussung durch verschiedenartige Verbände und Augensalben. — **Buehler, Anton**, Protoplasma-Structur in Vorderhirnzellen der Eidechse. Mit 3 lithographischen Tafeln. — **Fick, Adolf**, Arbeitleistung des Muskels durch seine Verdickung. Mit 2 Textabbildungen. — **Gattel, Felix**, Beitrag zur Kenntniss der motorischen Bahnen im Pons. Mit 1 lithographischen Doppeltafel. — **Michel, André**, Zur Kenntnis der Gürber'schen Serum-Albumin-Krystalle. Nebst einem Nachtrag von August Gürber. Mit 1 Lichtdruck-Tafel. — **Rieger, Konrad**, Die Psychiatrie in Würzburg von 1583 bis 1893. Fortsetzung aus Bd. XXVII (1893).

Inhalts-Verzeichnis des XXVIII. Bandes, 1894.

Anselm, Bernhard, Ueber den Eisengehalt in der Milch. — **Gürber, August**, Salze des Blutes: I. Salze des Serum. — **Hofmeier, Max**, Anatomische und klinische Beiträge zur Lehre von der ektopischen Schwangerschaft. Mit 1 lithographischen Doppeltafel und 6 Textabbildungen. — **Krischewsky, Jsack**, Zur Entwicklung des menschlichen Auges, nebst Anhang: Zur Aetiologie der angeborenen Lidkolobome. Mit 2 lithographischen Tafeln und 2 Tabellen. — **Nordmann, F.**, Ein Beitrag zur Lehre von der Bildung der Decidua. — **Schaumann, Hugo**, Beitrag zur Kenntniss der Gynäkomastie. — **Schultze, Oskar**, Ueber die Bedeutung der Schwerkraft für die organische Gestaltung, sowie über die mit Hülfe der Schwerkraft mögliche künstliche Erzeugung von Doppel-Missbildungen.

Sitzungsberichte der phys.-med. Gesellschaft

zu Würzburg. Herausgegeben von der Redaktions-Commission der Gesellschaft: Prof. Dr. *Oscar Schultze*, Prof. Dr. *W. Reubold*, Dr. *Rich. Geigel*. Preis pro Jahrgang *M* 4.—.

Medicinischer und naturwissenschaftlicher Verlag
der
Stahel'schen k. Hof- und Universitäts-Buch- und Kunsthandlung
in
Würzburg.

Aerztliches Geschäftstagebuch. Geschäftstagebuch für praktische Aerzte. 5. Auflage. In Leinwand-Mappe gebd., 1 Buch stark ℳ 5.—. In Leinwandmappe gebd., 2 Buch stark ℳ 7.20. Die sehr geschmackvollen Leinwand-Mappen sind derart eingerichtet, dass die verbrauchten Formularien*) herausgenommen und durch neue ersetzt werden können. Es bieten daher dieselben den Vorteil des langjährigen Gebrauchs.

*) Die Einlage apart zu dieser Leinwandmappe kostet: 1 Buch stark, gebunden: ℳ 3.20, 2 Buch stark, gebunden: ℳ 5,20.

Ankylostomum duodenale. Von Privatdoc. Dr. *O. Seifert*. Mit 1 lith. Tafel. Preis ℳ 1.—.

Atmung. Die Bedeutung der Nase für die Atmung von Dr. *T. Aschenbrandt*. Mit 1 Tafel. Preis ℳ 1.80.

Auge. Die Entwicklung des menschlichen Auges nebst Anhang: Zur Aetiologie der angeborenen Lidkolobome von Dr. *J. Krischewsky*. Mit 2 lithogr. Tafeln und 2 Tabellen. 1894. Preis ℳ 1.—.

Auswurf (Tuberkelbacillen). Untersuchungen des Auswurfs auf Tuberkelbacillen von Privatdocent Dr. *Heim*. Preis ℳ —.50.

Bacterien des Lidrandes. Ueber die Bacterien des Lidrandes und Bindehautsackes, sowie über deren Beeinflussung durch verschiedenartige Verbände und Augensalben von Dr. *Karl Brandt*. 1895. Preis ℳ —.60.

Bedeutung der Schwerkraft. Ueber die Bedeutung der Schwerkraft für die organische Gestaltung, sowie über die mit Hülfe der Schwerkraft mögliche künstliche Erzeugung von Doppelmissbildungen von Prof. Dr. *Oscar Schultze*. 1894. Preis ℳ —.60.

Bewusstsein. Das Bewusstsein und seine physiologischen Veränderungen. Eine psychologische Studie von Dr. *Heinrich Stadelmann*. 1894. Preis ℳ —.75.

Bleivergiftung. Die Bleivergiftung. Die Unzulänglichkeit der anatomischen Untersuchung des Nervensystems und die Notwendigkeit einer chemischen Analyse des Nervenstoffwechsels und der Nervensubstanz. Von Dr. *Rudolf Goetze.* 1893. Preis ℳ 1.—.

Blutsalze. Salze des Blutes. I. Teil: Salze des Serum. Von Dr. med. et phil. *Aug. Gürber.* 1895. Preis ℳ —.60.

Blüthen-Farbstoffe. Farbstoffe der Blüthen und Früchte von Prof. Dr. *A. Hansen.* Mit 2 Spektraltafeln. 1884. Preis ℳ 1.50.

Botanik. Repetitorium der Botanik für Mediciner, Pharmazeuten und Lehramts-Canditaten von Prof. Dr. *A. Hansen.* 5. Aufl. Mit 41 Abbildungen. 1896. Preis brosch. ℳ 3.20, gebd. ℳ 3.80.

Casuistische Beiträge zur Chirurgie von Dr. *A. Hoffa.* Preis ℳ —.50.

Centrosomen. Ueber das Verhalten der Centrosomen bei der Befruchtung des Seeigel-Eies nebst allgemeinen Bemerkungen über Centrosomen und Verwandtes von Professor Dr. *Th. Boveri.* Mit 1 Text-Abbildung. 1895. Preis ℳ 2.—.

Decidua-Bildung. Beitrag zur Lehre von der Bildung der Decidua von Dr. *F. Nordmann.* 1894. Preis ℳ —.60.

Ektop. Schwangerschaft. Anatomische und klinische Beiträge zur Lehre von der ektopischen Schwangerschaft von Prof. Dr. *Hofmeier.* Mit 1 lithogr. Doppeltafel und 6 Textabbildungen. 1894. Preis ℳ 1.50.

Eleidin. Untersuchungen über das Eleidin und den Verhornungsprocess der Pars cardiaca des Magens der Säugetiere von Dr. *L. Sclavunos.* Mit 1 Tafel. Preis ℳ 1.—.

Die Eingeweidemelanose von Prof. *R. Bonnet.* Mit 1 Tafel. Preis ℳ 2.—.

Farbenreactionen. Zur Charakteristik einiger physiologisch und klinisch wichtigen — von Dr. *F. W. Kruckenberg.* Mit 1 lith. Tafel. Preis ℳ 1.40.

Fäulnissbakterien. Weitere Beiträge zur Kenntniss der Fäulnissbakterien von Dr. *A. Hoffa.* Preis ℳ —.50.

Fiebertabellen. **Temperaturkurven** für Aerzte, Naturforscher etc.

Ausg. A.: 8 Stück kleineren Formats (40 × 90 mm) und 6 Stück grösseren Formats (50 × 216 mm). Preis in Couvert ℳ —.40.

Ausg. B. (für Würzburg bearbeitet): 9 Tafeln im Format von 88 × 252 mm. Preis in Couvert ℳ —.40.; 20 Stück ℳ —.90. 100 Stück ℳ 3.—.

Fracturen und Luxationen. Lehrbuch für Aerzte und Studirende von Dr. *A. Hoffa.* 3. Auflage. Mit 408 Abbildungen im Text und 29 color. Tafeln. Brosch. Preis *M* 20.—, stark gebdn. Preis *M* 22.50.

Gehirn-Untersuchung Untersuchungen an zehn Gehirnen von Verbrechern und Selbstmördern von Dr. *E. Schweckendiek.* Mit 2 Tafeln. Preis *M* 2.80.

Gelenk-Rheumatismus. Der akute Gelenkrheumatismus und dessen psychische Behandlung von Dr. *Heinrich Stadelmann.* Mit einem Vorwort und einem Litteraturbericht von Dr. *Freiherrn v. Schrenck-Notzing.* 1895. Preis *M* 1.—.

Geologie der Rhön. Zur geologischen Kenntniss der südlichen Rhön von Dr. *Hans Lenk.* Preis *M* 3.—.

Geotriton fuscus. Beiträge zur Kenntnis des Geotriton fuscus von Dr. *G. Fischer.* Mit 2 Tafeln. Preis *M* 2.—.

Geschlechtsorgane. Ueber die Variabilitäten der Entwicklung derselben beim Menschen von Privatdoc. *R. Geigel.* Mit 2 Tafeln. Preis *M* 1.80.

Geschmacksknospen. Die Geschmacksknospen in den blattförmigen Papillen der Kaninchenzunge. Eine histolog. Studie von Privatdoc. *M. v. Lenhossék.* Mit 2 Tafeln: 1 in Farbenlithographie und 1 in Lichtdruck. 1894. Preis *M* 3.—.

Gonorrhoe. Ueber Mischinfektion bei Gonorrhoe von Dr. *Gerheim.* Preis *M* 1 20.

Gonorrhoea rectalis. Von Dr. *Franz Frisch.* Mit 1 colorierten Doppeltafel. Preis *M* 1.20.

Gynaekomastie. Beitrag zur Kenntniss der Gynaekomastie von Dr. *Hugo Schaumann.* 1894. Preis *M* —.60.

Harnblase. Die Entwicklung der Harnblase und Harnröhre von Dr. *Paul Reichel.* 1894. Mit 3 lithogr. Tafeln. Preis *M* 2.—.

Härte des Stahls. Ueber den Einfluss der Härte des Stahls auf dessen Magnetisirbarkeit und des Anlassens auf die Haltbarkeit der Magnete von *Strouhal* u. *Barus.* Mit 2 Tafeln. Preis *M* 2.40.

— Ueber Anlassen des Stahls. Von demselben. Mit 1 Tafel. *M* 1.20.

Hautkrankheiten. Beiträge zur Anatomie und Aetiologie einiger Hautkrankheiten von Dr. *du Mesnil.* Mit 2 Tafeln. 1890. Preis *M* 2.—.

Hauttransplantation. Die Hauttransplantation nach Thiersch von Dr. *Max Jungengel.* Mit 2 farbigen Tafeln. 1891. Preis *M* 2.—.

Hermaphroditismus. Ein Beitrag zur Lehre von demselben von *H. Reuter.* Mit 1 lithogr. Tafel. Preis *M* 2.60.

Hüftgelenksverrenkung. Operative Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkungen von Dr. *A. Hoffa.* Preis ℳ —.50.

Impf-Keratitis, septische, von Dr. *G. Rindfleisch.* Mit 1 lithogr. Tafel. Preis ℳ 1.20.

Intelligenzstörungen. Beschreibung der Intelligenzstörungen in Folge einer Hirnverletzung. Von Prof. Dr. *C. Rieger.* Preis ℳ 4.—.

Kenntniss der Wasser. Beiträge zur Kenntniss der Wasser aus den geschichteten Gesteinen Unterfrankens von Dr. *Fr. Pecher.* Preis ℳ 2.40.

Kephir. Historische und experimentelle Studien über den Kephir von Dr. *J. Theodoroff.* Preis ℳ 1.20.

Kieselschiefer. Beitrag zur Kenntniss des Kieselschiefers von Dr. *G. Greim.* Mit 1 Tafel. Preis ℳ 1.50.

v. Kölliker, Dr. A., Ueber den feineren Bau des Rückenmarks. 1. Mitteilung. Preis ℳ 1.—.
2. „ (Fortsetzung.) Pr. ℳ —.30.

— Zur Entwicklung des Auges und Geruchsorganes menschlicher Embryonen. Mit 4 Tafeln. Preis ℳ 3.20.

— Zur Kenntniss des Baues der Lunge des Menschen. Mit 4 farbigen Quarttafeln. Preis ℳ 3.—.

— Der feinere Bau und die Funktionen des sympathischen Nervensystems. 1894. Preis ℳ —.60.

Körperliche Erziehung. Die körperliche Erziehung der Jugend von Dr. *A. Hoffa.* 1896. Preis ℳ —.60.

Krankenpflege. Anleitung für Krankenpfleger. Gemeinverständliche Darstellung der Krankenpflege und Verbandlehre von Dr. *A. Hoffa.* 1894. Preis gebunden ℳ 1.—. (Besonders geeignet für Sanitäts-Colonnen, barmherzige Schwestern, Vereine für Gesundheitspflege etc. etc.)

Kropfoperationen. Die Folgen der Kropfoperationen von Dr. *A. Hoffa.* Mit 3 Tafeln. Preis ℳ 2.—.

Leber-Atrophie. Acute gelbe Leber-Atrophie mit günstigem Ausgang v. Dr. *Ed. Wirsing.* 1892. Preis ℳ —.80.

Lungenschwindsucht. Die Behandlung der Lungenschwindsüchtigen von Dr. *Georg Sticker.* 1893. Preis ℳ 1.—.

Main-Kanalisation Der Einfluss der Würzburger Schwemmkanalisation auf den Main. Von Dr. *Hermann Fitzau.* Mit 1 Kärtchen, die Kanalisation Würzburgs darstellend. 1893. Preis ℳ 1.—.

Medullarplatte des Froscheies. Ueber die Entwicklung derselben von Prof. Dr. *O. Schultze.* Mit 2 lithogr. Tafeln. Preis ℳ 2.—.

Messung von Erdräumen. Studien zur Messung der horizontalen Gliederung von Erdräumen von Privatdoc. Dr. *K. Ehrenburg.* Mit 2 Tafeln. 1891. Preis ℳ 2.–.

Milchdrüsen. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte derselben von Prof. Dr. *Oscar Schultze.* Mit 2 lithograph. Tafeln. 1893. Preis ℳ —.80.

Missbildung des Herzens. Eine seltene Missbildung des Herzens von Dr. *O. Stadler.* Mit 1 Tafel. 1890. Preis ℳ 2.—.

Motorische Bahnen. Beitrag zur Kenntnis der motorischen Bahnen im Pons von Dr. *Felix Gattel.* Mit 1 lithogr. Doppel-Tafel. 1895. Preis ℳ 1.50.

Muskel. Arbeitsleistung des Muskels durch seine Verdickung von Professor *Adolf Fick.* Mit 2 Textabbildungen. 1895. Preis ℳ —.60.

Muskelknospen. Beiträge zur Kenntniss der Muskelknospen von Dr. *O. von Franqué.* Mit 1 Tafel. 1890. Preis ℳ 2.—.

Muskeln. Haltung, Heizung und Bewegung der Muskeln. Von Prof. Dr. *Conrad Rieger.* 1893. Preis ℳ 1.—.

Myothermische Fragen und Versuche von Prof. *A. Fick.* Mit lithogr. Tafel. Preis ℳ 1.20.

Nahrungsmittelprüfung. Gerichtlich - chemische Prüfung von Nahrungs- und Genussmitteln von Prof. Dr. *L. Medicus.* Preis ℳ 3.—.

Ohrenschmalzdrüsen von Dr. *A. Alzheimer.* Mit 2 Tafeln. Preis ℳ 2.—.

Ohr. Beitrag zur Topographie der äusseren Ohrtheile mit Berücksichtigung der hier einwirkenden Verletzungen von Prof. Dr. *W. Kirchner.* Mit 1 lithogr. Tafeln. Preis ℳ 2.—.

Ophtalmotonometer, neues, von *Rud. Arm. Fick.* Mit 1 lithogr. Tafel. Preis ℳ 2.—.

Organische Präparate. Anleitung zur Darstellung organischer Präparate von Prof. Dr. *E. Fischer.* 5. Aufl. 1896. Mit 20 Abbildungen. Preis gebd. ℳ 1.80.

Orthopädische Gymnastik auf Grundlage der Therapie der Scoliose von Dr. *F. Staffel.* Mit 1 Tafel und 15 Xylographieen. Preis ℳ 2.—.

Palaeontologische Beiträge von Dr. *K. Flach.* Mit 1 Tafel. Preis ℳ 1.—.

Paranephritis, die abscedirende und ihre Behandlung von Dr. *A. Rosenberger.* Preis ℳ 1.80.

Parthenogenetische Furchung. Ueber die sogenannte parthenogenetische Furchung des Froscheies von Dr. *Hans Dehner.* Mit 1 Lichtdruck-Tafel. 1892. Preis ℳ —.80.

Pathologische Befunde. Schemata des menschlichen Körpers zum Einzeichnen pathologischer Befunde. 32 Schemata auf 3 Blatt. Zum Gebrauche in Kliniken zusammengestellt von einem Kliniker. 3. Auflage. 1894. Preis gummirt und perforirt ℳ —.75, im Partiebezug billiger.

Pflanzenfamilien. Systematische Charakteristik der medicinisch-wichtigen Pflanzenfamilien nebst Angabe der Abstammung der wichtigeren Arzneistoffe des Pflanzenreichs von Prof. Dr. *A. Hansen.* Preis gebunden ℳ 1.—.

Processus mastoideus. Klinische Beobachtungen über Eröffnung des Processus mastoideus von Dr. *H. Kanasugi.* Mit 2 Textabbildungen. Preis ℳ —.60.

Protoplasma-Structur in Vorderhirnzellen der Eidechse von Dr. *A. Buehler.* Mit 3 lithogr. Taf. 1895. Preis ℳ 1.50.

Psychotherapeut, der. Für Ärzte. Von Dr. *Heinrich Stadelmann.* 1896. Preis ca. ℳ 3.—. (Im Erscheinen.)

Raumerfüllung. Die stetige Raumerfüllung durch Masse von Prof. Dr. *A. Fick.* Preis ℳ 1.—.

Salamandrina perspicillata siehe **Dr. Wiedersheim.**

Sandberger. Neue Beweise für die Abstammung der Erze aus dem Nebengestein. Preis ℳ —.80.

— Die Mollusken von Unterfranken diesseits des Spessarts. Preis ℳ 1.-.

— Die Verbreitung der Mollusken in den einzelnen natürlichen Bezirken Unterfrankens und ihre Beziehungen zu der pleistocänen Fauna. Preis ℳ 1.—.

— Ueber die Ablagerung der Glacialzeit und ihre Fauna bei Würzburg. Preis ℳ —.60.

— Die Lagerung der Muschelkalk- und Lettenkohlen-Gruppe in Unterfranken. Preis ℳ —.60.

Schädellehre. Die Beziehungen der Schädellehre zur Physiologie, Psychiatrie u. Ethnologie von Prof. Dr. *Rieger*. ℳ 4.—.

Seekreiden. Beitrag zur Kenntniss der Seekreiden und des kalkigen Teichschlammes der jetzigen und früherer geologischen Perioden von Dr. *C. A. Wiesner*. 1892. Preis ℳ —.80.

Seltene Missbildung. Fehlen des Penis und des Afters, Communication zwischen Blase und Rectum von Dr. *Adam Voll*. Mit 2 lithogr. Tafeln. 1889. Preis ℳ 2.—.

Semper. Gedächtnisrede auf Prof. Dr. *Carl Semper* von Dr. *August Schuberg*. Mit dem Bildnis Semper's und einem chronolog. Verzeichnis der Semper'schen Schriften. Preis ℳ —.60.

Serum-Albumin. Zur Kenntniss der *Gürber*'schen Serum-Albumin-Krystalle von Dr. *A. Michel*. Nebst einem Nachtrag von Dr. med. u. phil. *Aug Gürber*. Mit 1 Lichtdruck-Tafel. 1895. Preis ℳ 1.—.

Sitzungsberichte der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg. Herausgegeben von der Redactions-Commission der Gesellschaft Prof. Dr. *Oscar Schultze*, Prof. Dr. *W. Reubold*, Dr. *Rich. Geigel*. Preis pro Jahrgang ℳ 4.—.

Spaltpilzuntersuchung. Biologische Spaltpilzuntersuchung der Staphylococcus pyogenes aureus und der Osteomyelitiscoccus von Dr. *A. Lübbert*. Mit 2 Tafeln. Preis ℳ 3.50.

Strahlen. Eine neue Art von Strahlen. Von Professor Dr. *W. C. Röntgen*. I. und II. Mitteilung. Preis à ℳ —.60.

Temperatur-Curven siehe **Fiebertabellen.**

Triasformation im nordöstlichen Westfalen und einigen angrenzenden Gebieten. Mittheil. von Dr. *E. Carthaus*. Mit 1 Profiltafel und 1 in Farbendruck. Preis ℳ 3.80.

Triton helveticus und Rana agilis. Beiträge zur Kenntnis der Thierwelt Unterfrankens von Dr. *F. Leydig*. Preis ℳ —.80.

Tröltsch. Rede zum Gedächtniss des Prof. Dr. *Tröltsch* von Prof. Dr. *W. Kirchner*. Preis ℳ —.20.

Ulcus molle. Historisch-kritische Studie von Dr. *L. Friedheim*. Preis ℳ 1.50.

Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg. Herausgegeben von der Redaktions-Commission der Gesellschaft: Prof. Dr. *O. Schultze*, Prof. Dr. *W. Reubold*, Dr. *Rich. Geigel*. Preis pro Jahrg. ℳ 14.—.

Virchow, Prof. Dr. H., Ueber die Gefässe der Chorioidea des Kaninchens. Mit 1 lithogr. Tafel. Preis ℳ 1.60.

— Beiträge zur Kenntniss der Bewegungen des Menschen. Preis ℳ 1.—.

Vogeleierschalen, deren Farbstoffe, von Dr. *F. W. Krukenberg*. Mit 3 Tafeln. Preis ℳ 1.20.

Wiedersheim, Dr. Rob., Salamandrina perspicillata und Geotriton fuscus. Versuch einer vergleichenden Anatomie der Salamandrinen. Mit besonderer Berücksichtigung der Skelet-Verhältnisse. Mit 17 lithogr. Tafeln und 3 Holzschnitten. Preis ℳ 8.—.

Notiz für den Buchbinder.

Die Tafeln sind den nachbezeichneten Seiten **gegenüber** einzuheften:

Tafel 1	Seite 59	Tafel 16	Seite 339
„ 2	„ 154	„ 17	„ 343
„ 3	„ 190	„ 18	„ 349
„ 4	„ 204	„ 19	„ 356
„ 5	„ 246	„ 20	„ 415
„ 6	„ 265	„ 21	„ 438
„ 7	„ 272	„ 22	„ 450
„ 8	„ 296	„ 23	„ 454
„ 9	„ 302	„ 24	„ 460
„ 10	„ 302	„ 25	„ 476
„ 11	„ 307	„ 26	„ 503
„ 12	„ 308	„ 27	„ 504
„ 13	„ 315	„ 28	„ 600
„ 14	„ 324	„ 29	„ 636
„ 15	„ 325		

FRITZ GAL
MÜNCHEN

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Hoffa, Albert,

Lehrbuch der Fracturen und Luxationen für Ärzte und Studierende

Würzburg 1896

Chir. 137 kmcb
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11804351-9